四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第六七冊目次

普濟方一百六十八卷　存三十五卷（八至十　十六至二十一　二十三至二十七
三十四至三十六　四十至四十三　一百二十四　一百三十二至一百三十四
一百四十九　一百五十四　一百五十八至一百六十五）（二）　（明）朱橚撰　明鈔本　〇〇一

普濟方一百六十八卷 存三十五卷（八至十十六至二十一 二十三至二十七 三十四至三十六 四十至四十三 一百二十四一百三十二至一百三十四 一百四十九一百五十四 一百五十八至一百六十五）

（二）

（明）朱橚撰

明鈔本

普濟方卷之三十五目錄

○諸風門 類十四 方三百二十六 論二道 法一道

中風失音不語 中風舌強不語 風口噤
風癔 風口眼喎斜 風癱瘓
中風身體不隨 中風半身不遂 風腰脚不隨
風脚軟 風不仁 風腿腱
柔風 風癬[illegible]

○中風失音不語 論一道 方三十二方

羚羊角湯 薑附湯 大續命湯 又方 又方
治風冷失聲咽喉不利 羌活人參湯 治中風筋脉拘急語音
[illegible]湯 治若卒中冷聲嘶啞者 地黃湯 竹瀝湯
[illegible]白朮湯 梔子仁酒 獨活散 羌活湯 治卒不得語方
芥子膏 竹豆湯 紫桂散 大豆煎方 菖蒲飲
治風冷失聲咽喉不利 治卒失音 荊瀝飲子 烏金煎
白礬丸 獨竹散 治中風失音 治卒風不得語 桂心方
治卒失聲聲噎不出 又方 治風冷失聲咽喉不利
取涎丸 通關散 桂心散 治卒不得語 獨活湯
烏藥散 治失音 治中風失音方治失音不語吃病者
治中風失音并一切風疾 治失音不語 治卒失音 治風卒不語方
治卒閤風失音不語者 治中風失音 治感風不能言
治中賊風口偏不能語者 治中風卒不得語

○中風舌強不語 論一道 方二十四方

羌活湯 天麻散 牛黃丸 黃芩湯 附子湯
羚羊角湯 五味飲子 醋石榴飲子 雄黃丸 天南星散
麻黃湯 防風湯 獨活散 醒脾丸 竹瀝湯
[illegible]氣飲 三聖散 白礬散 桂心方 獨活酒
正舌散 茯神散 治中風不能語 治卒風不得語

○風口噤 論一道 方四十一方

竹瀝湯 甘竹瀝湯 羚羊角散 防風散 金虎丹
烏犀丸 枳殼散 [illegible]散 漢防己散 防己湯
獨活散 消梨飲子 海帶散 烏梅飲 獨活飲
獨活酒 治風涎發動口噤不開方 通頂散 開關散
治失音不語精神昏憒者 治中風口噤不開不知人事
治中風口噤不開方 備急膏 白朮飲
吳茱萸湯 附子散 白礬散
治中風口噤不開 治大人小兒噤口風
治中風通身冷口噤不知人者 搐鼻法 附子散
治中風牙關緊急方 白神散 大豆酒
治中風口噤不能言方 治中風口噤不開涎潮吐涎方
[illegible]方 芥子膏 治大人小兒口噤不開[illegible]者 治男女中風口[illegible]

○風癔 論一道 方十三方

金箔丸 羚羊角散 防風湯 麻黃湯 麻黃散 桂心散
又方 獨活湯 正舌散 治風癔精神不明舌強語澀[illegible]方
馬尾散 治風癔舌強不語 治風癔不語體強

風口眼喎斜 論一道 法一道 方七十三方

追風丸 騎馬丹 [illegible]散 烏蛇丸 烏藥順氣散
麻黃湯 換骨丹 不換金丹 獨活散 天麻丸
驅風散 防風散 羌活散 麻黃散 芎芎散
酸棗仁散 搜風順氣丸 治耳鳴偏方 葛根湯 防風湯
天南星丸 天麻散 木麻湯 天雄散 勻氣散
防風湯 追風丸 乾薑附子湯 白聖散 烏薑丸
人參丸 聖散子 治男入[illegible]使人瘖瘂卒死 一字散

大豆酒　吴茱萸湯　蒜灸法　石灰膏　又方
治一切風口眼偏斜（一名摄风）　草麻膏　又方　治口喎
治中風口偏不正　松葉　油麻酒　蠶沙浸酒
治中風口面喎僻不正　蜘蛛摩方　白膏　治偏風口面喎斜
治卒中風口喎不正　皂角膏　治中風口眼喎斜
治患風牽引眼目及口角喎斜　御藥院風膏（一名草麻膏）　救急方
治中風口喎　桂心方　積年痰飲流成風　眼喎斜重直
治風痰手足疼痛口眼喎斜　續命丹　犀角防風湯　至聖保命金丹
牛黄通膈湯　三祕散　肉桂熨法　秦艽升麻湯　消風散
天麻丸　大聖鎮風金丹　清涼丹　治中風口喎

風癱瘓　論一道　法一道　方一百六十首

大聖花蛇牛黄丸　換骨丹　麻黄丸　牛黄丸
荊芥散　金眼如聖煎丸　羌活散　天麻浸酒方　天雄丸
烏蛇丸　海桐皮丸　秦艽散　側子散　威靈仙丸
金虎丸　療癱緩風神驗黑神丸　舒筋保安散　愈風丹
腦麝祛風丸　活絡丹　沉香煎丸　躑躅丸　天南星丸
槐膠丸　防風散　虎骨酒　龍虎丹　紫金天麻丸
黑龍丹　神應丹　豨薟草法　伏虎丹　青金丹
四神救苦散　無比膏　天麻丸　治癱瘓手足不隨方
鎮心散　追魂散　續命湯　排風散湯　又左經丸
生地黄飲子　烏龍丸（一名鐵彈丸）　輕腳丸　拔楊丸
烏龍丹　左經丸　又方左經丸　四聖七寶金丹　四生丸
殭蠶丸　妙聖丸　小省風湯　小靈寶三倍丸　拔殺散
牝子丸　木香湯　保安丸　治熱風癱瘓常發者
獨勝散　治中風癱瘓　治癱瘓新得患及年深者　豆豉飲
治癱瘓風及諸風手腳不遂　大聖丸　搜肝散　至聖一醉膏
茵草散　大聖一草散　寶命丹　輕骨丹　經進[illegible]
黄氏必安丹　太乙丹　輕骨龍虎丸金丹　黄龍丸　乳香宣筋丸
青龍丹　防風煙黄丸　萬金丸　虎骨丸　保命龍虎丸

除風丸　赤金丸　紫金丸　麝香輕骨丹　黑神丸
四君子湯　龍珠丹　祛風保安丹　御藥院神賜丹　神仙秘寶丹
起癱丹　神仙丹　大通丸　石蓮丸　玳瑁丸
如聖散　換骨丹　作骨法　如神散
治諸風癱瘓及丹石風毒治風癱瘓　療癱瘓諸風手足不遂
麻黄酒

中風身體不隨　論一道　法一道　方三十九方

潤體丸　酒浸藥仙方　白龍丸　丹砂丸　仙靈脾散
石斛浸酒方　側子散　骨碎補湯　犀角湯　又藥丸
五加皮散　赭石搖煎　海桐皮丸　青龍丸　大四斤丸
蝎附散　附子散　夜合枝釀酒　附子湯　生地黄煎
羚羊角煎　赤箭丸　附子散　天麻丸　烏鷄散
蒴藋煎　天麻丸　獨活湯　白术釀酒
治男子婦人中風不能轉側　趁風膏　防風湯　大豆浸酒
治人不隨　治身中有攣痛不隨　又方
局方烏荊丸　果皮丸　治手腳不隨等風　導引法

中風半身不隨　論一道　方六十二方

鐵骨丹　烏犀丸　天雄丸　秦艽散　茯神湯
天麻散　赤箭丸　仙靈脾浸酒方　荊瀝湯　白鮮皮湯
黑龍丸　側子湯　白芷湯　摩挲丸　八風九州湯
化風丹　附子散　三石丸　御風丹　麻黄散
仙酒方　人參湯　活絡通經丸　天真丸　獨活湯
葛根湯　芎藭湯　獨活散　牛膝散　牛黄丸
防己湯　麻黄防風湯　芍藥湯　羚羊角湯　加味青州白丸
省風湯　安胃湯　祛風導氣化痰丸　踈風湯
乾薑附子湯　輕骨丹　趁風膏　枲耳散　八生飲子
舒筋丸　附子大獨活湯　風藥聖餅子　治一切風疾半身不遂
搜風順氣飲子　治風半身不遂　加減沖和湯

當歸連翹湯 玄參升麻湯 大阿膠丸 乳香宣經丸 八味順氣散
烏金煎 聖散子 治熱風中人悶倒不知人事 治風痰鼓凝方
治熱風中人悶倒不知人事 治大風半身不遂

風腰脚不隨

論一道 方三十一方

金虎丹 羌活丸 乾地黃丸 竹瀝湯 茯神丸
萬金散 白蘚皮湯 萆薢丸 牛膝湯 黃耆湯
巴戟湯 桑寄生丸 牛膝丸 附子散 茯苓湯
杜仲酒 萆薢散 雄豆散 紫威散 蒴藋散
治一切風筋骨節攣急腰脚不隨 治骨軟風腰膝疼行履不得

風脚軟

論一道 方二十八方

烏頭丸 透骨丸 仙靈脾散 側子丸 天雄散
海桐皮浸酒方 獨活散 烏金煎方 仙靈脾煎丸
牛膝散 蒴藋煎丸 桑枝煎方 海桐皮酒 巴戟天飲
巴戟酒 白朮丸 木瓜丸 附子羌活散 萆薢丸
附子丸 天雄煎丸 何首烏丸 石髓丸 四斤丸
活血丹 治風軟脚 治遍風脚手軟痺 治風軟脚

風不仁

論一道 法一道 方二十九方

苦參散 大風烏蛇散 烏蛇散 烏頭摩風膏 犀角丸
白花蛇丸 羌活散 白頭翁丸 追風丸 八風湯
烏鷄丸 一字散 牛膝天麻丸 秦艽湯 天南星丸
烏蛇丸 牛膝散 烏頭丸 茵芋酒 五參散
摩風膏 附子散 烏頭丸 皂莢膏摩方
乳香丸 秦艽酒 防風湯 小防風湯
治中風身手痛不仁不隨 導引法

風腲腿

赤箭丸 五加皮湯 獨活散 防風湯 芎藭飲子

側子散 薏苡仁丸 獨活湯 防風散 防風湯
蒼耳湯浸淋方 杏仁醞酒 萆麻酒

柔風

論一道 方二十方

天雄丸 白花蛇散 酸棗仁煎 麻黃散 防風散
當歸散 獨活散 葛根散 萆薢散 大續命散
烏金煎丸 五枝煎 乳香煎丸 羌活湯一名葛根湯
附子煎 紫葛散 檉柳湯 地膚子散 茯苓丸
石膏散 仙人杖浸酒方 附子湯 枳殼煮散方 牛蒡酒

風嚲曳

論一道 方二十二方

赤箭丸 犀角丸 生犀天麻丸 當歸散 天麻丸
仙靈脾丸 獨活散 側子丸 天南星丸 小八風散
附子湯 羚羊角湯 防風散 獨活湯 天麻丸
獨活湯 羚羊角丸 薑附湯一名乾薑附子湯 百部散
烏龍丸 敗龜丸一名敗龜散 蘇木煎丸

普濟方卷之一十五目録

諸風門

中風失音不語 附論

夫喉嚨者氣之所上下也會厭者音聲之門戶其氣宣通則聲音無所阻礙若風邪搏於會厭則氣道不宣故令人失音入臟則不能語發千金方云風寒之氣客於中滯而不能發故瘖不能言及喉痺失聲皆風邪所為也入臟皆能殺人故附之於治風方之末凡尸厥而死脈動如故此陽脈下墜陰脈上爭氣閉故也針百會入三分補之灸熨斗熨兩脇下又竈突墨彈丸大漿水和服之又針足中趾頭去甲如韭葉又針足大趾甲下內側去甲三分

羚羊角湯 出聖濟總錄 治中風失音手足不隨

羚羊角鎊 芎藭 細辛去苗葉 木香 防風去叉

麻黃去節 獨活去蘆 當歸切焙 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮

天麻各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候一方加羌活用水酒煎服名天麻散

薑附湯 出聖惠方 治中風失音不語氣厥無脈手足拘急

乾薑炮 附子炮裂去皮臍 甘草炙 桂心去粗皮 當歸切焙

白朮 細辛去苗葉各一兩 麥門冬去心焙二兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服一方有獨活無杏仁名附子散

大續命湯 出千金方 治肝厲風卒然瘖啞及五臟偏枯賊風

麻黃八兩 桂心 乾薑 芎藭各二兩 黃芩

當歸各二兩 石膏二兩 杏仁三十枚 荊瀝一升

右㕮咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥煮取四升去滓又下荊瀝煮數沸分四服能言未瘥後服小續命湯舊無荊瀝今增之其效如神一方有甘草

又方 出千金方 治大風經臟奄忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不知

獨活 麻黃各三兩 芎藭 防風 當歸

葛根 生薑 桂心 茯苓 附子

細辛 甘草各一兩

右㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服老小半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩噦者加橘皮二兩若胸中吸吸少氣者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日以後更候視病虛實平論之行湯行針依穴灸之

又方 出千金方 治與前大續命湯同宜產婦及老少等並可

麻黃 芎藭各三兩 乾薑 石膏 人參

當歸 桂心 甘草各二兩 杏仁四十枚

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服外臺名續命湯

治風令失聲咽喉不利 凡此中風又有竹瀝諸湯甚多此用藥雖火而是將治所患一劑不差更應服之 出崔氏方

通草 乾薑 茯神各一兩 防風 桂心

石膏各二兩 麻黃一兩 白朮半兩 杏仁去皮 附子一兩

右為細末煉蜜和丸如大豆大每一服七丸稍增加之

羌活人參湯 治中風失音不語

羌活去蘆頭二兩 人參二兩 附子炮裂去皮臍 桂心去粗皮一兩

獨活去蘆頭三分 菖蒲 甘草炙二兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞入荊瀝竹瀝地黃汁共半盞同煎至一盞去滓溫服空心日午夜臥各一服

治中風筋脈拘急腰背強直失音不語 出聖惠方

黑鉛半兩 水銀半兩與鉛結砂子細研 天南星炮裂 白附子炮裂

犀角屑半兩 朱砂半兩細研 牛黃一分細研

右為末入研了藥更研令勻用軟飯和丸如菉豆大每服不拘時候

以消利示汁下五丸

四逆湯　治卒中風不能言厥逆無脉手足拘急者

山茱萸　細辛　乾薑各一　甘草炙三　麥門冬一升去心

右㕮咀以水七升煑取二升分為四服忌海藻菘菜生葱菜

治舌卒中冷聲嘶啞者

甘草一兩　桂心二兩　五味子二兩　杏仁三十　生薑八兩

右㕮咀以水七升煑取二升為二服飲之

地黄湯　治中風失音不語神効

生地黄汁　淡竹瀝　獨活　附子

右將二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入竹瀝地黄汁少許同煎一盞溫服空心日午夜卧各一服

竹瀝湯　治中風失音不語昏沉不識人

竹瀝　荊瀝　剉示汁各　陳醬汁

右相和煎一兩沸再濾一徧令溫細細灌入口中口噤斡開灌之

生附白朮湯　治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足緩縱漐漐自汗失音不語便利不禁

附子炮　乾薑各半　白朮一兩　甘草一分炙

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

栢子仁酒

栢子仁二兩　雞糞白炒二　桂去皮　生薑

右麁擣篩共炒令焦色乘熱投酒六升候冷濾去滓每服七分一盞空心日午夜卧服一方有黑豆無生薑

獨活散　治中風失音不語四肢強直

獨活　防風　秦艽　荊芥穗　白朮

葛根　附子　桂心　甘草

右為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服

羗活湯　治中風失音不語

羗活　甘草　人參　附子

荊瀝　竹瀝　生地黄汁

右將前四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞入三件汁瀝共半盞煎至一盞去滓溫服日三夜一一方加防風二兩

治卒不得語方

用酒五合和人乳汁中半分為二服

芥子膏　治中風卒不得語

竹豆湯　治中風失音不語

青竹茹　烏豆二升

右以水八升相和煑令豆爛去滓再煎取一升每服二合灌之或口噤不開者斡口灌

桂散　治中風失音不語

大豆煎方　治中風失音不語

大豆　生薑汁一合

右先用水五升煑豆至二升絞去豆入薑汁慢火煎如稀膏空心食後夜卧時各用一匙細細含嚥甚者用竹瀝二合調服之

菖蒲飲　治中風失音立効

菖蒲一分　桂一兩去皮

右麁擣篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治風冷失聲咽喉不利

用殭馬勃郎金令赤內一升苦酒中破一鷄子合和飲子

治卒失音

濃煑大豆汁如膏用火火含嚥汁服無豆用豉煑汁飲之亦可

荊瀝飲子　治中風失音不語手脚轉動不得

荊瀝三合　竹瀝三合　蜜一匙　生葛根汁二合

右件藥相和令勻不拘時候溫服二合

烏金煎　治中風失音不語煩熱頭痛

黑豆二升　羗活二兩　獨活二兩　荊芥一兩

右為末先以水五大碗煑黑豆令爛去豆取汁入諸藥末慢火煎十餘沸次漸入無灰酒一升煎為膏盛於瓷器中每服不拘時候以溫酒調下半匙頭

百癆丸　治卒中風不語失聲及聲噎不出

白礬（五兩） 陳橘皮（焙五兩） 桂（去粗皮各一兩）

右為末蜜和丸如彈子大服每丸含化嚥津不拘時

獨行散 治失音（出經驗方）

用槐花瓦上炒令香熟如地上出大每三更後床上仰卧隨意服去

治咯血

治中風失音

研韭汁服之

治中風不得語（三因方）

剉穀枝以苦酒煑熟皮中末出隨多少飲之（即楮枝也）

桂心方（出千金方） 治中風失音

治卒失聲聲噎不出（出肘後方）

用橘皮五兩水三升取煑一升去滓頓服傾合服之

又方（出肘後方）

濃煑苦竹葉服之瘥

治風卒失聲咽喉不利（出肘後方）

擣薑荷根酒和絞汁飲之不拘時候溫服半盞一方用荷根二兩以酒一大盞服之

取涎丸 治中風不語喉聲如拽鋸口中涎沫（出聖惠方）

通關散（出和劑方） 治失音不能言由風邪客於脾經上入關機者舌本也又關膈不通其人精神昏憒失忘

白薑（炮各） 羌活（一分） 麝香（半錢）

右為末每服二錢先以薑汁少許調勻以沸湯浸放溫服之

菖蒲末時時著舌根下

桂心散（出聖惠方） 治中風失音不語

桂心（一兩） 羌活（一兩） 防風（去蘆） 附子（炮去皮臍）

赤箭（一兩） 羚羊角屑 酸棗仁（二兩） 甘草（炙）

右件藥為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合

煎一兩沸不計時候溫服

治卒不得語方（出肘後方）

以苦酒煑芥子傅頸一周以衣苞一日一夕乃解即差

獨活湯（出經效方） 治中風不語

獨活一兩剉酒二升煎至一升次用大黑豆炒聲將藥酒熱投蓋良久每溫三合灌未差再服

烏藥散（出濟生方） 治中風不語老人虛人可用也

烏藥 附子（一兩） 天雄（一兩） 沉香（一兩） 甘草

右八味為末各一錢病勢稍重用水一盞薑十片煎半盞空心服氣中加木香半錢無氣加人參半錢

治失音（出本草）

右桂末著舌下漸嚥汁

治中風失音方（出本草）

右取桂一尺以水三升煎取一升服取汗

治失音不語喉痛者（出本草）

以獲頭刺手心令痛即語男左女右

治中風失音并一切風疾（出本草）

以白殭蠶七枚為末用酒調方寸匕立効

治失音不語（出本草）

以車家鞘棲木作灰服一升立效也

治卒失音（出本草）

右用生大豆一升青竹筭子四十九枚長四寸闊一分和水煑熟豆去筭子將與汁服之日夜二服差

治風卒不語口偏者（出本草）

右熱鷄屎如豆淋酒法作名曰紫酒服之甚効

治中風失音（出本草）

用桂心一兩去其粗皮近人身体懷之至兩時辰許為末分為二服每服用水二盞煎取一盞服之差大妙聖惠方同

治卒風暗失音不語者（出本草）

以生薺菜擣汁一合頓服之日再服止

治感風不能言（出本草）

以黃耆防風煑湯數斛置床下熏之○昔唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時有柳太后感風而不能言脉沉而口噤

宗曰既不能下藥宜以氣熏之藥入腠理周時可差乃造此湯數斛置床下氣如烟霧熏其口便得語矣大熏蒸其妙如此

治中賊風口偏不能語者

取吳茱萸一升去目 清酒一升和煮四五沸令服之半升日進三服得以汗差

治中風卒不得語

用白芥子研細以醋[illegible]敷頸一周以帛包之一日一夕乃差

中風舌強不語 附論

夫中風舌強不語者蓋脾脈絡胃夾咽連舌本散舌下今風邪客搏則氣脈閉塞不利所以舌強不能言也又有言語謇云中風不得語者由心脾受於風邪故也脾脈絡於胃夾咽連舌本散舌根於舌下心之別脈係於舌本人二經俱為風毒所搏故令舌強不得語

方

羌活湯治中風舌強不得語手足舉動不得

羌活 羚羊角 麻黃 防風
獨活 旋覆花 人參 白茯苓
麥門冬 龍齒 杏仁 當歸

右㕮咀每用藥十錢匕以水三盞煎取一盞半去滓溫分三服空心日午夜卧各一

天麻散治中風不能語四肢強

天麻 乾蝎 烏蛇
白殭蠶 乾薑 人參 白附子 天雄 天南星
芎藭 麻黃
檳榔

右為散每服不計時候以熱酒調下一錢頻三服以厚衣蓋出汗

牛黃丸治中風舌強不語筋骨拘急飲食不得

牛黃 白附子 乾薑 麝香 芎藭
桂心 天麻 白殭蠶 附子 羌活
天南星 烏蛇

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不拘時候以薄荷酒下十丸

黃芩湯治中風舌強不得語面赤飲粗身體緩急目視不得見 治中風胃時不知痛處拘急不得轉側遺失便利宜產後失血

黃芩 桂 芎藭 人參 防風
防己 甘草 麻黃 芍藥
白朮 附子

右剉如麻豆大每用六錢匕以水一盞入生薑三片棗一枚大擘破煎取一盞半去滓分溫三服空心日午夜臥各一服如人行五里更一服

附子湯治中風舌強不得語

附子 細辛 麻黃 芎藭
白鮮皮 茯神 杏仁 羌活
防己 桂 甘草

右剉如麻豆每用藥十錢匕以水三盞入生薑三片棗三枚大擘破煎至盞半去滓分三服空腹併二服相去如人行五里更一服

羚羊角湯治中風舌強不語手足拘急發歇有時

羚羊角 麻黃 防風 升麻 桂
芎藭 薏苡仁 羌活 杏仁

右㕮咀每服三錢匕水一盞入木通竹葉煎至七分去滓不拘時溫服

桑枝飲子治中風不語

桑枝 黑豆 獨活 生薑
羌活

右㕮咀以水兩大盞煎一盞三分去滓入竹瀝一合又煎一兩沸不拘時候分溫三服

醋石榴飲子治中風不得語

醋石榴皮 青州棗 黑豆

右㕮咀以漿水三大盞煎至一盞半去滓入牛乳三兩好梨汁二合攪勻不拘時候溫服一合

雄黃丸治心脾中風舌強不語涎銷昏塞不省人事

雄黃 丹砂 牛黃 天南星 白殭蠶

天麻 麝香一分 全蝎

右為細末，煉蜜丸如鷄頭實大，每服二丸，豆淋酒化下，不拘時候

天南星散 治中風不語，筋脈拘急疼痛

天南星 白附子 桑螵蛸 白殭蠶 藿香

乾蝎 朱砂 麝香 膩粉

右為散，入後三味更研令勻，每服不計時候，以溫酒調一錢匕下

麻黃湯 治中風舌強不得語，身體緩急，口目不正，奄奄忽忽，神情悶亂，凡中諸風者服之皆驗，不令人虛

麻黃 防己 黃芩 桂

甘草 防風 人參 附子 芍藥

右剉如麻豆，每服十錢匕，水三錢入生薑三片，棗大相擊，煎取一盞半，去滓，分三服，空心併二服相去如人行五里再服，衣覆汗出慎外風

防風湯 治中風舌強不得語，面目不開，短氣欲死

防風 甘草 黃芩 白茯苓 當歸

杏仁 秦艽 麻黃

右麤搗篩，每用藥十錢匕，水二盞，酒一盞，入棗三枚去核，生薑同煎取一盞半，去滓，分三服，空心併二服相去如人行五里更一服

獨活散 出聖惠方 治中風不得語，身體拘急疼痛

獨活二兩 桂心二兩 防風一兩 當歸 赤芍藥

附子 甘草

右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不拘時候溫服

[illegible]丸 出聖惠方 治中風不語，精神冒悶

竹瀝湯 出聖惠方 治中風舌強不得語，神煩悶

淡竹瀝五合 人乳汁二合 三年醋汁半合

右相和調勻，分三服，溫服，口噤者斡口灌之立瘥

醋乳散 出聖惠方 治中風不得語，舌根強硬

三年醋汁 人乳汁各 二合

右相和，研以生絹濾取汁，分為三服，日夜服之，服盡能語 一方

三聖散 治中風舌強不語

沒藥 琥珀一分 乾蝎七枚全

右為末，每服三錢匕，用鵝梨汁半盞，皂莢末一錢匕，濃煎湯一合，與梨汁相和調下，須臾吐出涎，再服便能語

白礬散 治中風舌強不得語

白礬 桂

右為散，每服一錢匕，安舌下，吐出涎即語，一方綿裹如棗內舌下有涎出之

桂心方 治中風不得語，舌根強

獨活湯 治中風舌強不語

正舌散 治中風舌強語澁

雄黃 荊芥

右研勻，每服二錢，豆淋酒調下

茯神散 治證同前

茯神心 薄荷 蝎梢

右同為細末，每服一二錢，溫酒調下

治中風不能語 出本草

用吳茱萸豉各一升，水五升，煮取二升，稍稍服之

治中風不得語 出本草方

中風口噤 附論

夫風口噤者，風寒客於三陽之筋，使筋脈拘急，口噤不開，牙關緊急，若不速治，恐致他疾，以風者善行而數變也。又云，諸陽經筋皆在於頭，三陽之經，並絡入於頷頰，夾於口，諸陽為風寒所客則筋急，故口噤不開，診其脈遲者生

方

竹瀝湯 治卒中惡風，倒悶，口噤不能語，乃肝厥證

淡竹瀝一升 防風 葛根 菊花 細辛

芍藥 白朮 當歸 桂心 通草
防己 人參各一兩 甘草炙 附子炮 茯苓
玄參 秦艽 生薑 獨活各三兩
右八味以淡竹瀝一斗煮取四升分為四服已心每日 忌菘菜豬肉生菜生蔥醋物李雀肉等

甘竹瀝湯 治卒中惡風噫門口噤不能語所說尸厥死不識人閉目失錢不知痛風狂宜服此方
甘竹瀝一升 生薑三兩 甘草炙各 防己
麻黃去節 人參 黃芩 白朮 細辛
芎藭 秦艽 桂心二兩 附子炮各一兩
右咬咀以清水煮藥令升合竹瀝煮取四升分為四服已心每夜菘菜
桃李雀肉生蔥生菜豬肉冷水

羚羊角散 治中風心悶口噤不開
羚羊角屑一兩 防風去蘆頭 甘菊花 木通剉
人參去蘆頭 細辛 當歸剉微炒 桂心各一兩 甘草炙微赤剉二兩

附子炮裂去皮臍 赤茯苓 黃防己 枳殼麩炒微黃去瓤各一兩
右咬咀每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更煎
兩沸放溫不拘時拗開口灌之

防風散 治中風口噤不開煩熱悶亂
防風去蘆頭 赤芍藥 葛根剉 獨活 茵芋
甘草炙微赤剉 芎藭 細辛 白朮 麻黃去根節
羚羊角屑 人參去蘆頭 黃防己 川烏頭炮裂去皮臍
石膏二兩
右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝
一合更煎一兩沸放溫不拘時拗開口灌之

金虎丹 治中風口噤不語忽然仆地涎潮壅塞
牛黃研 丹砂研 粉霜研 膩粉研 雄黃研
龍腦研 鉛白霜研各一兩 天竺黃 人參各三兩 麥門冬去心
甜消研二 蓬砂研 白礬研一
右為末再同研勻煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸新汲水化下傷寒

伏熱在心狂亂者金箔化下一丸小兒急慢驚風口吐涎沫一丸分作
三服薄荷新水下 治一切風涎不可當者

烏犀丸 治風實之客於三陽經筋脈拘強口噤不語牙關緊急
宜服此藥
羚羊角屑半兩 天麻 白附子炮 白僵蠶炒 半夏湯洗七次
生乾地黃 當歸 烏蛇酒浸 天南星 麻黃去根節
附子炮 川芎 蠶沙 麝香研 乾蠍
右為末再同研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸溫酒
下不拘時候服

枳殼散 治中風口噤不開心胸滿悶
枳殼麩炒 羚羊角屑 細辛 茵芋 秦艽去苗
桂心 附子炮裂去皮臍 黃防己 赤茯苓 人參去蘆頭各一兩
防風去蘆頭 甘草炙微赤剉各二兩
右咬咀每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一
兩沸放溫不拘時候拗開口灌之

鎖頰散 治中風口噤及婦人洗頭中風牙關緊急
天南星 烏頭 芎藭 白附子炮 半夏湯洗 防風去叉 雄黃研
丹砂 牛黃 麝香研各
右為細末入雄黃已下四味同研勻每服溫酒調下半錢已四小兒
急慢驚風薄荷湯調下一字

黃防己散 治中風口噤不能筋脈拘急體熱煩悶
黃防己 葛根剉 麻黃去根節 甘草炙微赤剉
防風 赤芍藥 桂心 獨活 羚羊角屑各一兩
右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓放溫不
拘時候拗開口灌之

防己湯 治中風口噤項筋急人飲食不下
防己 桂去粗皮 麻黃去根節 葛根剉各二兩
甘草炙 防風 芍藥各
右麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎取七分去滓溫

服日三夜一如失音不能言並宜治之

獨活散 治中風口噤不開筋脈拘急疼痛

獨活 黑豆 天南星 生薑 防風

右細剉以清酒三大盞煎二大盞入從中一盞去滓放

溫不計時候拗開口灌中盞頻頻服以效為度

烏梅飲子 治中風口噤不開心膈壅悶

白礬 酒 薄荷 生薑 竹瀝

右藥相和煎三兩沸分溫三服不計時候拗開口灌之立効

每帶散 治風口噤牙關不開

每帶 烏梅肉 天南星 麝香

右為細散入瓷合內勿令透氣每患以半錢匕於口角揩牙齦上

揩使自開口立効

烏梅飲 治中風不語口噤吐涎頭項筋急

烏梅 荊芥 白礬

右先以水一升煎荊芥取三合去滓別盛又別以水一升煮烏梅

至三合去滓別盛又以水五合煮白礬取三合別盛以物斡口灌先

管荊芥湯次下烏梅湯又次下白礬湯放身傍服之良久又服吐

惡涎毒涎如不吐以鵝毛探喉中取吐

獨活飲 治中風口噤不語不知人飲食不下

獨活 葛根 甘草

右粗擣篩每服四錢匕以水一盞半入生薑半分切煎取七分去

滓熱服口噤服藥不下斡口開灌之効日夜四五服

獨活酒 治中風口噤不開

治風涎發動口噤不開方

半夏 五靈脂 腦麝香一字

右同乳鉢內研如粉為水和丸如雞冠花子大每用三丸於瓷盞

內用指甲研細入半皂子大白梅肉并生油少許一處研勻却分

作兩餅子於兩鼻大牙頭摩之外更以手揉頰自然涎出

以穀精草上花研作細末用一字耳子分作兩處以鵝管吹

入兩鼻中涎出其涎如涎出未快更以少許吹入喉中以甘草末揩入

鼻中解者也如牙關不噤但有涎即用一丸子放在舌上噙

咽不用藥亦用指蘸白各右涎出只是不得多不

得令鼻氣吹去不得嚥延不出後亦用甘草末解之此藥人年六

十以上者雖瘥是氣壯六十歲以下則若服藥男大年

者其不透風處

室服自己慎其藥須是臨治時

旋合不可預合

通頂散 治中風口噤不省人事合證方用封藥

傳風頭眩妙甚

黃狗頭 雄黃 細辛

右和停不省人事時挑少許搐入鼻中即噴涎出口開方可投藥

治失音不語精神昏憒者 四肢書語牙關者

用細辛末搐鼻又揩牙用白梅揩牙更以看舌下

開即開合可選用

治中風口噤不開不知人事欲死者

乾蝎 瓜蒂 赤小豆

右細羅為散每服半錢不計時候用粥飲調拗開口灌之如

未吐即再服一方無和圓以研一丸灌之

治中風口噤不開方

附子 甘草 桂心

右為末煉蜜和丸如皂莢子大每服不計時候以溫酒研一丸拗開

口灌之立效一方開噤圓

救急飲 治中風口噤不開

川烏頭 膽粉 龍腦

右研令勻以黃牛膽汁調成膏以瓷器盛每服不計時候以溫酒

調一錢拗開口灌之以豆投之

白朮飲 治中風口噤不能言者

白朮 酒

右合煮取一升頓服之亦可

開關散 治急中風目瞑牙噤不能下藥者用此散以中指點散子

嚼齒三二十次左大牙左右其口自嚼始得下藥
天南星 龍腦
右重研細五月五日午時令患者只使一手至半錢匕
吳茱萸方 治中風口噤悶亂不知人者飲不一
吳茱萸一升 豉三升
右麄搗篩每服四錢匕以水一盞半煎取七分去滓温服早夜各三
服 一方殺鬼毒中賊風口偏不語者以酒煮服之一方單吳茱萸
和酒煮服之亦良
附子散 治中風牙關緊急偏身強硬
附子一兩炮裂去皮臍 白附子一兩炮
右為細散每服一錢匕温酒調下三服見効
白礬散 治一切急風口噤不開
白礬半兩 鹽花一分
右並細研以手指點揩牙根下更將半錢匕以綿裹安牙盡頭
治中風口噤不開 以白梅揩牙令開者下藥
川獨活二兩 桂心一兩
右㕮咀每服三錢水酒各一盞煎至八分去滓温服
治大人小兒噤口痙
皂角一兩不蛀者去皮子 蘿蔔
右以皂角研為末以蘿蔔或子同醋研相雜細搗藥塗牙齦
上即甦
治中風通身冷口噤不知人者
用獨活四兩好酒一升煎至半升分温服
搐鼻法 治卒中風口噤不省人事者
附子散 治中風口噤不開吹口中
用附子炮裂去皮臍搗羅為散內管中斡開口吹入藥
治中風牙關緊急方
喉中并舌下不可多
用甘草比中指節截作五截於生油內浸過炭火上炙候油入甘草以物
斡開牙關令咬定甘草可人行一里時候又換甘草一截後灌藥極効

白神散 治中風或吐而牙關緊噤下藥不能
用白梅末不以多少將指揩牙並齦上即能收斂自然齒骨易開也
大豆酒 治中風口噤或偏風身體瘴痹者
用大豆五升炒令極熱以清酒五升沃之可得三升旋旋温服令少
汗出身潤即瘥
治中風口噤不能言方
用服荊瀝一升如無以竹瀝服之竹瀝一升亦可
治中風口噤不開涎潮壅塞方
用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黃色為末每服一錢匕非時温酒服
如氣實脉盛調二錢匕如牙關不開用白梅揩齒口開即灌藥以
吐風涎瘥
鷄糞方 治中風寒痙直口噤不知人
用鷄屎白一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服 一方加生大豆
同熬服之尤妙
芥子膏 治中風口噤舌本縮
治大人小兒口噤不開牙關者諸藥何効 生天南星末一錢 腦子
少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙上擦之立開
治男女中風口噤不語
以細研烏頭杏為末方寸匕酒煎蘇方去滓調服下立愈

中風癔 附論

夫風邪中於陰發於五臟其狀奄忽不知人喉中噫噫然有聲舌強
不能言身軟而汗眼下及人中左右白者可治一黑一赤吐沫汗不出
身體強直者死蓋風中於陰臟氣承之風邪與血氣相搏經脈
從立陰陽之氣不得偕行榮衛不流所以目瞑不知人也喉者所以通氣
氣既不利故喉中噫噫然有聲陰氣閉塞得之則表裏蹶逆筋脈
和緩陽氣得復故可治也○脾脈絡胃挾咽連舌本散舌下心之別脉
係舌本心脾二臟受風邪故舌強不得語也

方

金箔丸 治風癔奄忽不知人喉中噫噫然有聲舌強不能言身

或自汗口吐涎沫項背強直神志昏憒

金箔一百片 銀箔一百片 金角屑 牛黃 丁香

龍腦 沉香 真珠末 木香 麝香

琥珀 辰砂 烏蛇 天麻 雄黃

殭蠶 白殭蠶 附子 天南星 防風

白附子 甘草 丹砂 墨

右先以十五味搗羅為細末入研者藥一處和勻再研令勻入金銀箔入水銀三分同研如泥入諸藥研和勻鍊蜜和丸如雞頭大每服大人五丸薄荷酒下小兒二丸薄荷湯化下

羚羊角散 治風癔咽中作聲舌強語澀心膈不利

羚羊角 前胡 桂 芎藭 麻黃

秦艽 防風 附子 赤箭 天南星

獨活 茯神 檳榔 枳殼

桑螵蛸 乾蝎 丹砂 牛黃

蟬蛻 麝香 鉛霜

右除研者外搗為細末入研者和勻每服一錢匕溫酒調下不拘時候

防風湯 治風癔舌強不能言四肢拘急迷悶不知人

防風 麻黃 白朮 黃芩 赤芍藥

桂 防己 芎藭 人參 甘草

附子 杏仁

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時有汗宜避風甚妙

麻黃湯 治風癔邪氣入臟四體不收不自知覺口不能語冒昧不知痛癢

秦艽散 治風癔舌強不能言四肢拘急心神恍惚不識人

麻黃 石膏 當歸 芎藭 甘草

茯神 桂心 黃芩各一 杏仁

右搗羅為散每服半兩以水一大盞煎至七分去滓不計時候溫服

桂心散 治風癔咽喉作聲舌語蹇澀心胸不利

桂心 防風 羚羊角屑 獨活 前胡

枳殼 附子 甘草 細辛

右件搗篩為散每服半兩以水一大盞煎至七分去滓不計時候溫服

又方 治風癔舌強不能言四肢拘急迷悶不識人

獨活 桂心 麻黃 當歸

羚羊角屑 茯神 酸棗仁 甘草

赤芍藥各一

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

獨活湯 治風癔舌強不語昏冒不知人喉中作聲四肢不收手足解曳

獨活 甘草 生葛根 桂

芍藥

右件四味麤搗篩與葛根拌勻每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服日三夜一一方加栝蔞根名獨活散

正舌散 治中風舌本強難言語不正神昏

蝎梢 茯苓 龍腦

右為末每服二錢溫酒下或擦牙頰亦可

治風癔精神不明舌強語澀桂末吹鼻方

用桂半兩去麤皮半兩搗羅為細末每用少許吹入鼻中

又置舌下咽之

馬尾散 治風癔咽喉作聲言語蹇澀

用白馬尾一團如雞卵大燒灰細末每服一字至半錢匕日夜三服勿令病人知

又 治風癔舌強不語精神昏悶

用菖蒲石上九節新者剉半兩搗羅為細末每用少許吹入鼻中

治風癔不語體強不知人

用梁上塵取少許吹入鼻中

中風口眼喎斜 附論

[illegible]

□□□丸 治中風口眼喎斜 語言不正

草烏頭 [illegible] 麻黃 [illegible] 白芷 [illegible]
[illegible] 防風 [illegible] [illegible] 藿香葉
乾薑 [illegible] 白附子 [illegible] 甘草 [illegible]
龍腦 麝香 丁香 木香 白附子
蟬蛻 不蚛皂角 [illegible]

右為細末 鍊蜜和丸如彈子大 每服一丸 細嚼 酒化下 一丸 不拘時候服

騙馬丹 治男子婦人中風口眼喎斜 痰涎壅盛 語言蹇澀 手足不仁 筋脈拘急 腰膝不舉 或走注疼痛 頑麻 傳經絡 筋骨疼痛 腰腳浮腫 難以屈伸 或寒濕腳氣 或打撲損傷 筋骨髓蹉跌 皮膚瘙痒 風毒瘡瘍 並宜服之

真川烏 川芎 真蘇木 地龍 白芷
草烏頭 續斷 牛膝 肉蓯蓉 乳香
明松香 木鱉子 虎脛骨 骨碎補
自然銅 沒藥
金[illegible]

右為細末 用黃蠟打 陳米粉為丸 如梧桐子大 每服三十丸 食後 溫酒送下

赤箭散 治中風口眼喎斜 語言不正 目不能平視

赤箭 黃松節 滑石 牛膝 沒藥
骨碎補 芍藥 細辛 藿香葉 白花蛇
自然銅 地龍 木鱉子
[illegible] 虎骨 烏頭 羌活 桂

右為細散 每服二錢 以溫酒調下 不拘時候

□蛇丸 治中風口面喎斜 語言不正

白花蛇 烏頭 五靈脂 羌活 虎骨
天麻 牛黃 雄黃 麝香 乾蠍
天竺黃 白附子 朱砂 [illegible]

右為末 入牛黃 麝香 雄黃 [illegible] 一處 煉蜜和丸 如雞頭大 每服一丸 [illegible] 至十丸 [illegible] 不計時候

烏藥順氣散 治男子婦人口眼喎斜 四肢軟弱 一切風疾 痛之疾 並宜治之 常服順氣安神 調和五臟 美進飲食

半夏 川芎 [illegible] 麻黃
白茯苓 人參 枳殼 白朮
白芍藥 甘草 當歸 蒼朮
天台烏藥

右㕮咀 每服三錢 水二盞 生薑七片 棗子二枚 煎至八分 去滓 入麝香一捻 同煎熱 細細呷服 不拘時候

麻黃湯 治中風口眼喎斜

麻黃 草薢 附子
黃連 當歸 桂 枳殼 甘草
羚羊角 桑根白皮 牡丹皮 羌活 芎藭
酸棗仁 杏仁

右剉如麻豆 每服五錢匕 水一盞半 入生薑半分 切 煎至八分 去滓 溫服

猴骨丸 治卒中風口眼喎斜 左癱右瘓 半身不遂 不能言語 一切風癇 [illegible] 並宜服之 此藥與諸藥不同 散 汗出必愈

槐角子 桑白皮 仙木 威靈仙 人參
川芎 何首烏 荊芥子 防風 香白芷
五味子 木香 苦參 [illegible] 麻黃

右麻黃用水二十升 以槐枝攪 熬成膏 [illegible] 為丸如彈子大 每服一丸 用生薑七片 [illegible] 頭 [illegible] 水一碗 煎至 [illegible] 碗 先將丸子研細 用 [illegible] 薑湯熱調服 使於 [illegible] 處 厚衣被蓋 勿見風

汗出差一方加硃砂為衣服以和胃氣鎮搞及風寒茶下半丸蓋出汗
入膏時如稠再入水少許煎熬入藥唯以為妙其麻黄不可多

不換金丹 治口喎
荊芥穗 白殭蠶炒 天麻 甘草炙 防風各一兩
川烏頭生用 白附子生用 羌活半兩 細辛 川芎
蝎梢炒 藿香葉各 薄荷各二兩
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下如口喎向
左則右腮上塗之便正

獨活散 治中風口面喎斜手足不遂風入臟腑昏悶不語麻痺如
解難以化仰骨痺冷疼心驚不定
獨活 羌活 赤茯苓 附子炮 白殭蠶炒
天麻 麻黄去節 乾蝎微炒各 芎藭 桂心
羚羊角屑 丹參各半兩
右為細末每服不計時候以薄荷酒熱調下二錢

天麻丸 治中風口眼喎斜言語不正
天麻 芎藭 白殭蠶炒 白附子炮 天南星炮
防風去蘆頭二分 羚羊角屑 乾蝎微炒 牛黄細研 麝香各分研
膩粉半分 麻黄去根節三分
右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫
酒下十丸

驅風散 治口眼喎斜
人參去苗 官桂去皮 麻黄去節 川烏頭炮去皮臍
甘草炙 防風去苗 漢防己 白朮 黄芩
川芎 赤芍藥 白茯苓各四兩
右為麤末每服四錢用水一盞入生薑五片同煎至七分去滓熱服
出汗見効立命

防風散 治中風口面喎僻手足不遂風入於臟則語不得轉神
昏悶
防風頭 川升麻 桂心 麻黄去根節 薏苡仁各
羌活 芎藭各一兩 羚羊角屑分 杏仁去皮尖雙仁麩炒微黄二兩
右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合重
煎一兩沸不計時候稍熱服如人行五七里再服以衣蓋之汗出
為度

羌活散 治中風口面不正四肢拘急語澁
羌活 蔓荊子各一兩 細辛 枳殼麩炒微黄
桂心 當歸微炒 芎藭 羚羊角屑 白鮮皮各三分
右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更
煎一兩沸不計時候溫服

麻黄散 治中風口面喎斜筋脉拘急
麻黄去根節 芎藭 川升麻 防風去蘆頭
桂心 羚羊角屑 酸棗仁各一兩 秦艽去苗 漢防己
右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更
煎一兩沸不計時候溫服

芎藭散 治偏風口眼不正言語蹇澁四肢拘急
芎藭 獨活各一兩 當歸剉微炒 枳殼麩炒微黄去瓤 荊芥
天麻 羚羊角屑各一兩 細辛 桂心各二分
右麤搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓
不計時候溫服

酸棗仁散 治中風口面偏斜痰壅頭疼
酸棗仁微炒 羚羊角屑 丹參 防風去蘆頭 漢防己
甘菊花 麻黄去根節 羌活 石膏細研各一兩
右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

搜風順氣丸 治風氣口眼喎斜大便結澁
人參一兩 麻子仁 郁李仁 大黄各二兩 皂角不蛀者去皮子
黑牽牛末一兩 威靈仙二兩 朴硝半兩
右為末煉蜜丸如梧子大每服五六十丸溫酒下

治口耳喎斜方
防風 附子 葛根各二兩 桔梗 麻黄各二兩
獨活 生薑各二兩 杏人三十枚
右㕮咀以水一斗酒二升煮取三升分四服

葛根湯 治中風口面喎斜

葛根 防風去叉 附子炮 麻黄去節

芎藭 松脂 杏仁

右剉如麻豆每服半錢匕以水二盞酒入生姜三片煎取一盞半去滓分三服日二夜一

防風湯 治中風口面喎斜失音

天南星丸 治中風手足不隨口眼喎斜

天南星 天麻 附子 白殭蠶 白附子 乾蠍 藿香葉

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服五丸至十丸荊芥湯下空心食前服

天麻散 治中風倒仆不識人及口面喎斜

天麻 白殭蠶 乾蠍 防風 犀角屑 麝香

右搗細羅為散每服不計時候以温酒調下二錢

升麻湯 治中風口眼喎斜

升麻 防風 麻黄 芍藥 羚羊角屑 桂

右麤搗篩每服十錢匕以水三盞煎至二盞去滓入竹瀝一合更煎三沸分温三服空心一服夜卧一服相去如人行五里良久更服以衣覆令汗出避外風

天雄散 治中風口喎引目不合又令耳有風聲而瞤并皆令疼風眩頭疼

天雄 細辛 山茱萸 乾薑

山芋 防風

右為散每服温酒調下三錢匕漸加至五錢匕日再服

句氣散 治中風口眼喎斜

烏頭 白朮 旱蓮草 甘草 青皮

沉香

右㕮咀水一大盞煎 大棗一枚同煎至七分去滓加鹽少許空心服忌鼠麵雞魚等物

防風湯 治中風口眼喎斜四肢不仁好笑

防風 羌活 桂心 杏仁 乾薑

甘草

右每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

追風丸 治風口喎

礬石 石硫黄 麻子

乾葛 荳根 蔓荊子

右為末用麵糊和丸如彈子大 手右喎安左手候口正即去之

乾薑附子湯 治中風口面喎斜

白聖散 治中風口面喎斜

天雄 山茱萸 山芋 乾薑

右為散每服用熱豆淋酒半盞調下二錢匕患重者加至三錢匕

烏薑丸 治諸中風口眼喎斜

川烏 草烏 乾薑 良薑

右切碎以好醋一碗煮醋盡細切焙乾炒研為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服五七丸茶清送下食前日進二服忌熱食一時

人參丸 治中風口眼喎斜手足無事語不蹇止緣坐卧對耳有孔為風所中筋倦過一邊使眼皆緊睡着一眼不合者服此藥二十日内眼口皆正

人參 草烏頭 牛膝

右為細末水煮麵糊丸如梧桐子大每服十丸炒黑豆淋酒下日二服

聖散子 治中風口喎

伏龍肝 牡礪 附子

右為散用三歲雄鷄冠血調半錢匕如口喎向左邊即塗藥在右口角若喎向右邊即塗藥在左口角纔見口正當即便急洗去藥遲洗即却牽過口角傷之一方治中風著人面引口偏著人耳車急不轉加白礬

治風入腸使人瘖瘂卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者
用伏龍肝散和雞冠血及鱉血塗之乾即易良效又灸吻邊橫文赤白際逐左右隨年壯報之至三報三日不差更灸之

一字散 治中風口眼喎斜
烏頭 生用 青礬 各等分
右為細散每用一字搐入鼻內取出涕吐涎

大豆酒 出聖惠方 治卒中風口喎不正

吳茱萸湯 出聖惠方 治中風口偏不語者

蒜塗法 治口眼喎斜
用搽手盛蒜泥塗合骨穴左喎左貼右喎右貼扯正止之

石灰膏 出聖惠方 治中風口眼喎斜
用石灰一合醋炒如泥斜向右塗左向左塗右立正即洗方水和

又方 出聖惠方
用栝蔞搗爛絞取汁和大麥麵搜作餅炙令熱熨之如正便止不令大過

治一切風口眼偏斜 一名彈丸
用青州茶一斤青荷一斤一處於盆內研生蔥絞汁於青瓷內慢火同煎成膏餘滓三分去一分藿香不用將二分曝日乾為末以膏和為丸如梧桐子大每服二十丸日三服忌動風物溫酒下

蓖麻膏 治口眼喎斜不正
大蓖麻子 十二箇去殼研 巴豆 七箇去皮
右為泥成膏子後加麝香半錢一處和成膏子左患摘安於右手勞宮穴內用絹七重蓋定以熱湯瓶坐於膏上熨之如右患用左手暑坐一時辰用手托碗便正也方無麝香

又方 出聖惠方
鱉甲 烏頭 生用 各一兩
右為末以醋調塗正便拭去一方無醋

治口喎
用大豆麵三升炒令焦三升投取汁頓服日一服一中豆麵

治中風口偏不正
以生鹿肉生椒同搗傅之專看正即速除之又治偏風左患右貼右患左貼

松葉酒 出聖惠方 治中風口面喎斜亦治三年中風不效者
用青松葉一斤細剉如大豆太石臼中搗令汁出用生絹囊貯以清酒一斗浸二宿近火煨一宿初服半升漸加至一升頭面汗出即止
或無酒止用水浸亦可

麻酒 治中風口面喎斜
用胡麻炒搗羅一斤生絹囊貯取酒一斗五升浸七日後每服三合漸漸服之加至四五合以差為度一方治搜搗羅用生油麻細嚼以熱酒空心服之

蠶沙酒 治中風口面喎斜口角涎流
用蠶沙微炒搗碎五升以生絹囊貯取酒一斗五升浸經七日飲之三合至五合令常有酒氣以差為度

治中風口面喎僻不正
用雄雞血煎熱塗之正則止或新取者血便塗之亦佳塗頰邊一邊為良

蜘蛛摩方 出聖惠方 治中風口喎
用蜘蛛大者一枚摩其偏緩頰車上及耳前候視正即止亦可向火摩之或取蜘蛛大網絲成團如彈子摩之亦得

白魚膏 治中風口面喎斜
用衣中白魚七枚塗偏緩一邊纔正便止恐太過凡患急心邊燥者
有病先塗緩邊入摩多邊急邊少用

治偏風口面喎斜 一切熱毒風攻頭面
用芭蕉根不以多少於瓶內蒸兩次取出搗研絞取自然汁每日飯後取二合空腹一匙頭以酒調之頓服日再服

治卒中風口喎不正及手臂不仁
取空青末如豆大一枚含之即愈咽之亦可

皂角膏 出聖惠方 治中風口喎不正語則牽急四肢如故無他苦此由居處不便因臥而孔風入耳窒於陽明之經宜摩之
用大皂角五兩去皮子下篩以三年米醋和左喎塗右右喎塗左乾

更塗之

治中風口眼喎斜及治風頭旋眩暈 出聖惠方

用寒東南枝上蟬殼七月七日收不以多少細研如粉入寒食麵用醋調為糊如左斜塗右口角右斜塗左口角候口正急以溫水洗去藥

治惠 治中風口眼喎斜 出危氏方

用鱔魚一條以針刺頭上血左斜塗右右斜塗左以平正即洗去鱔血即放

崇聖膏 出聖惠方 治口眼喎斜由中風寒入內所致也

用東南枝上蓖麻子七粒去殼研碎塗在手心中以一盂子盛熱水坐於手心蓖麻子上用熱水置手心中正則急取盂子左斜置右手心右斜置左手心口眼歸正急洗去藥只須五七次效左右貼亦可又治產難及胎衣研塗兩腳心纔生下便洗去 一方用蓖麻子十四粒研以油調塗於左喎塗右右喎塗左

枳殼方 出聖惠方 治中風口僻眼急

以枳殼刮取上青為末欲至熱上者得細五升微火炒去濕氣以酒三升浸之良久煖令得藥味通性飲之 一方治風氣滯痹腰腳疼痛風枳殼為末溫酒服之

治中風口喎 出聖惠方

用巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以暖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

桂心方 出千金方 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉 方見中風門

積年痰飲漸成風口眼喎斜語不遂蘇合香丸薑汁調半盞青州白丸子有功

久年痰飲停滯胸膈忽然痰涎壅塞手足頑麻口眼喎斜語言不正

同局方麝香蘇合香丸三粒生薑汁調開送下青州白丸子五粒如不能吞將白丸子研細灌下為妙

口眼喎斜足中風前兆煩熱遍身中急煎五七加功藥蘇合香丸甚有功 出濟生拔萃方

風寒濕氣滯於經絡忽然手足頑麻口眼喎斜項強筋攣遍身煩熱未可便用風藥宜煎局方三五七散加芎藭三錢用水二盞生薑十片煎至一盞半去滓作三次調蘇合香丸三丸服留滓再煎

治風攣手足疼痛口眼喎斜大腸秘結痰涎壅口

參元去蘆 芎 天南星炮 當歸

荊芥穗 升麻各半 麝香二錢 木香 分 麻黃去根十錢

右細研羅為末每服一錢半食後溫酒調薄荷湯調下

排命丹 出聖惠方 治男子婦人卒中諸風口眼喎斜口語謇澀牙關緊急嘔吐逆痰卧不寧

川芎 羌活 天南星二錢 川烏頭去皮臍 肉桂

白蘚皮 當歸 防風 朱砂 海桐皮

熟地黃 地榆 虎骨 鉛白霜 烏蛇生

乾蠍 天麻各一兩 牛黃 雄黃各一錢 輕粉一錢

麻黃去節四兩以酒一升熬膏

右為末麻黃酒汁熬半斤同熬成膏與前藥末為丸如彈子大每服一丸豆淋酒下或薄荷汁下不拘時候服

犀角防風湯 出聖惠方 治一切諸風口眼喎斜手足瘓曳語言謇澀四肢麻木並皆治之

犀角 防風各一 荊芥 連翹 黃芩

當歸 桔梗 薄荷 全蠍 麻黃

甘草 天麻 羌活 大黃 白朮

石青一兩 獨活七錢 細辛四錢 山梔子 滑石二錢

已上為粗末每服五錢水二盞入生薑十餘片同煎至一盞去滓稍熱服未汗再服如是病人藏氣虛則全去大黃服之

至聖保命金丹 出御藥院方 治中風口眼喎斜手足瘓曳語言謇澀四肢麻痺精神昏憒痰涎並多

生地黃七錢 大黃 蒲黃 薄荷 牛黃研

龍腦研 朱砂 麝香 青黛 板藍根

貫眾 真珠

已上除麝香龍腦珠子牛黃朱砂外搗為末煉蜜丸如雞頭仁大每服一丸細嚼茶清送下或溫水送下或病人嚼不得用薄荷湯化下無時 此藥鎮墜痰涎大有神效用金箔為衣

牛黃半兩 大黃一兩 炙甘草一兩 朴硝一錢

已上都作末每服一兩水二盞除牛黃朴硝外煎至一盞去滓入

牛黃朴硝一半調服以利為度未利再服量虛實加減服之

〔三蛇散〕 治諸口眼喎斜

蜈蚣 南星

白芷半兩

右為細末入真麝香少許熱酒調一錢食後服

〔肉桂散〕

肉桂

右酒一大盞調桂末令匀人長火煎成膏去火良久用匙攤在一

片帛上貼在腮上頻頻更用熱手熨令熱透看正即去桂膏忌

左貼右患右貼左

〔秦艽升麻湯〕 治中風手足陽明經口眼喎斜惡風惡寒四肢拘急

升麻 葛根 炙甘草 芍藥 人參

秦艽 香白芷 防風去芦 桂枝

右件剉如麻豆大每服一兩水二盞連鬚葱白三莖各長二寸許煎

至一盞去滓稍熱服食後服藥畢避風寒處臥得微汗則止

〔消風散〕 治口眼喎斜半身不遂多因下元虛弱為防未先服順氣

散次服補藥卻用茶清消風散下青州白丸子而令痊愈東垣云此方

與友人柯清之云此藥只服三日見功甚有理

〔天麻丸〕 治男子婦人卒暴中風口眼喎斜

天麻 桔梗 鬱金 防風去芦

馬牙硝 天竺黃 甘草 川烏頭 黑豆

右件為細末入麝香少許煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一

丸細嚼荊芥蘇湯下食後

〔大聖顛風金丹〕 治卒患中風左癱右瘓口眼喎斜涎潮搐搦語言

蹇滯偏正頭風及屬風疾患皆治之每服一粒食後臨睡生薑自然汁

磨化熱酒調服再飲少熱酒助藥則覆以衣被候汗出即差病小

者每粒分二服忌發風物孕婦不可服

川烏頭 全蝎 僵蚕 附子

白殭蚕 防風 五靈脂 白附子

白附子 大戟 麝香

右為細末以熱湯攪令京墨一兩成膏子搜和合勻每重一兩

可作分作四丸只於風中乾之不可日曬金箔為衣

〔清涼丹〕 治風熱壅盛上攻頭面口眼喎斜語言不正肌肉瞤動面若

虫行又治傷寒熱盛狂言昏冒癲癎一切風熱並皆治之

天南星 牛黃 蝎梢 石膏

白花蛇 羚羊角屑 防風 甘草 真珠末

朱砂 大黃 龍腦

右件為細末研勻煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸薄荷湯化下食後臨卧

〔治中風口喎〕

以葦筒長五寸一頭刺於耳內四面以麵密封塞不透風一頭以艾

灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得

○風癱瘓 附論

夫風者分布八方長養萬物是天地山川之風為沖和之氣也其不時

時殺物之氣[illegible]人者則為虛風故聖人云避風如避矢今人喎把不正之氣

多中風病者是不遂風邪害氣也夫前賢所言皆帥日久之氣血不足腠理

疏也風邪易傷於筋骨主於胃肝腎中風而筋骨緩弱故名癱瘓也其病

春夏得之難治秋冬得之易療春夏者陽氣上騰人之方泄風入相得而

下也秋冬氣閉所以易療也其病手足軟緩不能收攝口

角[illegible]言語蹇滯是其候也癱瘓之疾癱則懈惰

而不能收攝瘓則弛縱而不能制物故其四肢不舉[illegible]

可支[illegible]之雖其四肢雖能舉動而較[illegible]方能運用之者

謂之緩[illegible]為癱右為瘓則非也左得之病在左右得之病在右

其始[illegible]氣血[illegible]陰陽[illegible]而得之[illegible]

出[illegible]之藥[illegible]動[illegible]而致然也

方

〔大聖夜光丸〕 治[illegible]言語蹇滯[illegible]骨無力行履

白花蛇 烏蛇 磁石
赤箭 半夏 威靈仙 防風去叉
[illegible] 羌活去蘆 海桐皮 乾蝎炒
白殭蠶炒 白鮮皮 蔓荊實 當歸 [illegible]
青橘皮 萆薢 五味子 遠志去心
葳蕤 芍藥 牽牛子
荊芥穗 白頭翁 肉蓯蓉 沉香 乾薑
麝香 牛黃 麻黃 丹砂 龍腦
水銀 桂 木香 葫蘆巴
楝實 巴豆霜
右除別研外，並搗羅為末，再與研者和勻，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，細嚼，用豆淋薄荷酒下，不拘時，如要出汗，煎麻黃湯下一盞投之，宜避風坐臥，一方無赤箭、芍藥二味。

接骨丹 治中風癱瘓，久不愈，四肢攣不隨，服諸藥不效
麝香 桂 麻黃

朱砂 甘松去土 川烏頭 白芥子炒 蕓香
草烏頭 海桐皮炒 何首烏 羌活 龍腦研
骨碎補 牛膝酒浸 威靈仙去土 桑白皮炒 犀角
木鱉子炒 自然銅 青皮去白 陳皮去白
白芷 防風 甜瓜子炒 萆薢炒 五靈脂
川芎 甘草炙 苦參 白膠香
右為末，用麻黃膏子入少蜜熬者搜成劑，丸如彈子大，朱砂為衣，每一丸，食後，搥碎茶酒任下，或用生薑自然汁更入酒半盞化開服，可更進酒一二盞投之，日二服，至三日於痛處微汗為效，至十日大效無不愈，但藥性稍熱，病寒者多効

麻黃丸 治癱緩風，手足不隨，骨節疼痛
麻黃 白花蛇肉 烏蛇肉 巴豆
硫黃 桂 硃砂 乾蝎
附子 防風 天麻 犀角屑 沉香

羌活去蘆 天南星 天雄 羚羊角屑 檳榔
白附子炮 白殭蠶炒 當歸 牛黃 龍腦
麝香
右除研藥外，搗羅為末，同研勻，與煎藥相和，杵千百下，丸如梧桐子大，每服一丸至二丸，以豆淋酒下，日三。

牛黃丸 治癱緩風，手足不遂，皮膚頑痺，口面喎斜，言語蹇澀
牛黃 蟬殼 桑螵蛸 烏頭 赤箭
晚蠶蛾 乾蝎 白殭蠶 朱砂 防風
獨活 烏犀角屑 天南星 仙靈脾 防風去蘆
牛膝 烏蛇肉 麻黃 萆薢 芎藭
漢防己 桂心 羚羊角 麝香
天雄
右為末，入研了藥令勻，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服不計時候，以溫酒下十丸

荊芥散 治中風癱緩，腰腳沉重，筋骨無力，問不知此藥，服風頑痹
大驗熱方可攻
荊芥穗 防風去叉 桑寄生 羌活去蘆 獨活去蘆
芍藥 乾蝎 白花蛇 天麻
附子 半夏 麻黃 木香 蔓荊實
芎藭 白殭蠶 龍腦 沉香 麝香研
丹砂 牡丹皮 桂
右為散，然後入朱砂、龍腦、麝香，再同研勻，每服二錢，溫酒或生薑薄荷湯調下，食後。

全蝎如聖煎丸 治癱緩風疾
麻黃 桃心 柳心 桑根白皮
黑豆二升 童子小便
天南星 天雄 天麻 乾蝎 天麥花
麝香 膩粉 乳香 木鱉子
丹砂 雲母末
金箔 銀箔

右搗後四味研如粉瓷合盛之用益母草圍裹於地坑子內用火五斤煅令通赤用黃土蓋候冷取出如粉紅色為驗服時先取法酒三升青子一兩煆着丹砂紅末兩同入銀石器中熬酒至一升分作五服先日午一服當服之日晚一服一更後一服取下惡物為候

羌活散 治中風癱緩風手足無力頭痛目旋涎唾不止

羌活 附子 旋覆花 烏蛇

天麻 蔓荊子 細辛 藿香 牛膝

白鮮皮 芎藭 天南星 蟬殼 白附子

地龍 殭蠶 甘草 麻黃 乾蝎

麝香

右為細散入研了藥令勻每服不計時候溫酒調下二錢

天麻浸酒方 治癱緩風不計深淺久在床枕

天麻 骨碎補 龍骨 虎脛骨 烏蛇

白花蛇 羌活 獨活

牛膝 熟乾地黃 松節 敗龜

芎藭 當歸 大麻仁 茄子根 原蠶沙

附子

右㕮咀如麻豆用酒二斗浸密封春夏三日秋冬七日熱每服一盞不拘時溫服

天雄丸 治癱緩風肌肉緩弱手足不遂言語蹇澀心神不安

天雄 天南星 白附子

半夏 天麻 乾蝎 羌活 芎藭

白殭蠶 桂心 防風 白鮮皮 甘菊花

木香 朱砂 巴豆 雄黃

麝香 白花蛇肉

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如麻子大不計時候以溫酒下七丸

烏頭丸 治癱緩風此由榮衛氣滯經絡痞塞致手足不遂

川烏頭 白殭蠶 蜈蚣

白附子 天麻 萆薢 石斛

桂心 天南星 天雄 麻黃

白頭翁 郁李人 白蘞 天門冬

仙靈脾 羌活 防風

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食前以豆淋酒下二十丸

海桐皮丸 治癱緩風手足不遂或時麻木口眼喎斜頭目昏悶

海桐皮 金毛狗脊 白芥子 沉香

天麻 苦薑子 地龍 甜瓜子 [illegible]

蔓荊實 草烏頭 牡蠣 威靈仙

蒼朮 木鱉子 自然銅

烏藥

右除研外搗羅為末和勻用煮糊丸如菉豆大每服二十丸木瓜溫酒下空心食前服

秦艽散 治癱緩風手足不遂肌肉頑痹筋脈拘急心神不安言語蹇澀四肢痿弱不利

秦艽 赤箭 獨活 桂心 五加皮

甘菊花 漢防己 羚羊角屑 萆薢 赤芍藥

防風 芎藭 側子 杏仁

甘草 磁石

薏苡仁

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

側子散 治癱緩風語言蹇澀手足不遂

側子 秦艽 獨活 當歸 羚羊角屑

天麻 黃耆 人參 白鮮皮 防風

乾蝎 白附子 菖蒲 躑躅花

麝香 牛膝 麻黃

右為末入研了藥令勻每服不計時候以溫酒調下二錢

威靈仙丸 治癱緩風腳膝無力行履艱難筋骨麻痹

威靈仙 草烏頭 骨碎補

地龍 天南星 自然銅 蒼耳

仙靈脾 側子 防風 羌活 蔓荊實

躑躅　藁本　萆薢　獨活

右搗羅十五味爲末合自然汁入末研令勻用好酒煑麪糊和丸如梧

桐子大每服三丸漸加至十五丸空心溫酒下服後且便灸熱物覺

身口麻者藥行故也

金虎丸

天南星　天麻　白附子　烏蛇　附子

乾蝎　狼毒　白殭蠶　檳榔

五靈脂　白頭　麝香　丹砂

右並生用除別研外爲末共和再研勻丸如雞頭大每服一丸細茶

酒下若周身癱走先先

療癱緩風神驗

側子　防風　芎藭　秦艽　甘草

羚羊角屑　漢防己　杏仁　五加皮　萆薢

甘菊花　枳殼　芍藥　麻黃　薏苡仁

右㕮咀以水一斗二升煑麻黃去上沫內諸藥煑取三升分溫三服相

去十里久將息取汗忌傳粉勿當風慎之及宜無灰酒

黑神丸　治男子女人左癱右瘓手足頑麻搔癢痺走注四肢百節

皆疼痛口眼喎斜頭目旋暈並宜服之

熟乾地黃　赤小豆　乾薑　藁本　麻黃

川芎　羌活　甘松　當歸　川烏

甘草　藿香　香白芷　草烏　川芷

右爲細末以水麪糊丸如雞頭大每服一丸細嚼茶酒任下如婦人血

風御手疼痛打撲傷損亦宜服之一方用當歸木瓜煑餅和丸

舒筋保安散　治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂腳腿少力乾濕腳氣

及濕滯經絡久不能去宜導諸氣

乾木瓜　萆薢　五靈脂　牛膝　續斷

白殭蠶　松節　白芍藥　烏藥　天麻

威靈仙　黃耆　當歸　防風　虎骨

右用無灰酒一斗浸上件藥二七日取出焙乾搗爲末每

服二錢用浸藥酒半盞調下又方金毛狗脊一兩

都搗羅香白膠香各一兩同研入乾藥末內

愈風丹

羌活　川芎　白殭蠶　桔梗　細辛

麻黃　防風　天麻

全蝎　甘草　朱砂

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下

腦麝祛風丸　治左癱右瘓

白花蛇　天南星　白附子　川烏頭

附子　半夏

細辛　防風　天麻　全蝎

皁角頭　麝香

右爲細末蜜丸如梧子大朱砂爲衣每服五十丸溫酒送下不

拘時候

活絡丹　治男子婦人癱瘓筋骨疼痛腰膝疼痛口眼喎斜語言蹇

澀

草薢　川烏　金毛狗脊

蒼术　破故紙　杜仲

山藥　吳茱萸　續斷　木香　乳香

薏苡仁　胡蘆巴

右作一處用好酒三升浸以文武火煑至約酒汁乾

取出焙乾爲末酒糊丸如梧桐子大每服五七十丸空

心溫酒或鹽湯送下

沉香丸　治癱瘓不能運動不能

沉香　丁香　胡蘆巴

牛膝　茴香　石斛

肉蓯蓉　木香　青橘皮　桂

右爲細末丸如梧子大每服二十丸炒生薑鹽湯下酒

亦得

蠲痹丸　治足不遂心神煩悶不安

蹋[?]花 天麻 羌活 黃芩 白殭蠶
朱砂 乾蝎 天南星 白附子
蟬殼 麝香 全蝎
右爲末入金銀箔末研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸
使次日服一二十丸
天南星丸 治中風癱瘓手足不遂及暗風
天南星 桂心 獨活 白附子
天麻 芎藭 當歸 羌活
麝香 香豆
右爲末入研了藥再研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不拘時候
以豆淋酒下十丸
鰾膠丸 治癱瘓風神妙
鰾膠 蘇枋木
丹砂 阿魏 乳香
沒藥 白花蛇
天麻 天南星 白附子 附子
甘草
右件後六味爲末與前藥膏和搗五七百杵丸如彈子大每服一丸生
薑酒下日三四服
防風散 治中風癱瘓風手足不遂身體疼急神思昏沉
防風 當歸 麻黃 羌活 天門冬
附子 生乾地黃 白朮 山茱萸 黃芩
桂心 甘草
右爲末每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服忌生
冷毒滑魚肉
虎骨酒 治中風癱瘓
茄子根 萆薢 枸杞子 牛膝 蔓荊子 大麻子
晚蠶沙 蒼耳子 枸杞子 羌活
萆薢 生牛蒡根 虎骨
右用絹袋盛於罐內以酒浸封閉不令大氣二七日開不令面

向缾口恐藥氣出人每服一盞日三服
龍虎丹 治三十年左癱右瘓口眼喎斜五種風頭疼
草烏 玄胡索 地龍 胡桃肉 松節
蜈蚣 乳香 沒藥 續斷 蝎梢
右爲細末用黃蠟酒打糊爲丸如梧子大每服十丸磨麝香酒
下臨卧時就地鋪薦寫火字一箇鋪紙一張在上朝東迎太陽取氣吹在
藥上用盂蓋着大龍真言三大在藥上真言曰
訶郁蠻雲盧州李副將擇此疾以大龍元四生元相間而服
不[?]年病去八九分
紫金天麻丸 治中風癱瘓手足頑麻
天麻 沒藥 乳香 牛膝 白朮
當歸 牛黃 犀角 附子
五靈脂
右爲末取三家井花水丸如櫻桃大每服一丸先用生薑汁化開次
用溫酒調下如中風癱瘓手足攣曳言語蹇澀口眼喎斜不省人事口
吐涎沫或手足搐搦筋骨疼痛皮肉麻痺並宜服之
黑龍丹 治癱瘓并諸風
朱砂 硫黃 水銀 雄黃
曾青 硇砂 紫石英 金薄 銀薄
已上九味節研入一古車轄子內令實上以定粉一兩半細研入在
子內蓋着藥上更用黃丹一兩半又入轄子內蓋之上以
文武火蓋轄子口後掘地作十字坑子坐轄子在中心四面去轄子四
五寸已來著火二斤不住火養三日後其藥結爲汁住火候冷打轄
子取藥細研
自然銅 古字錢 硫黃
已上三味與錢一重重間布藥末入合子內以鹽泥固濟稍以文
火後以武火燒令通赤候冷取出細研入前藥內相合
麻黃 白花蛇
已上二味用水一碩浸大夏[?]在森[?]上二

旋去之用夾絹濾去滓入銀器中文火[illegible]

羌活　白附子　附子　人參　乾蝎

天麻　天南星　虎脛骨　白殭蠶

木香　河[illegible]　羚羊角　防風　牛黃

麝香　龍腦　酸棗仁　琥珀

朱砂

右為末入石藥更同研令勻入煉蜜杵和[illegible]杵丸如雞頭大每服[illegible]

神應丹 治風癇癱瘓四肢[illegible]不遂麻痺[illegible]

麻黃[illegible]　全蝎　蒼朮

桑白皮　吳白芷　川芎　苦參

右同為末用麻黃膏子為劑丸如彈子大每服一丸溫酒一大盞研化臨臥服於不透風處睡汗出為度隔五七日再服一丸神妙及治卒中風邪延緩不利小兒驚風服之立效一方有白朮

採浮萍草法不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與瘓風些小微風都不算豆淋酒內下三錢鐵幞頭上也出汗

伏虎丹 專治左癱右瘓

生乾地黃　蔓荊子　白殭蠶　五靈脂

躑躅花　天南星　白膠香　草烏頭

右為細末酒煮半夏末為糊丸如龍眼大每服一丸[illegible]

日進二服昔[illegible]有一老人[illegible]

山[illegible]患風疾百治無效一日忽有一道人至言其因[illegible]

之教服此藥道人遂不見服之果驗乃知仙方

清金丹 治中風癱瘓口眼喎斜

丹砂　水銀　胡粉　雌黃　曾青

白礬　鉛丹　硫黃

右合細研於[illegible]先入丹砂次入硫黃次入水銀次入曾青次入鉛丹次入胡粉次入雌黃次入白礬[illegible]相蓋之如法固濟

[illegible]口候乾入爐[illegible]以四兩[illegible]

[illegible]透入[illegible]黃[illegible]之[illegible]出[illegible]白

殭蠶末乾蝎末鉛霜等分研和令勻粟米飯為丸如菉豆大每服五

丸空心薄荷湯下或豆淋酒下亦得

如神散 治左癱右瘓風濕痺走注疼痛無問男子婦人遠年日近並宜服之

御米殼[illegible]　陳皮　虎骨　乳香

沒藥　甘草

右為細末除乳香沒藥另研外每服三錢水一盞未煎至八分連滓熱服病在上食後病在下食前如煎藥一服[illegible]之[illegible]切[illegible]

所忌者為醋魚鮓等肉

[illegible]治癱瘓風脫[illegible]

仙茅　草麻子　浮萍草　獨頭蒜

桃仁　桃膠　自然銅

右六味為末研[illegible]為末入蒜膏內搗和[illegible]上塊[illegible]蓋之汗

出為效日三上

天麻丸 治癱瘓風

天麻　白附子　附子　地骨皮　烏頭　羌活

荊芥穗

右並生用為末煉蜜和丸如雞頭大每服[illegible]或一丸用生[illegible]

[illegible]茶清任下

治[illegible]手足不隨方

梅皮　枸杞根　苦參

桑木皮　五靈脂

右為末每用時[illegible]一人身長[illegible]

[illegible]

去骨[illegible]

鎮心散 治癱瘓風四肢緩弱無力

服鎮心散一服

白芥[illegible]　防風　甘草

右將[illegible]為末每服二錢[illegible]

邊臥於[illegible]上[illegible]用[illegible]

眼盡當有汗出如膠水

追風散　治癱瘓風

用五靈脂三兩杵碎以水浸攪勻先傾去上黑濁者後去下沙石者取中間細者於灰盆之中紙上注乾搗研為末每服三錢匕酒一盞煎兩沸服[illegible]服續命湯

續命湯　治癱瘓風

山茵蔯　麻黃

右麁搗篩每服十錢匕水三盞煎至二盞入好酒一盞再更煎三五沸去滓服盡不得離臥床上避風三七日須服六十一日乃無後患也服須是不透風仍從十月後二月以前可用此去治之過此時熱難用

排風散　治中風癱瘓

白附子　麻黃（去節）　骨碎補　天麻　白殭蠶

羌活

右並生用搗羅為散每服五錢匕溫酒調下不拘時候

又左經丸　治左癱右瘓手足顫掉言語謇澀渾身疼痛筋骨拘攣不得屈伸項背強直下疰腳膝行履艱難骨節煩疼不能轉側跌撲閃肭外傷內損並皆治之

木鱉子　白膠香（研）　草烏　五靈脂

當歸（一兩）　斑貓

右為末用黑豆去皮生杵粉一斤醋煮糊為丸如雞頭子大每服一丸酒磨下如筋骨疾不曾針灸傷筋絡者進四五丸立效此藥專治肝心腎五經服後小便少乃其驗也一治一切風便用醋調生豆末諸風重者兩日一服彈子大小兒五歲以下分四服以上三服日一丸酒下

生地黃散子　治癱瘓風手足不遂言語謇澀心神恍惚

烏龍丸　治中風癱瘓手足不隨語澀口喎筋骨疼痛與小續命湯相間服之大效

蹬腳丸　治左癱右瘓腳弱不能行履

木鱉子　白膠香（別研）　白芍藥　草烏　赤小豆

右為末入赤小豆糊為丸梧桐子大每七丸漸加至十丸溫酒或木瓜湯下病在上食後臨臥服病在下空心服忌熱物少時

放杖丸　治風癱左癱右瘓牽搐但服之久皆功

蒼朮　[illegible]　何首烏　蒼耳葉

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒下

烏龍丸　治癱瘓風手足擺動口眼喎斜言語謇澀步履不正

左經丸　治中風癱瘓手足顫掉語言謇澀渾身疼痛筋脈拘急不得屈伸項背強直下疰腳膝行步艱辛風濕疼痛不可轉側跌撲閃肭外傷內損並皆治之

生黑豆　川烏

沒藥　草烏

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不以時一方加乳香一兩研常服通經絡活血脉疎風順氣壯骨輕身一方無草烏

左經丸　蘇沉良方上四味各三兩生當歸一兩焙地龍斑貓百箇糯米炒用餘味同

草烏　木鱉子（研）　白膠香　五靈脂　當歸（五兩）

乳香（二兩）　地龍

右為末生黑豆末醋煮糊為丸雞頭大每服二丸溫酒磨服

四聖祭金丹　治男子婦人左癱右瘓口眼喎斜中風疾病偏方修合誠心服餌大病不過三服輕得病一服必驗

槐子　前胡　甘菊花　豬牙皂角

[illegible]

右為細末煉蜜為丸如彈子大病重者每服一丸細嚼茶清送下病輕臨時加減微汗出為效如汗後體熱難忍喫甘草解之

四生丸　治左癱右瘓口眼喎斜中風手足半身不遂不能舉者悉皆療之

五靈脂　骨碎補　川烏頭　當歸

右為細末用無灰酒打麪糊為丸如梧桐子大每服七丸漸加至中
丸至十五丸溫酒下服此藥莫服靈寶丹恐藥無効
殭蚕丸 治麻痺風手足不隨言語不正
白殭蚕炒 烏頭炮去皮臍 沒藥一兩另研 蜈蚣炙半
右為末酒煑麪糊和丸梧子大每服十丸薄荷酒下日三服
妙聖丸 治卒中癱瘓風手足攣急渾身疼痛
蜻蜓 麻黃去節 烏頭炮去皮臍 木鱉子去殼
右三味為末用酒二升熬蜻蜓破取汁十斤不用慢火熬成膏和藥末丸如
小彈子大每服一丸溫酒化下不拘時候
不省風湯 出直指方 治腲腿風 治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不能言半身不
遂手足頑麻一切風疾並皆治之
防風 南星炮 甘草一兩
右㕮咀每服三錢水一盞薑五片煎至六分去滓熱服氣逆者加紫
蘇二錢半木香三錢半氣虛加附子一兩沉香二錢脫腸不利加半
夏一兩人參半兩頭暈疼加天麻半兩全蝎二錢病熟入少麝香
小靈寶三倍丸 治癱瘓中風半身不遂語言蹇澁口眼喎斜股瘦
麻痺
草烏頭一斤黑豆一升同煮去皮 蒼朮 葱白
右焙乾為細末好醋煑麪糊為丸如梧子大每服十丸至二十丸食前
溫酒下日進三服大効
枳殼散 治中風手足無力口中涎出多在右邊
枳殼去穰麩炒 牛黃研 白芷各等分
右搗研為散每服三錢匕空心溫酒調下
梔子丸 出海上名方 治癱瘓風宜久服之
山梔子去皮 草烏頭炮 乾薑炮各兩
右為末棗肉和丸如菉豆大每服三丸漸加至七丸常服二丸不許
茶酒任下
木香湯 出聖惠 治左癱右瘓偏枯不遂等疾
青木香一兩 瓜蔞去皮一箇
右先取好瓜蔞一箇取子及穰去皮將子與穰各研細用無灰酒

一大盞投之攪勻用生絹濾取汁如此研絞二兩次看醋無味乃止
於銀石器內煎三兩沸調木香末帶熱服令人按摩病處良久
就病處卧移時自能舉動矣此方乃大為山僧云氣行則風行氣
逆則風聚甚者不過三五服大有神驗中風里地有熱証者可服
保安丸 治一切癱瘓風
治諸風癱瘓痛發者
乳香二斤 穀子
右為散酒服方寸匕日三服稍加之無忌
催明散 治麻痺不可針灸者 用蓮殼不以多少研為細末每服二錢溫酒下日三服至五
服不計時候服三日後再用杖策藥
治中風痰疾
用膽礬如研如麪每一字許以醋湯下立吐出涎效
治癱瘓新得患及年深者
用蒼耳地膚子末加葱汁打麪糊為丸如梧子大空心或酒或茶
下五十丸神效 一方為末葱汁酒調服之吐出涎取愈之為妙
豆豉散 治中風四肢不收者
用豆豉三升水九升煮取三升分為三服日二作之亦可酒漬煮飲
之用豉一升微熬令黃以酒三升漬中三宿溫服微令醉為佳
治癱瘓風及諸風手腳不遂腳氣痹弱者
用龍皮膠炙令微起 去滓內膠更煑六七沸膠烊如餳頓服之及熱喫葱豉粥任意多少
若食即令人嘔逆頓服三四劑即止禁如前法
黃連丸任
大聖丸 治癱瘓風及腎臟風上攻下注 切諸風疾並皆療之
川烏頭炮去皮臍 五靈脂 麝香 乳香
白附子 辰錦砂
右件五靈脂烏頭先細杵為末後研細入和勻以面北取
不語井花水為丸如櫻桃大丸了用朱砂為衣子盛掛當風處日一服
切不可多服無事不得服如是不忌飲食四散大段有汗解

之明日再服男子女人皆可服得合時救療日不開令一切風疾大雅大
等見錢臥用當日半身化出等扶服忌相風移宇婦不服

【祛肝散】治諸風及急攻主治骨生疹瘡癬赤白癜風等一切風疾

烏頭　天南星　白附子　天麻　殭蠶　藿香　牛黃　麝香　烏蛇　蝎梢

右為末都與研者和勻，溫酒下二錢，再服無差

常服半錢溫酒下

【至聖一醉膏】治癱瘓風

天麻（一分）　沒藥　乳香

安息香（一分）　麻黃　生附子　附子

右件七味一處搗羅為細末，每服四大錢，銀石器內熬成膏，傾出分在四處，遇內別用法酒，看患人飲酒多少漸調膏子服，盡為度，令患人以衣被蓋，或汗出，氣以漸行，即勿令風，次日再實一服，半身汗出，已與得此疾五十日已上方治，若緩者不在治限

【省草散】治癱瘓等疾及下痰毒

省草　前三稜　當歸　蓬莪茂

蝎梢（一分）　官桂　羌活

右件七味都生搗為末，如人卒中惡風，昏迷大有風涎，方器即時以藥四錢，用二錢生末先置盞中，以二錢末用酒一盞半煎至八分，熱在生藥盞內調勻，帶服服，但下得咽喉，扶起，須臾即吐出惡涎立愈。如諸般風疾症候皆法，每日一服，未無中風及疾延，知久患癱瘓，暑常服，經月餘，必被上有臭汗氣，損如人形狀，其患未差

【大蒜草散】治丈夫女人癱瘓風及血風，但一切風疾皆療

荊草　石斛　牛膝　附子　萆薢

天麻　麻黃　澤瀉　防風　石龍芮

松脂　獨活　杜仲　芎　芍藥

人參　茯苓　烏蛇　薯蕷　桂心

吳白犬　吳細辛　麝香　柏子仁　兔絲子

右件二十五味各等分，並為末，以好酒，每服一錢，溫酒下

【寶命丹】治諸風癱瘓，但未服此藥必差，治癱瘓風及軟風

五靈脂　牛黃　蝎　附子　天南星

右件五味並生為末，煉蜜為丸如雞頭大，用生薑自然汁化，後將放之溫服，或遠年軟風須無風處用甜酒并浸定，令汗出便服一丸，如是多年者，先燒火炙令熱，微方服此藥為妙

【輕骨丹】主中風癱瘓，四肢不隨，風痺等疾

麻黃　桑白皮　白芷

蒼朮　甘松　川芎　苦參

右六味研勻細，以前麻黃膏和丸，彈子大，每服一丸，溫酒下，盞研化溫服之，卧取汗，五七日間再服，手足當即輕快，卒中涎潮分利後用之

【經進骨碎補圓】治左癱右瘓

五靈脂　木鱉子　生薑

地龍　黑牽牛

白膠香

黑豆　威靈仙　乳香

防風　天南星　麝香

右件各焙碾為末，醋糊為丸，如梧桐子大，初服五丸，加至七丸，食後薄荷茶下

【萬氏必安丹】治血虛生風，左癱右瘓，口眼喎斜，語言蹇澀，諸疾

沒藥　全蝎　羌活　虎骨　獨活

防風　川芎　當歸　薏苡仁　半夏

川烏頭 去皮尖 天麻 蠍 前胡
東丹紅 細辛 朱砂 研為衣
麝香 腦子 以上各研
右為細末，糯米糊丸如龍眼大，朱砂為衣，每服一粒，溫酒下，或薄荷茶
下，食後服
太乙丹 治一切癱瘓諸風疾
五靈脂 大黃 草烏
殭蠶 錢子 地龍 川烏 防風
白膠香 乳香 沒藥 紫金
麝香
右為細末，酒糊為丸如彈子大，每服一丸，分三服，日，生薑酒
汁浸，溫酒一盞磨下，忌發風物，須臾日或端午日合，不許婦人
孝服人見，孕婦不可服
經進龍虎金丹 治一切癱瘓風疾
黑附子 川烏頭 虎骨
[illegible]
古文錢 為
地龍 木鱉子
黑牽牛 蓯蓉 牛膝 沒藥
乳香 巴戟 八 自然銅
右為細末，酒糊為丸如梧桐子大，每服十丸，漸加至二十丸，茶
鹽湯送下，食前
黃龍丸 治經絡間 方 經進 治左癱
右瘓，手足麻木，口眼喎斜，風痺，產後腳疼痛，治婦人血風勞氣遍身
疼痛，洗頭傷風，頭面浮腫，舌脹口乾，咽喉膈悶，多睡，腦風，來腦風，偏正
頭痛，破傷風等疾
紅芍藥 川烏 防風 香白芷 天麻
麻黃 華陰細辛 殭蠶 雄黃 川芎 各二
白蒺藜 甘草一兩 乾薑 藿香葉 甘松
右為末，煉蜜為丸如彈子大，每服一丸，薑汁磨化，溫酒調下，忌熱食

少許
乳香丸 治左癱右瘓，口眼喎斜，走注風氣，腫腳麻痺，一
切風疾，赤根白頭，氣瘡如瘡，油調塗瘡，濕癢，打撲閃肭，虎骨
損研碎入，又藥內入香各半錢
乳香 沒藥 川烏 草烏 地龍
白牽牛 白殭蠶 五靈脂
硃砂 何首烏
右焙碾為末，酒糊為丸如梧子大，每服十五丸至二十丸，食後茶酒
任下
青龍丹 治男子婦人左癱右瘓，牽引口面喎斜，遍身疼痛及
傷風身重，四肢頑麻，牙關緊急，並皆治之
草烏頭 香附子 半夏 麻黃
香白芷 白附子 白芷 天南星 赤芍藥
川烏頭 藿香葉 山藥 青皮
白殭蠶 藿香葉 甘松 零陵香
[illegible]
細松煙墨
右件為細末，醋麵糊為丸，每一兩作二十丸，每服一丸，生薑
同研，熱酒送下，不拘時候
防風雄黃丸 治左癱右瘓，手足麻痺，腰腳疼痛，或風氣面目口
苦舌乾，頭昏目暈，并腦風來腦風，偏正頭疼，兼治婦人血風勞氣遍身
疼痛，及洗頭風，破傷風，並皆治之
赤芍藥 八兩 防風 香白芷 川烏頭
麻黃 白蒺藜 雄黃 白殭蠶
細辛 天麻 川芎 乾薑
藿香葉 甘松 甘草
右件為細末，煉蜜為丸，每一兩作十五丸，每服一丸，細嚼，茶酒任下
不拘時候
蜀金丸 治男子婦人左癱右瘓，口眼喎斜，打撲傷損，筋骨疼
痛，語言蹇澀，行步艱難，一切風疾，下注腰腳，鶴膝等風
天雄 附子 草烏頭 骨碎補

白膠香（一兩） 川烏頭（一兩） 防風（去蘆） 天南星（炮）
錫蔔情（[illegible]） 草薢 白附子（炮） 自然銅（[illegible]）
葫蘆巴 破故紙 白殭蠶（炒去絲嘴）
五靈脂（炒） 赤小豆（生用） 糯米（炒黃） 沒藥（別研） 乳香（別研）
右件為細末，酒煮麪糊和丸，如梧桐子大，每服二十丸。如腰已上疼痛等病，食後細嚼荊芥茶送下；如腰已下疼痛等病，食前細嚼胡桃酒下。

虎骨丸（[illegible]） 治癱緩諸風及風寒濕痺，腳膝軟弱，骨節疼痛。
虎脛骨（酥炙） 川芎 熟乾地黃 防風（去蘆） 羌活
當歸（去蘆） 附子（炮去皮臍） 草薢 金毛狗脊（去毛） 羚羊角屑
川烏頭（炮去皮） 白蒺藜（炒去刺） 天麻（去苗） 白朮
黃耆（蜜炙） 杜仲（[illegible]） 已上十五味各一兩半
右件各細剉，如麻豆大，用酒浸，春五夏三秋七冬十日，取出焙為細末，以浸藥酒打麪糊為丸，如梧桐子大，每服三十丸，溫酒下，食前。

保命龍虎丹（[illegible]） 治癱緩走注疼痛，風勞氣冷，腰膝軟弱，四肢頑痺，兼治從高墮下，折口眼喎斜，久臥床枕，起止不得。
白膠香（別研） 虎骨（酥炙） 黑牽牛（生） 乳香（別研）
古老錢（[illegible]） 木鼈子（去殼） 當歸 川烏頭（炮去皮臍）
沒藥（別研） 附子（炮去皮臍） 巴戟（去心） 草烏頭（[illegible]）
牛膝（酒浸） 肉蓯蓉（酒浸） 自然銅（[illegible]）
右件各等分，為細末，醋煮麪糊為丸，如梧桐子大，每服三十丸，溫酒或煨蔥湯送下，婦人醋湯下，空心。

除風丸（[illegible]） 治中風癱緩，口眼喎斜，四肢不收，肌肉頑痺，時[illegible]。
天南星 川芎 白附子 半夏 天麻
白殭蠶 防風 石膏 蝎梢
白花蛇
右件為細末，生薑自然汁打麪糊為丸，如梧桐子大，每服五十丸，生薑湯下，食後臨臥。

赤金丸（[illegible]） 治卒中風，左癱右緩，筋脈拘攣，不能行步。[illegible]錢四十文，又鐵線穿入，放[illegible]

假蘇為末，入研細硫黃末一兩，相間入炒合子內，以赤石脂和泥固濟，令乾，復用火煅，候冷取出，細研，入下項藥：
附子（炮去皮臍） 川烏頭（炮去皮臍） 地龍（炒去土） 白膠香（別研）
乳香（別研，一兩半） 沒藥（別研）
右件為細末，醋煮麪糊丸，如梧桐子大，每服五七丸，加至十丸，溫酒送下，空心。

紫金丸（[illegible]） 治諸癱瘓，手足不隨，極妙。
天雄 附子 大川芎 [illegible]烏（四兩） 人參
白附子 乳香 沒藥 當歸（一兩） 山梔子
[illegible]（各一兩） 防風 降真乳 辰砂
全蝎
右件生用，焙乾為細末，酒煮麪糊丸，如梧桐子大，每服五七丸，空心溫酒下；[illegible]風木瓜酒下；頭風生薑茶下；婦人冷心痛，艾醋湯下。

麝香輕骨丹（[illegible]） 治左癱右瘓，不論走注，並皆治之。
川草烏[illegible]海桐[illegible]皆半兩，與蜈蚣、羌活一倍，同真麝香[illegible]末糊為[illegible]最有功，選甚左癱并右瘓，不論走注及諸風，四肢麻痺多疼痛，[illegible]損勞傷治一同，但把麝香酒研服，須臾驅取病源通。
川烏 草烏 防風 白膠香 獨活
全蝎 海桐皮 蜈蚣 羌活 真麝香（少許）
右為末，糯米糊為丸，如彈子大，空心服，酒下。

黑神丸（[illegible]） 治一切癱瘓風。
草烏頭 五靈脂（各等分）
右為末，六月六日滴水為丸，大彈子大，四十歲以下分六服，病甚一丸分一服，薄荷酒磨下，覺微麻為度。

四君子湯 治風癱瘓。
江州開元[illegible]安張[illegible]舒州蒲顯[illegible]野人至樂安[illegible]病癱[illegible]來[illegible]其只服四君子湯二十斤，可以向有七八年，苦不然，喫其[illegible]不敢聞於信，又只合四君子湯服之，至十餘斤，遂成完人，後壽數皆如所言。張後令中風人服四君子湯愈者三人，方雖世所共

人參 白伏苓 白朮 甘草

右四味擇好無蟲分為細末每服湯調下不拘時候

龍珠丹 治一切中風[illegible]手足不遂[illegible]骨節疼痛[illegible]

川烏頭 虎骨 牛膝 乾蝎

欵冬 香白芷 附子 楓香

鄭退花 獨活 藿香葉 白殭蚕

當歸 白花蛇 草烏 全蝎 乳香

天麻 麝香 麥門冬 羊角 沒藥 川芎

右件為細末研勻煉蜜為丸每一兩作十五丸朱砂為衣每服一丸[illegible]病大可服兩丸加不飲酒以荊芥茶送下不拘時候

祛風保安丹 治中風左癱右瘓一切風氣攻注[illegible]

骨疼痛手足不遂口眼不正肢體偏廢

烏蛇 天麻 附子 白附子 赤箭

沒藥 朱砂 細辛 羌活 防風

黃耆 赤芍藥 白殭蚕 萆薢 獨活

五靈脂 白朮 當歸 川烏頭 香白芷

木香 烏犀 川芎 乾薑 乳香

石蓮肉 全蝎 麝香

右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十五丸朱砂為衣每服一丸細嚼荼酒任下金銀薄荷湯或豆淋酒亦得不拘時候

御藥院神驗丹 治[illegible]諸虛不足中風癱瘓寒濕相搏[illegible]骨疼痛弱手足無力

降真香 骨碎補 木鱉子

附子 天麻 白蒺藜

烏藥 人參 川烏

乳香 麝香

右各研末同和煉[illegible]丸[illegible]下食前

神仙[illegible]治小兒心神中風[illegible]

口眼喎斜語言蹇澁[illegible]人難後中風

治[illegible]

白花蛇頭 附子 白[illegible] 赤足蜈蚣

全蝎 天麻 五靈脂 牛黃 腦子 麝香

乳香 沒藥 雄黃

右件為細末入腦子等末拌勻煉蜜為丸每一兩作十五丸朱砂為衣每服一丸[illegible]酒磨下小兒急慢驚風以一圓分作四服薄荷湯磨下

起發丹 治[illegible]中風癱瘓口眼喎斜語言蹇澁手足[illegible]筋脈拳縮骨節疼痛一名赤虎丹 甘和得病之日[illegible]剗人倏此驗[illegible]不為廢人

川烏頭 附子 白花蛇 五靈脂

乾薑 肉桂 羌活 天南星

金牙石 虎骨 菊花 零陵香

香白芷 川芎 麻黃 藿香葉 甘草 血竭

生地黃 當歸 白姜 朱砂 腦子 麝香

右件為細末入地黃當歸膏子同搜和於木臼內搗千餘杵每一兩作[illegible]

每服一圓用熟豆淋酒磨下不拘時候豆淋酒[illegible]
浸之去豆用酒是也
神仙丹 治一切中風左癱右瘓半身不遂眼喎斜卒暴中風
目瞪口噤牙關緊急不省人事[illegible]一切風疾並皆治療
雄雀 烏蛇 川芎 當歸 白花蛇 草薢
藿香葉 天南星 蔓荊子 檳榔 菊花
牛膝 犀角屑 白附子 全蝎 白殭蚕
真珠末 朱砂 麝香 阿膠
地龍 防己 殭蚕 天麻 牛蒡子
人參 防風 藁本 獨活 白茯苓
羌活 麻黃 乾薑 躑躅花 香白芷
右件為末同研拌勻煉蜜為圓每兩作一十五圓別研朱砂為衣每服
[illegible]化下空心一圓分四服金銀薄荷湯化下更量虛實不拘時候

大通丸 治卒中不語口眼喎斜左癱右瘓傷風頭疼[illegible]風四肢
頑痹頭面虛腫風熱[illegible]昏眩[illegible]
疼耳內蟬鳴腰脚疼痛風毒攻眼冷淚昏暗婦人血氣攻注疼痛
草烏頭 寒水石 陳皮
肉桂皮 荊芥穗 藿香葉 薄荷葉 天南星
甘松 藁本 香白芷 麻黃 烏藥
沒藥 天麻 牛膝 川芎 乳香
右件為細末合和令勻糯米糊和成丸每一兩作一十五丸每服一丸
一丸磨化茶酒任下卒中不語[illegible]眼喎斜左癱右瘓傷風頭疼天麻
風[illegible]茶下四肢頑痹[illegible]薄荷茶清下[illegible]
下[illegible]溫酒送下腰脚疼痛乳香酒下風毒攻眼[illegible]
婦人[illegible]溫酒送下[illegible]
花茶下[illegible]
石蓮丸 治中風[illegible]
一切風疾 草烏頭 天南星 川芎 五靈脂 木鼈子

躑躅花 蔓荊子 乾蝎 白膠香 沒藥
乳香 麻黃 地榆 天麻 京墨
右除[illegible]外並生用不見火日曬乾為細末入墨並酒糊丸如彈子大常於
端午日合[illegible]每服一丸[illegible]井水
生薑薄荷自然汁磨[illegible]溫酒[illegible]小兒天吊
驚風一丸分四服打撲傷損[illegible]薑汁[illegible]傷風咳嗽鼻塞眼
[illegible]衣[illegible]汗立愈忌猪雞[illegible]毒物如無生薑薄荷者亦得
飛龍丸 治中風癱瘓[illegible]不語
生[illegible] 朱砂 雄黃 白[illegible]
右為末用[illegible]石[illegible]酒煎[illegible]一兩[illegible]和丸菉豆大每服十丸溫
[illegible]子小便下
如聖散 治中風癱瘓不拘[illegible]老者用此方取效實人可用
[illegible] 白[illegible] 白术
右為末每服二錢溫酒調下日三服至五服不拘時候服藥三日後
用[illegible]湯[illegible]通[illegible]

[illegible]丹 治一切[illegible]手足頑麻腰膝沉重左癱右瘓四肢[illegible]
婦人血[illegible]產[illegible]一粒[illegible]溫化散[illegible]和[illegible]
散小兒驚[illegible]末飲化半丸
白桑皮 川芎 白术 紫河車 人參
防風 何首烏 地骨皮 蔓荊子 威靈仙
五味子 木香 苦參 各一兩 犀角 龍腦
麝香 各半兩
右為細末煉蜜和
作膏法
麻黃 蒼朮 犀角
右用河水一斗八升井水亦得同熬至三四升去滓[illegible]者再熬
成膏和前藥每兩作八丸朱砂為衣
如神散 治風濕手臂左癱右瘓風氣等證
真[illegible]角 北棗 四兩 海[illegible]
右先將[illegible]熬成膏汁濾出[illegible]

熬乾取出棗少頃再如前汲水煎熬至七分取汁一盞進旋[illegible]
乾為度每用三錢細末溫酒調下後服飲一盞或三四錢之上不得[illegible]
嬰

〔治暗風〕[illegible]
取牛[illegible]之後[illegible]中[illegible]每服[illegible]日每日飲三兩[illegible]多少[illegible]
新[illegible]每[illegible]食前服三七粒子熱湯吞之十服後[illegible]
[illegible]

治腰痛〔[illegible]〕取[illegible]
療癱瘓諸風手足不遂
三七遍[illegible]小便
用石[illegible]擣為丸如梧桐子大酒服三十粒日三服
百日差[illegible]服[illegible]
麻黃[illegible]治諸風左癱右瘓[illegible] 麻黃 木[illegible] 杏仁 大黃
[illegible]一斗煎一升[illegible]別[illegible]

中風身體不隨 附[illegible]

夫中風身體手足不隨者由[illegible]脾胃之[illegible]也足
太陰為脾之經脾與胃合足陽明為胃之經[illegible]水穀之海也脾
身[illegible]肌肉主為胃消行水穀之氣[illegible]
重受風邪[illegible]故不能為胃通行水穀之氣致四肢肌肉無所[illegible]
風邪[illegible]經[illegible]陽經[illegible]故令身體手足不
隨[illegible]
九竅不通四肢不舉皆[illegible]也又肝主筋腎主骨[illegible]
虛風邪[illegible]

方

閻[illegible]丸[illegible]治諸風手足不隨神志[illegible]言語[illegible]
筋脈[illegible]頭[illegible]不[illegible]健忘[illegible]
逆[illegible]不仁
防風 白龍腦 乳香 羚羊角
白殭蠶 附子 檳榔 肉豆蔻 沉香
[illegible] 蔓荊子 牛黃 [illegible]

麻黃[illegible] 生犀末 雄黃 麝香 木香
辰砂 茯苓 白附子 羌活 原蠶蛾
人參 [illegible] 芎藭 真珠末
[illegible] 乾蠍 半夏 [illegible]
天麻 琥珀 [illegible] 川烏 金箔
[illegible]
白花蛇[illegible] 白豆蔻
右為細末入研藥令勻煉蜜和丸如雞頭大每服一丸細嚼[illegible]荊芥茶
下[illegible]化[illegible]三丸[illegible]中風[illegible]手[illegible]口[illegible]發[illegible]
化[illegible]三丸[illegible]下[illegible]
[illegible]不拘時候

〔[illegible]仙方〕凡患風[illegible]四肢不舉[illegible]服之三日七日[illegible]十日
步[illegible]月[illegible]自依[illegible]覺[illegible]輕健[illegible]又有神效
治之
[illegible] 防風 羌活 杜仲 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 人參 白蒺藜 牛膝子
[illegible] [illegible] 山茱萸 白茯苓
[illegible] 遠志 [illegible] 牛膝 [illegible]
乾[illegible] 乾地黃 [illegible] 天雄 [illegible]
[illegible] 黑附子 白茯苓 兔絲子 續斷 [illegible]
右[illegible]已上[illegible]
右[illegible]川[illegible]好者依方[illegible]用新[illegible]
兒一斗[illegible]在內[illegible]二斗[illegible]封其口[illegible]
二七日[illegible]三七日[illegible]早[illegible]午[illegible]三時令[illegible]
酒三盞[illegible]服之每服不過一盞不[illegible]
[illegible]服者不過一月[illegible]十日[illegible]五日見效不問[illegible]小兒
骨節疼痛四肢[illegible]語言[illegible]

〔白花丸〕
中風[illegible]
川烏 草烏 兩頭尖 全蠍 細辛
香白芷 川芎 乳香 沒藥 白术 蒼术 五靈脂

天麻　人參　防風　菊花　薄荷各　獨活
白殭蠶　羌活　石膏　雄黃　蒼朮　茯苓
青皮　大風子　桑白皮　桔梗　荊芥　甘草
官桂　芍藥　寒水石　硃砂二　白花蛇　烏梢蛇
自然銅已上各一兩
右爲細末，[illegible]水[illegible]許，[illegible]作十九丸，每服
一丸，食後細嚼，熱酒下，[illegible]下，牙疼入鹽一捻，漱之，渾身疼
痛，不拘時候，溫酒下。
丹砂丸 [illegible] 治中風手足不遂，言語蹇澁，血脉不仁，肢節疼痛。
天南星　赤箭　附子　防風
牛膝　防已　白附子　獨活　白殭蠶
麻黃　芎藭　桂心　白花蛇　蟬殼
川烏頭　羚羊角　乾蝎　桑螵蛸
烏犀角屑　麝香　雄黃　牛黃
龍腦

右爲末，入研了藥，更研令勻，煉蜜和搗三五百杵，丸如梧桐
子大，每服空心及晚食前，溫酒下十丸。
仙靈脾散 [illegible] 治中風手腳不遂，肌肉冷麻，骨節疼痛，緩弱
不隨。
仙靈脾　天雄　天麻　牛膝　石斛
烏蛇肉　虎脛骨　肉桂
麻黃　獨活　芎藭　萆薢　當歸
附子　桑螵蛸　丹參　五加皮
海桐皮　防風　薏苡人　乾蝎　牛黃
麝香
右爲散，入研了藥令勻，每服食前，以溫酒調下一錢。
石斛浸酒方 [illegible] 治中風手足不遂，骨節疼痛，肌肉頑麻。
石斛　天麻　芎藭　仙靈脾　五加皮
牛膝　萆薢　當歸　桑寄生　杜仲
烏蛇　羌活　狗脊　丹參　桂心

附子　川椒　虎脛骨
右以細剉，用生絹袋盛，以酒二斗，於瓷瓶中浸，密封，經七日後，每日
旋取一小盞，不計時候溫飲之，常令酒氣相續，其酒取一盞，添一盞，
盡以藥[illegible]。
附子散 [illegible] 治中風手足不隨，言語蹇澁，[illegible]之暴驗。
附子　羚羊角　川芎
白茯苓　防風　白朮　當歸
桂心　肉桂　防已　麻黃　細辛
羚羊角　白茯神　甘菊花
右㕮咀，每服五錢，水[illegible]，生薑[illegible]，棗一枚，煎服，不拘時。
芎藭湯 治中風手足不隨，身體疼痛，口眼喎斜，舌強不語。
芎藭　防風　羌活　杏仁
葛根　羌活　桂心　白茯苓
薏苡人　石膏　萆薢　人參
桂心　麻黃

右㕮咀，每服十三錢，水三盞，煎[illegible]，分三服，微熱服之，日二服，夜一服。
每日[illegible]，風府一穴，風池一穴，肩髃一穴，曲池一穴，足三里一穴，五
穴各一穴，[illegible]九穴，即灸一寸，治偏風。
犀角散 治中風手足不遂，[illegible]疼痛，心胸煩熱。
生薑[illegible]，不用灸法。
羌活　防風　獨活　桂心　羚羊角
當歸　白茯苓　葛根　牛膝　仙靈脾
右[illegible]，每服[illegible]，煎至[illegible]，溫服，[illegible]。
海桐丸 治中風手足不隨，[illegible]。
五加皮散 治中風手足不遂，肌肉頑痺，骨節疼痛。
五加皮　桂心　羌活　防風　杏仁　萆薢
附子　牛膝　丹參　芎藭
當歸

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓空心溫服良久再服
衣覆得汗後忌生冷油膩毒魚動風物

礬石獨活湯 出聖惠方 治中風手脚不遂口面偏斜語澁重聽

礬石 桔皮 防風 蒺藜 桂心 白朮 赤箭 附子 炮裂去皮臍

赤茯苓 牛膝 去苗 各等分 枳殼 麩炒微黃去瓤 山茱萸 羚羊角

右為末用酒五升煉大火成膏收於瓷器中每於食前以暖酒調

麝香一錢 羌活一兩

下中卷

海桐皮丸 出聖惠 治中風手足不隨身體疼痛肩背拘急

海桐皮 石斛 去根 羌活 去蘆 赤芍藥 牛膝 去苗酒浸 白附子 炮

防風 一兩 木香 山茱萸 各三分 菊花 蔓荊子 各半兩

右為細末以天南星末二兩半同好酒煮為膏和丸如梧桐子大每服十

五丸茶酒任下

青龍丸 出聖惠方 治中風手足不隨筋脈拘急

附子 炮裂去皮臍 芎藭 白朮 獨活 一兩

麻黃 去根節 蔓荊子 一分 牛黃 研 各分 麻黃

丹砂 研 龍腦 研 麝香 研 龍齒

右為細末別用水銀三兩以蒸棗肉五十枚去皮核研水銀星盡為

度次入諸藥更入少許熟蜜和丸如雞頭大每服半丸或一丸臨卧以

熟水化下其患甚者每服夜所二丸如小兒驚風每丸分作三服

用薄荷湯化下

大四斤丸 出和劑方 治風寒濕毒與血氣相搏筋骨緩弱四肢疲疼痺痛

天麻 川牛膝 去苗 宣州木瓜 肉蓯蓉 洗切焙 各一斤

熟附子 虎骨 酥炙 二兩 大當歸 三兩 乳香

沒藥 五靈脂 各半兩 麝香 一錢

右為末浸酒煮麵糊丸梧桐子大每服三四十丸食前溫酒或豆

淋酒下木瓜湯亦下

蠲痺散 出本事方 治肝腎氣虛風入腰膝骨手足緩弱

小附子 去皮 草烏頭 去皮 蒼朮 川芎

牛膝 酒浸 當歸 天麻 各半兩 防風 白芷

右為末每一錢黑豆一撮同煎調酒用枝…溫酒下食前服

附子湯 出聖惠方 治中風手足不遂肢節疼痛

附子 炮裂去皮 桂心 各一兩 赤箭 牛膝 去苗 枳殼 麩炒 羚羊角

萆薢 當歸 丹參 仙靈脾

右為細末每服食前以溫酒調下一錢

夜合枝湯 出… 治中風手足不遂攣縮屈伸艱難

夜合枝 桑枝 槐枝 柏枝 石榴枝 各生用五兩 羌活 黑豆 防風 糯米 細辛

右先以水五斗將五枝同煎取二斗五升去滓從黑豆…

與防風羌活二味并和…

清酒三合至五合時飲之常令有酒氣無令過醉恐至亡

亂正氣

附子湯 治中風身體不遂不能言語精神恍惚

六十一

附子 炮裂去皮臍 桂 去皮 葛根 剉一兩

地骨皮 白朮 獨活 去蘆 芎藭 石膏

右剉如麻豆每服五錢以水二盞入生薑五片煎至一盞去滓不計時候溫服

空心併二服夜一服或夜所二服服訖以熱生薑粥投之衣服蓋取汗

小風不欲汗即不以食粥

生地黃煎 治中風手足不隨或拘攣屈伸不得口眼喎斜偏風

疼痛或痿痺沉重病在筋骨

生地黃 取汁 桂 海桐皮 山茱萸 黑豆

右先以四味知大麻豆於銀石器中先煎地黃汁三二十沸

黑豆汁又煎三二十沸即下吹咀四味勿停手攪候大煎至一

生布絞去滓入下…煎二兩再煎勻攪如稠

每日空服以無灰酒…調服之…

以酒每日三服切忌房室此方兼治婦人產後風血惡疾

羚羊角煎 治中風手足…

羚羊角湯　荊芥穗　羌活去芦各　熟乾地黄
防風二兩　黑豆
右先以四味㕮咀如麻豆每服五錢已用荊芥一盞半同煎至八分
去滓重煎如膏每空心以溫酒服調日三夜一不拘時
赤箭丸　治中風手足不遂肢體麻痺筋骨疼痛
赤箭　獨活去芦各　麻黃去節　烏頭炮製去皮
芎藭二分　乾蝎去土　當歸切焙
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸暖荊芥酒下不拘時
附子散　治中風手臂不隨口面偏斜
附子炮去皮　桂去粗皮各一兩　乾薑炮二兩　細辛去苗葉　防風去叉
甘草炙三分
右為散每服一錢至二錢已空心以溫酒調服
天麻丸　治中風手足不隨筋骨疼痛行步艱難
天麻二兩　地榆一兩　沒藥　烏頭炮去皮臍
麝香一錢

右除麝香沒藥細研外同搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下空心晚食前服
烏雞散　治中風手足不遂
桂去粗皮　細辛去苗葉　防風去叉　乾薑炮二兩
右為散每服半錢加至一錢食後良久溫酒調下日三夜一未覺漸加
萆薢煎　治中風手足不遂
生萆薢　細辛　生地黃汁　附子
右先取萆薢地黃汁附子末同煎
天麻丸　治中風手足不遂肢體疼痛
天麻　地榆　玄參　烏頭
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三丸至五丸食前荊芥湯下

獨活湯　治中風不能言四肢不收手足軃曳
白芍藥　桂心　栝蔞根各一分　甘草三分　獨活二兩
右剉如麻豆每服四錢以水二盞煎至一盞去滓溫服
皇甘酒　治中風手足不隨
白朮　地骨皮　荊實　菊花
右㕮咀以水三石同煎取一石五斗去滓
五合
宜服此酒
治男子婦人中風不遂
麻黃一兩　地骨皮一兩　生地黃一兩　木鱉子一兩
右為粗末每服四兩
防風湯　治中風手足不遂
續命湯

不自覺知　治中風
秦艽　獨活　麻黃　防己　白朮　石膏　防風
人參　甘草　當歸　遠志　杏仁
右為末入半夏片令勻每服四錢水二盞生薑七片同煎至一盞
去滓取清汁
大豆酒　治中風手足不遂
黑豆一升
治中風手足不遂
目下　一寸

又方

取杉木削之以水煮令汞熱灼灼仍以漬痛處效

烏荊丸 治風痓手足亦治便血

川烏 一兩炮去皮 荊芥 二兩

右爲末醋糊爲丸如梧桐子大每服二十丸熟水呑之

果皮丸 治人患風疾手足不遂

果州陳皮 川當歸

右爲末酒糊爲丸溫酒任服不拘多少親見人用之效神妙

治手腳不遂等風

以人肝蘸生研服之

導引法

養生方云極力左右振兩臂不息九通愈臂痛勞倦風氣不隨振兩臂者更互踶蹄猶言厥九通中間偃伏皆爲之名蟲䖂行之不已愈臂痛勞倦風氣不隨不覺痛癢作種種形狀又云偃臥合兩膝布兩足生腰口內氣振腹七息除壯熱疼痛兩脛不遂又云治四肢疼悶及不隨腹內積氣床席必須平穩正身仰臥緩解衣帶枕高三寸握固握固者以兩手各自以四指把手拇指舒臂令去身各五寸兩腳豎趾相去五寸安心定意調和氣息莫思餘事專意念氣徐徐漱醴泉漱醴泉者以舌舐略唇口牙齒然後咽唾徐徐以口吐氣鼻引氣入喉須微微緩作不可卒急強作待好調和引氣吐氣勿令自聞出入之聲每引氣心心念送之從腳指頭使氣出引氣五息六息一出之爲一息一息數至十息漸漸增益數至百息二百息病即除愈不用食生菜及魚肥肉大飽食後喜怒憂恚不得輒行氣惟須向曉清靜時行氣大佳能愈萬病

中風半身不遂 附論

夫脾胃爲水穀之海水穀之精化爲氣血氣血充盛則身體健而風邪不能爲患脾胃既弱水穀虧耗所以氣血不足血氣偏虛則風邪所侵此所以半身不遂而苦其人偏不舉也診其脈寸口沉細是也又寸口偏絕者是偏不遂兩手俱絕則不可治

○又云世言左爲癱右爲瘓此說亦非何者經有偏中半身不遂之旅則癱瘓之很當以左右俱中者名之右云春夏得之難治秋冬得之易治春夏者陽氣上騰大力方盛風又相侵而壯故難治也秋冬者陽氣下降大力漸微則易治也此說亦未可以爲信且中於深者爲難其方法者理肝胃爲盡肝主筋胃主骨風中肝胃則筋骨癱瘓也

鐵骨丹 治諸方風毒癱瘓拳攣半身不遂

川烏頭 草烏頭 各炮去皮 川芎

肉桂 川續斷 華陰細辛 當歸 酒浸

乾蠍 直殭蠶 炒去絲 木鱉子 去殼 補骨脂 天麻

巴戟 去心 防風 威靈仙 麻黃 去節 羌活

檳香 地龍 去土 白蒺藜 去刺 薏苡仁 蒼朮

萆薢 杜仲 牛膝 一兩 虎脛骨 酥炙

白附子 秦艽 金毛狗脊 川五靈脂 自然銅

沒藥 滴乳香

右細末乳香沒藥別研細入拌和以麥糵煮糊爲丸如彈子大 [illegible] 每服一丸細嚼溫酒下不拘時候仍用 [illegible] 子大每服一二十丸 [illegible] 高良薑碎一升煎湯下 [illegible]

二十一箇去翅足同黑豆一處 [illegible] 只用七箇 [illegible] 蝎梢四十枚微炒五靈脂二錢半爲末糊丸麻子大每二十丸溫酒下

烏犀丸 治中風半身不遂身體頑麻

先去其風根

烏犀屑 羚羊角屑 天南星

天雄 炮去皮 天麻 桂心

白殭蠶 微炒 乾蝎 微炒 芎藭 獨活

蔓荊子 白木 細辛 牛膝

當歸 白芷 白附子 炮裂

獨活 青橘皮 去白

桑螵蛸 微炒 阿膠

烏蛇 酒浸去皮骨 人參

麻黃 去根節 牛黃 細研 防風 去蘆 麝香 細研

右爲散入研了藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下十九

天雄丸 治中風半身不遂言語謇澁肌膚頑痺筋脉不利骨節疼痛

天雄 天麻 附子 麻黄 仙靈脾
乳香 道人頭 羚羊角 桑螵蛸
蟬殼 牛膝 當歸 芎藭
羌活 白殭蚕 桂心 萆薢 防風
乾蝎 朱砂 五加皮 烏蛇
牛黄 麝香

右爲末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服以温酒下二十丸食前
三十九日三四服

秦艽散 治半身不遂言語錯亂[illegible]

秦艽 獨活 黄耆 人參 防風
山茱萸 桂心 石斛 附子
細辛 當歸 芎藭 五味子
甘草 白朮 乾薑 麻黄 遠志
天雄 白蘚皮 甘菊花
[illegible]

右治下篩酒服方寸匕日再漸漸加至二匕又云治風無[illegible]

茯神湯 治中風手足不遂不收精神恍忘

茯神 防風 牛膝 枳殼 防己
秦艽 玄參 芍藥 黄耆
白蘚皮 獨活 桂 五味子 人參
薏苡人 羚羊角 石膏 甘草 麥門冬
甘草 磁石 [illegible]

右[illegible]磁石外[illegible]搗篩每用藥[illegible]
大碗以水四盞同煎至二盞去滓分二服[illegible]空心[illegible]
[illegible]

天麻散 治中風半身不遂[illegible]

天麻 白附子 白殭蚕 防風 麻黄
甘菊花 白蘚皮 藁本 羌活 獨活
細辛 阿膠 乾蝎 烏蛇
當歸 桂 白茯苓 乾薑

右爲散每服[illegible]三錢[illegible]

赤箭丸 治肝腎風虛外中風半身不遂[illegible]

赤箭 茯神 五加皮 防風 牛膝
獨活 蛇床子 酸棗人 山茱萸 巴戟
仙靈脾 萆薢 熟乾地黄 桂心
附子 石斛 兔絲子 [illegible]

右爲末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以温酒下
二十丸

仙靈脾浸酒方 治中風身不遂[illegible]

仙靈脾 天麻 獨活 天雄 牛膝
五加皮 芎藭 萆薢
海桐皮 羚羊角 [illegible]
桂心 當歸 石斛 [illegible]

右細剉以生絹袋盛用好酒二斗浸之密封經七日每日不計
時候温飲一小盞常令酒氣相續[illegible]

荆瀝湯 治中風半身不隨[illegible]

荆瀝 麥門冬 人參
甘草 黄芩 白茯苓 芎藭
防風 細辛 杏人 石膏 [illegible]

右除荆瀝竹瀝外[illegible]以水[illegible]
[illegible]一合[illegible]
日三夜一[illegible]

白鮮皮湯 治中風半身不遂口不能言語治諸偏枯

白鮮皮 附子 白术 防風 麻黃

葛根 獨活 防己 人參 茯神 甘草 當歸

杏仁 石膏 桂心 白芷

右㕮咀如麻豆大每用半兩水三盞煎取一盞半去滓分溫三服日

二夜一不拘時候 一方治風痱入生薑半分同煎

黑龍丸 治中風半身不遂口眼喎斜手足拘攣或生瘡或語言蹇澀

心多驚悸狀多癲倒氣血俱虛風邪外中

五臟氣大守形正相干故為是病宜服之

側子湯 治中風手足半身不遂口面喎斜

側子 附子 獨活 芎藭

麻黃 木通 秦艽

山茱萸 山芋 杜仲 白鮮皮 甘草

桂心 防風

右㕮咀如麻豆大每用十五錢匕以水四盞入生薑一分切煎至二

盞去滓分溫三服空心日午夜臥各一服服此湯訖所患處微取汗慎外

風

白芷湯 治中風手足一邊不遂言語蹇澀

白芷 白术 芎藭 防風

羌活 牛膝 狗脊 石膏 一兩

萆薢 薏苡仁 杏仁 麻黃

桂 附子 葛根 一兩

右㕮咀如麻豆大每服八錢匕以水四盞入生薑一分切煎取一盞去滓分溫

三服微熱服日二夜一

麝香丸 治中風癱瘓半身不遂口眼喎斜言語謇澀或精神昏塞步履

艱難或肌肉偏枯手足顫掉或筋脈拘攣不得屈伸及氣痹

之疾諸風身體疼痛

天麻 辰砂 天南星 烏蛇 自然銅 麝香

生龍腦 雄黃 薰陸香 當歸

地榆 丁香 木香 黑參

真珠末 川烏頭

右為末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸溫酒化下不拘時候服

訖避風衣被蓋覆令汗出患重者服一月痊安輕者半月痊初

患者五七服可安

八風九州湯 治男子婦人寒冷不自愛護當風解衣汗出臥冷濕

地中身不遂或俛仰屈伸難周身淫淫痹四肢不收狀如風狂飢

食損少手足皆冷或不遂

麻黃 甘草 乾薑 附子 防風

獨活 石膏 茯苓 白术 芎藭

柴胡 當歸 人參 杏仁

細辛

右㕮咀以水一斗清酒五升煮取四升分為三服一日令盡若

病人羸瘦者用水煎服微去上衣汗解

以粉粉之忌生菜海藻菘菜豬羊肉雞肉

化風丹 治一切中風半身不遂語言謇澀神昏錯亂頭暈

風驚風服之皆効

防風 羌活 獨活 麻黃 白芷

芎藭 桂枝 川烏 藁本 茯苓

白附子 全蝎 甘草 皂角

右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒下日三

服傷風惡心而下婦人血風當歸

酒下小兒驚風人參薄荷湯下

附子散 治中風半身不遂股節無力疼痛

附子 防風 萆薢

桂心 牛膝 獨活 當歸 杜仲 薏苡仁

桑白皮 木香 山茱萸 枳殼

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時

溫服

三石丸 治中風半身不遂肩背悲愁思慮闇入離少氣多汗偏身不舉

磁石 石膏 天南星 陽起石

一錢 蝎梢 一錢半 天麻 … 半夏 烏頭 … 麝香 … 白附子

乾蝎 … 白殭蠶 … 龍腦 … 麝香 … 海蛤 … 白附子

晒乾 …

右研令細入白麪一錢半令勻煉蜜和丸如雞頭大每服一丸細嚼

荊芥薄荷湯下茶清亦得不拘時候

化風丹 治一切中風半身不遂神昏語塞口眼喎斜婦人頭風血風

暗風倒仆嘔吐痰涎手足瘈瘲

川芎 白芷 桔梗 知母 麻黃 川羌活

白殭蠶 天南星 … 細辛 … 防風

白芷 乾生薑 甘草 … 朱砂 …

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸熱酒化下食前日三服

神昏者加朱砂二錢半

麝香天麻丸 治中風半身不遂及口眼喎斜心煩躁熱

… 葛根 … 桂心 … 麝香 … 地骨皮

…香 白朮 獨活 … 芎藭 … 石膏

六十九

甘菊花 … 甘草 …

右爲麤末每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候溫服忌…

… 仙酒方 治大風手足拘攣半身不遂

川牛膝 … 秦艽 … 防風 … 枸杞 … 天麻

蠶沙 … 牛蒡子 … 桔梗 … 蒼朮 … 地黃

當歸 …

右用黑豆二斗以前藥於瓷缸內浸用七重白紙封七

日勿用婦人封取酒逐日用時人面勿得於無… 一盞

盡二服手足重感不遂二斗後服如… 進一服

人參湯 治中風半身不遂手足拘急不得屈伸身體疼痛

或昏憒或身背強直不語或狂言妄語或角弓反張或飲食或不

能食或大小便不利悉皆治之

人參 … 桂心 … 麻黃 … 當歸 …

獨活 … 芎藭 … 石膏 … 黃芩 … 乾薑 …

杏人 …

右麤搗篩每用藥十二錢匕以水三盞煎取一盞半去滓分溫三

服空心併服服可相去如人行五里衣覆令汗出辭即食白粥慎外

風未汗復更前併服之准汗出得差能稱是如人行七八里用熱生

薑 … 汗出

活絡通經丸 治半身不遂口眼喎斜癱瘓諸風通行經絡導經

常服壯筋骨勁血脈起痼痒其功如神

川烏頭 … 斑猫 … 草烏 …

木鼈子 … 墨 … 白膠香 … 當歸 …

白花蛇 … 烏蛇 …

五靈脂 …

右爲末糯米糊和研合勻和丸如黑豆大一作好醋拌一兩作十九

以無灰酒空心食前溫酒送下一丸

天真丸 治中風半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及一切

風他藥不能治者小兒驚風大人頭風婦人血風皆可服之

白附子 … 川烏 … 半夏 … 麝香 …

四十

… 防風 … 天麻

朱砂 …

右爲末 … 丸如梧子大每服三十丸溫酒下不拘時

獨活湯 治中風半身不遂口不能言

獨活 … 桂 … 葛根 … 甘草 … 防風 …

當歸 … 芍藥 … 附子 … 半夏 …

右㕮咀如麻豆大每服秤十二錢匕以水三盞入生薑半分拍碎同

煎至二盞去滓分溫三服空心午時及晚間各一服一方用棗一枚

同前

葛根湯 治中風半身不隨口不能語

芎藭湯 治中風半身不隨口不能言冒昧如醉不知人

凡風生於… 多起於… 則生熱熱則生… 風…

室多則皆亂故令半身不隨

芎藭 一兩 石膏 … 桂 … 人參 … 甘草 …

乾薑（炮）各一兩　當歸（切焙）　杏人（湯浸去皮尖炒）　麻黄（去根節）

人參（去蘆頭）

右㕮咀每服十二錢匕以水四盞煑取二盞去滓分温三服日二夜一不拘時候

獨活散　治中風半身不遂身體筋脉攣急行步艱難宜服此獨活散

中膝散　治中風半身不遂筋脉拘急疼痛

牛膝　萆薢　酸棗人　茯苓

羚羊角屑　芎藭　防風　桂

右為散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓入酒一合更煎一兩沸不拘時候温服

牛黄丸　治中風半身不遂或寒熱疼痛

牛黄（研）　麝香（研）　犀角屑　白殭蠶　白附子

白花蛇肉　羌活　桂心　乾蝎

右為末研入牛黄麝香令勻煉蜜和丸如梧桐子大每於食前以温

酒下十五丸

防己湯　治中風半身不遂口面喎斜語不得轉

防己　竹瀝　防風　麻黄

桂心　芎藭　羚羊角　升麻

右先將七味細剉每服十二錢匕以水四盞煎至二盞去滓入

竹瀝二合更煎三沸温分三服空心午時夜臥各一服常服加獨活

一兩半最佳此方神良若手足逆冷加乾薑二兩炮裂若不即瘥更

服後麻黄防風湯

麻黄防風湯　治中風半身不隨

麻黄　防風　芎藭　防己

桂　黄芩　甘草　白朮

人參　獨活　竹瀝　附子

升麻　羚羊角

右先將十五味㕮咀如麻豆大每用藥一十五錢匕以水四盞入生

薑一分切煎至二盞去滓入竹瀝二合更煎三兩沸分温三服空心併

二服可相去如人行十里更一服若有滯氣宜服防己湯

芎藭湯　治中風半身不隨

芎藭　防風　麻黄　葛根

黄芩　防己　桂　白朮

人參　羌活　芍藥　竹瀝　升麻

牛膝　石膏　陳橘皮　羚羊角屑　五加皮

右先將十八味㕮咀如麻豆大每用藥一十二錢匕以水四盞煎

二盞去滓入竹瀝一合更煎三兩沸分三服空心午時夜臥各一服

羚羊角湯

加味青州白丸子　治中風半身不隨口眼喎斜治男子婦人卒中風邪半身不隨口眼喎斜

痰涎閉塞吐血小兒驚風婦人血風大人洗頭風並宜服

之

白附子　天南星　半夏

天麻　乾蝎　川烏頭　白殭蠶

右並生用為細末以白麪糊丸如梧桐子大每服三五十丸生薑湯下

不拘時風濕酒下小兒驚風薄荷湯下常服安神定志

去痰婦人不宜服一方云以前八味一料為末加

真蘇合香丸二兩和丸如梧桐子大小兒偶患驚

風湯下三五丸立定

省風湯　治中風痰涎口眼喎斜半身不遂不省人事

半夏　防風　甘草　全蝎　川烏

白附子　木香　天南星

右㕮咀每服半兩水一盞煎温服

古治飲食汗出心中虛邪令人半身不遂見喎風瘧

痰之先除其汗之風

黄連　甘草　熟甘草

升麻

右㕮咀分作二服每服水二盞煎去滓温服

枕治男子婦人咳嗽氣積喘吐痰涎頭目昏暈

半身不遂偏廢口眼喎斜他藥不效者

大川烏頭 半兩炮 天南星 三兩 白附子 生三兩

天麻 去蘆 全蝎 用一兩不去毒 半夏 七兩

右各取淨末,除南星半夏生取末,以絹袋盛,安磁器中,新水浸,日換

夜露,三晝夜,就浸袋取出,三日取出晒乾,為細末,各依分兩秤,相和,重

羅,用數合香油三兩,如無,蘇合香丸膏子亦可,如不散,入糯米粉打

薄糊為丸,如梧桐子大,每服五七十丸,食後臨臥,薄荷湯下,日進三服

藥品蒼乾,不要焙乾及焙

味風湯 治半身不遂,肢體攣痛,筋骨疼痛

麻黃 去節 杏仁 去皮尖 甘草 升麻

右㕮咀,每服一兩,水一小盞,煎至六分,去滓,...

大汗去...不可

乾薑附子湯 治心虛寒風,半身不遂,骨節離解,緩弱不收,便利

無度,口面喎斜

乾薑 附子 桂心 麻黃

右㕮咀,以水九升,煮取三升,分三服,三日後服一劑

經骨丹 治脾胃虛弱,風邪攻手足,身不隨,少氣汗出,宜服

狗脊 去毛 大黃子 去殼 五靈脂 草烏頭

右並生用,為末,用栗米粥和,杵數百,成和丸

如梧桐子大,每服七丸,溫酒下,不拘時候

起風骨 治中風手足偏廢不舉

川山甲 紅海蛤 大川烏頭

右為末,每用半兩,搗葱白汁和成厚餅,約徑寸半,貼在所患一邊腳

中心,用舊帛緊縛定,於無風密室中椅子上座,椅前用湯一盆,將貼

藥腳於盆內浸,仍用人扶病人,恐汗出不能支持,候汗出,即急去了

藥,汗欲出身麻木,得汗周遍為妙,切宜避風,自然手足可舉,如病未

盡除,候半月二十日以後,再依此法用一次,自除根本,仍服治風補

理藥,忌口,遠慾,以自養

蒼耳散 專治半身不遂,口眼喎斜,肢體麻痺,皆可服之,即愈 方見諸風

聖治錄

八生散子 治半身不遂,手足無力,飲食起居失節,陽氣不斂

風邪外傷,若服補劑,則風邪愈固,其病尤難治,先宜以主湯,次陰踐風

去風之劑,次可服此藥,服之旬日,以手足輕,腳膝有力為驗,可戒羊肉豬

頭動風之物,切不可針灸也

天雄 大川烏 天南星 白附子

天麻 白朮 川芎 木香 全蝎

半夏

右件並生用,剉如麻豆大,每服水一盞半,生薑一兩切片,每服一兩

半,文武火煎,取一盞半,更以水三盞,再煎第二滷,取一盞,又用水三

盞,再煎第三滷,取一盞,共煎得三盞,一處和合,分作三服,空心稍溫

服,一日可服此三盞

舒筋丸 治瘀痛

蒼朮 川牛膝 肉蓯蓉 木瓜

虎脛骨 附子 乳香

官桂 沒藥

右件為細末,酒糊為丸,如梧桐子大,每服五七十丸,以溫酒空

心送下,日二服

[illegible]子大獨活湯 治男子婦人體虛中風,半身不遂,左癱右瘓,口眼

喎斜,手足戰掉,腰腳疼,腳足軟弱,四肢頑麻,令肌肉麻痺,骨節疼,行

步艱難,及風濕相搏,關節煩痛,自汗惡風,頭目拘急,面目浮腫,昏眩,八風

五痺,久患頭風,每遇陰雨發則頭疼,項強,背拘急,痰涎嘔吐,不食,發

渴不已,一切風氣虛損不足,並宜服之

白芷 人參 肉桂 乾葛

當歸 川獨活 大附子 九枚 防風 北沙參 甘草

右為㕮咀,每服三錢,水兩盞,煎至一盞,去滓,熱溫服,其驗如神,中

風者此藥不過十服,並見除效也

聖[illegible]子 治男子婦人半身不遂,手足頑麻,口眼喎斜,痰涎壅

塞,及一切風,他藥不能治者,小兒驚風,大人頭風,婦人血風,並宜服之

川烏 生一兩 草烏 生一兩 荊芥 一兩 防風 蒼朮 五兩

白附子 藿香 川芎 香白芷 雄黃

白殭蚕五錢 何首烏五錢 麻黄一兩三錢 乾薑二錢
右為細末醋打麵糊為丸如桐子大捻作餅子每服二餅細嚼破茶
清送下食後服之
治一切風疾半身不遂口眼喎斜或成癱瘓或生瘡疥或腰脚無力手
足沉重四肢不等頭目昏眩語言謇澁心神煩燥大腑秘熱一切風病
喉塞宜此方
麻黄去節 附子炮去皮 荆芥穗 木香 蔓荆子
細辛 人參 沉香 藿香 殭蚕去絲
桔梗 防風 天麻 乾蝎 烏蛇酒浸去皮骨
白附子 [illegible]花 菊花 芎 羌活
天南星 半夏湯洗 獨活 麝香
當歸各一兩 龍腦三錢 半二分
右除麝香龍腦二味另研外餘藥味都作一處杵羅為末却入麝香
等和研令勻細每服四錢薑湯半盞薄荷湯半盞相對入藥末更
煎一沸和滓空心頓服蓋衣被以出汗為度若汗未出再服入生
薑二片同煎至八分去滓放温服之仍蓋衣被出汗為度若臟腑傷冷只用
生薑一般湯調藥入末更煎一沸空心頓服也取汗前法若
是初中即如此發汗若已中多時只平常服之服一錢半非時
湯調下知痒覺也大腑冷不可請
搜風順氣散治婦人半身不遂肢節疼痛腰膝
倦口眼喎斜語言謇澁或濕痺身骨痛或麻木不仁無時以斟酌
服之
大黄五錢 甘草五錢 當歸一錢 防風二錢 朴硝六錢
白芍藥三錢 天麻三錢
右㕮咀作一服用水二大盞煎至一大盞去柤食前温服以利取効
柤再煎服
治風半身不遂須迎腰膝痛疼或走不定狀如結核
芎藭 附子 杏仁 川當歸 甘草
生薑各四 石膏 麻黄 人參 防風
肉桂

右件為細末以水一盞煎兩錢去滓至七分服
加減中和湯 治使氣鼓脹 夫年六十一歲於乙未閏十
一月加得風疾半身不遂言語謇澁心神昏憒須扶回汗表虛惡
風如病冰雪口不知味鼻不聞香臭聞音則驚悸小便頻大便結燥若用
大黄之類下之却便飲食減少不敢用食畫夜不得瞑目寐寐苦於此
約三月餘凡三易醫病全不識至庚申三月七日又因形風加之發熱
惡寒寒症不利語多中風半身陰陽手足之間經有云風寒傷形憂
恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病亦乃傷又云人之氣以天地之疾風名
之此乃風氣不治八中中太絕生發上行其病矣又曰中是也言病生
於脈神色病也指風加之稍入於經絡與當歸和陰氣相出見為病必
先其本於氣乃服論脾胃則宜升陽補胃寫風火清熱則宜養血衛
氣宜補火制胃益元氣節喜怒之治其本也以此藥治之
柴胡 升麻 黄芪 半夏 黄芩
陳皮 人參 芍藥 當歸 甘草
黄蘗

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞温服如自汗多加黄芩
半錢放者五味子二十箇
畫夜不得寐乃因心事煩燥心火內動上乘陽分衛氣不得交入
陰分故使然也以朱砂安神丸服之由是畫亦得睡十日後安熱已不
得睡三月餘今因腹不已莫非他証否乎曰不然衛氣者晝行陽二
十五度夜則行陰亦二十五度此乃衛氣交入陰分循其天度故安
穩而得睡也何病之有焉
十三日晡微有悶亂不安於前中和湯又加柴胡三分以升少陽之氣
飲三服至十五日全得安卧口汗惡寒除熱枸風痛元小便多服
藥之後戒中大便一二日行鼻聞香口知味飲食如脉微弦而柔
緊之微有力
秦艽升麻湯治眼口喎斜惡風寒四肢拘急以足微寒者
支麻升麻湯 治咽喉中妨悶食減及語言快利于後微
大阿膠丸 治一切中風半身不遂口眼喎斜并産後中風及風

兼治痛遊走不定

白花蛇（酒浸）　烏蛇（酒浸）　虎脛骨（酥炙）　海桐皮

赤箭（各二兩）　麻黃（去節）　蜈蚣（去頭足）　天南星　[illegible]

木香　白殭蠶（炒）　[illegible]附子[illegible]　白朮

全蝎（炒）　[illegible]　白芷　防風　白附子　川芎

阿膠（炒）　沒藥（別研）　肉桂　細辛　人參

牛黃（別研）　麝香（別研）　[illegible]

右件為末，煉蜜為丸，每一兩作十丸，每服一丸，空心生薑[illegible]下。小兒每丸分作四服，[illegible]化下。

乳香壓經丸　治中風，半身不遂，手足[illegible]

[illegible]熱，滯氣，痰涎[illegible]

[illegible]

蒼朮　[illegible]　茯神木（同）

右各半兩，為末，[illegible]

後[illegible]

[illegible]卷之二　六[illegible]

食前

八味順氣散　治中風[illegible]，反多因喜怒[illegible]，心氣不安，又為酒色過度[illegible]，以致[illegible]不遂，口[illegible]，[illegible]不仁，偏身不[illegible]，風大宜服之

人參　白朮　白茯苓（去皮）　白芷　烏藥　青皮

陳皮　[illegible]甘草（炙）

如痰盛，可加南星、半夏[illegible]。如氣不順，加木香。

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，生薑七片，棗一枚，同煎至七分，去滓溫服，[illegible]服臨臥時可服[illegible]

子蘇合香丸三[illegible]服之大妙

烏金煎　治中風半身不遂，手足麻痺疼痛

大附子[illegible]　雄黑豆

右用水一大碗，入附子，[illegible]，則先滋出豆，其附子且於豆汁內更煮，令汁乾，不令焦，取附子切片，[illegible]心，[illegible]豆，以湯[illegible]

遇先取一粒，旋[illegible]五粒，入口細嚼，如[illegible]未得，咽下，更[illegible]

一百粒，一[illegible]如[illegible]，口便用熱酒[illegible]，[illegible]下，別用熱酒

半盞，[illegible]，[illegible]汗，[illegible]後就[illegible]，[illegible]

少有汗出，明日又將[illegible]起，[illegible]附子依前[illegible]一百粒，[illegible]服[illegible]

依前[illegible]服，[illegible]附子三[illegible]為[illegible]，各以[illegible]紙包裹[illegible]

心[illegible]一片[illegible]，酒下，一如前法，[illegible]日[illegible]後取[illegible]者不[illegible]

[illegible]見人用此藥數驗無疑

至寶丹　治偏風，半身不遂，一切風，[illegible]，[illegible]等

[illegible]

藁本　防風　川芎

白芷　天南星　雄黃

[illegible]　當歸

右十味為末，每服一字，用[illegible]白僵蠶湯調下，[illegible]服[illegible]

[illegible]可進飲食

治熱風中人，忽然倒不知人事，半身不遂，口眼喎斜，[illegible]

[illegible]之後，[illegible]多服熱藥，[illegible]

[illegible]中[illegible]，[illegible]不知人事[illegible]

[illegible]

[illegible]

取延散　治[illegible]，[illegible]不語，[illegible]

治風痰[illegible]延散方

半夏（三分）　硝石　[illegible]一兩

須[illegible]是熱方可與

射干　荊芥穗　天南星　羌活

[illegible]為細末，每服[illegible]熱湯調下，和[illegible]，[illegible]牙閉[illegible]

急以木[illegible]之，以吐延為度，未[illegible]服

治熱風中人，閉倒不知人事，[illegible]先要[illegible]，而取延散子後[illegible]

風氣方　大[illegible]熱方可與

荊芥穗　防風　天麻　羌活　獨活

荊[illegible]　乾蝎　白花蛇　[illegible]

附子　半夏　麻黃　木香　[illegible]子

[illegible]　沉香　麝香　朱砂

右爲細末，用淡淡入硃砂、龍腦、麝香，研令如塵，每服二錢，以荳三
片濃煎薄荷湯調下，食後臨臥
治大風半身不遂

風腰脚不隨 附論

夫風腰脚不隨者，腰脚運用不能如常也。蓋肝主筋，腎主骨，肝腎氣虛，
風邪攻之，則流傳筋骨，走注腰脚，故令緩弱不利，不能相隨也

金鳳丹 治肝腎久虛，風邪攻注，腰脚不隨
五靈脂　天麻　烏頭
乳香　地龍　沒藥　木鱉子　海桐皮
黑豆　草烏頭　乾蝎　牛膝
丹砂　薄荷葉　附子　當歸
自然銅　骨碎補　虎脛骨　龍腦　麝香

右爲末，以生薑自然汁和丸如雞頭大，每服一丸，細嚼，溫酒下；走注
風，荊芥酒下；中風，薄荷酒下；腰脚中風，暖酒下；半身不遂，
松節酒下；婦人產後破傷風，豆淋酒下；不可食諸般血，產後虛
及頭面生瘡、偏身痒痛，白芷酒下；風痰治效

羌活丸 治風氣流注，腰脚不隨，五勞七傷六極，并諸風痺
羌活　牛膝　乾熟地黃　人參
兔絲子　巴戟　茯神　防風
五加皮　桂　五味子　蛇床子　黃芩
白蘚皮　乾地黃
右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，空心溫酒下，日再

乾地黃丸 治風腰脚不隨，沉重，飲食減少，乏力無力
熟乾地黃　大麻人　萆薢　五加皮
石斛　牛膝　桂
麻黃

右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服十五丸至二十丸，空腹溫酒下，日再

竹瀝湯 治風腰脚痺弱，或脚脛轉筋，或皮肉腫起如癱而按
之不沒，心中有時不欲飲食，或風引氣急者
竹瀝　甘草　秦艽　細辛　白朮
黃芩　桂　防己　乾葛　葛根
防風　升麻　麻黃　附子
右除竹瀝外，剉如麻豆，每服五錢，水一盞半，煎至一分，去滓，入竹瀝一
合，更煎一沸，溫服，空心日晚各一

茯神丸 治風腰脚不隨，行履不得，丈夫五勞七傷六極，并治
諸風痺
茯神　五加皮　防風　桂　五味子
蛇床子　羌活　鹿茸　牛膝　山茱萸
兔絲子　肉蓯蓉　巴戟天　熟乾地黃
右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，溫酒下，早晚
食前各一

萬金散 治風癱瘓，筋骨不遂，血氣凝滯，沉重，脚弱無力，骨節
杜仲 治手足風累驗，予常病左臂不隨，後雖已痊，而手指不便
續斷　杜仲　防風　牛膝　細辛
白茯苓　人參　當歸　桂　熟乾地黃
甘草　川芎　獨活　秦艽
右等分爲末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，濾去滓，不拘時，但空心熱服
本事方有白芍藥，共十五味，同㕮咀，每服四錢
服二錢，水一盞，生薑三片，棗一枚，同煎至七分，空心食前，細服
云予常臂不隨，後已痊，然手指不便，試聖不驗，後服此藥，終半
而愈，名續斷湯，屢驗。方治手足麻木不仁，防風、秦艽、羌活、附子等
方爲末三大錢，水一盞半，生薑三片，煎至七分，去滓，入生地黃汁兩合，再
煎數沸，空心服，名小防風湯。一方治血虛體弱，加鹿茸肉
淡滲

白蘚皮湯 治風腰脚不隨，四肢痿痺，口噤不語，手臂
痿弱顫掉

白鮮皮　女萎　防風去叉　細辛去苗　升麻
蒼耳炒　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　五味子各一兩　黃耆三兩剉
菖蒲九節者米泔浸切焙　蒺藜子炒去角各一兩半
右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服日再
萆薢丸出聖濟總錄治腰腳不遂骨節疼痛筋脉拘急心行履艱難兩脇抽痛
萆薢三兩　牛膝去苗酒浸　白檳榔煨　酸棗人炒　防風去叉各二兩
杜仲去粗皮炙　丹參　赤芍藥　郁李人湯浸去皮　石斛去根各一兩半
當歸一兩　桂去粗皮一兩
右為末煉蜜丸如梧桐子大每空腹溫酒下三十丸
牛膝湯出聖濟總錄治風虛腳不隨
牛膝去苗　羌活去蘆　羚羊角鎊　升麻
芎藭各二兩　防風去叉　虎脛骨酥炙各　酸棗人炒　梔子人三枚
右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候服
黃耆湯出聖濟總錄治風腰腳不隨髀脛筋攣疼痛不可忍
黃耆剉　獨活去蘆　防風去叉　酸棗人炒　茯神去木各一兩
白鮮皮　羚羊角鎊一兩　桂去粗皮半兩
右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心晚食前
各一
巴戟湯出聖濟總錄治腎藏風冷腰腳不隨神藏虛風
巴戟天去心　覆盆子炒　羚羊角鎊　地骨皮　牛膝酒浸
酸棗人炒各半兩
右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服早晚食前
各一服
桑寄生丸出聖濟總錄治風腰腳不隨
桑寄生　黃耆剉　熟乾地黃焙　枳殼去瓤麩炒各二兩
蔓荊子炒一兩
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下日再合
藥宜於淨室中修取服人自身天醫三生日
牛膝丸出聖濟總錄治風腰腳不隨筋急疼痛
牛膝酒浸切焙　白朮炒　萆薢剉炒各　烏頭炮裂去皮一兩

丹參炒二兩
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸至十五二十丸溫酒或鹽
湯下早晚食前各一
附子散出聖濟總錄治風冷腰腳疼痛不隨由少年服冷藥太過補
暖調氣
附子去皮臍生　牛膝酒浸切焙　防風去叉　羌活去蘆頭各一兩
右㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服早
晚食前各一
茯苓湯出聖濟總錄治冷濕風虛腰重不遂腳膝浮腫溫腎
白茯苓　乾薑炮　澤瀉　桂去粗皮各半兩
右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前
夜臥各一服
杜仲酒出聖濟總錄治腰腳疼痛不遂風虛
杜仲二兩　石南二兩　羌活四兩　大附子五枚
右㕮咀以酒一斗漬三宿每服二合日再偏宜冷病婦人服之即効
萆薢散治中風腰腳疼痛行步艱辛不穩
萆薢四分　杜仲三分
右為末早朝溫酒調服三錢加至五錢忌食牛肉
黑豆散出聖濟總錄治風腰腳不隨筋急行履不得
用雄黑豆緊小者不限多少以新汲水淨淘漉乾頻灑水候生
葉纔及半寸暴乾炒熱不退皮搗羅為散每服二錢至三錢匕溫酒
調下日二至半月後所患處覺有觸動是驗
紫威散出聖濟總錄治風腰腳不隨
用紫威東引根凌霄花根是也多少搗羅為散每服二錢匕
空心溫酒調下
蒴藋散出聖濟總錄治風腰腳不隨
用蒴藋根去皮土切焙搗羅為散每服一錢匕空心溫酒調下漸加
至一錢半
治一切風筋骨節疼痛腰腳不遂
右以金牙石燒浸服之良

白骨散治風腰腳疼行履不得遍身瘙痒
以何首烏 天麻 朽木 牛膝 各一斤[illegible]
為末煉蜜丸 每日空心[illegible]五十丸

風腳軟

夫風腳軟者腎氣不足風[illegible]腳若[illegible]不足則骨
髓虛弱榮衛之氣壅以風[illegible]故令腳軟不能步履
無力也 方

烏頭丸 治風腳軟膝疼[illegible]
烏頭[illegible]
海桐皮[illegible] 白附子[illegible]
白蒺藜[illegible] 烏蛇[illegible] 萆薢
天南星[illegible] 靈仙[illegible] 僵蚕[illegible] 牛膝
白花蛇[illegible] 乾蝎[illegible]
右為細末用酒煮黑豆末糊和搗為丸
如梧桐子大每日空心溫酒或鹽湯下二十丸

透骨丸 治[illegible]風腳軟不能行步
附子[illegible] 麒麟竭 白殭蚕 地龍
乾蝎[illegible] 草烏頭[illegible] 五靈脂[illegible]
麻黃[illegible] 馬牙硝 乳香 沒藥
自然銅一分 龍腦[illegible]
右擣和令勻用飛羅麵二兩無灰酒二兩煮[illegible]丸重一錢
三字以布袋盛掛當風處[illegible]若腳手麻軟每服半丸磨酒
研爛用生薑自然汁[illegible]酒[illegible]溫服[illegible]各一服五
日見效若[illegible]入生薑汁[illegible]好酒[illegible]
分溫服初如[illegible]第二服漸見手足[illegible]第三服見遍身
汗出即下第四服空心日午臨卧各進一服[illegible]不能
合不可治

仙靈脾散 治風腳膝軟弱筋骨緩縱不能行立
仙靈脾 天雄[illegible] 石斛[illegible] 天麻 牛膝[illegible]
麻黃[illegible] 芎藭 五加皮 萆薢[illegible] 丹參
桂心 當歸 防風[illegible] 羌活[illegible] 虎脛骨[illegible]
[illegible]
右為細散每服食前以溫酒調下二錢[illegible]
[illegible]
[illegible]
杜仲[illegible] [illegible] 大艾
附子[illegible] 當歸 [illegible] 牛膝[illegible] 石斛[illegible]
海桐皮[illegible] 肉桂[illegible] 虎脛骨[illegible] 五加皮 丹參
右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下三十丸
加至四十丸空心及晚食前服

天雄散 治風毒攻脊膝[illegible]主腳[illegible]軟[illegible]每[illegible]時疼痛
天雄[illegible] 石斛[illegible] 麻黃[illegible] 赤芍[illegible] 牛膝[illegible]
薏苡仁 檳榔[illegible] 羌活 草薢[illegible] 防風[illegible]
赤芍藥 當歸 木香 枳殼[illegible]
肉桂[illegible]
右擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓
食前溫服之

海桐皮浸酒方 治風毒腳膝軟弱行立不得
海桐皮 五加皮 獨活 天雄[illegible] 石斛[illegible]
桂心 防風[illegible] 當歸 杜仲[illegible] 仙靈脾
萆薢 牛膝[illegible] 薏苡仁 生乾地黃[illegible]
虎脛骨[illegible]
右細剉以生絹袋盛用清酒二斗春夏浸七日秋冬浸二七日
每日[illegible]一小盞[illegible]常令醺醺不得大醉重者不過兩劑
[illegible]
獨活散 治風毒攻西腳軟[illegible]
獨活 石斛[illegible] 海桐皮[illegible] [illegible] 當歸[illegible]

附子炮裂去皮臍 羚羊角屑 芎藭 牛膝去苗 五加皮
仙靈脾 桂心 羌活各一兩
右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓
食前溫服忌生冷油膩毒魚滑物
烏金煎方 治風腳膝軟弱骨節疼痛手臂節無力行步艱難
黑豆二升 茄子根
桂心 羌活 芎藭 仙靈脾
虎脛骨塗酥炙 萆薢 酸棗人微炒 防風去蘆頭
牛膝去苗 附子炮裂去皮臍 當歸
右為末入於前二味汁中以慢火熬令稠候可丸
止藏於瓷器中每日早晨以暖酒調下一茶匙日再服
仙靈脾煎丸 治風腳膝軟弱不能履步骨節無力肢節疼痛
仙靈脾 威靈仙 牛膝去苗 桑根白皮各五兩
黑豆一升
右已上五味細剉以水二斗煮至一斗去滓再煎至五升
天雄炮裂去皮臍 天麻 酸棗人微炒 麝香研 肉桂去皮
虎脛骨塗酥炙令黃各三兩 當歸二兩
右為末入前煎汁中以慢火熬令稠以柳木篦不住手攪候可丸
即丸如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下三十丸忌生冷油膩
豬雞肉
牛膝散 治風冷傷中兩足俱軟筋緩不能收攝或兩手
不能舉浮腫者
牛膝去苗 乾薑炮 草烏頭 烏頭炮裂去皮臍 黑豆炒
赤小豆炒 地龍炒 樟柳根 附子炮裂去皮臍 防風去蘆頭
山藥各一兩
右剉如麻豆大每以藥半兩以水一大碗煎至七分去
滓每日早晚旋溫五分一盞服漸加至一盞以覺麻木即減
分數以知為度
荊[illegible]丸 治風腳膝軟弱不得屈伸疼痛
核人 海桐皮 牛膝去苗 羌活 當歸

附子炮裂去皮臍 桂心 仙靈脾 石斛去根剉 郁李人湯浸去皮
大黃剉碎微炒
右為末先以好酒二升和羊脂汁於銀鍋中熬令稠和諸藥末
搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下二十丸
桑枝煎方 治風腳膝軟弱
桑枝剉三升 黑豆一升 附子生用去皮臍 茄子根剉一升
已上四味以水三斗煮至一斗濾去滓再煎取五升入後藥末
石斛去根剉 天雄炮裂去皮臍 天麻 芎藭 牛膝去苗
桂心各二兩
右為末入前汁中於銀鍋內慢火熬用柳木篦不停手攪候
如稀餳收於瓷合中每日空心以熱酒調下一茶匙晚食前再服尤妙
海桐皮酒 治風冷流於膝行立不得
海桐皮 五加皮 獨活去蘆頭 防風去蘆頭 枳殼去瓤
杜仲去粗皮炙 牛膝去苗 薏苡人各二兩 生地黃十斤
右細剉綿裹以無灰酒二斗春夏浸七日秋冬二七日每日空心
溫服一大盞日三常令酒氣不絕重者不過兩劑差
巴戟天散 治冷痹腳膝疼痛行履不得
巴戟天去心 五加皮二兩 牛膝去苗 石斛去根 萆薢
甘草炙 防風去蘆頭 白茯苓 附子炮裂去皮臍
右剉如麻豆每服三錢以水一盞入生薑一分煎至六分去
滓空腹溫服
巴戟圓 治風痹腳軟弱急痛行履不能
巴戟天去心 牛膝去苗 石斛去根 蜀椒去目
生薑 羌活 當歸各三兩
右㕮咀如麻豆大以生絹袋盛用酒一斗五升浸每日三度空腹
隨性多少旋添酒候藥味薄即止
白朮丸 治風虛腳弱無力肌瘦不能食
白朮 牛膝去苗 巴戟天去心 菟絲子酒浸別搗
熟乾地黃 桂去粗皮
右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心晚食前溫酒下二十丸漸加至

三·丸

太八丸 [illegible] 治脚軟 [illegible] 用 [illegible] 不能

木瓜 [illegible] 白附子 [illegible] 人 大 [illegible]

右件 [illegible] 末與木瓜同搗爲丸如梧桐子大 [illegible]

空心 [illegible] 二十丸至三十丸

附子散 治風脚軟筋骨 [illegible] 行履不得

附子 [illegible] 續斷 [illegible] 芎藭 [illegible]

右爲細散每服一錢匕空心日午煎 [illegible] 下

萆薢丸 治風冷下注腰脚疼弱步履無力

萆薢 [illegible] 牛膝 [illegible] 兔絲子 [illegible]

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大空心 [illegible] 溫酒下二十丸 [illegible]

附子丸 治風冷腰脚疼弱痿痺不仁

附子 [illegible] 乾薑 [illegible]

右爲末先以牛乳一升二合 [illegible]

即丸如梧桐子大每服空心食前溫酒下二十丸加至三十丸日三服

日後知痛

大雄煎丸 治風脚膝軟弱筋骨攣急疼痛

天雄 [illegible] 牛膝 [illegible]

右爲末以安息香一兩生薑五兩同搗 [illegible] 和前藥末令軟硬得所

搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下十丸

何首烏丸 治風脚軟腰膝疼行履不得遍身瘙痒

石髓丸 治風由補 [illegible]

時可久 [illegible]

悅顏色和五臟久服無失

牛膝 [illegible] 人參 大防風 [illegible]

五味子 [illegible] 杜仲 附子 兔絲子

虎脛骨 [illegible] 當歸 白术 鹿茸

大芎八味

右各依法製了碎剉焙乾爲細末以西山木瓜二十枚去皮核片切用

羊肋髓二兩 雄羊腰子二枚去筋膜片切好酒半升細切入青鹽

一銖取木瓜研好從容一兩洗切 [illegible]

牛膝等末至硬軟得所丸如梧桐子大每服五十丸至八十丸任下空心

鹽酒米湯皆可日二服

四斤丸 補治風强脚膝

從蓉 天麻 牛膝 [illegible] 大 [illegible]

右件當乾爲細末煉蜜 [illegible] 和丸如梧桐子大空心溫

酒化下三十丸 [illegible]

養血丹 若遇足膝無力 [illegible]

能行 [illegible]

肝虛 [illegible]

乾地黃 [illegible] 當歸 白芍藥 續斷 白木 [illegible]

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大溫酒下三十丸漸加至五十丸

治風軟脚 [illegible] 以丹參酒浸服可逆奔馬

治筋風脚手軟 [illegible] 以人肝腎煮服之亦佳研服亦得

治風軟脚 用蠶砂炙之爲末酒服之

○風不仁 附論

夫風不仁者由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣行不宣流致痒結痹皮膚痛浮無所覺知 [illegible] 皮膚不榮故爲不仁其狀搔之皮膚如隔衣是也診其寸口脈緩則皮膚不仁不脉虛數者生牢急疾者死

方

苦參散 治風皮膚瘙痒不仁積年不瘥

苦參 蒺藜子 石南葉 芎藭

白木 秦艽 白斂 防己

甘草炙 遠志 沙參 白茯苓 人參

石膏 前胡 當歸 獨活 黃耆

乾薑 山茱萸 附子 防風 蜀椒

次出汗 羚羊角鎊上一半

右件和再羅為散每服一錢半至二錢匕漸加至三錢匕空服酒調
下須臾以食壓之日再以知為度

大八風烏蛇散 治風不仁皮膚疼麻手足攣急

烏蛇酒浸去皮骨炙 防風去叉 青葙子 獨活去蘆 麻黃去根節
桔梗炒 秦艽去土 羌活去蘆 當歸切焙
桂去粗皮各三分 芎藭 白芷 白芍藥
細辛去苗 天麻各二 附子炮裂去皮臍
蒺藜子炒去角 人參

右搗羅極細每服二錢匕空心溫酒調下日三微汗為度

烏蛇散 治頑麻風搔之皮膚不知痛癢

烏蛇肉酒浸去皮骨炙 天麻 桂心 防風去叉
麻黃去根節 白殭蠶炒 苦參 赤茯苓 威靈仙
枳殼去瓤麩炒 天冬 木香 羌活 獨活
人參去蘆 赤芍藥 芎藭 白蒺藜炒去角

右細羅為散每服食後臨臥及晚食前以溫酒調下二錢忌豬雞肉

烏頭摩風膏 治風痛及皮膚不仁筋脈拘急

川烏頭生去皮臍 防風 桂心 白芷 藁本
川椒去目 吳茱萸 白朮 細辛 芎藭
白附子 乾薑 莽草 羌活 黃蠟五兩
煉了豬脂一斤 生薑二兩

右件藥細剉先以豬脂內鐺中煎之先入諸藥煎令白芷色黃候
味出又以綿布絞去滓更以綿濾過複入鐺令淨更入蠟於鐺中消
火熬之次下黃蠟令消去火待稍凝收於瓷器中每有痛處按
火邊摩手令熱取膏摩之一二百遍以手按為度

犀角丸 療百病鬼疰惡風入皮膚淫淫液液流移無有常
處四肢不仁食則肢背腰脹病心痛逆滿不得飲食吸吸少氣
欬嗽夜寤惡夢與鬼神通交接嗜血落痛淋之

犀角屑 桂心 羚羊角屑 牛黃研 鬼臼各二
獺肝三分炙 雄黃八分研 丹砂四分研 貝齒十分炙 巴豆十分去皮心
蜈蚣一枚去足炙 真珠四分研 射罔 麝香研 附子炮去皮各一分

右為末蜜和丸如胡豆每服半丸但二丸酒飲並得日三忌豬肉冷水
生菜生血物蘆筍

白花蛇丸 治風不仁皮膚痛癢搔之如隔衣

白花蛇酒浸去皮骨炙 乾蠍炒去土 仙靈脾 天雄炮去皮臍
天麻 桂去粗皮 麻黃去根節 鹿角膠炙令燥
萆薢各一兩 桑螵蛸炒 [illegible]子 烏頭炮裂去皮
天南星炮 雄黃研 麝香研各一分

右細搗羅為末先以好大麻仁三兩爛研入無灰酒二盞大熬成膏
次用前末和搗五百杵丸如梧桐子大每服二十丸溫荊芥酒下不拘時
服

羌活散 治風不仁手腳痛麻疼痛

羌活去蘆 獨活去蘆 防風去叉 蔓荊實
人參 蒺藜子炒去角 白茯苓去黑皮 芍藥 枳殼去瓤麩炒
芎藭 天麻 阿膠炙令燥 威靈仙去苗土

右為末每服二錢匕空心豆淋酒調下溫酒亦得或煉蜜
丸如梧桐子大豆淋酒下十五丸至二十丸

白頭翁丸 治頑麻風及麻痺疼痛

白頭翁去蘆 當歸 防風 苦參剉 獨活
川大黃剉炒 枳殼麩炒去瓤 黃芪 桂心
牛膝去苗 仙靈脾 烏蛇肉酒浸炙
晚蠶沙微炒各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食前以溫酒下十丸
漸加至二十丸

追風丸 治風不仁發撼筋脈緩縱

萆薢 馬藺花 骨碎補去毛 狗脊去毛
黃芪剉 五靈脂炒 楓香脂研 地龍去土炒各一兩
草烏頭炮 乳香研 沒藥研各一分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸加至十五丸茶
酒任下初服五六丸漸加之

八風湯 療五緩六急不隨身體不仁下重腹中雷鳴失小便方

防風 芎藭 茯苓(各二兩) 黃耆 當歸
人參 乾薑(各一兩) 獨活(四兩) 甘草(炙一兩) 大豆(二升)
附子(炮去皮)

右㕮咀,以水一斗,清酒二升,合煮,取三升,分三服。忌海藻、菘菜、豬肉、冷水、酢物。

(烏鵲丸)(聖惠) 治風虛皮膚不仁,頭目昏痛,手腳腫痛,肢節疼倦
烏鵲(一隻) 麝香(研) 虎骨(酥炙) 白殭蠶(炒) 防風(去叉)
乾蝎(炒) 白附子(炮) 藿香葉 烏蛇(酒浸去皮骨炙)
右除別研外,搗羅為末,入研者拌勻,煉蜜丸如梧桐子大,每服十丸,加至十五丸,溫酒下,茶清亦得,不拘時。

([illegible]手散) 治風不仁,手足痺麻,及婦人血風,頭面虛腫,渾身瘙癢
芎藭 烏頭(炮) 麻黃(去根節) 地龍(炒) 防風(去叉)
羌活(去蘆) 白附子(炮) 天麻(酒浸) 草烏頭
右為細散,每服一字,食後,勿飲白湯,荊芥茶調下,溫酒亦得。

(牛膝天麻丸) 治風不仁,偏身癢麻,皮膚瘙癢,頭目昏倦 方見

([illegible]丸) 治風氣虛冷不仁,皮膚瘙癢,如隔衣狀 方見

(天南星丸) 治手足頑麻風
天南星(炮) 天麻 烏蛇肉(酒浸炙) 赤茯苓(各一兩)
白附子(炮裂) 白殭蠶(微炒) 朱砂(細研) 羌活(三分) 乾蝎(微炒)
右為末,入朱砂更研令勻,煉蜜和丸如梧桐子大,每服食前以溫酒下二十丸,忌羊血。

(烏蛇丸) 治身體頑麻風
烏蛇(酒浸去皮骨) 白花蛇(酒浸) 防風(去芦)
細辛 天麻 獨活 肉桂(去皮) 枳殼(麩炒)
苦參(剉)
右為末,煉蜜和丸如梧桐子大,每服食前以溫酒下二十丸。

(牛膝散) 治風不仁,皮膚瘙癢,氣血虛,風邪濕痺
牛膝(酒浸) 白殭蠶(生用) 海桐皮(剉) 天南星(生用) 麝香(研)
丹砂(研) 狼毒(剉) 附子(炮去皮)
右為散,和勻,再研,每服二錢匕,熟豆淋酒調下,不拘時。

(烏頭丸)
川烏頭 天麻
當歸 羌活 肉桂(去皮) 防風 黃耆
右為末,用生地黃自然汁六兩,蜜十二兩,相和令勻,和丸如綠豆大,每日空心以溫酒下十丸,食前再服。

(茵芋酒) 療新久風,體不仁,[illegible]
茵芋 狗脊 躑躅(生用) 烏頭(去皮) 附子
天雄
右㕮咀,以酒一斗,絹袋盛,漬之,冬八九月,夏五六日,初服半合,不知,稍稍增之,以知為度,忌猪肉冷水。

(五參散) 治風不仁,皮膚不知痛癢,偏身作疱,渾身瘙癢
人參 沙參 丹參 玄參 苦參
白花蛇(酒浸)
右為細末,每服二錢匕,食後臨臥溫酒調下,加至三錢匕。

(摩風膏) 治皮膚麻痺,不知痛癢,去風毒
龍骨 虎骨 當歸 桂(去粗皮)
苦酒 皂莢
右為末,先將酒別取皂莢十挺,取汁去滓,入鍋中煎,次入前四味,候如稀餳,入瓷合盛之,若患取指摩手揉。

(附子散) 治中風手臂不仁,口面喎僻

(烏頭丸) 治風不仁,腰腿疼痛,皮肉身體諸風
烏頭 附子 麻黃
防風
右為細末,煉蜜丸如梧桐子大,每服五丸,加至七丸,溫酒下,空心午時夜臥各一服。若不用防風,只生用三味為末,麵糊丸如大麻粒大,每服三丸至五丸,酒下。服後未可熱食。

(皂莢膏) 治身體手足有頑麻風
皂莢 川烏頭 烏蛇肉(三兩) 麻黃
右件藥,以酒三升浸皂莢經三宿,挼取汁,入鍋中同烏頭烏蛇等煎

至一升運去滓更熬又入桐槌大入硫黃末攪令勻旋取摩頑處
即効
【乳香丸】治風令榮衛不行四肢疼痛及膚不仁
乳香 乾蝎 烏頭
右搗羅五味爲末用醋半升煎化入□下乳香末攪勻候可丸丸
如菉豆大每服十丸溫酒下不拘時
【秦艽湯】治四肢風手臂不收髀腳疼弱或拘急攣蜷偏枯痿躄痛
小汗頑痹者悉主之
秦艽 天門冬 五加皮 牛膝 附子
桂心 巴戟天 杜仲 石斛 細辛
獨活 薏苡人
右爲麤散每服二兩酒二盞浸一宿濾去滓分爲二服不拘時候溫
服之
【防風湯】治手足不仁或腫不已宜服之
防風 麻黃 川升麻 川獨活 川羌活 甘草
此防風
此湯散
右等分剉散每服二錢水一盞煎至八分隨證上下空心食後進
服如覺氣通遍滯服活血丹之類此說方係名醫間經驗
以救效全聞有用之者其應如響
【小防風湯】治手足不仁
防風 秦艽 羌活 附子
右㕮咀每服二大錢水一盞半薑三片煎至七分去滓入生地黃汁
一兩合再煎數服空心服
【治中風手痛不仁不遂】
右以乾艾斛許揉團之內瓦甑中並下塞諸孔獨留一目以痛處
着甑目下燒艾熏之一時久知矣
導引法
養生方云松子曰偃臥展兩脛兩手足外踵指相向以鼻內氣自
極七息除死肌不仁足寒又云展左足右足上除不仁脛寒

風腰腿（附論）

夫風腰腿之證四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈怠腰腳緩弱不自
覺知也是風邪侵於分肉流於血脈榮衛稽留而不行致身體骨節肌
肉頑痺無力不能用也久不差氣體虛弱則變成水痺

方

【牛膝丸】治腰腿風緩觧虛弱風濕所攻致腰腳緩弱肌肉虛滿肢
節疼痛
赤箭 赤茯苓 芎藭 防風 白附子
桂心 漢防已 附子 當歸 五加皮
牛膝 石斛 麻黃 木香 枳殼
羚羊角屑 白朮 羌活 海桐皮
杜仲
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服食前以豆淋酒下二十丸
【五加皮湯】治風腰腿四肢緩弱骨節疼痛皮膚不仁肌肉虛滿腰
腳沉重舉動無力
五加皮 萆薢 獨活 防已 牛膝
桂 赤茯苓 附子 薏苡人
當歸 秦艽 黃芩 海桐皮 赤芍藥
羌活 麻黃 丹參
右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至七分
去滓溫服不拘時
【獨活散】治腰腿風肌骨虛滿四肢不收骨節疼痛腰膝緩弱無力
獨活 附子 麻黃 薏苡人 赤茯苓
牛膝 防風 當歸 桂心 芎藭
天麻 海桐皮 赤芍藥 檳榔 萆薢
枳殼
右爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前稍
熱服
【防風湯】治腰腿風肌肉虛滿四肢不收骨節疼痛

防風 五加皮 附子 萆薢 薏苡仁
桂心 牛膝 獨活 赤茯苓 當歸
杜仲 海桐皮 木香 枳殼 仙靈脾
右㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑三棗大拍碎同煎至一
盞去滓溫服不拘時
芎藭散子 治腳氣風腫虛弱四肢緩弱頑痹不仁心胸滿悶
芎藭 白朮 薏苡仁 桂心 附子
羚羊角屑 前胡 赤茯苓 麻黃 漢防己
羌活 赤芍藥 人參 丹參 甘草
右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓食前溫服忌生
冷油膩毒滑物
側子散 治腳氣風肢節緩弱腰腳無力皮膚頑痹
側子 漢防己 萆薢 防風 赤芍藥
芎藭 秦艽 甘草 五加皮
甘菊花 薏苡仁 麻黃 磁石
杏仁 羚羊角屑
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前稍熱服
薏苡仁丸 治腳氣風濕毒風邪攻腹肌膚麻痺腳無力骨節疼
弱四肢滲痺
薏苡仁 天雄 威靈仙 漢防己 檳榔
防風 羌活 石斛 枳殼 五加皮
桂心 赤芍藥 赤茯苓 牛膝 當歸
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前以溫酒下三十丸
獨活湯 治風腳四肢不收身體浮腫節骨疼痛皮膚不仁
獨活 防風 赤茯苓 防己 赤芍藥
桂 芎藭 當歸 白朮 人參
秦艽 麻黃 細辛 甘草
右㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑三棗大拍碎大棗
二枚擘破同煎取七分去滓溫服日三夜一
防風散 治腳氣風亂悶生滿肢節緩弱皮膚不仁骨節疼痛

防風 赤茯苓 芎藭 白蘚 麻黃
桂心 海桐皮 當歸 人參 獨活
細辛 白朮 杏仁
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓
食前稍熱服
防風湯 治身體四肢節解如遺脫腫按之皮陷頭眩短氣
溫溫悶亂欲吐者
防風 白朮 知母 桂心 芎藭
芍藥 杏仁 甘草 半夏 生薑
右剉以水一斗煮取三升分四服日三夜一一方無半夏杏仁芎
藭用附子三枚為八味
谷皮湯浸方 治風腳腿四肢不收
茯苓 羊角 赤小豆 食鹽
右以水一石五斗煮取一石去滓適寒溫浸所患腳勿過膝
每浸一度須出勿令湯冷司持湯更暖換令熱若浴身汗
出差不可覆避風
杏仁酒 治風腳腿四肢不收失音不語
杏仁 糯米
右三味先取杏仁三斗搗碎以盆內擣研汁入水八斗旋研旋絞取汁
令盡去滓煎取四斗五升熟入不津甕中如法蓋覆
作三料醞酒
第一醞取糯米一斗炊作飯用麴末一斤二斤拌和又取杏仁四
升研漸以水一斗六升煎取八斤寒溫適宜投入甕中醞之
第二醞取糯米二斗炊飯用麴末四斤拌和又取杏仁三升爛研漸
以水一斗一升煎取六升寒溫適宜投入甕中
令米漬
第三醞用米麴杏仁水汁一切依第二醞法
右三醞既畢用蠟紙密封莫令氣泄於甕便候香熟每服取
五合不拘時相續飲之常令有酒氣醺醺勿至醉吐為妙為末和酒服之亦可
烏麻酒 治風腳腿軟弱不收失音不語

草麻子油一升 酒一斗

右同於銀石器中盛攪令勻重湯煮一日不住攪候熟每服三合空心日午夜卧各一服初服吐風涎勿怪不吐即涎不出

○柔風 附論

夫柔風之狀四肢不能收裹急不能仰蓋以血氣俱虛風邪並入在陽而轉於外則皮膚緩在陰而裹於內則腹裹急故也

方

天雄丸 出聖惠方 治柔風皮膚虛緩四肢不收或時頭疼腰脚無力

天雄 三分炮裂去皮臍 人參 去蘆頭 沙參 去蘆頭各半兩
白花蛇 一兩酒浸去皮骨炙微黃 羚羊角屑 白殭蚕 微炒
獨活 半兩 防風 去蘆頭 牛膝 去苗 萆薢 麻黃 去根節
甘菊花 半兩 天麻 一兩 桂心 三分 當歸 枳殼
乾蝎 微炒 蟬殼 微炒 細辛 白蒺藜
仙靈脾 白附子 三分炮裂各 蔓荊子 半兩 麝香 一分研

阿膠 三分搗碎炒令黃燥

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十丸

白花蛇散 治柔風血氣俱虛邪中內外皮膚緩腹裹拘急

白花蛇 酒浸去皮骨炙令黃用之 萆薢 萆本 去苗 五加皮
牛膝 去苗 桂 去皮 熟乾地黃 木香
蔓荊子 當歸 甘草 藏靈仙 白附子 炮
甘菊花 蔓荊子 郁李人 羌活 去蘆
虎骨 酥炙 乾蝎 微炒 白芷 防風

右為散每服二錢匕空心溫酒調下不拘時候亦得

酸棗仁煎 治柔風身體疼痛行履不得

酸棗仁 敗龜 海桐皮 仙靈脾 赤石脂
萆薢 羌活 虎骨 蒺藜 石斛
牛膝 巴戟天 附子 木香 杜仲
熟乾地黃 各 白蜜 牛酥 桑枝

右將十六味搗羅為末後用清酒一斗先煎桑枝 去桑枝却下藥末更煎取濃次下白蜜牛酥煎如稀餳用瓷器盛每服半匙以溫酒調下空心日午夜卧服

麻黃散 出聖惠方 治柔風兩脚疼痛緩弱不仁風壅五藏心神煩亂肢節無力

麻黃 去根節 附子 炮裂去皮臍 白茯苓 獨活 各一兩 吳茱萸
酸棗仁 微炒 秦艽 去苗 防風 去蘆 細辛 芎藭
桂心 乾薑 炮 白朮 人參 去蘆 漢防己 各
甘草 炙半兩 杏仁 [illegible]

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服之仍令酒服

防風散 出聖惠方 治柔風四肢軟弱皮膚不仁脚膝浮腫行立無力

防風 一兩去蘆 獨活 牛膝 去苗 茵芋 芎藭
丹參 赤芍藥 萆薢 細辛 澤瀉
漢防己 羚羊角屑 石膏 桂心 赤茯苓
烏頭 炮裂去皮臍各一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

當歸散 出聖惠方 治卒中柔風身體緩弱四肢不收頭熱腹內拘急大小便澀

當歸 防風 去蘆 麻黃 去根節 白朮 各一兩 黃芩
白茯苓 附子 炮裂去皮臍 生乾地黃 山茱萸 甘草 炙微赤剉各半兩
桂心 川大黃 剉碎微炒

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

獨活散 出聖惠方 治柔風肌肉軟弱身體疼痛四肢不仁

獨活 桂心 芎藭 麻黃 去根節 防風 去蘆
白朮 赤芍藥 細辛 附子 炮裂去皮臍
枳殼 麩炒微黃去瓤 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 甘草 炙微赤剉

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

葛根散〔二〕聖惠 治柔風筋骨緩縱脚弱不能行立

葛根 羌活 三兩 乾薑 桂心 防風

半夏 甘草 天麻 麻黃

天雄 牛膝 去苗 萆薢

右搗篩爲散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不

計時候熱服以常有汗爲度

萆薢散〔同上〕聖惠方 治柔風體重氣急四肢者痺不仁

萆薢 防風 人參 桂心 山茱萸

乾薑 獨活 細辛 附子

天雄 牛膝 去苗 白朮

右搗細羅爲散每服食前以温酒調下二錢

大續命散 同上 治柔風及脅體弱四肢不仁腹內拘急骨節疼痛

麻黃 人參 黃芩 赤芍藥 芎藭

甘草 杏仁 防風 桂心

附子

右搗篩爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不

計時候溫服

烏金煎丸〔同上〕聖惠方 治柔風四肢緩弱及言語謇澀

羌活 獨活 牛膝 去苗 附子 白蒺藜

芎藭 牛蒡子 海桐皮 防風

右都搗羅爲末用黑豆七升淨淘以水二斗煮取汁二升去豆入前

藥末一半相和却入銀鍋內以文火煎成膏又入餘藥末和丸梧桐

子大不計時候以温酒下二十丸

五枝風 治柔風肢體緩弱腹內拘急不得俛仰

桑枝 桃枝 槐枝 百靈藤枝 柳枝

黑豆 防風 羌活

右五枝各取東南向者細剉如豆粒羌活防風搗羅爲末先將豆鋪

甑中攤平即將五枝攤於豆上蒸之及一飯頃即取釜中湯約一斗

五升淋過凡三五度然收取汁又別著鍋煎旋旋入釜中再蒸以

豆爛爲度 [illegible] 釜中湯約一斗 [illegible] 鍋中煎三分減二入防風羌活

二味末同和如稠餳每日空心夜臥溫酒調半匙許加至一匙若婦

人血風及風手足攣躄半身不遂即入桂半兩當歸末各一兩地黃汁

七合及生薑汁三合同和再入銀鍋煎神效其滓即衆熟分作三度炙

帛裹之每夜服熨 [illegible] 不過三度 [illegible] 全即用兩拌炒熟用之

乳香煎丸 治柔風四肢不收重不能舉

乳香 麝香 天麻 二兩 安息香 地榆

人參 烏頭 胡麻子

右件五味搗羅爲末入研藥和勻別用麻黃去根節二兩搗碎以

水酒一升煮 [illegible] 同和 [illegible] 丸如梧桐子大每

服十五丸至二十丸 [illegible] 茶 [illegible] 湯亦得

秦艽丸 治柔風身體疼痛四肢緩弱破起不隨

產後中風四肢不能收攝

秦艽 熟乾地黃 桂 芎藭

麻黃 甘草 葛根

右搗篩每服五錢 [illegible] 水一盞 [illegible] 生薑半分 [illegible]

[illegible]

豬膽煎

附子煎 治柔風四肢不收腸中拘急

附子 黑豆 天雄

淡豉

已上四味將三味細剉 [illegible] 一斗五升煮 [illegible] 取汁

更用

天麻 芎藭

右共六味 [illegible] 同搗 [illegible] 如稀餳每日空心

熱湯或溫酒調服一匙頭

麻黃散 治柔風四肢不收腹內拘急兼治婦人產後中風

麻黃 防風 羌活 甘草 黃連

右爲散每服二錢 [illegible] 溫酒調下

換腿丸 治柔風四肢不收仍精并風毒腳氣行履不得

檳榔 黑豆 桑根白皮 郁李仁

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片分切碎煎至一盞去滓空心臨卧溫服

地膚子散 治柔風股體拘攣不收言不能者是無治婦人産後中風

地膚子 紫葛 白頭翁

右為散每服二錢半加至三錢匕溫酒調下

茯苓丸 治柔風拘攣癱瘓無力四肢緩弱不能行立

白茯苓 羌活子

右為末用白麵二兩附子生去皮臍為末一兩共用酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十丸食前溫酒下

石膏散 治柔風身體疼痛自汗出

石膏 甘草

右為散每服一錢匕溫酒調下日四服不拘時

仙人杖浸酒方 治柔風腳膝痿弱久痛風舉上衝肩臍腹筋骨疼痛

用仙人杖一斤剉洗去土皮剉枸杞根白皮是也用生絹囊貯以酒二斗浸七日每日溫服一盞至兩盞不拘時溫飲盡再入五斤

依前浸服兼治一切熱毒風

仙靈脾散 治柔風筋骨拘攣不能行立及治頭風

用附子炮去皮臍一兩[illegible]如麻豆以水五升煎至三升[illegible]去滓每服半盞細細飲之空心日午臨卧服

羚羊角膏 治柔風筋骨疼痛手臂拳攣

同羚羊角二升微上炒飯頃如無[illegible]大豆五升蒸[illegible]於

床上著衣盛被令人臥蒸良久所患處

牛蒡酒 治柔風久不差四肢緩弱

牛蒡子 二兩 生乾地黃 枸杞子 三兩 牛膝

右藥細剉用生絹袋盛以好酒二斗於瓷器內浸密封春夏七日秋冬二七日後每日空心溫服一小盞晚食後再服常令醺醺為效

○風彈曳（附論）

夫人經脈不收者化為痰涎筋脈相隨...

無所不從若脾胃虛弱水穀不化筋脈無所稟養復遇風邪外搏

腠理筋脈拘攣經絡閉澀肢體彈曳其彈則偏而不舉曳則弛而不隨

是皆不能收攝也

方

赤箭丸 治風邪攻肌膚虛弱手足彈曳筋脈不利

赤箭 天雄 丹參 川烏頭 天南星

獨活 防風 五加皮 桂心 白花蛇肉

芎藭 白附子 牛膝 仙靈脾 白殭蠶

桑螵蛸 獨活 酸棗仁 乾蝎

野狐肝 羌活 萆薢 麻黃 牛黃

朱砂 麝香 龍腦

右並生用搗羅為末入研了藥和研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十丸忌生冷油膩毒滑魚肉

犀角丸 治風彈曳手腳不能收攝肌膚頑痺筋脈不利心神恍惚骨節疼痛

犀角屑 羚羊角屑 牛黃

天麻 白附子 桂心 麝香

防風 附子 蟬殼 當歸

芎藭 羌活 白殭蠶 牛膝

獨活 萆薢 麻黃 五加皮 烏蛇肉

羌活 麻黃 朱砂 遠志

金箔 銀箔 仙靈脾 道人頭 地骨皮

右搗羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十丸漸至三十丸忌生冷羊血

生犀天麻丸 治一切風手足彈曳肢體麻痺不仁及骨節疼痛口面偏斜痰涎語澀心松驚悸並宜服之

犀角 天麻 地榆 玄參 丁香

烏頭 烏梟 木香 丹砂 乳香

琥珀 真珠 牛黃 麝香 龍腦

白殭蠶 安息香一兩
麻黃 白花蛇 防風 蝎稍
天南星
右除別研者外為細末，再合研令勻，將安息香膏更別搗，
和丸如櫻桃大，每服一丸，以溫酒或荊芥湯、薄荷湯嚼下。丸
如梧桐子大，二十丸，溫酒下，不拘時。

（當歸散）治妻風攣手腳不遂，身體緩弱，或風入
五臟，精神恍惚，多語喜忘，有時恐怖，肢節疼痛，頭眩心悶，腹
滿不食。

當歸 羚羊角 黃芩 川烏頭
芍藥 遠志 麻黃 秦艽
防風 芎藭 白茯苓 蔓荊
五味子 人參 甘草
桂心 石斛 杏仁
五加皮 石膏
右搗羅為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，
去滓，不計時候，稍熱服，忌生冷豬雞犬肉毒魚滑物。

（天麻丸）治一切風，手足痺，身體不仁，及骨節疼痛，口面
偏斜，痰涎語澀，心忪驚悸。
羚羊角 天麻 獨活 人參 丁香
木香 烏藥 麻黃 黃牛 龍腦
琥珀 乳香 真珠 麝香 天南星
防風 白花蛇 蝎稍 芎藭
安息香
右除研化外為細末，再研令勻，入安息香膏，杵臼擣熟，丸
如梧桐子大，每服二十丸，溫酒下，荊芥湯亦得，不拘時。

（仙靈脾丸）治風痺，手足麻痺，筋脈不得
仙靈脾 牛膝 芎藭 牛黃 麻黃
烏蛇肉 天麻 白附子 當歸
天雄 防風 獨活
桂心 細辛 白殭蠶 萆薢
朱砂 麝香

右搗羅為末，都研令勻，煉蜜和搗三五百杵，丸如梧桐子大，每服食
前以豆淋酒下十丸，忌毒滑魚肉牛血等。

（獨活散）治卒中急風，口噤不能言，四肢痺曳，緩弱疼痛，風經
五臟，恍惚恚怒無常。
獨活二兩 白芍藥 白朮 葛根 白茯苓
防風 茵芋 細辛 甘草 黃防己
芎藭 薏苡仁 桂心 人參 五加皮二兩
麻黃 川烏頭
右搗篩為散，每服四錢，以水一中盞，煎至五分，去滓，入竹瀝一
合，更煎一兩沸，不計時候，稍熱服。

（附子丸）治毒風，四肢不收，或麻痺頑痺。
附子 白附子 天南星
黃防己 羚羊角 芎藭
烏蛇肉 天麻 羚羊角 牛黃
麝香 硫黃 桂心
右搗羅為末，入牛黃麝香等，以水煮大棗肉，搗爛，更入少熟蜜，同和
搗五七百杵，丸如梧桐子大，每服食前以熱酒研下十丸，忌生冷油
膩毒滑魚肉。

（天南星丸）治一切風，手足麻痺，身體疼痛。
天南星 白芷 麻黃 防風
羌活 獨活 芎藭 天麻 白芍藥
桔梗 細辛 白殭蠶 甘草 乾薑
龍腦 麝香
右除研外為細末，和令勻，煉蜜丸如杏核大，丹砂為衣，每服一丸，細
嚼，以溫酒下，不計時候，傷寒頭痛，肢節疼痛，薄荷茶下。

（大風散）治風重，百病，肢體痺曳不遂，
與三兩服尤效。
人參 當歸 天雄 附子 防風
川椒 天門冬
乾薑 山茱萸 五味子 前胡 麻黃

白芷三分 茯苓 甘草炙各半兩

右搗細羅為散每服不計時候以温酒調下二錢匕忌生冷油膩粘滑魚猪肉

附子湯 治風癉手足不遂身體不能俛仰

附子炮裂去皮臍 乾薑炮 甘草炙 防風去叉 獨活去蘆頭

石膏碎 白茯苓去黑皮 白朮 芎藭 柴胡去苗

當歸切焙 人參各一兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 細辛去苗葉一兩

右剉如麻豆每服五錢匕水酒共一盞半煎至一盞去滓温服日三羸弱者只用水煎服

羚羊角湯 治風癉曳及癱緩不隨等疾

羚羊角鎊一兩 防風去叉 防己 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 乾薑炮

側子炮裂去皮臍 五加皮二兩 磁石煅醋淬 薏苡人二兩 芎藭

芍藥 麻黃去根節各

秦艽去苗 甘草炙各一兩

右㕮咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服日三夜一

防風湯 出聖惠方 治風癉不能言四肢頑痺皮肉痛癢不知

防風去叉 獨活去蘆 芎藭 赤茯苓 當歸

葛根剉 桂心去皮 麻黃去根節 附子炮裂去皮臍

細辛 漢防己 甘草炙微赤剉

右搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

獨活湯 治風癉四肢頑不能收攝 方見中風門

天麻丸 出聖濟總錄 治中風癉曳手足不收口眼不正語言謇澁大治筋骨疼痛

天麻 附子炮裂去皮臍 乾蝎炒 白殭蠶炒 芎藭

牛膝酒浸切焙 乾薑炮 甘草炙各

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸温酒下常服大治筋骨至效

獨活湯 治中風手足癉曳不能言

獨活去蘆頭 甘草炙 桂去粗皮 生葛根 芍藥

栝蔞實各一兩

右剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半生薑三片煎取一盞去滓温服日三夜一

羚羊角丸 治中風手頭癉曳語澁

羚羊角鎊一兩 犀角屑三分 羌活去蘆 防風去叉各

薏苡人炒 秦艽去苗各

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸竹葉湯下漸加至三十丸

薏苡湯 出聖惠方 治風癉曳肢體緩弱不相收攝 方見中風門

百部散 治中風癉曳手足不能起

百部一兩 烏頭炮一分 牛膝去苗酒浸 白朮各半兩

右為細散每服一錢匕温酒調下稍加至二錢匕日三夜一

烏龍丸 出聖濟總錄 治中風手足癉曳口眼喎斜語言謇澁步履不正

神驗方 見中風門

蚖蛇丸 出聖惠方 治中風手足頑痺癱曳 方見中風門

蘇木煎 出經驗良方 治風手足癉曳或麻痺不仁

羌活 獨活 川芎各一兩 雄黃 附子

[illegible]

右剉用好大蘇木一兩剉搗碎以米醋各一升銀石器中慢火熬至半升以來濾去滓和上件藥末入臼杵五七百下丸如小豆大粒每服七丸加至十丸十五丸用[illegible]菊根湯下中風手足不隨用海桐皮并金銀煎湯下腹空時一日三服神效

普濟方卷之九十五

考論官教授臣[illegible]頊
對方醫士臣[illegible]先 馮[illegible]文
寫書馮信等
刊經匠[illegible]保等

普濟方卷之三十六目錄

諸風門 論一十二道 類一十二類
方四百三十七方 去三道

類
風痓 風痙 風角弓反張
急風 偏風 風偏枯
中風四肢拘攣不得屈伸 風身體疼痛
中風百節疼痛 風腰脚疼痛
風走注疼痛 風入腹拘急切痛

○風痓 論一道 方一十八方
牛黃丸 天麻丸 麻黃散 白附子丸 麻黃湯
天麻散 天麻湯 續命湯 甘草湯 附子湯
羚羊角散 白术散 秦公當歸酒 獨活湯
三黃湯
承氣湯 療風痓 治中風痓通身拘急口噤不省人事
治中風痓口噤面青

○風痙 論一道 方三方
紫湯方 大豆紫湯 解肌湯

○風角弓反張 論一道 方二十方
天麻丸 一名朱附丸 犀角散 龍腦丸 麻黃散 枸杞浸酒
蕙救人散 天雄散 麻黃散 小續命湯 羚羊角散
威靈仙散 麻黃散 大黃散 續命散 急風散
當歸湯 大豆散 鹽豉酒 治角弓風
治因瘡中風腰脊反張 治中風腰背角弓反張
治中風身如角弓反張

○急風 論一道 方五十五方
牛黃丸 麝香丸 天竺黃丸 牛黃散 狐肝丸
蟬蛻丸 腦麝散 龍腦丸 鉛霜丸 白花蛇丸
紫金丸 牛黃丸 天雄丸 丹砂丸 雄黃散
龍腦丸 烏蛇丸 龍腦牛黃丸 如聖散
大黃丸 天南星散 防風丸 追風散 牛黃金虎丹
透明丸 附子散 妙聖散 烏蛇散 雄黃散
天麻散 土蜂散 蝎梢丸 銀星丸 阿膠散
赤箭丸 七寶丸 分延散 白附花丸 天南星丸
治急風不語無主氣攻刺于胸膈蝎散 天麻丸 續命丸
急風方 鯽魚散 天麻散 半夏丸 治急風立效方
治急風吐痰方 當歸散 蝴蝶散 六神湯
治一切丈夫婦人 主口瘡眼急風
治卒中急風身直不得屈伸反覆者

○偏風 論一道 方五十六道 法 道
茯苓浸酒 換骨丹 大木香丸 甘草湯 茵芋散
防風散 側子散 防風湯 防風散 一名羌活湯
麻子湯 獨活湯 防風散 五加皮散 萆薢丸
海桐皮丸 麻黃湯 防風湯 人參湯 獨活湯 一名[illegible]
荊瀝湯 烏蛇丸 枳殼丸 枳殼人參丸
天麻散 枳殼丸 防己湯 一名加減續命湯 羚羊角散
麻黃散 獨金丸 續命獨活湯 羌活酒
安息香丸 羚羊角湯 羌活湯 麻子人酒
急療偏風膈上風熱經心藏恍惚神情天陰心中憒憒如醉
生地黃湯 竹瀝湯 鐵彈丸 治偏風手足及拘攣經年不瘥
獨活酒 一名[illegible]丸 石灰膏 又方 治偏風手足不遂皮膚不仁
白魚膏 治偏風半身不遂及癱瘓
治偏風半身不遂兼失音不語 附子酒
黃侍御仙酒 治偏風筋骨攣縮手足不遂及腰腳軟皮膚頑痺
治中偏風[illegible] 治偏風口噤 治卒急偏風口喎語澁

主偏風口喎手足攣緩補虛益陽　療偏風半身不遂冷痹疰
治半身不遂失音不語　導引法

〇風偏枯　論一道　方四十一方　灸一道

凝水石酒　大八風湯　扁鵲散　牛黃丸　龍腦丸
甘草湯　牛膝浸酒方　烏蛇散　沒藥丸
茱萸散　祛風丸　天麻木浸酒　十聖天麻丸
虎脛骨酒　桂心散　麻黃散　天雄散　當歸湯
金箔丸　烏藥順氣散　乳香沒藥丸　川烏頭丸
獨活散　赤車使者酒　天南星丸　皂莢丸
獨活煮酒　磁石湯　虎骨散　竹瀝飲子　三聖丹
犀角散　茵芋浸酒　烏頭益丹
山龍丸　羌活散　香風散　小黃耆酒
治中風偏枯不遂手腳冷頑痺硬及攣縮不伸
治風攣拘急偏枯血氣不通利　續斷湯　大八風湯

導引法

〇中風四肢拘攣不得屈伸　論一道　方五十八方　灸一道

生犀丸　輕骨丹　萆薢丸　酸棗人煎　列節受病方
白花蛇丸　乳香丸　羌活散　羌活湯　天雄丸
防風散　牛黃丸　乳香丸　防己麻黃湯
秦艽丸　天麻丸　茵芋湯　西州續命湯
薏苡人散　獨活散　酸棗人丸　人參湯　天麻丸
白花蛇散　白斂薏苡湯　勻氣散　烏蛇丸　當歸湯
犀角丸　防己湯　勻氣散　羚羊角散　麻子湯
附子散　地龍散子　舒筋丸　麻黃湯　附子湯
杜仲散　杏人散　二聖散　烏蛇丸　[illegible]
枳茹酒　治中風身直不得屈伸反覆　商陸方　拂延散　小續命湯　續斷丸
貼藥芫花散　治手足流中風不得屈伸不能洗熨方　驅風散
枸杞菖蒲酒　椒朮丸　烏龍丸

治中風麻痹緩弱及風氣攻注手足不遂筆藥方
舒筋丸　治筋脈拘攣久風濕痺下注腳膝骨中邪氣
地捻丸　治中風四肢走注青木丸轉筋呼者
中緩風四肢不隨者　導引法

〇中風身體疼痛　論一道　方四十三方

辟風神驗方　麻黃煎丸　麒麟竭丸　至聖丸
虎骨散　獨活散　茵芋散　羌活湯　芎藭散　防風散
乳香丸　附子散　靈效丸　羚羊角散　虎骨丸
地龍丸　祛風丸　萆薢散　五加皮散　沒藥丸
羌活湯　沒藥丸　應痛丸　沒藥丸　海桐皮丸
通氣防風散　骨碎補散　露蜂房蕪荑方　虔正丸
麝香丸　威靈仙丸　黑神丸　治風痛方
治渾身風疼痛腿膝攣動不得者
虎骨酒　骨碎補丸　治一切腫痛風病

治丈夫冷氣及風筋骨疼痛　天麻飲子　治風手足
鐵彈丸　治頑麻身中急痛者　除風痛出汗
治風濕身頑疼日漸倒者與麻黃杏人薏苡人湯

〇中風百節疼痛　論一道　方二十七方

麝香丸　仙茅散　羌活湯　羌活散　護風趁痛散
白花蛇散　三黃湯　芎桂散　神朮湯
治諸風痛攻四肢百節　又方　芍藥方
白頭翁酒　又方　治中風筋攣附骨疼痛
治骨體風每疼痛不可運動者　虎骨散
治大風攻主四肢筋骨疼痛　治腰疼仲者患手足十指疼痛
治中風氣瘖言語蹇澀　精神昏亂筋脈拘急身痛獨活湯方
再造丹　主風在骨節間及血痹　治筋骨風急痛
治中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜　治筋骨急攣中風
治諸風筋骨攣縮及皮膚痒手足不遂

治中風骨節疼痛五劳七傷久变風風

風腰腳疼痛　論一首　方五十六方

乾蝎丸　虎骨散　虎骨浸酒方　虎骨丸
虎骨散　白花蛇浸酒方　防風湯　牛膝丸　杜仲浸酒方
續斷湯　虎骨湯　虎脛骨酒　附子根浸酒方
酸棗仁浸酒方　枸杞子湯
羌活散　石斛浸酒方　菊花浸酒方
浸酒方　麻黄湯　肉蓯蓉丸　附子散
薏苡仁散　萆薢浸酒方　仙靈脾浸酒方
五加皮浸酒方　牛膝湯　當歸丸　牛膝浸酒方
海桐皮浸酒方　獨活湯　茯苓丸
木香丸　牛膝丸　安息香丸　龍虎丹
薏苡仁丸　治風氣攻刺手腳腰背痛　應痛丸
仙靈脾散　浸酒方　狗脊丸
治風毒攻腳膝疼痛　地龍散　三神散　牛膝散　安息香丸
浸酒方　何首烏丸　皂莢散　枳殼散
豆豉散　貼膈烏頭散
治風血痺衰老起陽強腰腳除痺變白益命氣排風邪
治諸風腰膝疼痛　治腰腳風血積冷筋急拘攣疼痛者

風走注疼痛　論一首　方四十一方

骨碎補丸　獨活散　海桐皮煎丸　虎骨散
狼毒丸　治風走注疼痛　虎骨丸　獨聖黑龍丸
牛膝丸　妙應丸　大通丸　防風天麻散
如意丸　骨碎補丸　虎骨散　天麻丸　烏頭散
桂心散　乾地黄丸　應痛丸　威靈仙丸　活絡丹
一漬散　治風走注疼痛　又方　羌活丸
莎草根丸　仙靈脾散　神效膏　烏蛇丸　治風走注疼痛
趁痛丸　蔓荊子散　治風走注疼痛
芥子丸　虎骨木瓜丸　地黄丸
治走注風散血止痛　治走注風

風入腹拘急切痛　論一首　方十六方

竹瀝湯　大棗湯　乾地黄湯　大准散　烏頭散
甘草湯　人參湯　附子散　甘草散
芎藭湯　桂心湯　烏頭湯　赤芍藥散　理中湯
治中風寒熱腹中絞痛　食鹽方

普濟方卷之二十六目錄

普濟方卷之三十六

諸風門

風痓

論

夫太陽中風重感於寒濕則變痓也。痓者口噤不開，背強而直，如發癎之狀，搖頭馬鳴，腰反折，須臾十發，氣息如絕，汗出如雨，時有脫易。得之者新產婦人及金瘡血脈虛竭，小兒臍風，大人涼濕得痓風者皆死。溫病熱盛入腎，小兒癎熱盛，皆痓。痓瘈癎相似，故以癎成顛，宜審察之。其重者患耳中策策痛，皆風入腎經中也。不治，流入腎則卒然身體痓直如死，皆宜服小續命湯兩三劑也。若耳痛腫生汁作癰癤者，乃無害也。惟風宜防耳，針耳前動脈及風府神良。

方

牛黃丸（出聖惠方）治風痓身體強直，牙關緊急，心神昏昧。

牛黃（細研）　麝香（細研）　羚羊角屑　硃砂（細研水飛過）
白僵蠶（微炒）　虎頭骨（塗酥炙黃）　白花蛇（酒浸去皮骨炙）
白附子（炮裂）　天麻　白蒺藜（微炒）　赤茯苓　白芷
羌活　獨活　蔓荊子　麻黃（去根節）　漢防己
木香　犀角屑　藁本　防風（去蘆頭）　乾蝎（微炒）
當歸（剉微炒）

右為末入研了藥令勻，煉蜜和擣三二百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，以溫酒研下十丸。

天麻丸（出聖惠方）治風痓四肢強硬，口噤不開。

天麻　烏蛇（酒浸去皮骨炙微黃）　白僵蠶（微炒）　桂心
防風（去蘆頭）　蟬殼　川烏頭（炮裂去皮臍）　白附子（炮裂）　羚羊角屑
羌活　細辛　獨活　附子（炮裂去皮臍）
麝香（細研）　天南星（炮裂）　麻黃（去根節）　乾蝎（微炒）

右為末，煉蜜和擣二五百杵，丸如綠豆大，每服不計時候，以溫酒研下[illegible]丸。

麻黃散（出聖惠方）治風痓身體強直，口噤不能言，神思昏悶。

麻黃（去根節）　羌活　附子（炮裂去皮臍）　赤茯苓　芎藭（各）
桂心　黃芩　羚羊角屑　蔓荊子　酸棗仁（各）
防風（去蘆頭）　甘草（炙微赤剉）

右擣篩為散，每服四錢，以水一中盞，煎至五分，去滓，入淡竹瀝一合，更煎一兩沸，不計時候溫服，衣覆汗出避風。

白附子丸（出聖惠方）治風痓口噤，身體強直，悶不識人。

白附子（炮裂）　白僵蠶（微炒）　麻黃（去根節）　防風（去蘆頭）　[illegible]
膩粉（一分）　天南星（炮裂）　羚羊角屑（各三分）　白朮（半兩）
麝香（細研）　白花蛇（酒浸去皮骨炙）

右為末入研了藥令勻，以糯米粥和擣三二百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，以溫酒研下十丸。

麻黃湯（出聖惠方）治風痓身體強直，口噤不知人事。

麻黃（去根節）　甘草（炙）　當歸　黃芩
石膏　桂（去粗皮）　芎藭　乾薑（炮）　附子（炮裂去皮臍）
杏人（湯浸去皮尖雙仁麩炒）

右剉如麻豆，每服五錢，以水二盞，煎至一盞，去滓入荊瀝半合，更煎三五沸，溫服，日三夜一。一方治風痱身體不能自收，不能言語，冒昧不知人者，不用荊瀝，每服六錢，以水三盞，煎至一盞半，去滓分溫三服，空心夜卧各併二服，和服一日，猶能自覺者，勿熱服，服訖當宣臥，用厚衣覆，微汗出，漸減衣，未汗出更用熱生薑稀粥投之，汗出忌觸外風。并治上氣欬逆，若面目大腫，但得走不得卧，凡產婦并病人已曾大汗者不可服，若虛羸人但當少服。

天麻散（出聖惠方）治風痓口噤，腰背強直，不可轉側。

天麻　獨活　麻黃（去根節）　當歸（剉微炒）
防風（去蘆頭）　桂心　細辛　附子（炮裂去皮臍）　蔓荊子（各一兩）

右擣羅為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至五分，去滓，不計時候溫服。

天麻湯（出聖濟總錄）治風痓身如板直，偏身顫掉，強

天麻（三兩）　羌活（去蘆頭）　人參　桂（去粗皮）　白朮
麻黃（去根節）　杏人（湯浸去皮尖雙仁炒）　附子（炮裂去皮臍）

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半入薑一片大水二盞煎至一盞去滓入…
盡再煎熱服服後以少蒸餅投之汗出後…日一服
續命湯 治風痓口噤不語身背強直角弓反張
麻黃 人參 芎藭
羚羊角屑 桂心 防風
右㕮咀每服六錢以水一盞半煎取一盞去滓溫服衣覆
避風每半春分復常服二三
甘草 治風痓口噤不語體強直
甘草 附子 人參 防風
右剉如麻豆每服四錢以水一盞半入薑煎十合去滓…分去
滓入荊瀝竹瀝各…溫服日夜各一服
附子湯 治風痓口噤不語身體強直
附子 防風 桂心
右剉如麻豆每服五錢以水二盞煎至一盞入竹瀝一合更煎二沸
去滓五服空心食前二服
羚羊角散 治風痓口噤身體強直不知人事
羚羊角屑 附子 當歸 桂心
阿膠 麻黃 天麻 獨活
右搗羅為散每服四錢以水一盞中煎至三分去滓不計時
候分溫二服
當歸散 治風痓強頭口噤身體強直
當歸 細辛 防風 桂心 附子
薏苡仁 芎藭 獨活 麻黃
右搗羅為散每服四錢以水一盞入生薑煎至五分去
滓不計時候溫服
蒼公當歸湯 治風痓
當歸 防風 獨活 麻黃 附子
右為末每服五錢水二盞煎去滓溫服
龍膽湯 治五臟生風發痓日夜數十發者
防風 黃連 草龍膽 白薑

右為末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服
大黃湯 治剛痓大便不通十數日者
大黃 枳實
芒硝
右除芒硝外並為粗末每服十錢水二盞煎去滓入芒硝
半錢再煎二兩沸微熱
原賊風痓
右以鐵炒使極熱用投酒中飲
治中風痓通身不知人事婦人產後亦可服之
右用獨活一兩為末以酒大豆煎至七分去滓入竹瀝今分二服
治中風痓口噤手足婦人產後亦宜服之
右用竹瀝一升分為五服微溫頻服大效
小兒風痓論
夫風痓病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭動搖
卒口噤背反張…
…
不識一斷…
指撮動…作風痓病療之
方
葉湯方 治中風無問男子婦人中風者急身痓
大豆 防風
右以水…先煮大豆…
大豆…治風痓…
右用黑豆炒焦…三錢…

死腹中服此並差此歸荊湯獨活以人為邪氣所干則發而為病若氣若
血若痰若水若風若寒若暑若濕臟腑表裏冷熱虛實各有受病之
處用藥之法必究其源而後可以起病否則前賢所謂猶不知先廣
絡原野冀一人獲之術亦疏耳是可以人試伎乎哉一方用羌活獨活各
歸荊湯 治風痙昏迷吐沫抽掣背脊強直產後中痙通用
當歸　荊芥穗 各等分
右為末每二錢水一盞酒少許煎七分灌下如口噤用斡匙斡開以
灌藥入口或用童便調下或以芎藭代當歸亦可之
口風角弓反張
論
夫風角弓反張之狀腰背反折不能俯也由風邪客於諸陽之經脈
相搏風氣勝則筋脈緊急腰背反折如弓之形也
方
天麻丸 治中風角弓反張口噤不語四肢拘急并腎臟風
毒攻注手足頑麻一切急風
天麻　白附子 炮裂　附子 炮裂去皮臍　牛膝 去苗　白殭蠶 微炒
羌活　犀角屑　防風 去蘆頭　天南星 炮裂
蟬殼　硃砂 細研　膩粉　麝香 細研　乾蝎 微炒
白花蛇 酒浸
右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如雞頭實大每服
以生薑汁薄荷汁各少許入熱酒二合相和研下一丸不計時候頻服
一方無薄荷汁
羚羊角散 治中風角弓反張心神煩亂口噤不語
羚羊角屑　麻黃 去根節　羌活　附子 炮裂去皮臍　杏人 湯浸去皮尖
防風 去蘆頭　桂心　白朮　人參 去蘆頭
芎藭　白茯苓　細辛　當歸　石膏 二兩
甘草 炙微赤
右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹
瀝一合更煎一兩沸不計時候溫服
龍腦丸 治中風身如角弓反張不語昏悶

龍腦 細研　麝香 細研　蟬殼　牛黃 細研　乾蝎 微炒
天南星 炮裂　硃砂 細研　阿膠 搗碎炒令黃燥　香墨　白附子 炮裂
防風 去蘆頭　羚羊角屑　白桂　羌活　烏蛇 酒浸
已上各等分
右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如菉豆大每服不
計時候以溫酒下十丸
麻黃散 治中風身如角弓反張口噤不語
麻黃 去根節　石膏　防風 去蘆頭　羚羊角屑　獨活
五加皮　前胡　桂心　附子 炮裂去皮臍　人參 去蘆頭
芎藭　當歸　甘草 炙微赤　杏人 湯浸去皮尖
右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不
計時候溫服
枸杞浸酒 治中風身如角弓反張及婦人一切血風上攻下注
若久服悅澤顏色滋潤皮膚退風益氣強力
枸杞子　晚蠶沙　惡實 微炒　蒼耳子　防風 去蘆頭
大麻子　茄子根　牛膝 去苗
惡實根　枸杞根　羌活　秦艽 去苗
右細銼
右以生絹袋盛用好無灰酒三斗浸密封閉勿令通氣七日方開每
不得面對瓶口每服一盞溫過空心食前臨卧服常令有酒容久病
風疾不過一月差
羌活散 治中風身如角弓反張心胸滿悶
羌活　芎藭　桂心　當歸　細辛
前胡　羌活　[illegible]　生乾地黃　萆薢
羚羊角屑　甘草 炙微赤
右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不
計時候稍熱服
天雄散 治中風身如角弓反張口噤者
天雄 炮裂去皮臍　獨活　羚羊角屑　白蘚皮　防風 去蘆頭
躑躅花　麻黃 去根節　芎藭　酸棗人 微炒　桂心

牛黃 川烏頭

右搗羅爲散入研了藥令勻每服一錢不計時候以溫酒調下二錢頻服

以汗出爲度

麻黃飲 治中風身如角弓反張四肢不遂煩亂口噤

麻黃 防風 桂 白朮

人參 芎藭 當歸 甘草 乾薑

附子 杏人

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服不拘時候

小續命湯 治惡風角弓反張飛尸入腹或隔門注來有嚮

急少陰傷寒口噤下利

大黃 黃芩 青羊脂 當歸 乾薑

桂心 熟地黃 芍藥 甘草 細辛

吳茱萸

右㕮咀以水二斗煮取六升分六服重者加藥用水三斗煮取九升

分十服

羚羊角散 治中風身如角弓反張筋脉拘急疼痛

羚羊角屑 桂 細辛 赤茯苓 芎藭

當歸 酸棗人 防風 羌活 芍藥

丹參

右搗羅爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不

計時候稍熱服

威靈仙散 治中風身如角弓反張言語蹇澀心神煩亂

威靈仙 獨活 羚羊角屑 麥門冬 桂心

赤茯苓 防風 細辛 麻黃 五加皮

薏苡人

右搗羅爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入

竹瀝一合更煎一兩沸不計時候溫服

麻黃散 治中風身如角弓反張昏口噤

麻黃 芎藭 當歸 杏人

羌活 附子 防風 桂心 薏苡人

羚羊角屑 甘草

右搗羅爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計

時候稍熱服

大黃飲 治中風身如角弓反張及飛尸入腹疠痛悶絶往來

有時筋急少陰寒熱口噤不開

大黃 熟乾地黃 雄黃 乾薑

桂 赤芍藥 細辛 甘草 青羊脂

右剉如麻豆每服三錢匕水一大盞煎至七分去滓溫服日二夜一

續命散 治中風口噤身體拘急如角弓反張欲死者

獨活 防風 附子 杏人

麻黃 細辛 芎藭 當歸

右搗羅爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計

時候溫服

急風散 治中風身如角弓反張

附子 烏頭 天南星

藁本 防葵 白芷 乾蝎

白附子

右爲細散每服半錢匕豆淋溫酒調下日二服未愈再服

當歸湯 治中風身如角弓反張口噤不開

當歸 細辛 防風 獨活 麻黃

附子

右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞酒半盞同煎取一盞去滓溫服

如得汗出攻外風者口噤即斡開口灌之一方治賊風口噤者加生薑

一豪大柏酒同煎服名當歸飲一方水酒煎

大豆散 治中風背急反張身不著席口噤不開

大豆 乾薑 蜀椒

右爲細散每服一錢匕溫酒調下日夜各三作汗出即差

鹿皮膠酒 治中風身如角弓反張兼治賊風口噤

鹿皮膠 清酒

右以酒煮膠令化取六升分十二服空心細細服之

治角弓風 出本草
以豆淋紫酒服之
治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直 出本草
雞屎白一升 大豆五升
右和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身
出汗須勿觸風
治中風體角弓反張四肢不隨煩亂欲死 出本草
清酒伍升 雞屎白一升
右搗篩末合和之攪千遍乃飲大人服一升日三少小五合差
治中風身如角弓反張口噤不語 雞人屎 發亦宜服之
川烏頭
右取黑豆半升同炒半黑豆以酒三大升瀉於鐺中急攪以絹濾
取微溫服一小盞取汗若口不開者拗開口灌之未效加鷄糞一合
炒入酒中再服以差為度

急風

論

夫急風中人乃毒厲之氣非天地陰陽素節之常也其證筋脉緊急牙
音聲直而黑鼻乾口噤不語須臾風入五藏與[illegible]相引附通身壯熱
汗出如油直視昏青疾涎結聚咽喉壅塞如拽鋸聲妙兩手脉陰陽
俱細緩書主或沉微浮散者難治

方

牛黃丸 治中急風
牛黃 硼砂 丹砂 水銀 膩粉
硫黃 龍腦 麝香
金薄 雄黃 天麻 芎藭
獨活 人參 茯苓 麻黃
牛膝 升麻 白芷 桂 芍藥
縮砂人 龍骨 細辛 枳殼 桔梗
葛根 當歸 前胡 杜仲 黃芩
木香 羚羊角 遠志 防風 紫菀

乾蝎 微炒 白豆蔻 去皮 蟬殼 微炒
附子 炮裂去皮 白殭蠶 炒 藁本 羌活 青橘子
烏蛇 酒浸去皮骨炙
右除研藥外搗羅為細末與研藥拌勻煉蜜同和搗
三千杵丸如麻子大每日空心熱酒下二丸加至三丸纔覺中風便
取熱豆淋酒研化三丸服良久以熱生薑酒粥投之衣蓋汗出即差
患者只服二丸至三丸不得多凡合藥取臘日及四時王相日天德
月德月合之日仍忌慎勿令婦人孝子小兒雞犬等見凡入口附子先
以豆淋酒浸三日 若腰四肢中風傷寒如一丸麻黃杏人湯
下小兒驚風一丸如黍粒大荊芥薄荷湯下大人癱緩風天麻酒
下三丸空心午時夜臥各一服
麝香丸 治急風口眼喎斜四肢拘制
麝香 牛黃 白附子 蔓荊子 白殭蠶
乾蝎 白蒺藜 羚羊角屑
龍腦 膩粉 雄黃 犀角屑 桂心

羌活 獨活 防風 芎藭
麻黃 白花蛇 天麻 半夏
朱砂 附子
右為末都研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服下[illegible]溫酒下十丸
天竺黃丸 治中急風
天竺黃 牛黃 雄黃 龍腦 羚羊角
麝香 水銀一分 丹砂
[illegible]石 天麻 烏蛇 乾蝎
白殭蠶 炒 蟬殼 桑螵蛸 羚羊角 白附子
附子 炮裂 蓽撥 羌活 獨活 狐肝
蔓荊實 麻黃
右除研藥外為細末再入研藥拌勻煉蜜和丸梧桐子大每服豆淋
薄荷酒下二丸至三丸加至五丸後以熱稀粥投之日夜可三四服
汗出多即減服數
牛黃散 治急風壅涎胸膈躁悶

牛黄 龍腦 麝香 蟬殼 殊砂
雄黃 天南星 烏蛇肉 白附子
白殭蠶 芎藭 防風 紫葳 麻黄
細辛 藁本 蝎子 大麻 乾蝎
甘菊花 羚羊角屑 天竺黃
右細羅為散入研令了藥同研令勻不計時候以熱酒調下二錢

狐肝丸治中急風
臘月狐肝 雚書 臘月猪脂 桑螵蛸
白附子 地骨皮 麥門冬
乾蝎 烏蛇 白殭蠶 白花蛇
天門冬 人參 檳榔 天南星
膩粉 麝香 五靈脂 天麻 羌活
右將前七味先下狐肝猪脂次下五味藥入瓷子內固濟口上
仍留一眼如錢竅大出煙黃泥封定慢火先燒令熱加大火燒青煙
出即泥合竅子住火候冷取出研細同餘藥一十三味再同
研令勻重羅煉蜜為丸如菉豆大每服溫酒下三丸至五丸微汗不
得多服空心併二服如人行五里再一服午時再服各一服汗出即差

驛鶄丸治急風半身不隨語澀四肢疼痛手足痺急面瘡
斜言語蹇澀白癜頑麻心驚恍惚及腫體腫瘦及腳氣風癰瘡
痛等疾
驛鶄 乾蝎 附子 烏蛇 五味子
芎藭 白殭蠶 防風 天南星 乾薑 天麻 麻黃 白附子
蔓荊實 狗脊 雄雀糞 當歸 雄黃
丹砂 麝香
右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸薄荷酒磨下急風癱緩及
注痛骨疼痛薄荷汁化開一丸以熱酒投下向患處以衣被蓋汗出
體覺疼痛即定

膩鸚散治急風手足攣急口噤項強不知人事

臘月烏 天麻 臘月野狸肝 烏蛇
桑螵蛸 乾蝎
天南星 白附子 阿膠 麝香
白殭蠶 天竺黃 晴粉 蛇蛻
牛黄 龍腦
右細羅為散與前味相和更研令勻每服以溫酒調下二錢不
計時候頻服以效為度

龍腦丸治急風四肢拘急口眼不正語澀
龍腦 麝香 雄黃 硫黃 殊砂
蝎尾 桂心 白附子 天南星 阿膠
木香 人參 天麻子 防風 粉霜
半夏 香墨
右為末每研令勻用肥皂莢二斤去黑皮以水五升浸軟接濾取汁
於銀鍋中慢火熬稀稠得所和前藥末更搗五七百杵丸如梧桐子大
每服不計時候以溫酒化破十九服後別喫一盞熱葱酒令有汗出
更重者併三五服差

鉛霜丸治急風身強口噤手足拘急
鉛霜 赤箭 殭蠶 附子
羚羊角屑 桑螵蛸 白附子 乾蝎 天南星
半夏 烏頭 防風 白花蛇
羌活 羚羊角屑 麝香
右為末入研了藥令勻以水煮天麻膠和丸如菉豆大不計時候以溫
酒研下十丸

白花蛇丸治急風口噤項強手足攣急唇青面黑
白花蛇 乾蝎 白殭蠶 白附子
防風 桂心 麻黃 鹿角膠
半夏 天南星 川烏頭
牛黃 桑螵蛸 雄黃 硃砂
右為末都研令勻用天麻三兩搗羅為末以無灰酒一大盞慢火熬
成膏和藥末更搗五七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以

薄荷酒研下十九

紫金丸 治急風筋脉緊急身背強直牙關不開口噤不語甚者壯熱汗出直視唇青涎盛咽塞

烏頭 地龍 白膠香 木鱉子 龍腦
乳香 没藥 丹砂 五靈脂 天麻
附子 白花蛇 當歸 麝香

右為末用辰月日時於辰方上取東流水和擣三千下丸如雞頭子大每服半丸生薑自然汁和酒磨下一切風隨證或乳香龍腦麝香薄荷茶酒臨時作湯使

牛黃丸 治急風身背強直口噤心煩言語不得

牛黃 麝香 龍腦 雄黃 硃砂
水銀 阿膠 桂心 獨活 白附子
赤箭 麻黃 天南星 鉛霜

右為末都研令勻煉蜜和丸如雞頭大不計時候以熱豆淋酒研下十九

天雄丸 治急風筋脉拘急口噤

天雄 麻黃 天麻 桂心 天南星
半夏 羌活 乾蝎 硃砂 防風
膩粉 雄黃 牛黃 麝香

右為末入研了藥令勻煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大不計時候以荊芥酒下十九

丹砂丸 治中急風昏亂不識人

丹砂 牛黃 阿魏 龍腦 水銀
天麻 防風 芎藭 細辛 羌活
麝香 烏雞血 烏蛇

右各別為末先以[illegible]合研勻[illegible]丸如梧桐子大每服十丸熱酒下未出再進

雄黃散 治急風不省人事

雄黃 香墨 乾蝎 蟬殼 龍腦

麝香 丁香 牛黃 膩粉 硃砂
天南星 阿膠

右細羅為散入研了藥都研令勻不計時候以豆淋酒調下一錢

龍腦丸 治中急風

龍腦 白花蛇 乾蝎 白附子 白僵蠶
天麻 乾薑 膩粉 半夏
麻黃 麝香

右除研藥外為細末與研藥和勻酒煎阿膠和丸麻子大豆淋酒下五丸至十丸日三夜一不拘時候

烏蛇丸 治中急風

烏蛇 天麻 白附子 天南星
半夏 羌活 犀角 乾薑
白僵蠶 麝香

右除研藥外擣羅為細末與研藥拌勻煉蜜為丸如菉豆大每服二丸至三丸若風口噤化七丸熱酒灌下再用五丸投之

龍腦牛黃丸 治急風涎潮搐搦四肢緩弱手足[illegible]

龍腦 牛黃 桃膠 阿膠 膩粉
水銀 白花蛇 乾蝎 麝香 鉛白霜 阿魏

右先將桃膠阿膠蝎白花蛇擣羅為細末再入諸藥研勻煉蜜和丸如皂子大每服一丸細嚼荊芥薄荷下更以酒少許衝下[illegible]密室內避風服藥後見病處手出汗自心上至腰足後出或暴利[illegible]汗頻勻為轉三服後即見成退後三日再一服

如聖散 治急風

[illegible]

龍腦 麝香 牛黃 犀角 琥珀
金箔 銀箔 真珠 丹砂

右件研極細同前藥研勻每服一錢已薄荷自然汁入酒少許調下空心日午臨臥各一服

大黄丸　治急風手足搐搦不得屈伸大小便澁百節痛不能行走
大黄（煨）　乾薑（炮）　白殭蠶（炒）　天麻　白附子（炮）
天南星（炮）　附子（炮去皮臍）　半夏　牛黄（研）
腻粉（一分）　麝香（研）
右為末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸以溫酒化下
天南星散　治急風及破傷角弓等風
天南星　半夏　乾蝎（炒）　白殭蠶（炒）
細辛　白附子（炮）　肉桂（去皮）　腻粉（一分）
白花蛇（酒浸去皮骨）　犀角屑　天竺黄
右細羅為散不計時候以豆淋酒調下一錢
防風丸　治中急風
防風（去叉）　白殭蠶（炒）　乾蝎（炒）　白附子（炮）　丹砂（研）
五靈脂（研）　羌活（去蘆）　天麻　天竺黄
牛黄（研一分）
右為細末拌勻煉蜜和丸麻子大薄荷酒下五丸加至七丸
口噤研化灌下小兒急驚風荊芥薄荷湯下二丸至三丸
追風散　治一切急風角弓反張四肢抽掣牙關緊急節疼痛
及破傷風
烏頭（炮去皮）　附子（炮去皮）　白附子　白花蛇（酒浸去皮骨）
丹砂（研）　蝎梢　麝香（研三分）　腻粉（研一分）　天南星
右並生用搗羅六味為細散入研藥合研勻後合收每服半錢至
一錢豆淋酒或煎葱白酒調下口噤者用少藥揩牙即開為妙
牛黄金虎丹　治急中風身背強直口噤失音筋脉拘急鼻乾
面黑遍身壯熱汗出如油目瞪唇青心神迷悶形體如醉痰涎壅
塞胸膈喉中如拽鋸聲
白礬（枯過）　天竺黄（研）　天南星
腻粉（研）　牛黄（研）　生龍腦（研）　天雄（炮去皮臍）
金箔（八百片為衣）
右為末煉蜜搜和每一兩半作十丸以金箔為衣每服一丸以新汲
水化灌之扶坐使藥行化良久續以薄荷自然汁更研化一丸灌之

立愈肥盛體重多涎有風之人宜常以此藥隨身備急驚風昏
搐黑心膈悶亂有涎欲倒化藥不及急嚼一丸新汲水下小兒急驚
風一歲兒服芥豆大一丸薄荷自然汁化灌之更量歲數臨時加減
孕婦人不得服
追風丸　治中急風眩冒僵仆頭目昏運涎涌偏痛手足無力
舉動艱辛語言蹇澁心忪不寧
麻黄（去根節）　麝香（研）　天麻　沒藥（研）　乳香（研）
地榆　甜瓜子　黑參　川烏頭（生去皮臍）
右為末以酒一升浸大麥為膏更重入煉蜜丸如梧桐子大每
服三十丸豆淋酒下不計時候
附子散　治急風面青口噤心膈有涎不可出者
附子（炮去皮臍）　白附子（炮）　白殭蠶（炒）　天南星（炮）
烏蛇　半夏　狼毒
乾蝎（炒）　麝香（研）
右搗細羅為散入麝香都研令勻每服以熟豆淋酒調下一錢食前
再服少吐涎出相次以熱葱酒一盞投之蓋覆令有汗為效
蝎梢散　治急風四肢搐搦口面喎斜不知人事
蝎梢（炒）　白附子（炮）　獨活　天麻
桂心　白殭蠶（炒）　天南星（炮）　腻粉　桑螵蛸（炒）
右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢
烏蛇散　治急風語言蹇澁心膈煩悶四肢緊急
烏蛇（酒浸去皮骨炙）　白殭蠶（炒）　天麻　天南星（炮）
白附子（炮）　半夏　附子
蝎梢（炒）　牛黄（研）
右搗細羅為散不計時候以溫酒下二錢薄荷湯調下亦得
雄黄散　治急風及破傷風之類
雄黄（研）　白附子（炮）　天南星（炮）　牛黄（研）
白花蛇（酒浸去皮骨）　麝香（研）　蝎梢（炒）　白殭蠶（炒）
天麻（二兩）
右搗細羅為散入研了藥令勻不計時候溫酒調下一錢

天麻散 治急風四肢拘急牙關緊急恐失音不語
天麻 附子 天南星 白附子
麻黃 桂心 烏頭 半夏
乾薑
右擣細羅為散每服以豆淋酒調下二錢蓋覆當有汗出良久未
汗即再服之
土蜂丸 治急風筋脈拘急口眼喎斜
土蜂 雄黃 硫黃 硃砂 膩粉
龍腦 麝香 乾蠍 蟬殼
右擣研為末用糯米粥和丸如菉豆大每服不計時候以熱豆淋
酒下十丸頻服汗出為度
蟾酥丸 治急風眼前暗黑心躁涎四肢不舉
蟾酥 殭蠶 乾地龍 蜈蚣 烏頭
蠶沙 天麻 晚蠶蛾 白花蛇
右為末用烏雞膽汁和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下
十丸其藥杵後用瓶合之
鐵星丸 治急風涎盛口眼喎斜語言蹇澀
天南星 白附子 麝香
蝎梢 水銀 鉛 牛黃
右合研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服十丸至十五丸煎荊芥黑豆湯
下小兒驚風痰涎不利服三五丸微利者以龍腦膩粉薄荷汁調
下 方有石腦油與麝香各半錢丸
阿膠散 治急風口眼不開筋脈拘急
阿膠 當歸 蟬殼 桂心 附子
麻黃 乾蠍 白殭蠶
右擣細羅為散每服以溫酒調下二錢良久以葱酒投之令汗出為
效未汗再服
赤箭丸 治急風涎在膈悶亂不已
赤箭 天南星 阿膠 乾蠍 半夏
雄雀糞 膩粉 麝香

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以溫生薑酒研下七丸為妙
七寶丸 治中急風及中惡不識人面青四肢逆冷
丹砂 蟾酥 安息香
雄黃 龍腦 麝香 琥珀
右以六味合和同研一日取安息香以無灰酒五合別入明膠二兩同
研以蒿葉子攪於銀器上蒸三升黍米飯熟為度更研如
稠糊和前六味若硬即更入煉蜜丸如雞頭大每服生薑汁合童子
小便二合化下半丸如人行五里再服汗出清利即愈孕婦不可服
分涎散 治急風口噤手足搐搦涎潮作聲不得出
藿香葉 蝎梢 白附子 天南星 丹砂
膩粉 粉霜
右先將四味搗羅為末次入丹砂膩粉霜同研勻每服一錢匕至
二錢薄荷茶調下未吐利再服
白花丸 治急風牙關緊急口眼牽急
白花蛇 烏頭 半夏 天南星 膩粉
水銀 白花蛇
右為末入水銀於鉢內研令勻煉蜜和丸如菉豆大不計時候以熱酒下五丸
天南星丸 治中風
天南星 白附子 乾蠍
桂 附子 白花蛇
右為末煉蜜和丸如梧桐子大用膩粉半兩衮以粉盡為度每服熱
酒下三丸衣覆出汗避外風
治急風不語兼注氣攻刺背痛
白附子 白殭蠶 天麻 乾蠍 白花蛇肉
膩粉一兩
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二丸冷酒下再用熱酒投汗出即差
乾蠍散 治急風頭涎壅悶不知人事
乾蠍 桑螵蛸 蟬殼 白附子 膩粉
白殭蠶
右擣細羅為散不計時候以溫酒調下一錢

天麻丸 治中急風

天麻 白附子 半夏

天南星 乾蝎

右擣羅為末用豶猪膽一枚拌和為丸如小豆大每服空心薄荷酒下五丸至七丸小兒如大麻粒大薄荷湯下一丸至二丸

歸命丸 治急風中人身背強直面黑鼻乾口噤不語

雄黃 鉛粉

豶猪膽 朱砂

右研極細拌和丸如雞頭大一切風用薄荷酒磨下一丸小兒半丸并熱合水磨一丸分作四服合時忌婦人雞犬見如是大人小兒中風口噤牙張涎滿者灌下一服之者以紙裹...

薄荷酒磨下少許吐之又名仲六九合丁排來盤中日內...之又...

甜者每丸下...

急風方

朱砂 膩粉一錢 巴豆 金蝎一枚 蟬殼一枚

右為末合和大人壹劑用薄荷泡湯調下小兒分半用乳汁調下或吐痰或泄毒物皆效

[illegible]散 治中急風

乾蝎炒 白附子炮 附子 天南星

右為散每服一錢巳生薑汁調下

天麻散 治中急風

天麻 天竹黃 天南星 乾蝎

右為散每服半錢巳溫酒調下小兒半字

半夏丸 治急風吐涎四肢拘急腰背強硬

半夏 天南星 乾蝎 烏頭

右並生用擣羅為末以黑豆麪和丸如菉豆大每服不計時候以溫生薑湯下十丸

治急風立效方

土蜂子 乾蝎

牛黃 雄黃

右同研細以米飯和丸如梧桐子大不計時候以溫酒研下五丸

治急風吐痰方

藁本 防風 生薑

右將前二味以水五盞煎取二盞每一盞入生薑汁半合空心服之良久即吐痰并惡物等

紫雄散 治急風吐痰

雄黃 黃丹

右和勻為散以好酒一升調下之取吐凡中風人口噤或不能嚥藥即用黑豆三二升以青布裹於鍋內蒸之熱熨人前後心并肩髃令風氣散即得藥下或用灶內灰亦得一方治中風失音不語用蠶沙炒黃右下良久以溫水嚥下一方以溫酒調服白礬一方以水煎不得肝使才溫二服無亂髮

蝴蝶散 治急中風牙關緊不能轉舌語言

蝴蝶 香附 僵蠶

右同研勻每服半錢巳溫水調灌之若牙緊不能下藥即白礬中灌下之

六神湯 治老人急中風痰涎潮口噤昏沉不醒

天雄 大附子 天南星

半夏 人參 白朮

右為剉散每服三大錢水二大錢生薑二十大片同煎至八分去柤溫服不拘時候

治一切丈夫婦人急中風痰涎悶倒不醒人事口中涎出服此

右以不損皂角一斤捶碎揉取汁濃煎熬以濾過土器內熬令溫和塗[illegible]吐涎即安未吐更灌一盞

治婦服急風

用燒...上青為末以至...得...五升微火灼茜...氣以酒三升漬微火煎令得藥味遂性飲之

治卒中急風身直不得屈伸反覆者

剉取枳木皮...之枳茹一升酒一升漬一宿服五合至盡再作良

○偏風

論

夫人身所養者惟血與氣血氣內涉無過不及之害稍至衰微則所運不周遂致體有偏虛復因風客乘虛者謂之偏風其狀半體不知痛痒或痺痺不仁或縱緩或痛痛是也

方

茯苓支酒 治偏風手足逆攣縮不隨白皆未殺已經數歲宜服

山茱萸 栝蔞根 防風 赤茯苓
牡丹皮 人參 白朮 甘菊花
牡蠣 黃耆 紫苑 肉蓯蓉
天雄 蒼耳 芍藥 菖蒲
菟絲子 熟乾地黃 金鈴 石斛
百子人 蛇床子 萆薢 杜仲
遠志 乾薑 狗脊 惡實根
菟絲 桔梗 枸杞子 牛膝
虎骨 續斷 惡實 附子

右剉如麻豆每斤藥以生絹袋盛貯用无灰酒一斗乾瓷瓶中浸封頭以蠟紙數十重封繫至二十七日藥成方開時不得面當瓶口藥氣衝人每日早旦日中晚後各一盞服四合不得過多若病深常令有酒容不得醉吐如患經數年不過一料諸疾損軀合見效如有丈夫女子骨節疼痰腫痛行履不得四肢不收背僵僂語言蹇澀口面喎斜手足不隨頭皮眼暗冷淚下流身體常出冷汗腰脚筋脈牽抽偏身瘙癢毒風刺痛赤癜白癜並服之不論年月久新皆瘥或手足冷痛并腰腎疼痛腸鳴胸膈逆痰水夜不睡頭兒漸衰小便失精氣力微細累年心痛丈夫風冷男女子血風勞赤白帶下五種痔疾依法服之並皆得差兩劑若[illegible]即[illegible]

乾蝎為末煉蜜和丸如梧桐子大每空心服三十丸如患諸風用酒下令氣以米飲下諸風右為散卽酒調下三錢匕服之

換骨丹 昔人早年患偏風證四肢不舉未服此藥時非人則持不能自動服藥三日便覺手抬頭七日四肢能舒十日行步半月更身輕眼明此藥神功不敢隱藏

白茯苓 覆盆子 蒼耳子 天雄 乾薑
郁李仁 附子 虎脛骨 白花蛇
牛蒡子根 牛膝 何首烏 甘草 檳榔
白附子 益智仁 甘菊花 防風 瓜蔞
牡蠣 牡丹皮 石菖蒲 杜仲 黃耆
羌活 羌活 枸杞子 天麻 山茱萸
桑白 桔梗 狗脊 蛇床子 白茯苓
菟絲子 蒺藜

右入銀石器內用無灰好酒三五斗浸瓶口密封在[illegible]內封閉春夏之春夏各二十七日秋冬三十七日開時人面不得向瓶口上取皮藥用日進三服各一盞[illegible]服不過月日近者只三五服見藥租[illegible]乾為末煉蜜為丸名換骨丹每服三四十丸如梧桐子大溫酒送下此藥神效益精補虛[illegible]

一切風疾常服烏髭駐顏身輕骨健[illegible]精神[illegible]一月妙

大木香丸 治偏風半身不遂語言謇澀麻痺不仁風毒[illegible]疫[illegible]延出精神恍惚

木香 天麻 桔梗 防風
天南星 白芷 白鮮皮 海桐皮
羌活 川芎 當歸 茯苓 麻黃
白殭蠶 虎脛骨 白花蛇 烏蛇 犀角
羚羊角 人參 阿膠 蟬殼 沒藥
桂心 乾薑 白附子 全蝎 牛黃
硃砂 腦子 麝香

右為細末煉蜜丸如彈子大硃砂為衣每服一丸生薑湯下食前服

甘草湯 治偏風積年不差手脚枯細面口喎斜精神不定言語倒錯

甘草 桂心 芎藭 麻黃 當歸
芍藥 人參 附子 細辛 獨活

防己 生薑 石膏 茯神 白朮
黄芩 細辛 羌活 防風 菊花
淡竹瀝
右㕮咀以水一斗先煮麻黄去沫取七升內竹瀝及諸藥煮取三升分四
服服三服訖間二五里後更進一服得汗勢即止慎生冷醋滑豬雞乳
酪魚等
芎藭散 治偏風積年不差腰手足細細疼痛骨節不守言語
謇澀
芎藭 桂心 漢防己 附子 側子
芎藭 人參 麻黄 當歸 赤芍藥
茯神 五加皮 秦艽 防風 白朮
黄耆 細辛 甘菊花 甘草
右搗麁羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓
入竹瀝一合更煎一兩沸不計時候溫服忌生冷油膩豬魚等物
防風散 治偏風頑痺心神冒悶身體疼痛
防風 白朮 甘草 當歸 前胡
麻黄 羌活 川椒 天雄
附子 赤箭 乾薑 細辛 川烏頭
白芷 山茱萸 丹參 人參
右搗細羅為散每服二錢不計時候以溫酒調下
側子散 治偏風不遂骨節疼痛心胸滿悶緩縱不仁
側子 獨活 桂心 漢防己
附子 芎藭 人參 麻黄 當歸
秦艽 茯神 防風 白朮 細辛
甘菊花 枳殼 甘草
右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入
竹瀝半合攪令勻更煎兩沸不計時候溫服忌生冷油膩雞豬
肉
防風湯 出千金方 治偏風
防風 芎藭 白芷 牛膝 狗脊

萆薢 白朮 羌活 葛根 杏人
附子 薏苡人 石膏 桂心各一兩
麻黄 生薑
右㕮咀以水一十二升煮取三升分作三服服一劑覺好更進一劑
即一度針九處九針即差灸亦得針風池一穴肩髃一穴曲池一穴
支溝一穴五樞一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴凡針七穴即差
防風散 治偏風半身不遂骨節相牽疼痛不得屈伸
求子方 治偏風
大麻子 麻黄 防風 生薑
橘皮 芎藭 桂心 石膏
竹茹 薤白 蜀椒 杜仲
獨活
右切以水二斗煮大麻子令牙出去粗取一斗先煮麻黄三兩去
去沫內諸藥煎取三升去滓空腹頓服之令盡覆取
汗以粉粉身勿觸風此藥補之不虛人余不利者偏風疾及大風
者不過三四劑忌生蔥生菜熱麵蕎麥豬魚等動風物
獨活散 治偏風手足不遂肌肉頑痺
獨活 附子 桂心 赤茯苓 漢防己
芎藭 赤芍藥 牛膝 當歸 萆薢
菌芋 防風 羚羊角屑 麻黄
牛蒡
右搗麁羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓
不計時候溫服忌生冷油膩豬魚雞犬肉
防風散 治偏風手足不遂肌體不仁筋脈拘急時有疼痛
防風 芎藭 白芷 牛膝
狗脊 萆薢 薏苡人 杏人
當歸 羌活 麻黄 桂心 附子
石斛二兩
右搗麁羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不
計時候溫服忌生冷油膩雞犬肉

五加皮散 治偏風不遂肌體頑疼皮膚無力

五加皮 防風 白朮 附子 萆薢

芎藭 桂心 赤芍藥 枳殼 荆芥

羚羊角 丹參 麻黄 羌活 甘草

右件擣羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不計時温服

萆薢丸 治偏風手足不遂筋脉拘攣肢節疼痛

萆薢 白蒺藜 附子 蓖麻

防風 羌活 人參 羚羊角 柏子人

薏苡人 桂心 生地黄 當歸

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以酒下三十丸

海桐皮丸 治偏風手足不遂筋骨疼痛

海桐皮 石斛 桂心 附子 仙靈脾

芎藭 麻黄 牛膝 萆薢 枳殼

[illegible] 柏子人 羌活 防風 當歸

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以酒温下三十丸

麻黄湯 治偏風半身不隨

防風 芎藭 防風 麻黄

黄芩 芍藥 人參 附子 羚羊角

桂心 石膏 杏人 甘草

右剉如麻豆每服十錢匕以水三盞煎取一盞半入竹瀝一合生薑

汁半合再煎取一盞半去滓分二服空心日中夜臥各一服熱服取

汗慎外風漸覺病勢少損仍服後防風湯

防風湯 治偏風不隨

防風 芎藭 獨活 麻黄

桂 升麻 羚羊角

右麄擣篩每用十錢匕水三盞煎取二盞入竹瀝一合更煎三兩沸去

滓分三服日二夜一微熱服之若手足冷加生薑三兩若未退

服後人參湯

人參湯 治偏風半身不隨手足常冷

人參 甘草 白朮 麻黄

防風 羚羊角 獨活 芎藭 升麻

石膏 防己 竹瀝 桂 黄芩

附子

右剉如麻豆每用十錢匕以水三盞入生薑十片煮取一盞半入竹瀝一合更煎

三兩沸去滓分二服日二夜一微熱服之若有冷加陳橘皮

去黄芩五兩更加附子一兩若冷甚服

獨活湯

獨活湯 治偏風中身手足不遂心中煩悶言語謇澁

獨活 竹瀝 生薑

右細剉以水三合以酒調下一方不用酒止服藥汁亦差

[illegible]

烏蛇丸 治偏風手足不遂皮膚不仁麻痺

烏蛇 天南星 天麻 羌活

麝香 白附子 白殭蠶 烏頭

龍腦 麝香 牛黄 丹砂

右各為細末先將烏蛇丹砂研末與餘同搜和諸藥為丸如

梧桐子大每服七丸至十丸薄荷湯下日三服

枳殼丸 治偏風不遂

枳殼 羌活 防風 人參 升麻

羚羊角 白茯苓 熟乾地黄 黄連 乾薑

薏苡人 桂 甘菊花 一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心温酒下二十丸日二 方治熱毒風者用

生乾地黄 茯苓

枳殼人參丸 治偏風手足不遂不能食背膊疼

枳殼 人參 羌活 甘草

防風 羚羊角 黄耆 熟乾地黄

升麻 黄連 桂 薏苡人 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸空心温

酒下日再

天下散 出聖惠方 治偏風不遂心神壅煩頭目昏重肢節不仁
天麻 麻黄 去節 防風 芎藭 枳殼
荊芥 桂心 附子 獨活 白朮
當歸 石膏 二兩
右麄搗羅爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計
時候溫服
枳殼丸 出聖惠方 治偏風不遂心神煩悶言語謇澁
枳殼 赤茯苓 川升麻 黄耆 羌活
人參 桂心 丹參 防風 羚羊角屑
薏苡人 生乾地黄
右爲末錬蜜和丸梧桐子大每服不計時候以荊芥湯下二十丸忌生冷油
防己湯 治偏風半身不遂口眼喎斜不能言語筋脉拘急不
風

醫方類聚卷之二十七

得
羚羊角散 出聖惠方 治偏風肌體虛弱手足不遂頑麻拘急心胸煩悶宜服
羚羊角屑 酸棗人 防風 芎藭
黄芩 五加皮 熟乾地黄 獨活
薏苡人 赤茯苓
右細羅爲散每服二錢以水一中盞入竹瀝半合煎和渣不計時候溫服
麻黄散 出聖惠方 治偏風手足不隨舌強不語口眼喎斜
麻黄 防風 附子 芎藭 桂心 各一兩
羚羊角屑 酸棗人 赤芍藥 人參 杏人
甘草
右搗麄羅爲散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候
溫服
拯金丸 治偏風半身不遂不知痛癢
骨碎補 狗脊 烏蘭花 萆薢 乳香
楓香脂 五靈脂 地龍 草烏頭
右件藥搗羅爲末入研者二味和勻醋煮麵糊和丸如小豆大每服

服三丸至五丸荊芥湯下空心臨卧各一服
續命獨活湯 治偏風半身不遂煩悶
獨活 防風 人參 芍藥 防己
桂心 羚羊角屑
右㕮咀如麻豆大每服五錢以水一盞半煎至八分去滓入竹瀝半合煎一
二沸溫服
羌活酒 治偏風緩得悶不知人手足顫痛便速神效
羌活 獨活 芎藭 大麻子人
黒豆
右麄搗以無灰酒四升浸夏月三日秋冬七日滿更煎十餘沸去滓
每服二合至三合日
二服
安息香丸 治偏風半身不仁
安息香 乳香 麻黄 胡桃仁
乳香草

醫方類聚卷之二十八

右先將麻黄爲末與研藥拌勻錬蜜和丸如彈子大每
服一丸溫酒化下以汗出爲度
羚羊角湯 治偏風手足不隨四肢疼痺
羚羊角屑 獨活 防風 烏頭
右剉如麻豆每服五錢以水二盞煎取一盞去滓分溫二服空腹夜
臥各一
羌活湯 治偏風一邊手足痹攣行履不得肌肉痛痹百日
羌活 桂 葛根 附子
右剉如麻豆每用五錢以水一盞半煎取一盞去滓分溫二服空心臨臥
各一
内
麻子人酒 治偏風手足不隨口眼喎斜
麻子人 黒豆 鵝糞 桑柳枝
右先以酒入瓶中煮柳枝桑枝并鵝糞黒豆等令黄黒氣使
枝茶柳枝酒內煎更去滓令淨每服旋取溫服二合至三合空心臨

臥各一眠

治心療偏風踊上風熱經心藏狂惶如隔天言心中憒憒如醉不醒者[illegible]

竹瀝 [illegible] 羚羊角 石膏 茯神

右以水一斗合竹瀝煮取一升五合去滓食後溫分為三服常飯服之亦

千金風懿急療方

生地黃 [illegible] 治偏風手足一邊不收口噤及言語蹇澀其脣不遠人

先心迷可服之

生地黃汁 竹瀝 獨活

右先將羌活防風各一兩去蘆頭并入附子一枚重半兩者去皮臍

生用切入瓦器入前三汁中煖火煎取一升半去滓每服明朝再三合

調化藥汁一合煖服之日二夜一無所忌又更宜得服之

附子湯 治偏風手足一邊不遂心神恍惚不知人舌強不能言口[illegible]

中風先當之

竹瀝 二升 生葛汁 一升 生薑汁 三合

右相和煎溫去滓分溫服三合日可三服夜一服者[illegible]

五百二十八字

四肢拘攣風痺有方麻黃湯

鐵彈丸 治偏風手足[illegible]

五靈脂 烏頭 [illegible]

右合研令勻滴新汲水和入臼中杵一千下丸如彈子大生絹袋子內盛

之懸透風處每丸分四服細嚼溫酒下要十服後一丸分二服更十日後

御一丸分四服一月內必差如不喫酒者荷茶下亦得餘不如酒服

一方治中風肢體麻痺頑痺少力用餘塗為丸[illegible]

食後

治偏風手足一邊拘攣縱半不隨半身不遂

大豆葉一斤 楸葉一斤

右先以掘地方五尺深二尺為坑坑內先燒黃蒿芬耳令坑中熱熱

去出灰灑醋澆入二件葉鋪藉令勻即將病人臥偏風不遂及疼

痛處臥於葉上以衣厚蓋令汗出為度三兩遍即差

獨活酒 治偏風一邊不遂口眼喎斜

石灰膏 治偏風手口喎斜

灸方

用炭火生姑正即[illegible]之如上貼左右

治偏風手足不遂兼背不仁

用竹瀝一斗細剉納余[illegible]春夏三日秋冬五日用厚綿重

重封閉每使出氣透開通意煖飲常令醺醺不得大醉久之

忌不效今時切忌雞犬見之

白氏治卒急偏風口喎語澀方

治偏風半身不遂及癱瘓

用桃仁一千七百枚去雙人皮尖以好酒一斗二升漬經二十日出日乾杵令細

煉蜜丸如梧子以前二十丸空心酒下之

治偏風半身不遂兼失音不語

用生茵[illegible]七七枚不去土更[illegible]新[illegible]七七枚七七日[illegible]而後[illegible]

[illegible]即以所[illegible]下之[illegible]多少[illegible]

附子酒 治偏風半身不遂

乾薑附子[illegible] 治偏風手足拘攣半身不遂

五百六十一字

中風手足 牛膝

獨活 茯苓 大麻子

烏活 防風 秦艽

右件藥並細剉以絹袋盛[illegible]七日每服一大盞溫服常令有

酒力 食後

治偏風筋骨攣急手足不遂腰膝軟更當[illegible]

以原蠶沙令熱分袋熨之

治中風手口喎斜

取新研石灰一合以醋調如泥於患人口唇上不患處一邊塗之立便

牽正如向右即於左邊塗之向左即於右邊塗之後才正如舊

即須以冷水洗下大效

治偏風中惡 以蔥一握[illegible]服之

治中風口噤語澀

取白鹽[illegible]牽耳下向左牽右向右牽左

主偏風口喎手足拘攣疼痛[illegible]

用蔥手膝肘酌多少以醇酒煮迄火令溫空心服之取汗出

療偏風半身不遂冷痹疰

以附子一兩生用無灰酒一升右㕮咀內於酒中經一七日隔日飲之一小合益

治半身不遂失音不語

取萆麻子油一升酒一斗銅鍋盛油著酒中一日煑之令酒出熟服

導引法

養生方云一手長舒合掌一手捉頦挽之向外一時極勢二七左右亦然手不動兩向側勢急挽之二七去頭骨急強風猶旋喉痹膊內冷注偏風又云一足蹹地一手向後長舒努之一手捉涌泉急挽足努手挽一時與身左右挽翻二七去上下偏風陰氣不和風

○偏枯

夫風偏枯者由血氣偏虛則腠理開受於風濕風濕客於半身在分腠之間使血氣凝澀不能潤養久不差真氣去邪氣獨留則偏枯其狀半身不遂肌肉偏枯小而痛言不變智不亂是也邪初在分腠之間宜溫臥取汗益其不足損其有餘乃可復也診其胃脈沈大心脈小牢急皆為偏枯男子則發左女子則發右若不瘖舌轉者可療三十日起其年未滿二十者三歲死又左手尺中神門以後脈足太陽經虛者則病惡風偏枯此由愁思所致憂慮所為也

凝水石湯 治八風十二痺偏枯不遂宿食虛冷五勞七傷及婦人產後餘疾月水不調皆主之 方

凝水石　白石英　赤石脂　代赭石　礬石

礜石　石膏　芒硝　卷柏　石斛

石韋　天雄　附子　常山　續斷

芫花　白朮　防風　當歸　黃連

大黃　麻黃　熟乾地黃　山茱萸　杏人

玄參　葶藶　狼毒　半夏　䕡茹

菖蒲　前胡　吳茱萸　甘草　龍膽

桔梗　秦艽　芍藥　紫菀　白芷

遠志　菟絲子

右剉如麻豆盛以絹囊以水三斗七月七日麴三斤黍三升作飲依和酒法以藥囊著甕中合訖七日冬十日夏三日酒成服半雞子殼日三并暴囊中藥搗篩為散服方寸匕隨性為度一方有桂心細辛烏頭蜀椒無芒硝

夫八風病廢毒風寒痺頑不或手腳不遂身體偏枯或毒弱不任或風冷五臟恍恍惚惚或多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊強直不得俯仰又加腹滿食少時氣欲或為渴痛將卒倒悶絕即不能語便失瘖半身或舉體不遂不仁沉重皆由體虛時少不避風令所致二十三種

[illegible]臺散 治中風偏枯手足不遂

滿臺　地龍　當歸　附子

天麻　乾蝎　黃耆　沒藥　丹砂

白花蛇　烏蛇　桑根

牛膝　麻黃　羌活　天南星　獨活

虎骨　白殭蠶　麝香　桑根白皮

右除別研外搗羅為細末即入別研者拌和令勻每服半錢匕研胡桃酒調下豆淋酒亦得如急中風手足嚲曳口噤言語蹇澁加一錢匕服了就所患偏處臥立應或有汗出慎外風

牛黃丸 治中風偏枯不遂常在床枕轉動艱難

牛黃　麝香　硃砂　天南星　天雄

牛膝　赤茯苓　蔓荊子　烏犀角屑　羚羊角屑

萆薢　躑躅花　人參　白殭蠶

天麻　獨活　防風　芎藭　當歸

烏蛇

右為末入前研了藥令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前以溫酒下十五丸

龍腦丸 治中風偏枯不遂肢節疼痛行履艱難

龍腦　雄黃　麝香　牛黃　天南星

蝟頭花 硃砂 乳香 乾蝎 微炒
白殭蠶 微炒 没石子 川烏頭 天麻
羌活 附子 白花蛇 白附子
麻黃
右爲末入龍腦研勻六味合勻用麻黃膏和搗三五百杵丸如梧桐子大
每服食前以溫酒下十丸忌生冷羊血油膩毒滑魚肉
甘草湯 治中偏風積年不差手足枯細口面喎斜精神不守言
語錯亂
甘草 炙 側子 炮 桂心 防己 防風
附子 炮 芎藭 人參 麻黃
當歸 赤芍藥 秦艽 茯神 白朮
黃芩 細辛 甘菊花
右剉如麻豆每服六錢以水二盞入生薑半兩切同煎至一盞去滓入竹
瀝半合更同煎一兩沸溫服空心晚食前

大百二十卷 卷之二十一 十二

神驗浸酒方 治風癱偏枯筋骨疼痛
牛膝 去苗 茄子根 鼠粘子 防風 萆薢
枸杞子 羌活 海桐皮 蒼耳子 大附子
五加皮 虎脛骨 牛蒡子 大麻子 茯神
晚蠶沙 黑豆 秦艽
右細剉以生絹袋盛用好酒三斗浸封頭經七日每日空心午時夜
臨臥溫飲一小盞其酒旋添味薄即換藥忌猪雞毒魚粘滑物
烏蛇散 治中風偏枯手足不隨筋骨疼痛
烏蛇 麝香 羌活 防風
桂心 海桐皮 萆薢 獨活
當歸 阿膠 麻黃 天雄
酸棗仁 乾薑 生牛蒡子
右件搗羅爲散每服不計時候以溫酒調下二錢忌生冷油膩雞豬
犬肉
沒藥丸 治中風偏枯手足不隨言語謇澀口眼喎斜
沒藥 乳香 丹砂 麝香 人參

烏頭 地龍 羚羊角
犀角 丁香 木香 玄參 天麻
龍腦
右爲細末煉蜜和丸以金箔爲衣櫻桃大每服一丸溫酒化下食
前服日三 重病者服一月差 初患五七服即愈 一方治中風手足不隨者
白花蛇 玄參
寧覺散 治中風偏枯不遂筋脈拘急肢節疼痛
山茱萸 天雄 麻黃 川芎
羌活 萆薢 桂心 川烏頭
防風 甘草 牛膝 狗脊 萆薢
石斛 蜀椒花
右件搗羅爲散每服不計時候以溫酒調下二錢
祛風丸 治中風偏枯手足戰掉語言謇澀筋骨痛
川烏頭 草烏頭 天南星 半夏 薄荷
甘草 川芎 荊芥葉 白殭蠶

大百二十卷 卷之二十一 十四

硃砂 地龍 蝎梢 川薑
右爲末二兩用羊黃豆粉一兩以白麪二兩南木烏丸如梧桐子量人虛實
加減細嚼茶酒下五七丸食後初服三丸漸加
天蓼木浸酒 治中風偏枯不遂失音數年
天蓼木 桑根白皮
地骨皮 石斛 遠志 牛膝 羌活 蒼耳子
生地黃 防風 枳子 白蒺藜
烏蛇 烏雞糞
右細剉以生絹袋盛入天蓼木酒中密封閉冬月三七日春夏二七
日量性飲之令常有酒容如覺熱即減之服鼻中及面口偏者
七日取正手腳不遂半月內差失音服之即語此方神驗不
具書之
天麻丸 治中風手足偏枯癱瘓不隨
天麻 地龍 附子
白附子 丁香 木香 雄黃

黃芩 [illegible] 犀角屑 [illegible] 真珠 [illegible] 牛黃 [illegible]
麝香 [illegible]
右除七味搗羅為末 [illegible] 研令勻 煉蜜丸 如 [illegible] 大每
服一丸 溫酒嚼下 [illegible] 更以熱酒一盞投之 [illegible] 空心
食前臨臥各一服 [illegible] 以下兩月 [illegible] 一月 [illegible] 每
日發汗出 [illegible] 常服 每 [illegible] 作四服

虎脛骨酒 [illegible] 治風偏枯 [illegible] 行 [illegible] 得風 [illegible] 四肢不遂 [illegible]
能行步 但是一切諸風手足之疾悉皆治療
石斛 石南葉 防風 虎脛骨 當歸
茵芋葉 杜仲 川牛膝 芎藭 川續斷
金毛狗脊 川巴戟
右剉如豆大 以絹囊盛藥 以酒一斗 漬之十日 每一盞 [illegible]
不拘時候

桂心散 [illegible] 治中風偏枯手足逆 筋脈拘急疼痛 腰脇不利
桂心 枳殼 牛膝 檳榔 續斷
虎骨 海桐皮 白鮮皮 犀角屑
木香 當歸 羌活
右搗篩為散 每服四錢 以水一大盞 入生薑半分 煎至五分 去滓 不
計時候

麻黃散 [illegible] 治中風偏枯不遂 轉側四肢 [illegible] 風毒
麻黃 羌活 芎藭 前胡 附子
獨活 防風 天麻 甘草 赤芍藥
桂心 檳榔
右搗細羅為散 每服不計時候 以溫酒調下二錢

天麻散 [illegible] 治中風癱瘓偏枯不遂 肢節疼痛 [illegible] 冷
天麻 白殭 桂心 附子 萆薢
乳香 狗脊 防風 當歸 吳茱萸
沒藥 乾蝎 [illegible]
右搗細羅為散 每服不計時候 以溫酒調下二錢 忌生冷油膩等物

當歸湯 [illegible] 治中風手足偏枯 [illegible] 痛 一日不能合
當歸 白芷 防風 白鮮皮
白朮 芎藭 甘草 菊花
杏仁 人參
大豆 [illegible]
右剉如麻豆 每服五錢匕 以水二盞 入生薑 [illegible] 切 煎至一盞 去滓
溫服 日三夜一 與食相間服之

金箔丸 [illegible] 治中風偏枯手足不遂 言語蹇澀 心神恍惚
金箔 丹砂 阿膠 丁香 麝香
龍腦 牛黃 [illegible] 天南星 雄黃
右為細末 再研 研勻 煉蜜和丸 如梧桐子大 每服二丸 [illegible] 溫
酒下 [illegible]

烏荊丸 [illegible] 治風氣 [illegible] 手腳偏枯 [illegible]
舒筋骨疼痛 [illegible]

乳香沒藥丸 治中風偏枯 半身手足不能舉動
沒藥 乳香 虎骨 白附子 [illegible]
草烏頭 麻黃 自然銅
乾蝎
右為細末 再入研者拌勻 以酒煮 [illegible] 和丸 [illegible] 分作十丸 每丸更分
作二十丸 每服一丸 溫酒磨下 日三五服 不拘時候服之

獨活散 [illegible] 治中風偏枯不遂 口眼不正 語澀 四肢拘急
獨活 桂心 赤芍 羚羊角屑
枳殼 芎藭 當歸 細辛
防風
右搗篩為散 每服四錢 以水一中盞 煎至六分 去滓 入竹瀝半合
更煎一兩沸 不計時候溫服 忌生冷油膩豬雞肉

赤車使者湯 [illegible] 治中風 [illegible] 偏枯 [illegible] 不遂 五勞七傷 [illegible] 寒
當歸 [illegible]
赤車使者 當歸 防風 獨活 細辛
人參 白茯苓 附子

右剉如麻豆用水一斗麴一斤五兩逐兩內三斗四兩中塞以絹袋盛
藥勿令水入沉井底三宿取出置高燥處停二日平旦服半
盞日再增之

天南星丸（出聖惠方）治風偏枯癱瘓細小而痛言語謬附知不亂

天南星　半夏（湯洗七遍）　烏頭（去皮臍）　草烏頭　自然銅
木鱉子（去殼）　滑石（各三錢）　乳香（一分另研）

右為細末用醋酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服十丸溫酒送下

川烏頭丸（出聖惠方）治中風偏枯不遂手足重急疼痛

川烏頭（炮去皮臍）　天南星（炮）　白僵蚕（炒）
桂心（半兩）　赤箭（一兩）　安息香（一兩）　麝香（細研）
牛黃（別研）

右為末研入後二味勻鍊蜜和丸如梧桐子大每於食前
熱酒下五丸蓋取汗麻黃三兩以酒二升煎去沫如膏放冷丸如梧桐
子大每服以冷酒或冷水研下一丸須臾偏枯處有汗通手足舒展

獨活湯（出聖惠方）治中風偏枯不遂骨節冷痛

獨活　桂心　防風（去蘆頭）　附子（炮裂去皮臍）　牛膝（去苗各一兩）
大麻子（三合）　川椒（去目及閉口者微炒出汗）　天蓼木（剉三兩）

右件藥細剉以生絹袋盛以酒一斗密封頭浸三日後開每日食前
及臨卧時煖一中盞飲之以藥力盡為度患者不過三兩劑必
効

磁石湯　治中風偏枯骨疲無力

磁石（燒醋淬七遍二兩）　牡丹（去心一兩）　防風（二兩）　五味子（二兩）　甘草（炙）
人參（二兩）　附子（炮裂去皮臍）

右剉如麻豆每服五錢匕以水二盞入黑豆三十五粒同煎至一盞
去滓空心日午夜臥服

虎骨散（出千金方）治半身不遂肌肉乾燥漸漸細瘦時或疼痛此由血
少氣虛風邪留於脈絡榮衛不得運行名曰偏枯謹勿用麻黃
發汗重亡津液爾其急以養血也宜以補養去風

當歸（二兩）　赤芍藥　川續斷　白朮　藁本
虎骨（各二兩）　烏蛇肉（半兩）

右為細末每服二錢溫酒調下食後服如骨中煩疼熱者加生地
黃一兩若臟寒自利者加天雄半兩一方有羌活無藁本

竹瀝飲子（出聖惠方）治中風偏枯不遂言語謇澁膈上熱心神恍惚恐懼如
醉

竹瀝（二合）　羚羊角屑（半兩）　石膏（二兩）　茯神（一兩）
麥門冬（去心）　獨活（三分）

右細剉以水三大盞煎至一盞半去滓入竹瀝分為四服不計時候
溫服之

皂莢丸（出聖惠方）治中風偏枯不遂行步艱難出汗

肥皂莢（十挺去皮子炙黃焦）　羌活（二兩）　防風（二兩）　桂心（各二兩）
乾薄荷（二兩）　附子（炮裂去皮臍）

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以溫酒或薄荷湯下
二十丸日三服常於暮臥有汗為効

犀角煎（出聖惠方）治中風手足偏枯不隨或腳氣攻頭面浮腫
口眼喎斜語澁多涎精神恍惚大便風秘

犀角屑（一兩）　大麻子（一升）　附子（炮裂去皮臍各二兩）　龍腦（半兩研）
[illegible]

右先將大麻子以水一石煮至三斗以絹濾去滓只取清汁
更入酒一斗同於銀石器中熬至一斗更添[illegible]
入天麻附子末於汁中以慢火熬成膏放令溫冷入犀角
屑末龍腦末一處同攪勻用瓷合子內盛之如有患者用薄荷
湯化下一彈丸大

防風羌活湯（出聖惠方）治中風手足偏枯肌膚瘦不得屈伸

當歸（去蘆頭）　獨活（去蘆頭）　防己（一兩）　蔓荊子（去浮皮）
秦艽（去苗土）

右麤為散每服以生水三斗煮取二斗去滓內藥二兩半煎至一盞
溫服漸漸患手足汗出即止

雞峰活血丹（出雞峰方）治一邊手足無力漸漸乾瘦上攻頭肋下連腰腿
筋骨痿弱不能舉步病後重亡津液血少不能榮養筋脈故也

乾地黃（八兩）　白芍藥　當歸　川續斷　白朮（各一兩）

右爲末丸梧桐子大每服二十丸溫酒下

三聖丹 治中風偏枯不遂口手攲斜

丹砂 雌黃 一兩 硫黃 半兩

右先將雌黃硫黃於鍋內鎔成汁後下丹砂末攪令勻候冷却

下藥紫蘇汁煮三日三夜旋旋添湯日足取出研入甁子中以文武

火逐乾出者候三晝夜入合子內用炭以一十斤火煅候火銷至三五斤

其藥已消合底作一片候冷取以青草餘甘子汁浸瓷中入水

煮一日出火毒了更研令細入蒸餠和丸如馬尾如菉豆大每日空心

以冷酒下三丸漸加至五丸服之半月即瘥忌羊血

小續風丹 治偏風半身枯瘦肢體細小而痛

蜥蜴 一枚 烏頭

右烏頭不去皮尖細剉作丸和用葱白兩莖中心漬酒調一葉

在內亭子貼白兩脚心候用纏定以衣被蓋之令汗出至足心止

至藥白汗出

羌活散 治中風偏廢

附子 一兩 羌活 烏藥 各一兩

右爲細末每服五錢水四盞煎至二盞去滓分二服

香豉散 治三十年風癱偏枯手足不仁

生地黃 一斤 香豉 二升

右取地黃汁漬豉蒸之曝乾更合豉蒸曝令乾

下篩酒服一方寸匕日三可以汁服數月有神效

小續命湯 治大風癱緩四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或

緩弱腹下滿心下有伏水脇下有積飲夜喜夢悲愁不樂恍惚喜

忘此因風寒五藏受邪所致或多生腹痛耳聾起眼瞤

寒熱通身疼痛飲食惡冷漸漸羸瘦心中疼痛心下寒痛

皆主之婦人產後中風風寒積冷不消者

黃芩 附子 防己 防風 牛膝

細辛 桂心 獨活 白朮 芎藭

甘草 茯苓 大黃 前胡 乾薑

烏頭 山茱萸 當歸

右以九味以酒所漬合之以絹袋中盛清酒二斗漬之春

夏五日秋冬七日可先食服一合不知可至四五合日三服凡藥攻疾甚

佳亦可令人飲食大宜加減茯苓二兩下利加乾薑三

兩寒加附子三兩可更以酒二斗重漬澤服之

補不酒服方寸匕不知稍增之服一年得力令人耐寒令補虛治諸風

令神良

治中風偏枯手足不遂冷痹脚疼不得坐走疼痛

乞黃 一斤 鹽

右相和令熟以爲末每令服六錢以溫酒爲度

右風寒拘急心偏枯血脈不通利

當歸四兩搗濾每日空心溫酒一盞服一匙頭服之

續斷方 治中風偏枯手足

細辛 當歸 生乾地黃 豬肉 芎藭

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服以多少者加附子一兩

大八風湯 治中風偏枯失音半身不遂時恍惚

當歸 杏仁 甘草 桂心 乾薑

五味子 升麻 川烏 黃芩 芍藥

獨活 防風 川芎 麻黃 秦艽

石斛 人參 茯神 石膏 黃耆

紫菀 大豆

右爲麤末每服五錢水二盞酒一合煎一盞去滓溫服恍惚不用酒

導引法

養生方云正倚壁不息行氣從頭至足止愈疽疝大風偏枯諸風痹又

云仰兩足指五息止引腰背痺偏枯令人耳聞聲常行眼耳諸根無有

罣礙又云正倚壁不息行氣從口趣令氣至頭始止療疽痺大風偏枯

又云一足踏地足不動一足向側相轉身欹勢并手盡急迴左右迭二

七去脊風冷偏枯不通潤

口中風四肢拘攣不得屈伸

論

夫藏眞散於肝，肝藏筋膜之氣，筋爲肝之合，養得其養，則能屈伸矣。
或爲虛者，經絡偏虛，風邪乘之，寒邪客於機關，則筋脉緩急，不能屈伸，則手足
臂從而拘攣。此皆邪氣內致，正氣不能扶養，諸筋故爲四肢拘攣不得屈伸。
久而不已，重感於邪，則夜臥不寧，小便背數，凡以肝氣傷其筋，爲驚駭者。
之脉絡勝，故其爲有從於上，喜臥而熱狀也。且五臟虛，腰疼瘛瘲。
是本傷之絡，令人肩背拘急也，足厥陰之絡也。肝通主諸筋，主在春，其
在於筋故也。春遇運爲筋痹，則筋屈不利，客於機關，使筋攣。邪客於
絡，絡虛而遇風邪，則傷於筋，使四肢拘攣不得屈伸。診其脉急細
如弦者，筋急也，足攣也。者筋屈不已，又遇於邪，則轉變入肝，其狀夜臥
則驚，爲小便數也。

方

生犀丸 治風邪客於機關，筋絡緩急，肢體拘攣

生犀角 木香 赤箭 中藥 芎藭
天麻 萆薢 威靈仙
乾薄荷 羌活 薏苡人 酸棗人 補骨脂
生乾地黃 黃芪 何首烏
甘菊花 杜仲 防風 白花蛇
蔓荊子 桂 丹砂 厚朴
白附子 白芷 甘草 麝香

右爲末，別入生龍腦五錢，細研，於淨盤中攪拌勻，秤藥三兩，備須是身細，
鍊蜜搜和得所，入臼中杵約三千下，旋丸，每一兩分作三十丸，以蘿蔔香
蜜子爲丸，四丸內收盛，每服
下一丸，日三服，不拘時候。上膈不利，痰涎恩多，以薄荷木香湯下
下二十丸，食後服，臥一日三服，常服茶酒任下。

輕骨丹 治中風手足緩弱，肢節不伸，筋脉攣急，痰壅偏風，
半身不遂，口面喎斜，語言蹇澀，肌肉不生，一切諸風並皆治之。常服此藥
壯筋骨，補虛注，益精骨，生髮烏髭。

牛膝 菟絲子 茯苓 當歸
羌活 骨碎補 全蝎 大附子 萆薢

川烏頭 川芎 破故紙 胡蘆巴
白芥子 五味子 天麻 防風 川芎
木香 全蝎 續斷 沒藥 地龍
牡丹子 木鱉子 熟地黃 乳香

右爲細末，酒煮麪糊爲丸，如梧桐子大，每服二十丸至四十丸，食前溫服
酒下。

萆薢丸 治風毒所攻，四肢拘攣，骨節疼痛，腳膝無力

萆薢 酸棗人 獨活 附子 石斛
虎脛骨 檳榔 乾蝎 芎藭 仙靈脾
丹參 牛膝 當歸 防風 桂心
狗脊 赤箭 海桐皮 木香 麝香

右爲末，入研了藥令勻，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服不拘時候，以溫酒
下二十丸。

酸棗人煎 治筋骨拘急，及頭風痰，行履不得

列節浸酒方 治風骨節疼痛，行履不住

列節 黃耆 羌活 桂心 海桐皮
虎脛骨 附子 防風
茵芋 生乾地黃 芎藭 當歸 枸杞子
白芷 牛膝 五加皮 酸棗人
黑豆

右細剉和勻，以生絹袋盛，用酒三斗，瓷封，經一七日後開取。
每日空心午時及夜臥時，煖一小盞飲之，其酒旋添，更添或將此酒下
諸丸散亦得。忌生冷豬雞牛馬肉。

白花蛇丸 治風邪客於機關，筋脉緩急，肢體拘攣

白花蛇 蟬殼 乾蝎 人參
天麻 白殭蠶 萆薢 當歸 芎藭
羌活 白芷 烏頭 附子 甘草
狼毒 生犀角 龍腦 雄黃

右研勻，煉蜜和丸，如皂角子大，每服不拘時，茶酒任意嚼下一粒服之。

乳香丸 治中風四肢拘攣，筋骨疼痛

乳香（細研）一兩　烏頭（炮裂去皮臍）　附子（炮裂去皮臍）　雄黃（細研）
羌活（去蘆頭）一兩　白附子（炮）　羚羊角（屑）　原蠶蛾（微炒）　防風（去叉）
烏蛇（酒浸去皮骨炙）　白殭蠶（炒）　虎脛骨（酥炙）　膩粉一分　麝香（細研）一分
牛膝（酒浸）　沒藥（研）
右為末再同和勻煉蜜丸如桐子大每用豆淋酒下十丸如人
行十里再服
羌活散　治風毒入四肢筋脉拘攣手疼痛
羌活　天麻　酸棗人（微炒）　羚羊角　地骨皮
栢子人　芎藭　鹿角膠（杵碎）　側子（炮裂去皮臍）
人參（去蘆頭）　白附子（炮裂）　桂心　薏苡人　海桐皮
牛膝（去苗）　烏蛇（酒浸去皮骨炙）　犀角屑
右為散不拘時候以豆淋酒調下二錢
羌活湯　治中風四肢拘攣手脚筋急或緩縱不隨骨肉疼痛
羸瘦腰脚或腰背強直或心忪虛悸怵惕不安服諸湯汗出後又患
虛因病仍未差急服
羌活（去蘆頭）一兩　防風（去叉）三分　人參　白茯苓（去黑皮）四兩
芎藭一兩　遠志（去心）　薏苡人　附子（炮裂去皮臍）　桂心（去粗皮）
麻黃（去根節）　磁石　秦艽（去苗）　丹參
五加皮二兩　生乾地黃（焙）　杏人（湯浸去皮尖雙人炒）
右剉如麻豆每服五錢匕水二盞棗二枚擘破生薑一半大切同煎
至一盞去滓溫服空心晚食前各一服若病者有熱即去桂加葛
根一兩剉白鮮皮一兩炙剉四肢疼痛痿弱攣急加當歸切焙細
辛去苗葉各二兩
天雄丸　治筋骨拘急痛引下痛不可轉側
天雄（炮裂去皮臍）　桂（去粗皮）　羌活（去蘆頭）　當歸（切焙）　白朮（炒）
天麻　芎藭二兩　烏藥（剉）　陳橘皮（去白焙）　續斷
石斛（去根）　白茯苓（去黑皮）　乾薑（炮）　白芷（剉）　乾蝎（去土炒）
乾漆（炒令煙出）各一兩
右搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心荊芥酒
下日二服

防風散　治風四肢不利筋脉拘攣手足歘疼痛
防風（去蘆頭）　羌活　黃耆（剉）　五加皮　牛膝（去苗）
丹參　酸棗人　桂心　赤茯苓　麻黃（去根節）
附子（炮裂去皮臍）　檳榔　當歸　枳殼（麩炒微黃去瓤）
右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘
時候溫服忌生冷油膩豬雞犬肉
牛黃丸　治風毒攻四肢筋脉拘攣
牛黃（研）　麝香（研）　白附子（炮）　防風（去叉）　虎脛骨（酥炙）
大黃　桂心　羚羊角屑　烏蛇（酒浸去皮骨炙）
白殭蠶　附子（炮裂去皮臍）　天麻
羌活　麻黃
右為末以無灰酒五升於銀鍋內同藥末一半同熬候如膏入
餘上藥并牛黃麝香和擣三五百杵丸如雞頭實大每服
不拘時候以溫酒嚼下三丸
乳香丸　治風四肢拘攣手脚骨節疼痛
乳香（研）　白附子（炮裂）　羚羊角　蟬殼（微炒）　烏蛇（酒浸去皮骨炙）
羌活　防風（去叉）　白殭蠶（微炒）
烏頭（炮裂去皮臍）　雄黃（細研）　附子（炮裂去皮臍）　膩粉
麝香（研）
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以熟豆淋酒下十丸如人行
十里再服一方加當歸三分
防己麻黃湯　治中風四肢拘攣手足強疼痛口燥咽乾舌上白
脊背理寒冷濕風毒腰脚攣急強疼腰背心腹暴痛不可轉側
防己一兩　麻黃（去根節）　桂心（去粗皮）一兩　蔓荊子
獨活　芎藭三分　石膏一兩　秦艽（去苗土）
桑寄生　牛膝（酒浸切焙）　葛根（剉）三分　甘草（炙剉）三分
右粗搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服日三夜一
服不拘時候如喘嗽者加杏仁一兩湯浸去皮尖雙人同擣
秦艽酒　治四肢風手臂不收髀脚不收或有拘急攣縮屈指偏

治癱瘓足弱不仁頑痺者主之（方見除中風類）

天麻丸 治中風四肢拘攣脚手骨節疼痛少力

天麻 蝎稍 沒藥 麻黄 丹砂

麝香 地龍 防風 烏頭 乳香

自然銅 安息香

右除安息香外擣研為末再同研勻以安息香熬膏和劑丸如梧桐子大每服不拘時候以薄荷酒下二十丸至三十丸有人患手臂不随又有患腿膝無力行步艱倒服之並效素有熱人減烏頭一半

茵芋酒 治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒主之

茵芋 附子 天雄 烏頭 秦艽

女萎 防風 防己 躑躅 石南

細辛 桂心各一兩

右切以絹袋盛清酒一斗浸之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日再漸增之以微痺為度（方無細辛桂心）

西州續命湯 療中風入藏及四肢拘急不随緩急風

五百七十七字

麻黄 石膏 芎藭 生薑 黄芩

甘草 芍藥 桂心 郁李人 防風

杏人 當歸

右㕮咀以水九升先煑麻黄去上沫内諸藥煑取三升分四服初服取汗末粉粉衣裹粉之忌海藻菘菜生葱

薏苡人散 治風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不能飲服之

薏苡人 細辛 黄耆 人參 枳殼

羚羊角屑 赤芍藥 五加皮 獨活 麻黄

天雄 白朮

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候溫服

獨活散 治風口眼不正語澁四肢拘攣

獨活 防風 枳殼 芎藭 當歸

薏苡人 酸棗人 細辛 桂心

羚羊角屑 桑根白皮

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入竹瀝半合相和不拘時候温服

酸棗人丸 治風毒流注心腹四肢攣痛少得睡臥

酸棗人 羚羊角屑 防風 晚蠶沙 楊柳

附子 藁本 梔子人 羌活 赤芍藥

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候溫酒下三十丸

人參湯 治中風四肢拘攣舌強不能語精神恍惚

人參 石菖蒲 芎藭 防己

桂 防風 附子 麻黄

杏人

右剉如麻豆大每服四錢以水一盞半入生薑半分煎至一盞去滓溫服空心一服相去如人行五里再一服衣覆微汗勿觸外風如體中覺熱每服更入竹瀝一合同煎三兩服

五百七十字

天麻丸 治風四肢麻痺拘攣骨節疼痛

天麻 地龍 川烏頭 乾蝎

沒藥 麝香 防風 麻黄

右為末研入麝香令勻煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不拘時候以薄荷酒下二十丸至三十丸

白花蛇散 治筋脉拘急手足疼痛

白花蛇 天南星 天雄 乾蝎

白殭蠶 麻黄 蟬殼 甘草

乾薑

右為末研勻每服二錢以溫酒調下

白斂薏苡湯 治中風拘攣手不可屈伸

白斂 薏苡人 芍藥 桂心 牛膝

酸棗人 乾薑 甘草 附子

右㕮咀以醇酒二斗漬一宿微火煎三沸每服一升日三扶杖起行不耐

酒服五合一方有[illegible]

烏蝎丸 治手足拳攣手痛不可忍

乳香 没藥 地龍 全蝎 草烏

白膠香 麝香 蜈蚣 川烏

右為末麪糊丸梧桐子大每服七丸至十丸十五丸用麝香少許好小酒送下空心服服至七日為料至十日或[illegible]其食風[illegible]月子後多服其[illegible]安全後常用生川烏[illegible]以[illegible]漫用日二服通[illegible]風湯加[illegible]

急熱食[illegible]時[illegible]四[illegible]子夏[illegible]六十五歲[illegible]

是不能伸屈人以為[illegible]服此藥[illegible]

當歸散 治[illegible]風四肢不仁[illegible]不[illegible]語[illegible]背痛不[illegible]

當歸 桂心 獨活 麻黄 芍藥

海桐皮 乾薑 甘草 杏人

右為末每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候溫服

蜂兒丸 治風四肢拘攣疼痛

蜂兒 白花蛇 天雄 白殭蠶 赤箭 地龍 麝香 天南星 乾蝎

右㕮咀用為末以煉蜜[illegible]以[illegible]和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候以溫酒下五丸

防己湯 治中風四肢拘攣百節疼痛

防己 白茯苓 桑根白皮 桂 芎藭 甘草 麻黄 芍藥

右㕮咀每服五錢以水二盞入大棗二枚煎至一盞去滓溫服相去如人行十里再服中間[illegible]生薑稀粥投之衣覆取汗慎外風痛在四肢背直併服在飯食後良

[illegible]散 治中風手足[illegible]半身不遂手足不能屈伸口眼[illegible]風氣

有人[illegible]風疾諸藥不[illegible]此方[illegible]上

白术 防風 天麻 天[illegible] 青皮

白芷 甘草 人參

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜三片紫蘇五葉木瓜三片棗子一枚煎至七分去滓空心溫服

羚羊角散 治風毒攻四肢筋脈拘攣

羚羊角屑 桂心 附子 毛[illegible] 酸棗人 天[illegible] 桑根白皮 防風

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候溫服

麻子湯 治中風四肢拘攣急風行在皮膚身體[illegible]人不覺

附子 甘草 麻黄 杏人

右㕮咀每服五錢以水二盞煎至一盞去滓溫服相去如人行五里再服以衣被覆之有汗即愈[illegible]汗用生薑[illegible]

地龍散 治中風手足[illegible]拘攣疼痛

地龍 乳香 麻黄 烏頭 鱉甲

右為末醋煑麪糊為丸如烏頭大[illegible]子[illegible]每用一錢以蔥白[illegible]手足節上以手[illegible]在一處[illegible]熱湯[illegible]

中熱[illegible]方[illegible]手足[illegible]可用三[illegible]如[illegible]

舒筋丸 治[illegible]中風四肢拘攣不得屈伸手足無力

烏頭 烏藥 牛膝 赤小豆 地龍

右[illegible]為末[illegible]和丸梧桐子大每服十五丸鹽湯下不拘時候服之

麻黄湯 治中風四肢拘攣百節疼痛心煩惡寒淅淅不欲飲食

麻黄 獨活 細辛 黄芩

右麁搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓空心溫服相去如人行五七里再服微汗即愈病在四肢者併服有熱加大黄二分剉如麻豆用鵲以令紫色腹滿加枳殻二分去瓤麩炒黃并之加人參二分腸下悸滿加牡蠣三分爲加桔梗二分事有冷加附子一枚炮裂去皮臍 一方治中風百節疼痛有熱者頻滿加枳實

附子湯 治中風脚弱四肢拘攣不得屈伸身體冷重行步艱難骨節痠疼

附子（炮裂去皮臍） 桂（去皮） 白朮（各二兩） 甘草（炙一兩）

右㕮咀每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓不計時候稍熱服有汗出爲効

杜仲飲 治中風筋脉攣急腰膝無力

杜仲（去粗皮炙剉一兩半） 芎藭（一兩） 附子（炮裂去皮臍半兩）

右剉如麻豆大每服五錢匕水二盞入生薑一棗大拍破同煎至一盞去滓空心溫服如人行五里再服汗出慎外風

杏人散 治中風四肢攣急筋脉抽掣疼痛

杏人（湯浸去皮尖雙人麩炒） 附子（炮裂去皮臍） 蜀椒（去目并閉口）

右剉如麻豆每用五錢匕以水二盞煎至一盞去滓空心分溫二服相去如人行五里再一服以衣被蓋之取汗遍身若或只在腰併服之亦佳

三聖散 治[illegible]大治手足拘攣口眼喎斜左癱右瘓骨節疼痛脚弱無力行步不正一切風疾除孕婦外老幼皆可服

當歸（去蘆） 肉桂（去皮） 玄胡索（微炒各等分）

右爲末每服二錢溫酒調下臨卧日進三服除孕婦外老幼皆可服

一名舒筋散

烏荊丸 治風氣四肢拘攣[illegible]

[illegible]暴得風四肢攣縮拘攣不能行動

取大豆三大升淨揀擇淘之煮出去之得豉[illegible]下飲[illegible]二大升執中和攪令匀於蓋屋內地上設鋪席一鋪[illegible]大豆著怕上[illegible]六重綿衣覆豆令病人於豆上卧以被蓋之著[illegible]令斷斯[illegible]

令一人於被內引挽攣急處却綿衣蓋豆令被取汗若散中作前法豁熱下然後著牛羊脂和豆一淳[illegible]引汗[illegible]

枳茹煎 治中風身體強直不得屈伸[illegible]

治中風身直不得屈伸反覆者

取枳皮黄白者切之以酒或水六升煮取二升去滓適寒溫稍稍服之

[illegible]散 治中風四肢不收涎潮隔塞牙關不通

光明晋礬（一兩） 牙皂[illegible]

右細末研勻每服一錢至二錢溫水調灌下得吐微微冷涎出一二升便甦不可大吐能虛人

小續命湯 又有人五七年病右手筋急拘攣[illegible]二部右手下二部脉弦[illegible]小續命湯加薏苡仁一兩以治筋急黃芩人參芎藭各半兩以避中寒杏仁只用百五粒後云尚食太冷者前三味加當歸一兩果然[illegible]小續命湯[illegible]主治

中風不省[illegible]用水[illegible]取汁一盞入生薑汁再煎一二沸日三服[illegible]汗出[illegible]有[illegible]武當[illegible]桂一半各及杏仁去黄芩[illegible]防己[illegible]安常小續命湯尤[illegible]全方于右

麻黄 [illegible] 木香（一兩） 縮砂仁（一兩）

人參 芎藭 甘草 杏人 漢防己（一兩）

桂心 防風 附子 川烏

白芍藥 黄芩 獨活

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至七分去滓食前溫服

治中身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澁肢體麻痺神思昏亂頭目眩重痰涎壅盛筋脉拘攣屈伸轉側不便涕唾不收但是諸風服之作効

續斷丸 主四肢手攣不伸筋脉[illegible]有人因勞病多[illegible]而風痿[illegible]足疾注骨節四肢不能運動服此有効

茯神（去木） 白茯苓（去皮） 白朮（炒） 黄耆

羌活 二兩　川烏　薏苡人　木瓜 去瓤焙
半夏麴　神麴　天雄 炮去皮　白芍藥　乳香 別研
沒藥 研　防風　獨活　當歸　玄胡索
桑寄生　海桐皮　木香　陳皮 去白　枳殼
南星　地龍 去土　荊芥　麝香
右為細末用生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服三
十丸溫酒送下不飲者米飲湯下
貼凌霄花散 治腳膝腫痛筋攣不可忍
以凌霄花根剉碎研為末米醋調塗痛處大小停之
治手足腕中風痛伸不能者洗藥方 出肘後
蒼耳 一把　蒴藋 三斤　小豆 一升　鹽 四兩
右以水十升煮取五升入鹽內下淋洗手足冷卽更煖換之次下後藥
驅風散 出濟生
乾葛　防風　白芍藥 各二兩　獨活 一兩　生薑 四兩
川當歸　附子　麻黃　甘草 各二
七月五分
右搗為粗末分作十貼每貼以水一升半取半升空心服未差更服痊
後加半夏茯苓羌活如不加白鮮皮三服立差
枸杞葉酒 出方 治緩急風四肢不隨行步不正口又急四肢不得
屈伸方
枸杞根 一百斤　甘菊 五斤
右二味細剉以水四石煮取一石六斗去滓釀二斛米依釀法釀熟
之
雄朱丸 出經驗方 治中風手足不遂麻痺
雄黃 研　朱砂 研　天麻　大天南星 炮
白附子 炮　白殭蠶 去嘴　狼毒　桂
檳榔　南木香　白花蛇
全蝎　黑附　大川烏頭
麝香 研　龍腦 研
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸荊芥湯下微嚼下
服空時服屋要用此

烏龍丸 出方 治風手足不隨麻痺不能起
烏蛇 一條　荊芥穗　薄荷葉
威靈仙
右為末用羌活不拘多少一斤剉去蘆頭以長流水一斗浸兩宿
接取汁生絹濾過用銀石器中慢火上熬次取五分更入白沙蜜四兩
再熬成膏與藥末拌和搗可丸卽丸如梧桐子大每服十五丸
至二十丸不拘時候溫酒下一日三服服至七日後覺手足疼痛
是藥力行不論月日服半兩後發汗其病一服出
吳祖曾服之得效
治中風麻痺行履艱難風氣攻注手足不遂薏苡仁方 出經驗方
川山甲　艾葉　蜀椒　天麻 去皮　烏頭
甘草
右六味各等分搗為細末每服一錢以上石五七塊先安在
壓搗篩末兩在石上依大小一尺五寸
將所病手足踏在石上熏之仍用衣被蓋出汗候冷卽效
日更供黃耆建中湯方見高士吳云吳祖用之得效
烏犀丸 治中風手足痛急開展風痹筋脈聖惠方
大天南星 炮　川烏頭 去皮臍　白附子 炮　杏仁　山梔子
腦麝 各一
右為末入研者再拌勻更用胡桃肉二兩去皮黃色研細擇勻酒煮
麵糊為丸如梧桐子大每服七丸至十丸煎蔥白湯下空心時服一
日二服三五日後其手如蟲行是效未愈卽加丸數婦人血風更
卻手腳服有大效
治風痺拘攣久風濕痺下氣除胸中鬱結利腸胃消水腫久服輕
身益氣力
右薏苡仁一升搗為末以水作粥空心服
地榆丸 治風氣攻注心腹疼痛骨節所致久不療除
風毒癱緩
大川烏頭　天麻　地榆 一兩
麝香　續斷 一兩

右件五味同擣為末煉白蜜五兩和為丸如梧桐子大以瓷合貯之
每日空心食前溫酒下二十丸服此藥當有汗出是驗
治中風四肢逆冷吐青水宜服此方
獨活二兩以水三升煮取二升去滓通熱盡服
中風四肢不遂者
用豆三升水九升煮取三升分為三服日二夜一亦可漬酒飲之
導引法
養生方云手前後遞互交拓極勢三七手掌向下頭面心氣向下
至湧泉倉門卻努一時取勢散氣放縱身體平頭動髆前後欹側柔
髆二七去髆井冷血筋急漸如消〇又云兩手抱左膝生[illegible]氣[illegible]內七息
展右足除難屈伸拜起脛中痛痿〇又云以兩手抱左膝著膺除下
重難屈伸〇又云踞坐右膝兩手抱左膝頭生[illegible]以[illegible]內[illegible]自極七
息展右足著外除難屈伸拜起脛中疼痹〇又云立身上下正直一手上拓仰
手如似推物勢一手向下如捺物極勢上下來去換易四七去髆內風兩
肩內冷血兩腋筋脈急〇又云踞身左膝兩手抱右膝生[illegible]足以膝
兩膝自相七息展左足著外除難屈伸拜起脛中疼痹
〇風身體疼痛
論
夫風身體疼痛者由風冷濕搏於陽氣致也夫人陽氣虛者腠理易開
而為風濕所折使陽氣不得發泄而與風濕相搏於分肉之間相擊
故疼痛也診其脈浮而緊者則身體疼痛也
方
摩風神驗膏方 治一切風身體疼痛頭風目眩瘙癢風痹髮落
麻黃 雄黃 朱砂 人參 乾薑
細辛 防風 白芷 桂心 當歸
芎藭 川椒 獨活 菖蒲 川大黃
藁本 白朮 吳茱萸 松脂
附子 天雄
右細剉以酒浸一宿明日於銀鍋內以煉成豬脂

中以慢火煎之取藥味盡為度以綿濾去滓下松脂雄黃朱砂等
攪令勻以瓷盒收於瓷合中病在內即以溫酒服
如棗核大病在外即取摩手大熱炙手摩之即効
麻黃煎丸 治一切風手足不遂偏身疼痛語澀精神恍惚及偏枯
丹砂 天南星 附子 桂心 羌活
芎藭 白鮮皮 海桐皮 當歸 防己
白花蛇 麝香 乾蝎
虎脛骨 烏蛇 天麻 麻黃
右除研者外為細末研令勻用麻黃五斤去根節以水三升煮麻
黃不用入蜜四兩甚於銀鍋內熬成膏丸如雞頭大每服一丸
蘇風痛風四肢不遂及骨節疼痛煎豆淋酒下
酒化下四肢[illegible]不開即研藥如[illegible]用薄荷汁於[illegible]中灌之即愈
勝金丸 治男子婦人諸風
白僵蠶 防風 羌活 天南星 赤小豆
胡蘆巴 白附子 威靈仙 川萆薢 五靈脂
草烏頭 白膠香 天麻 附子
乳香 骨碎補 白花蛇
右為細末以無灰酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心溫
酒下空心服大治頭風神効方一本云採傳云
仁者服此藥數年不動得此方初服便覺精爽服至一料
居閒錦當以祕藏之皆有効也
定聖丸 治風氣身體疼痛筋脈拘急手足頑麻腳弱
又丹田虛冷
附子 牛膝 肉蓯蓉 防風
草薢 狗脊 黃耆 菟絲子 威靈仙
續斷 蘹香子 木香 骨碎補 乳香
天麻 木鱉子
右除研者外為細末再同和勻以酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十

丸空心食前以酒下

虎骨散 治風身體疼痛或手足疼痛擧腰脚沉重無力不隨

虎骨 敗龜 生乾地黃 芎藭

萆薢 何首烏 羌活 白蒺藜 一兩

附子 當歸 芎藭 牛膝

白芷 乳香 威靈仙 檳榔 菟絲子

右件爲散每服空心溫酒調下二錢匕日三服如不飲酒用荊芥湯下

一方有生薑 同煎至一盞去滓溫服之

獨活散 治身體疼痛筋脈拘急

獨活 防風 桂心 芎藭 人參

白术 萆薢 海桐皮 枳殼 甘草

附子 麻黃 赤茯苓 牛膝

薏苡人

右爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時

候溫服忌生冷油膩毒魚滑物

萆薢散 治風身體疼痛腰節不利

萆薢 肉桂 海桐皮 芎藭 枸杞

防風 牛膝 杜仲 蒼耳子 當歸

羌活 木香 附子 麝香

右爲散入研了藥令勻每服不拘時候以溫酒調下二錢如不飲酒

荊芥薄荷湯下忌生冷油膩毒魚

羌活湯 治風身體疼痛筋脈拘急

羌活 地骨皮 桑根白皮 芎藭 當歸

麻黃 防風 桂心 黃連 白术

附子 甘草 木香

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半入生薑五片煎取八分去滓溫服

不拘時候

芎藭散 治風身體疼痛頭目昏重

芎藭 麻黃 當歸 牛蒡子

防風 枳殼 白术 桂心 天雄

甘草 蔓荊子 藁本

右爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時

候溫服

防風散 治風身體疼痛轉側不得

防風 羌活 當歸 芎藭 肉桂

薏苡人 仙靈脾 附子 牛膝 骨碎補

細辛

右爲散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候稍熱服

[illegible]丸 治痛風攣急不能移動日夜呻吟不敢動

川烏頭 生乾地黃 木香

草烏頭 五靈脂 沒藥

虎脛骨 自然銅 麻黃

乳香

右件細如粉煉蜜爲丸如龍眼大每一兩重十二丸以黃蠟為衣

薑自然汁化開一丸熱酒調以酒半盞送下病在下空心食前

服病在上食後臥時服一日三服以有大痲勿疑

附子散 治風身體疼痛四肢攣急

附子 秦艽 五加皮 麻黃 獨活

當歸 赤茯苓 芎藭 桂心

萆薢 杜仲

右爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時

候溫服忌生冷油膩毒魚滑物

靈効丸 治男子婦人痛風

乳香 白膠香 五靈脂

當歸 白附子 香白芷 草烏頭

蒼术 桑柴灰

右爲細末醋糊丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下

羚羊角散 治風身體疼痛筋脈拘急不可屈伸

羚羊角 羌活 赤茯苓 薏苡人 防風

赤芍藥　當歸　芎藭　桂心　[illegible]

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候溫服

虎骨丸 治一切風偏身疼痛腳疾少力

虎脛骨　烏頭　海桐皮　芎藭　牛膝

天南星　天麻　白花蛇

菟絲子

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十丸

地龍丸 治風身體疼痛

地龍　甜瓜子　乳香　骨碎補　赤芍藥

五靈脂　當歸　沒藥　自然銅

右除研者外為細末再和勻用醋煮麵糊丸如梧桐子大每服十丸空心

溫酒下

趁風丸 治風身體疼痛

沒藥　木鱉子　防風　乳香　血竭

荊芥穗　五靈脂　青鹽皮　烏頭

右除研者外為細末再和勻用醋煮麵糊丸如雞頭實大每服

酒化下一丸

萆薢散 治風身體筋骨痛

萆薢　牛膝　菟絲子　枸杞子

秦艽　羌活　當歸　桂心　[illegible]

右為散每服二錢空心以胡桃仁同酒調下痛極者再服一服痛

止者更可五服骨痛者食後服腳膝及腰痛者空心服之

五加皮散 治風氣壅滯身體疼痛

五加皮　羌活　丹參　赤芍藥　羚羊角屑

[illegible]　[illegible]　防風　桂心

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候稍熱服

沒藥丸 治諸風肋骨及偏身疼痛

沒藥　乳香　地龍　甜瓜子　骨碎補

五靈脂　自然銅　虎脛骨

右除研者外為細末再和勻用醋煮麵糊丸如梧桐子大每服五丸加

至七丸食前下

羌活湯下 治四風身體疼痛四肢緩弱不能起及產後中風宜服

之

沒藥丸 治風身體疼痛腰腳無力

沒藥　荊芥　草烏頭　虎骨　乳香　麒麟竭

蒼朮

右為除研者外為細末再合研勻用酒煮麵糊丸如小豆大每

服五丸溫酒下如病甚者用牛膝酒下並空心日午臨卧日三

服

定痛丸 治風身體疼痛

烏頭　草烏頭　麝香　赤小豆　天南星

威靈仙　地龍

右除研者外為細末再同和勻用醋煮麵糊丸如梧桐子大每

服溫酒下十丸

沒藥丸 治風身體疼痛狀如錐刺

沒藥　骨碎補　威靈仙　草豆蔻　木香

自然銅　地龍

右除研者外為細末煉蜜丸如梧桐子大空心溫服酒下三五丸

海桐皮丸 治一切風身體手足疼痛

海桐皮　防風　牛膝　羌活　大腹子

郁李人　萆薢葉

右除萆薢汁外為末先以萆薢汁同酒一升熬成膏入藥末

和為丸梧桐子大每服空腹溫酒下三十丸

通氣防風散 肩背痛不可回顧者此手太陽氣鬱而不行

以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經不行以通氣

防風散主之

露蜂房散 治風手足疼痛皮膚有瘡疥

露蜂房　冰片　茴香　附子

荊芥　川椒

右細剉以水五升煎至二升去滓淋熬疼痛處

虎骨丸 治風寒身體疼痛血脉凝滯手足無力

熟乾地黄一両　烏蛇　附子　天麻

乳香

右件藥搗羅為細末再同和勻用煉蜜和丸如梧桐子大空心食前

溫酒或茶下二十丸

麝香丸 治風身體疼痛頭目不利肩背拘急肌肉痛痹

又並宜服

麝香　秦艽　羌活　白术　鹿角

右件除麝香研外為細末入麝香研勻煉蜜和杵千百下丸如龍眼大

每服一丸細嚼溫酒或薄荷茶下不拘時

威靈仙丸 治風身體疼痛

威靈仙　乳香　没藥　五靈脂　草烏頭

右件搗羅為細末再和勻煉蜜丸如雞頭實大每服一丸生薑

一片同細嚼溫酒下兼治大風疾

黑神丸 治風身體疼痛

草烏頭　地龍　五靈脂

麝香

右件研為細末再和勻用糯米粥丸如梧桐子大每服十丸溫

酒下

治風痛方

天南星　蒴藋花

右並生時同搗和作餅子蒸四五次為末煉蜜丸如桐子大溫酒下三丸

食後服大良

治渾身風寒痛難轉不得者

用松根…煎至八分溫服服後良久自覺

身手腳如火燒…

虎骨酒 治骨髓疼痛風痹…

用虎骨一具…

銚中浸春夏七日秋冬二七日…

易曰風以散之…

追風方 治風節風寒…

骨碎補丸 治肝腎風虛上攻下注筋脉拘攣骨節疼痛頭面

浮腫手臂少力腰背強痛腳膝緩弱屈伸不利行履艱難並宜服之

荊芥穗　白附子　牛膝　肉蓯蓉

骨碎補　威靈仙　縮砂仁　地龍　没藥

自然銅　草烏頭　半夏

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五丸至七丸溫酒下婦人

荊芥湯或當歸湯下妊娠不宜服之不計時候

治一切腰痛風痛

以剉虎骨桑枝杵細剉焙乾搗羅為末溫酒調服一錢匕

治丈夫婦人氣及風痛背痛

用羚羊角作粉常服又以水研如膏入金箔令不散光

常含人以皮作粉薰腳氣

天麻散子 治風血不足血氣虛風邪相搏遍身肢節疼痛

熱結不散急心肝煩躁恍惚不寧血虛難以發散不可涼藥調血退

熱解勞進食輕健四肢

天麻　防風　當歸　川芎　羌活

威靈仙　五加皮　烏藥　肉桂

木香　羚羊角　海桐皮

人參　白术　細辛　甘草

右為末每服三大錢水一盞生薑二片煎至七分去滓熱服不拘時

治中手足

中風中手足酸疼…

…

獨活丸

地龍　木鱉　防風　白膠香

五靈脂　没藥　當歸　草烏頭

自然銅　乳香　麝香

右為末糯米粥丸桐子大每服一丸…

治頭項身中急痛者
除風痛出汗二兩之
風桑桑前寸服之
治風熱身項痛日痛劇者與麻黃湯
麻黃三兩 杏人三十枚 甘草 第一錢
右四物以水四升煮取二升分溫再服

中風百節疼痛

論

夫中風百節疼痛者由體虛受風邪中於關節攻百節筋脈拘急寒痛寒熱更作不可屈伸此皆真氣怯弱不勝風邪所致所以痛也

方

麝香丸 治中風手足拘攣疼痛不利撮抑合關百節疼痛

麝香　牛黃　木香　人參
赤茯苓　芍藥　獨活　麻黃　羚羊
牛膝　天麻　附子　乾蝎　防風
白殭蠶　海桐皮　龍齒　白附子　萆薢
虎脛骨　桑寄生　天南星　桂去皮
乾薑　虎骨　烏蛇

右為末再同研勻煉蜜和丸如彈子大每服一丸溫酒研化下服之

仙茅散 治骨髓手足頭目筋脈麻痺一切風寒疼痛不可忍立有効

仙茅　陳皮　枳殼　浮萍
官桂　當歸　白茯苓　白芍藥
白芷　川芎　半夏　麻黃　厚朴
甘草　川烏　白薑　乳香　檳榔
金蝎

右除桂乳香外餘並以好醋炒一以入桑同為末每服三大錢炒大豆酒同木瓜煎酒服不拘時候

羌活丸 治中風百節疼痛頭目昏眩肢節疼

痛肩背拘急

羌活　當歸　防風　天麻
旋覆花　白附子　甘草　荊芥　甘菊花
天南星　麻黃　川芎
附子　蒼术　陳橘皮
威靈仙　牽牛子

右剉如麻豆每服三錢以水一盞入生薑七片同煎至七分去滓服

羌活散 治中風百節疼痛寒熱更作不可屈伸筋脈攣急疼痛

白附子丸

白附子　附子　赤小豆　天南星
白僵蠶

右為散每服半錢至一錢溫酒調下

白花蛇散 治中風百節疼痛

白花蛇　何首烏
蔓荊實　威靈仙　荊芥穗　旋覆花

右為末每服一錢溫酒調下空心臨卧服

三黃散 治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心悶不飲食加減

石膏散 治中風四肢疼痛及兩足俱軟行步不便

川烏頭　川芎
桂心　甘草　乾薑

右為末每服二錢溫酒調下日三服

神术散 治外傷風邪百節疼痛頭疼身重

蒼术　甘草　麻黃

右為粗末每服三錢以水一盞煎至七分去滓不拘時候服

治諸風痛攻四肢百節

黑豆　威靈仙　桑枝

右用好酒一升煎服

又方 出聖惠方

杏人 虎骨

右用醇酒一升熱調服

芎藭方 出聖惠方 治風毒骨髓疼痛

芎藭 一兩 虎骨 一兩

右爲末更搗篩令勻每服一錢溫酒調下日三服

白蒺藜酒 治諸風痛四肢百節

用白蒺藜一兩搗研以酒調之頓服

又方 出聖惠方

用生虎骨炙黃爲末服方寸匕

治中風筋攣附骨疼痛

用羚羊角末摩和水塗腫上及惡瘡良

治骨節風毒疼痛不可運動者 出聖惠方

虎骨散 治筋骨疼痛挾風邪通血脈 方見前

治大風攻注四肢筋骨疼痛遊走不定及皮膚瘙癢大便秘澀小便黃赤加

宜服此方

牡丹皮 去心 麻黃 去根節 白花蛇 酒浸炙 黃芩

芍藥 山梔 仁 牛蒡子 羌活 荊芥穗

細辛 去苗 茯苓 乾蝎 大黃 秦艽 各一兩

連翹子 半兩

右爲細末每服三錢水一盞煎一沸去滓空心食後去滓熱服

治骨蒸中常患手足十指疼痛麻木真祖宗醫云有風而非蒸以此方

治之而愈

附子 木香

右二味以附子爲末用生薑如常法煎木香隨氣虛實加減如治足弱去木香

附子用烏頭

治中風氣壅言語蹇澁精神昏憒筋脉拘急羚羊角獨活湯方

方傳云屢有効

羚羊角屑 獨活 茯神 人參 石菖蒲

川芎 黃芪 防風 各 黑參二分 酸棗仁 炒 兩

桂心 各一兩 甘草 半兩

右十二味爲麄末每服四錢匕水一盞半生薑三片薄荷七葉同

煎至七分去滓不計時候溫服

麝香丹 治骨節疼痛語言不正行步艱難手足戰掉搐搦

川烏頭 草烏頭 五靈脂 各二兩

右爲末角水煮糊丸如雞頭大每服一丸研碎入酒一盞生薑三片

薄荷三條麝香少許同煎至七分臨臥溫服

微以助藥力如合時入麝香一大錢和煎時更不可入

主風在骨節間及血氣 出本草

以虎脛骨煮汁作酒服之

治筋骨風急痛 出本草

以虎骨和通草煮汁空腹服半升覆蓋臥少時汗即出切忌熱食

損齒 一方治骨風毒以虎骨煮湯浴之良

治中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜 出本草

取烏雞皮一領去毛洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空

心食之

治筋骨急痛中風 出本草

以羚羊角和五味子炒之投酒中經宿飲之

治諸風筋骨攣縮及皮膚瘙癢手足不遂無問新舊諸疾在皮膚骨

節者 出本草

入溫湯浴之浴訖當大虛憊可隨病與藥及飯食補養

治中風骨節攣急五勞七傷及皮膚風

用五加皮并根葉作蔬菜食之妙

風腰脚疼痛 附論

夫腰者腎之府也腎主腰脚其氣不足致腰脚風痺有是風濕冷三氣

相攻而成也氣勝則爲行痺不爲留滯濕氣勝則注於腰脚而

與正氣交爭經脉拘攣不能俯仰於腰脚故足伸步履皆痛名爲濕痺

虛濕痺亦如之行男則以手捫之後不痛春多入筋間夏入

腠中秋入皮膚冬多在人血脉腠理則爲諸風矣

本由外風邪入於経絡氣命也

方

乾蝎丸 治元藏風氣攻注腰膝疼痛及一切風氣

乾蝎 天麻 羌活 附子 檳榔

沉香 木香 牛膝 獨活 防風

白附子 桂 當歸 枳殼

巴戟天 昆布 葫蘆巴 人參

萆薢 蒺藜子 肉豆蔻 沒藥 白朮

方 硇砂 阿魏 麝香

右件搗研為末以好酒一升熬成膏同搗和丸如梧桐子大每服五更後空心溫酒下二十丸

悅利行即差

虎骨散 治風毒腳疼痛下注腳膝行步下得或腫痒或在兩膝腫疼痛久療不差腳數足脛細小少力

虎脛骨 天麻 木香 羌活 芎藭

藁本 蒺藜子 青橘皮 大腹皮 桂

檳榔 沉香 白茯苓 桃人 敗龜

山芋 當歸 海桐皮 五味子 甘草

白蘚皮 肉蓯蓉 附子

右為散每服二錢匕空心臨卧溫酒或鹽湯調下

虎骨浸酒方 治風氣攻注腰腳骨髓疼痛

虎脛骨 熟乾地黃 石斛 獨活

防風 附子 丹參 桂心 當歸

萆薢 牛膝 酸棗人 山茱萸 山薑

五加皮 芎藭 骨碎補 川椒

白蒺藜 烏蛇

右細剉以生絹袋盛以好酒三斗於瓷瓶中浸之密封經七日後每日空心日午近晚各溫飲一盞常令醺醺以差為度忌生冷油膩猪雞粘滑物

虎骨丸 治肝腎藏風毒流注腰腳疼痛冷痹及筋骨攣急行履

不得

虎脛骨 白附子 沉香 乾蝎 天南星

芎藭 赤芍藥 殭蠶 川烏頭

白殭蠶 白花蛇 天麻

防風 羌活 桂心 羚羊角

海桐皮 麻黃 牛膝

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十丸

虎骨散 治風毒腳冷痹疼痛行履不得

虎脛骨 敗龜 附子 牛膝

天麻 白附子 防風 羌活 芎藭

乾薑 萆薢 烏蛇 當歸 海桐皮

桂心 骨碎補 熟乾地黃 麝香

右為散入研了藥令勻每服食前以溫酒調下二錢忌生冷雞猪等物

白花蛇浸酒方 治風骨髓及腰腳疼痛行步艱難風毒攻注皮膚痒痛不知

白花蛇 虎脛骨 當歸

芎藭 附子 桂心 熟乾地黃 防風

山茱萸 萆薢 石斛 牛膝 細辛

天麻 蒼耳 獨活 枳殼

肉蓯蓉

右細剉以生絹袋盛以好酒三斗於瓷瓶子內密封浸七日後隨性暖飲常令醺醺勿令大醉其酒旋添酒味稍薄即換藥忌生冷粘滑動風物

防風湯 治風濕腳膝腫痛

防風 麻黃 石韋 絡石

桑根白皮 大腹皮 芎藭 生乾地黃 各一兩半

附子 白朮 桂 羌活

牡丹皮 射干 各一 草荳蔻 桃人

右㕮咀如麻豆每服五錢匕水一盞半生姜五片同煎取八分去滓溫服

菝葜根浸酒方 治風毒攻注腰脚骨髓疼痛皮膚冷痺筋脉拘攣屈伸不得

菝葜根 牛膝 牛蒡子 防風 羌活 秦艽 敗龜 附子 晚蠶沙 大麻子 虎脛骨 枸杞子 桂心

右細剉用生絹袋盛以無灰酒五斗浸之封閉勿令透氣經十日後開取開時不得面向瓶口每日空腹午時近夜各溫飲一盞常令醺醺為妙忌毒滑魚肉動風物

續斷湯 治腎藏虛弱卧冷濕地風邪乘之流入腰脚冷痺疼痛

續斷 杜仲 防風 牛膝 細辛 桂心 當歸 白茯苓 人參 [illegible] 獨活 芎藭 秦艽 生乾地黃 甘草

右麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服宜用前羅[illegible]以綿孚安床上及熱用上冷卽易之冬月取椒搗用一方用生姜三片棗一枚同煎空心服之

虎骨湯 治風腰脚疼痛筋脉拘急

虎頸骨 天雄 當歸 萆薢 代赭 黃耆 桂心 羌活 芎藭 防風 芎藭 桔梗 鍾乳石 蒼耳 山茱萸

右㕮咀如麻豆每服五錢匕水酒共一盞半入生姜一分棗子大劈破煎取八分去滓溫服不拘時

虎脛骨湯 治風毒脚膝疼痛或[illegible]不得[illegible]噎逆吐食[illegible]沉重宜服

虎脛骨 當歸 桔梗 赤石脂 白术 地榆 桂心 敗龜 人參 白芷

木香 黃連 厚朴 肉豆蔻 麝香

右㕮咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

牛膝丸 治腎藏虛[illegible]疼痛令人[illegible]筋骨無力

牛膝 萆薢 杜仲 附子 乳香 安息香 石斛 敗龜 丹參 芎藭 當歸 桂心 羌活 白茯苓

右件擣羅為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十丸晚食以前再服忌生冷油膩

[illegible]酒方 治風冷腰脚疼痛屈伸不得

杜仲 乾姜 秦艽 天雄 石斛 當歸 細辛 川椒 桂心 防風 萆薢 獨活

右細剉以生絹袋盛用好酒二斗[illegible]浸之七日後開每溫飲一小盞常令醺醺不得大醉[illegible]每服[illegible]

[illegible] 治[illegible]腰[illegible]疼痛止疼痛

牛膝 生乾地黃 虎脛骨 羌活 山茱萸 桂心 仙靈脾 萆薢 天雄 芎藭 天麻 肉蓯蓉 甘菊花 桑寄生

右細剉以生絹袋盛以無灰好酒二斗浸[illegible]七日[illegible]每日[illegible]溫飲一盞常令醺醺[illegible]

[illegible]治[illegible]風虛腰脚疼痛不仁骨髓疼痛不能久立

羌活 防風 黃耆 五加皮 麻黃 丹參 桂心 芎藭 牛膝

川烏頭一兩　當歸一兩　人參　木通二兩
牛膝一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓空心食前溫服良久以熱生姜酒或溫酒調下服出汗慎外風

羌活散　治下焦風虛腳膝疼痛令人不任行履
羌活　牛膝去苗　附子炮裂去皮臍　酸棗仁微炒　虎脛骨塗酥炙黃
萆薢剉　當歸微炒　松節一兩　防風去叉　五加皮
木香　威靈仙　桂心　丹參各一兩
右為散每服食前以豆淋酒調下二錢

石斛浸酒方　治風冷氣攻腰腳行止無力
石斛去根　牛膝去苗　五加皮　羌活　防風去叉
海桐皮　木香　桂心　烏蛇酒浸　甘菊花
川椒去目及閉口者微炒出汗　附子炮裂去皮臍　天麻各一兩　虎脛骨塗酥炙黃
茯苓微炙黃
右細剉以生絹袋盛用好酒二斗以瓷瓶子盛密封勿令泄氣浸七日後開取每日三度溫飲一小盞每取卻一盞即添一盞直候藥味稍薄即更換之

菊花浸酒方　治風虛冷腰腳疼痛食少肌體瘦乏羸痺行止無力
甘菊花　杜仲去粗皮炙微黃　鍾乳粉研　當歸　石斛去根
黃耆　肉蓯蓉酒浸去皮　桂心　防風去叉　附子炮裂去皮臍
萆薢　獨活　白茯苓　山茱萸各一兩
右細剉以生絹袋盛用好酒二斗於瓷瓶中浸密封春夏七日秋冬二七日後開取每日三四度溫飲一小盞

又方　治諸風腰腳疼骨風羸五臟氣乏力
虎脛骨塗酥炙令黃　丹參　天麻　牛膝去苗
杜仲　芎藭　羚羊角屑　烏頭炮去皮臍　白茯苓
人參　薏苡人各二兩　秦椒去目及閉口者
右粗搗以生絹袋盛用好酒三斗浸於瓷瓶中密封經七日開空腹量性飲之令微有酒氣取一盞添一盞藥味薄即換

麻黃湯　治風毒攻腰膝骨節疼痛
麻黃去根節　獨活　丹參剉
牛膝去苗　羚羊角屑　細辛　磁石火煅醋淬　萆薢
黃耆剉　桂心　防風去叉　犀角屑
右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓空心日午臨臥食前溫服

肉蓯蓉丸　治下焦風冷氣攻注腰腳疼痛腫滿腳重少力行步艱難
羌活　木瓜一枚　天雄炮裂去皮臍　檳榔　藿香子炒
牛膝酒浸焙　木香　天麻　陳橘皮湯浸去白焙各一兩
硇砂別研一兩以醋一大盞熬成膏
右為末將木瓜剜去瓤留蓋將藥末與硇砂膏填在木瓜內蓋了以竹釘釘定於飯甑內炊熟取出研如膏與餘藥末一處搗和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下鹽湯亦得如難丸更入少許酒煮麵糊為丸

附子散　治風腰腳疼痛腫滿拘急
附子炮裂去皮臍　赤芍藥　酸棗人微炒　海桐皮剉　芎藭
獨活去蘆頭　檳榔　五加皮剉　仙靈脾　牛膝去苗
木香各一兩　枳殼麩炒微黃去瓤
右為散每服二錢以溫酒調下不計時候此藥兼治白虎風痛
驗

萆薢散　治風腰腳疼痛及手臂不任行履
萆薢剉一兩　防風去叉　羌活　附子炮裂去皮臍　薏苡人
石斛去根剉　牛膝去苗　赤芍藥　杜仲去粗皮炙微黃剉
桂心　當歸　酸棗人微炒
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服忌生冷油膩毒魚滑物

淋漬浸酒方　治腰腳風毒攻注疼痛
萆薢　牛膝　石斛　羌活　黃耆各二兩
防風　獨活　川芎　山茱萸　當歸

破故紙四兩 桂心二兩 大麻人二兩

右細剉以生絹袋盛用好酒二十斤浸封七日後取每日

三五度溫飲一盞常令醺醺無令大醉

仙靈脾浸酒方 治風冷腰膝疼痛

仙靈脾二兩 桂心 防風 虎脛骨 塗酥炙黃

羌活 萆薢 芎藭 生乾地黃 海桐皮

牛膝 去苗 骨碎補 附子 炮裂去皮臍

右細剉用生絹袋盛以清酒一斗於瓷瓶中浸密封經五日後取溫

任飲之減少旋添酒味薄即再合以差為度忌生冷毒滑魚肉

五加皮酒方 治風毒攻腰腳連骨髓日夜疼痛

五加皮 熟乾地黃各三兩 枳殼 麩炒微黃去瓤 防風 去蘆頭

乾薑 炮裂剉 獨活 地骨皮 牛膝 去苗 烏喙 炮裂去皮臍

石南葉 丹參各一兩 虎脛骨 塗酥炙黃

右細剉以生絹袋盛用清酒二斗於瓷瓶中浸密封七日後取每

日三五度溫飲一小盞常令醺醺以差為度

一百八十三方

牛膝湯 出聖惠 治風寒腳氣痛不能運動足心俱痛

牛膝 酒浸焙 乾木瓜 焙 杜仲 去皮 芎藭 萆薢各一兩

桂 去粗皮 羌活 去蘆頭 羚羊角 鎊 黃耆 天麻

桑根白皮 剉各半兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎取八分去滓溫服

空心食前

當歸湯 出聖惠 治風冷客著腰膝疼痛

當歸 切焙 桑耳 萆薢 牛膝 酒浸

檳榔 附子 炮裂去皮臍 乾漆 射干各一兩

乾薑 炮 桑根白皮 剉 桂心 去粗皮

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一分棗二枚切煎至八分去滓食後

溫服

牛膝浸酒方 出聖惠 治風腰腳疼痛及皮膚不仁筋脈拘急

牛膝 去苗 當歸 石斛 去根

酸棗人 微炒 芎藭

仙靈脾 赤箭 虎脛骨 塗酥炙黃 桂心

附子 炮裂去皮臍 萆薢 各二兩

右細剉以生絹袋盛以酒二十斤於瓷瓶中浸密封經七日後開取

每溫飲一盞常令醺醺不得大醉忌生冷油膩毒滑魚肉

忌生冷毒滑物

海桐皮酒方 治風毒攻入腳膝疼痛行履不得

海桐皮 五加皮 獨活 枳殼 麩炒 防風 去蘆頭 乾蠍 微炒

杜仲 去粗皮 薏苡人 酸棗人 微炒 桂心 附子 炮裂去皮臍

生乾地黃 一兩

右剉如麻豆大用生絹袋盛以好酒二十斤於瓷瓶中浸密封夏

秋七日春冬二七日開取溫飲不拘時候盡飲一小盞子

獨活湯 出聖惠 治風腰腳疼痛不可忍足脛無力

獨活 去蘆頭 黃耆 剉 防風 去蘆頭

白蘚皮 羚羊角 鎊 酸棗人 微炒 茯苓 桂 去粗皮

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服空心日午夜

臥各一 治中年身不遂身體筋脈拘急肝心壅滯有五加

史氏瑞人

從容丸 俗名瑞丹 治風冷攻注腰膝疼痛

肉蓯蓉 酒浸 麝香 研 萆薢 菖蒲 防風

白蒺藜 炒 烏頭 炮 牛膝 酒浸

右為末酒糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸茶酒任下

木香丸 出聖惠 治風毒下注腰腳連髀膝疼痛

木香 茯苓 研 烏蛇 酒浸 天南星 炮 白附子 炮

附子 炮 烏頭 炮 羌活

右為末用木瓜一枚重七八兩者剜頂去瓤入硇砂半兩蓋之以竹釘

簽定蒸之爛熟和前藥末同搗得所和為丸如梧桐子大每服

二十丸空心食前下良久食煎酒或茶投之

牛膝丸 出聖濟總錄 治風冷腰腳疼痛行步不能

牛膝 酒浸 附子 炮裂去皮臍 羌活 去蘆頭

桂 去粗皮 五加皮 杜仲 乾薑

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下

桑根白皮散 出聖惠方 治腳氣腳不隨或痛或腫腫如石壁中少力及指悶

生瘡有黃水自出不止

桑根白皮 剉一分　　羌活　　茯神 三分　　防己

木通 剉　　芍藥 各三分　　羚羊角屑

右粗搗篩每服五錢以水一盞煎至一盞去滓入生地黃汁[illegible]

更煎令沸空心日午臨臥溫服

龍虎丹 出聖惠方 治腰腳風痛

草烏頭 剉　　風青蒿　　五靈脂　　木鱉子 去殼　　地龍 一兩

乳香 別研半兩

右為末井花水拌和搗千百杵丸如雞頭實大以丹砂為衣每服一丸臨

臥以冷酒磨下[illegible]香[illegible]得[illegible]出[illegible]服[illegible]之[illegible]其疾[illegible]自

令見火

檳榔丸 出聖惠方 治風氣攻注腰腳疼痛手足沉重

檳榔 一兩半　　乾薑 炮　　木香　　皂莢 [illegible]

牽牛子 二兩微炒　　青橘皮 湯浸去白

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前以生薑湯下[illegible]服微利

六百一十八字　普濟方　[illegible]

治風氣攻刺手腳疼背痛楚無藥可療 出聖惠方

為散藏宜即此服

附子 炮裂去皮臍　　吳茱萸 湯浸七遍焙　　木香

桂 去皮　　地龍　　當歸 [illegible]

右為末每用半錢頭入白麵少許生薑自然汁調稀稠得所於痛處

攤於紙上貼患處更用油單子蓋以綿衣裹定

應痛丸 出[illegible]方 治[illegible]腰腳手臂疼痛

生蒼朮 一斤　　舶上茴香 一斤炒　　破故紙 一斤炒

骨碎補 去毛　　生草烏

川山甲 [illegible]

右除草烏一斤用生薑二斤連皮生老薑一斤搗爛將草烏一處淹

經宿焙乾連前藥[illegible]為細末[illegible]酒[illegible]丸如梧

桐子大每服五十丸[illegible]下[illegible]

空心服如服藥忌一時飲食

仙靈脾散 出聖惠方 治風腰腳疼痛冷痺及四肢緩弱

仙靈脾 一兩　　附子 炮去皮　　當歸 一兩微炒　　萆薢 一兩　　杜仲 去粗皮

木香 一兩

右為散每服食前以溫酒調下二錢

又方 出聖惠方 治腰腳疼痛

杜仲 去粗皮炙　　石南　　羌活　　附子 [illegible]

牛膝 [illegible]　　防風 [illegible]

右細剉以生絹袋盛用好酒二斗於瓷瓶中浸七日後開取每

日三四度飲一盞

狗脊丸 出聖惠方 治風腰腳疼痛

狗脊 [illegible]　　防風 [illegible]　　萆薢　　烏頭 [illegible]

菟絲子 [illegible]

右為細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下

或以鹽湯下

治風毒攻腳膝疼痛不能屈伸及腰背等方 出聖惠方

五百一十四字　普濟方　[illegible]

牛膝 [illegible]　　虎脛骨 [illegible]　　羚羊角屑

枳殼 麩炒

右細剉以生絹袋盛用好酒二斗於瓷瓶中浸密封春夏七

日秋冬二七日後開取每日三四度溫飲一盞其酒旋添至藥味

稍薄即止之

地黃散 出聖惠方 治風腰腳疼痛及筋攣

地黃 [illegible]　　附子 [illegible]　　桂 [illegible]

赤芍藥 [illegible]

右為散每服二錢以溫酒調下空心晚食前服

三神散 出聖惠方 治風腰腳痛不得屈伸及折傷損瘀血攻痛

黑豆 [illegible]　　當歸 [illegible]　　生地黃 [illegible]

右為細末每服二錢溫酒調下食前服

牛膝散 出聖惠方 治冷痺下注腳膝疼痛行步無力

牛膝 [illegible]　　山茱萸 [illegible]　　桂心 [illegible]

右為散每空腹以溫酒調二錢七日二

安息香散 治風痺疼痛冷痺及腳氣無力
安息香 杜仲
右為散 每服合 下一錢
虎脛骨
右剉 以生絹袋 以清酒一斗浸之 春夏三日 秋冬七日 每服煖
一小盞服之 不飲酒人 隨性飲之
何首烏丸 治骨節風疼 腰膝疼 行履不得 遍身瘙痒
何首烏 牛膝
右以何首烏 熟捶者去皮 竹刀薄切 片上 次鋪於
下用黑豆 石鍋 鐵器
以熟水從上淋下
汁曝乾
於木臼內搗末 煉蜜丸 每日空心溫酒下三五十丸
皂莢散 治風攻腰腳疼痛及腸痔
用皂莢刺二兩 東南枝上者 為散 每日
空腹用溫酒服一錢 加至三錢
皂莢煎
積殼散 治風氣 腰腳疼痛
豆淋飲 治風
用豆五升 以酒一斗 服之
烏頭散 治風腰腳疼痛
烏頭
右為散 以醋調 痛止
治風頭痛 排風
以鹿茸 汁服
治諸風 痛不可
以鹿角四兩
治腰腳 疼痛者
用茄根五十莖 細切淨洗 以水五斗煮 取濃汁

虛至一斤以來 用入生 大 用 米泔送
二十丸 男子女人
風毒流注痛
論
夫風毒之注 痛之 毒氣 也 血
骨節 有不 風邪 相 行 凝
疼痛 注痛也
骨碎補丸 治一切風毒流注疼痛
骨碎補 牛膝 木香
威靈仙 山茵子 當歸
虎脛骨 自然銅 乳香
天南星 沒藥 草烏
白花蛇 附子 川烏頭
全蠍 麻黃 赤芍藥
白芷
右為末 令身 和搗五七百杵 丸如梧桐子大 每服不計時
候溫酒下二十丸
毒氣 風毒痛 足 痛 在一足 痛
不定 頭 左 右手
指頭上 有一點 疼痛 不可 服此方
加 有 其 痛處
實 或 腰 或
疼 痛 有 疼 痛 指
或在 指 或在
之 風 方服 風
之 酒 一
主 服 乳香 當歸
沒藥 川芎 骨碎補
大黃 牛膝 桂
肉桂

乾蠍七枚　黃耆　芍藥　赤茯苓　木香
麻黃去節　羌活　上　吳茱萸　蒺藜炒
伊骨　羌活　[illegible]
白花蛇　[illegible]　唐香　牽牛子
右件藥先將　一味別杵為末　二味亦別作一處為末
其余藥並為一處為末每服空心　[illegible]　牽牛子末
錢氏萆薢　[illegible]　二味已共作一服　[illegible]
海桐皮煎丸　治風毒走注腰腳疼痛不可忍
海桐皮　牛膝
已上三味並細剉以水一斗於大鍋中煎至一升用砂盆內爛研取汁
其汁即和於膠內研入前二味煎為膏
附子　川烏頭　川大黃
桃人　虎脛骨　五加皮
赤芍藥　白茯苓　麻黃　當歸　香薷
地龍　木香　羌活　沒藥　防風

聖濟總錄

骨碎補　乳香　[illegible]　乾蠍　天南星
麝香
右為細末入麝香都研令勻入前膏和搗五百杵丸如梧桐子大
每服不計時候以溫酒下二十丸忌食生冷毒魚骨物
麝香丸　治男子因氣虛血弱風毒相乘客邪攻注皮
膚骨髓之間與血氣相搏往來交擊痛無常處遊走不定或日輕夜
重以至體腫筋脈拘急不能伸屈宜服之
虎脛骨　敗龜　赤芍藥
白蒺藜　白附子　蒼耳子　當歸　防風
骨碎補　肉桂　白芷　牛膝　五加皮
川芎　羌活　川天麻
右入麝香研勻為末每服二錢用熱水以酒調服之　[illegible]
亦可丸服此藥一方
乙虎骨散
治毒氣注　[illegible]　風走注疼痛

狼毒一兩　天南星　附子
治筋風疼痛　[illegible]　以石臼
內搗爛成膏和丸如梧桐子大不拘時以溫酒下二丸如不飲酒
用荊芥水下亦得
治風毒走注疼痛不定處宜服之
黑豆五升　羌活一斤　生薑
右都以旋入鍋內用　[illegible]　痛上更看炒熱以效為度
虎骨丸　治風毒走注疼痛不定
虎脛骨　中膝　天雄　天麻
羌活　白附子　防風　桂心　麻黃
天南星　[illegible]　烏蛇　桑螵蛸
桃膠　槐膠　當歸　川大黃
麝香
右為散入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫酒下
二十丸

聖濟總錄　卷七　七十八

獨聖果龍丸　治一切風氣走注四肢百骨節疼痛及肉
卸等疾
耳私　木香　木瓜
牽牛　白僵蠶　沙草根　白附子
白芷　麻黃　甘草　天南星　烏頭
藿香葉　山芋
右為末以生薑二兩木瓜一斤　[illegible]　作糊丸如梧子大每服
丸用茶清　[illegible]　下
牛膝散　治風氣下注腳膝　[illegible]
[illegible]　宜服之
虎骨　牛膝　防風　萆薢　威靈仙
海桐皮　金毛狗脊　川烏頭
地龍　骨碎補
木鱉子
右為　[illegible]　如梧桐子大　[illegible]　溫酒　[illegible]　食前服

奴惡丸 治諸風走注疼痛遊走不定百藥所不效者

穿山甲 全蝎 麝香 地龍
草烏 沒藥 乳香 蜈蚣
五靈脂 白殭蠶

右為末煎餅丸菉豆大青黛為衣每服二十丸不拘時候以酒送下
忌食熱物

大通丸 治風走注身體疼痛筋骨攣拘

石斛 牛膝 附子 木香
乾姜 肉蓯蓉 檳榔 枸杞子
甘菊花 石硫黃 白花蛇

右為末以酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下如服丁請貴盛骨內疼甚者乃藥病相對人當歸酒下作細散每服一錢半七溫酒調飲任調下

防風天麻散 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘖不語內外風熱壅滯昏眩

防風 天麻 川芎 香白芷 草烏頭
白附子 荊芥穗 當歸 甘草 滑石
羌活

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸細嚼白湯化下亦得酒下急效日三服此藥徹有熱性[illegible]發風熱當時[illegible]以使藥血宣通而愈或屬多熱以寒涼藥不能退者亦宜以白湯或三服病服不四明即服防風通聖散得熱勢稍歇復再服之熱盛大甚者及因疾口瘡咽喉腫痛者不宜服之但宜以[illegible]涼藥也小丸宜服之

如意丸 治風走注之上而骨疼痛

草烏頭 五靈脂 藿香 青橘皮 防風 蒼耳子
陳橘皮 木鱉子

斑猫 木香
右為末用酒炊餅醋煮作糊和丸如菉豆大每服一丸酒下不拘時

骨碎補丸 治風毒走注疼痛

骨碎補 地龍 威靈仙 草烏頭
天南星 白附子 木鱉子 楓香脂
沒藥 乳香

右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服五丸溫酒下不拘時服之

虎骨散 治風走注疼痛不可忍

虎脛骨 白芷 當歸 漏蘆 紫菀
桂心 赤箭 白花蛇 地龍
赤芍藥

右細羅為散每服不拘時以溫酒調下一錢

天麻丸 治風毒上攻下注遊走不定肘手疼痛

天麻 地龍 乳香 獨活
桂 附子 沒藥 荊芥穗 麝香

右為末生蜜和丸如櫻桃大食後每服一丸用荊芥臘茶清下如狂被酒至甚者下過二十日上攻則食後下注則食前服

烏頭散 治風走注疼痛及手足拘急頭痛不可忍

川烏頭 乾姜 川椒
硃砂 細辛 桂心 天雄
麻黃 桂實

右細羅為散每服不拘時以溫酒調下半錢

桂心散 治風走注疼痛

桂心 地龍 白殭蠶 漏蘆 威靈仙
芍藥 白芷 當歸 木香

右細羅為散每服不拘時以熱酒調下二錢

乾地黃丸 治走注疼痛

生乾地黃 白芷 當歸 沒藥 防風
烏頭 木香 赤小豆

右為末以麥蘖餅心和丸如梧桐子大每服五丸令酒下空心食前服日二

□痛丸 治風毒因攻之注疼痛不定

五靈脂 地龍 白芥子 草烏頭

乳香

右為末用黃麵糊和丸如小豆大每服五丸溫酒下

威靈仙丸 治風氣之注疼痛無常處

威靈仙 五靈脂 烏頭 木鱉子 乳香

赤芍藥

右為末煮酒糊和丸如梧桐子大每服七丸食前令酒下加至十丸

活絡丹 治一切痛風之注浮身疼痛

□椒散 治風之注疼痛及白虎歷節風等

漢椒 附子 桂心

麻黃 當歸 木香

右細羅為散每服不拘時以溫酒調下半錢

治風之注疼痛不定隨痛處灸之

羌活 漢椒 桑根白皮 □□

桂心

右為散用醋一斤拌炒令熱以青布裹灸痛處令冷更入醋重炒依前灸之以差為度

又方

針砂 硇霜 硇砂 雄黃 礬石

麝香

右為末臨時以醋拌炒令熱用故帛裹於痛處熨之立差

羌活丸 治風毒之注疼痛及体內多風疾者

羌活 獨活 地龍 天麻 烏頭

右為末用生蜜和丸如梧桐子大每服二十丸薄荷湯或溫酒下食前服

菝葜根丸 治風之注入經絡疼痛及腰腳疼痛

菝葜根

威靈仙 □□花 劉寄奴

右為末用乳香各半兩研入醋煮麪糊和丸如梧桐子大以□自然銅細研為衣每服五丸漸加至十丸煨蔥酒下

仙靈脾散 治風之主疼痛往來不定

仙靈脾 威靈仙 芎藭 桂心 蒼耳子

右細羅為散每服不拘時以溫酒調下一錢

神效膏 治風之主疼痛上下不定隨痛處貼之

牛皮膠 芸薹子 安息香 附子

漢椒

右細羅為散入膠中和成膏塗傅上隨痛處貼之立定

烏頭丸 治之注疼痛不可忍

烏頭 乾蝎 地龍 □□花

右為末醋麪糊和丸如菉豆大每服五丸婦人當歸酒下男子荊芥酒下

治風之注疼痛

水銀 天南星 乾蝎

羌活

右為末入水銀同研和丸如小豆大每服以溫酒調令白色無星每服不拘時以豆淋酒下五丸

走痛丸 治風毒留客日深痰氣癖實皮膚不定走注疼痛

大戟 萆薢 白芥子

右為末用大麥麵一兩和勻醋調作餅子慢火炙黃熟再搗羅用醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服十丸漸加至十五丸空心冷酒下病甚不入

大麥麵搗

芸薹子散 治風毒之注疼痛如□

芸薹子 天南星 草烏頭

右為散每用五錢已量入生麪以醋煤生薑汁生油各少許調成膏塗痛上一分貼痛處可止

消毒膏 治風毒之主疼痛筋脈拘急

烏頭

烏頭

右同研令勻每服二錢匕白湯調下三錢匕生薑七十一...於
鼻子上熱貼之換之

治風走注疼痛

地龍 麝香

右細羅為散每服不拘時以溫酒調下一錢

芥子膏 治走注風毒疼痛及小兒癱瘓風

用芥菜子為末雞子白調塗之 一方治中風口噤不省人事...

...醋調金銀下及傳...

虎骨木瓜丸 治歷節風走注疼痛...

骨疼痛...

並治之

虎骨 酥炙 南乳香 研 沒藥 研 木瓜 天麻

沒藥

右為細末除乳香沒藥作糊為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空
心食前溫酒送下日進二三服

透骨膏 治一切風濕走注疼痛

生川烏 ... 吳茱萸 白芷 ...

乾薑 ... 甘草 ...

右為細末用米醋調似膏...

令...如此七次...

地黃丸 大治走注風氣四肢...

熟地黃 ... 玄參 ...

右四味等分為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸...

空心食前服...

治走注風敵血止痛

以石蚕...

治走注風

用是水草...

論

夫氣入腹拘急疼痛者由寒熱搏於經絡也...陰陽錯雜...腸
經絡...虛之氣與正氣相搏故令裏急而切痛也

方

竹瀝湯 治氣毒入腹...心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁
口噤不能語

竹瀝一升 防風 茯苓 各二兩 當歸

黃芩 人參 芎藭 白朮各二兩 獨活

甘草 升麻 麻黃 附子二枚

葛根 生薑

右以水...竹瀝煮取四升分五服...

一方無麻黃...

大...治氣入腹中絞痛...

梔子 ... 乾地黃 細辛 茯苓

吳茱萸 芎藭 乾薑 當歸

桂心

右...以水...

行十里...

乾地黃湯 治氣入腹...

熟乾地黃 當歸 甘草

人參 桂心 附子

細辛 乾薑 吳茱萸

右...每服二錢以水一盞...

天雄散...

...當歸

...乾...

天南星（炮）半两

右細羅為散，入研了麝香令勻，每服不計時候，以生姜溫酒調下一錢。

烏頭散 治風冷氣攻腹拘急切痛，坐卧不安，宜服此方

川烏頭（炮裂，去皮臍） 黃芪 乾姜 人參

天雄（炮裂，去皮臍） 甘草（炙微赤，剉） 當歸

芎藭 白朮 漢防己

右為散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候，稍熱溫服。

甘草湯 治風入腹中疞痛，手足逆冷，每時發則搶心腹脹痛，如錐刀刺

甘草（炙，剉） 細辛 乾姜 當歸 桂

白茯苓 赤芍藥 吳茱萸

熟乾地黃

右剉，每服五錢，以水一盞，入切子指少許，同煎至八分，去滓，空心日午夜臥服。

人參湯 治風入腹拘急疞痛

人參 附子（炮裂，去皮臍） 麻黃（去根節） 防己 三分

當歸 黃芩 防風 芍藥 三分

甘草（炙）二分

右粗搗篩，每服三錢，以水一盞，入生姜三片，同煎至七分，去滓，稍熱服，不計時候。

附子散 治風入腹疞痛，發則欲死，心腹拘急

附子（炮裂，去皮臍） 細辛 甘草 當歸

桂心 赤芍藥 生乾地黃 青橘皮 吳茱萸

右搗羅為散，每服三錢，以水一中盞，入生姜半分，同煎至六分，去滓，不計時稍熱服。

甘草飲 治風入腹，心腹疞痛，溫中止痛，利大小便

甘草（炙） 防風 吳茱萸 赤芍藥 當歸

細辛

右粗搗篩，每服五錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，取八分，空腹溫服，日二服。一方有桂心，無甘草，名防風湯，又名桂心散。

治風入腹，寒急，又腹中

甘草 石膏

麻黃

右粗搗篩，每服五錢，以水一盞半，煎至八分，去滓，空心臥各一服。與外風一方，以東流水煮服之。

桂心湯 治風入腹，五臟拘急，四肢不遂，腹滿欲絕

桂 防風 黃芩 乾姜

吳茱萸 甘草

右粗搗篩，每服五錢，以水一盞半，煎至八分，去滓，不拘時。一方無吳茱萸，有生姜。

烏頭湯 治風冷寒入腹攻五臟拘急，不得轉側，叫呼發作有時，使人冷汗，手足厥逆

烏頭 大棗 甘草 芍藥

桂心 老姜一斤

右㕮咀，以水七升，煮五味取三升，去滓，別搗烏頭，去皮，以蜜二升微火煎，令減五六合，內湯中煮兩小沸，去滓，服一合，日三，間食。強者三合，以如醉狀為知，不知增之。一方無大棗。

赤芍藥散 治風入腹攻五臟，拘急不得轉側，陰縮，手足厥冷，腹中疞痛

赤芍藥 桂心 甘草 防風 芎藭

川烏

右搗粗為散，每服三錢，以水一中盞，入生姜半分，棗三枚，煎至六分，去滓，不計時稍熱服。

理中湯 治風入腹，心腹疞痛，霍亂吐瀉，心下痞塞不通

人參 乾姜 甘草 白朮

右為散，每服一錢，水一盞，煎至六分，去滓，稍熱服，空心食前服。

治口風實熱腹中絞痛

以乾鮑魚一頭炙末二指撮以苦酒一升煎之温服取汗良

食遺方　治中惡但腹中切痛

以鹽半匙熟煎令水乾者口中飲熱湯二升得吐愈

普濟方卷之三十六

考論官文史兼[illegible]

對方醫官[illegible]

[illegible]

普濟方卷之四十目錄

諸風門

類

大風癩病　白癜風　烏癩　大風出蟲　紫白癜風　白駁　白禿風　歷節風

大風癩病

論

治大風神效方　治大風疾[illegible]方　異功散　九江散　換肌散　烏蛇丸　第一服神仙換骨湯　第二服神仙換肌丸　桑枝湯　換骨丸　神應酒　茯苓丸　消風丸　治大風瘡　黑龍丹　水銀丹

[illegible]　搜風瀉營湯　大風丸

[illegible]

凌霄散　治一切大風癩　胡麻丸　枳實散　樺皮湯　柳枝煎防風丸　桂枝湯方　摩風膏

梔子仁散　黃蓍丸　神効丸　地骨皮散　岐伯神散　菖蒲酒　杏仁丸　桃枝湯方　苦參丸　知聖散　羚羊角散　犀角丸　百神散　莽草散　蛇床散　丹砂散　蒺藜酒　防風散　莽草丸　白殭蠶丸　烏蛇丸　白花蛇散　天南星丸　皂莢子湯　苦參散　大雄散　雄黃散　治風疹癢瘡疥如蟲行　百根丸　赤箭丸　枳殼丸　治身體瘙癢或生瘾疹　八風湯　八仙丹　醉仙散　八寶散　石榴湯浸方　苦參散　三奇丸　摩風散　烏麻子丸　蠶蛾散　六神散　小牛黃丸　治大風瘡癬者　治一切大風癩疾不問久新者　麻癩丹　治面目有瘡　乳香散　治大風癩疾方　五天丸　神仙追風丹　凌霄散　天麻丸　石斛散　蒼耳湯　取蟲散

苦參飲　萆草方　附子圓　治大風　[illegible]方
通天再造散　牡蠣丸　[illegible]子散　一聖散　[illegible]
換肌丸　苦參丸　松脂醞酒方　[illegible]　換骨丹
治大風癩頑麻風[illegible]
追仙丹　疎風散　備急香　去毒丹　甘草散
解毒丸　酒浸丹　水膏藥　皂莢湯　桑椹煎丸
胡麻散　[illegible]　百花煎　黃精煎　鐵粉石膏方
治風癩　治大風　追風散　[illegible]　乳香煎
治大風疾神効方　退毒散　[illegible]散　治大風
麻風宣[illegible]丸　蝦蟆丸　萆薢[illegible]　治大風疾　皂莢煎
苦參丸　治癩　毒大風疾[illegible]
雄黃丸　又癩遍身癩[illegible]　治大風神驗方
大麻大酒法　紫茄子根散　治大風疾　何首烏散
治大風半身不遂　又方　治諸癩大風手疾
治大風　白花蛇造酒方　羊蹄根方　皂角丸
得效方　去大風　治身上癩瘡　天門冬丸
[illegible]　治[illegible]　清氣風入[illegible]　[illegible]
治大風　葫蘆湯　萬先蒿散　萬丈[illegible]
又[illegible]　治大風癩疾眼昏頭癢手足[illegible]　上[illegible]散　醞烏蛇丸
天麥[illegible]方　又方　又方
通天再造散　四聖保命丹　祛風散　治[illegible]湯
烏蛇散　[illegible]　治[illegible]　地[illegible]丸
[illegible]胡[illegible]方[illegible]
洗藥　苦參[illegible]　[illegible]　治大風及諸惡瘡
治風癩　治八癩治大上下[illegible]痛　治[illegible]大風
治大風身痒　治肺毒[illegible]如大風疾　治[illegible]及癩疾
洗藥

白癩（論）一道（方）十一方

烏蛇散　[illegible]　白花蛇散　苦參酒

天麻煎　治白癩頑[illegible]方　[illegible]酒　艾[illegible]酒
治白癩　治白癩

烏癩（論）一道（方）二十方

[illegible]丸　硫黃散　大黑神[illegible]方　雄黃[illegible]方
[illegible]酒[illegible]草浴方　萬先蒿散　苦參飲
雌黃散[illegible]方　大[illegible]膏[illegible]方　烏頭丸

大風眉鬢墮落（論）一道（方）二十方

白[illegible]散　[illegible]散　防己散　[illegible]湯　白花蛇散
[illegible]子丸　皂莢丸　山梔子散　[illegible]草散　羚羊角飲
雷圓散　[illegible]散　蘇木[illegible]丸　乳香丸
治大風眉[illegible]方　[illegible]　向香烏丸　[illegible]方
清[illegible]散　[illegible]湯　治癩[illegible]法　二聖散
松[illegible]方　[illegible]丸　治大風頭面髭髮脫落
[illegible]萬散　[illegible]方　治大風[illegible]出眉毛[illegible]方

大風出蟲（論）一道（方）[illegible]方

石灰酒　[illegible]酒方　烏金丸
[illegible]散　烏蛇丸　獨活散　[illegible]散　阿魏[illegible]丸散
[illegible]方　[illegible]丹　[illegible]散　雷丸散　通神散[illegible]
[illegible]酒　[illegible]丸　[illegible]散　五仙浴湯

白虎風（論）一道（方）二十一方

虎骨散　[illegible]仁散　[illegible]仁散　白頭翁煎　雄黃散[illegible]方
虎骨散　虎骨散　[illegible]散　沉香湯　羌活散
羌活散　虎骨散　[illegible]散　羌活湯　[illegible]白虎方
地龍散　[illegible]散　烏頭散　麝香丸　牛膝散
七[illegible]散　赤[illegible]散　麝香散　皂莢散傳之方
[illegible]丸摩之方　[illegible]散　白[illegible]散　[illegible]龍散

阿魏散　蟠蜡散　虎骨散　附子散

療白虎風痛走不定無問老少　摩白虎方　防風散　沒藥散

治白虎風走疰疼痛兩膝熱腫　[illegible]　神聖散

烏蛇浸酒方　獨勝散　治患白虎風

治白虎風痛甚不以積年久患疼痛　治[illegible]節痛

治白虎病

○歷節風（論一首　方[illegible]）

海桐皮散　川烏頭丸　[illegible]丸　麝香入散

虎骨丸　[illegible]丸　茯神散　萆薢散　松脂散

虎骨散　桂心散　[illegible]散　[illegible]湯

[illegible]散　烏頭丸　[illegible]湯　桂心散　[illegible]散

海桐皮散　天麻散　[illegible]丸　防己湯　[illegible]湯

人參湯　白朮湯　麝香丸　趁痛散　附子八物湯

[illegible]　獨活散　芍藥知母湯　大棗湯

趁痛丸　秦艽湯　防風湯　附子湯　麻黃散

[illegible]丸　牛蒡子散　烏頭湯　乳香丸　仙靈脾散

松節酒　獨活散　[illegible]散　古聖散

治歷節諸風骨節疼痛不可忍　治歷節風　治[illegible]節風

虎骨酒　松葉酒　治歷節諸風百節酸痛不可忍

[illegible]風酒　虎骨散　羌活湯　治白虎歷節風痛甚

麝香丸　[illegible]丸　芥子[illegible]　神效丸　又方

定痛丸　治歷節風丸子方　[illegible]

又方　治歷節風　治歷節風四肢疼痛[illegible]

治風毒骨髓疼痛　治骨風[illegible]行履不得[illegible]

紫白癜風（論一道　方[illegible]）

烏蛇浸酒方　[illegible]　[illegible]神散　[illegible]

治紫白癜風　玉粉膏　[illegible]白癜風大有神效　[illegible]方

硫黃膏　[illegible]　[illegible]散　[illegible]

白花蛇散　[illegible]丸　烏蛇散　[illegible]塗方　代赭丸

硫黃膏　除風散　五倍子膏　羊蹄根塗方　胡桃塗方

治紫白癜風　[illegible]散塗方　[illegible]白癜風　[illegible]散　防風湯

蒺藜散　硫黃膏　烏蛇散　追風丹

苦參散　白斂散　又方　治白癜風　治白癜風

附子[illegible]　治白癜風　又方　[illegible]白癜風

又方　治白癜風　又方　治白癜風　石灰[illegible]　蛇蛻皮方

治白癜風　又方　治白癜風　又方　羊蹄根方

靈水膏　又方　治白癜風　又方

治白癜風　又方　治紫癜風　[illegible]白散　[illegible]根散

加減何首烏散　何首烏散　治紫白癜風　又方

治白癜風　治白癜風

治白癜風　治白[illegible]　治白癜風

白駁（論一道　方一十四）

[illegible]

治白駁方　治白駁方

[illegible]酒方　白駁散[illegible]　[illegible]白駁方

治白駁方　[illegible]　治白駁方　[illegible]

治白駁　[illegible]　白駁[illegible]但不[illegible]宜用此[illegible]方

治面項身體白[illegible]　蛇蛻皮方　靈水膏　[illegible]

○鶴膝風（論一道　方[illegible]）

[illegible]丸　[illegible]丸　大防風湯　鶴膝風[illegible]　四聖[illegible]

普濟方卷之四十目錄

普濟方卷之四十

諸風門

大風癩 [illegible]

[illegible]

頭如錢大狀如 [illegible]

[illegible]

若其欲 [illegible]

[illegible]

水銀膏方 治大風癩

雲母石　紫石英　[illegible]白石　花蕊石　玄精石

井泉石 石鍾乳 寒水石 代赭石 滑石[illegible]
金牙石 銀牙石[illegible]
右為細末，[illegible]粉水銀各七錢，細研入前藥同研，不見水銀星，後用清油
調去無風處，待之日三次，七八日藥乾[illegible]出盡，用黃連、貫眾
各一兩，煎湯服之，及頭疾用三黃丸下，若[illegible]麻痹不仁，用麻黃、木鱉子、防
風[illegible]分，煎服[illegible]

治大風疾金傳方[illegible]
磁石[illegible] 太陰石[illegible] 烏鈴狼[illegible] 陽起石[illegible] 寒水石[illegible]
代赭石[illegible] 金星石[illegible] 水銀[illegible] 銀星石[illegible]
右[illegible]藥末二錢匕，又水銀粉二錢匕，研，大麻子三合，麻油一
兩，半生半熟，取汁，調全身[illegible]以[illegible]末，[illegible]為度，細[illegible]眼以敷[illegible]
出汗及[illegible]下惡物為度[illegible]

治大風疾[illegible]
吳天助散[illegible]
天麻[illegible] 赤芍 松黃 鬼臼 安息香[illegible]
[illegible]
羌活[illegible] 款冬花 楓香脂[illegible] 天麥花 側柏葉
蒼耳[illegible] 苦參[illegible] 何首烏[illegible] 細辛[illegible] 防風[illegible]
[illegible] 牛膝[illegible] 地骨皮[illegible] 甘草[illegible]
乳香[illegible] 天門冬[illegible] 麥門冬[illegible] 丹砂[illegible] 草[illegible]
木香 虎骨[illegible] 當歸[illegible] 天南星[illegible] 乾蝎[illegible]
烏蛇[illegible] 白花蛇[illegible] 麻黃[illegible] 雄黃[illegible]
附子[illegible] 白[illegible]茶[illegible] 桂[illegible] 麝香[illegible]
右搗研為散，入雲母粉六兩，研和，入[illegible]脂一錢半匕，[illegible]茶或米
飲調下，日三服。

治大風疾[illegible]方
黃耆 當歸[illegible] 香[illegible] 大楓子肉[illegible]
草烏[illegible] 五靈脂 川芎[illegible] 防風[illegible] 沒藥[illegible]
烏藥 赤芍藥 [illegible]麻子[illegible] 枸杞根[illegible]
乳香 威靈仙 何首烏[illegible] 赤土[illegible]
[illegible] 熟地黃[illegible] 大黃[illegible] 黑牽牛[illegible]

荊芥[illegible] 天麻[illegible] 獨活 羌活 蔓荊子[illegible]
大戟子[illegible] 白芷 牛蒡子[illegible] 赤石脂[illegible] 荊芥[illegible]
苦參[illegible] 石菖蒲[illegible]
白花蛇[illegible]
[illegible] 全蝎[illegible]
烏蛇[illegible] 白殭蠶[illegible]
地龍[illegible]
右[illegible]為[illegible]末，[illegible]蛇[illegible]白米飯搗碎，
作糊丸如梧桐子大，每服四十九至五十九丸，日進三服，待半月病在外
然後服大黃[illegible]通一二行，再服前藥，忌一切動風諸物及房
事，[illegible]可食淡粥[illegible]者，破重者加天麻少許。

[illegible]靈丹[illegible] 治大風疾[illegible]
石膽[illegible] 雄黃[illegible] 白石英[illegible]
[illegible] 水銀[illegible]
金箔[illegible] 太陰玄精石[illegible] 滑石[illegible]
[illegible] 馬牙硝[illegible] 白礬[illegible] 鉛丹[illegible] 朝粉[illegible]
[illegible]
[illegible] 白附子[illegible]
白花蛇[illegible] 白殭蠶[illegible] 天南星[illegible] 天竺黃[illegible]
天麻[illegible] 麻黃[illegible] 螺[illegible] 虎骨[illegible]
敗龜[illegible] 烏蛇[illegible] 羚羊角[illegible] 鹿胎[illegible] 犀角[illegible] 木香
[illegible] 桑[illegible] 桂[illegible] 麝香[illegible]
右除天南星以下一十九味，[illegible]為末，外研[illegible]以下十[illegible]味，用燒
[illegible]子一枚，六一泥固濟，入乾[illegible]研玄精石至朝粉六味末，平分
一半，布在[illegible]子內，次入[illegible]金箔八味在中，又[illegible]石等末在
上，[illegible]入金箔二十四斤[illegible]定，候以六一泥固濟，留半寸許不要
泥合[illegible]中[illegible]坑，闊深二尺二寸[illegible]如[illegible]十二寸，又於鑪
中心[illegible]九[illegible]一大[illegible]上[illegible]火[illegible]濕，用火一
斤去[illegible]五寸[illegible]三[illegible]泥合[illegible]又加火至三斤，仍
[illegible]三[illegible]日[illegible]入五斤[illegible]子[illegible]
一[illegible]上[illegible]用[illegible]土[illegible]至來日早[illegible]
取出[illegible]細研[illegible]上[illegible]三復[illegible]

每日夜三次細煎水於土上常以大盆合蓋候出火毒日足別密縫
一夾絹袋貯藥於銀器石器中用水二斗甘草一斤搗爲末上煮藥
袋子得到藥煮一復時取出晒乾再研如粉與後十九味藥拌和
研勻用蒸棗肉丸如櫻桃大每服一丸空心苦參黃連浸酒二合磨下
治一切毒風豆淋酒下半丸日二夜一其患乘其草木有瘡瘍疥癬
風熱瘡疹麻沈郎腰脚攤緩角弓反張並有瘀疳等風身癢痒走
注疼痛破傷等風服訖蓋覆出汗偏身麻痺不動搖波灰風食須煎
金銀湯勝風湯荊芥湯小兒疾病未蒸薄荷湯酒相解患一丸分
五服小兒夜啼驚怯研丹砂水磨一丸分八服半丸緋帛裹男
左女右繫在臂上

九江散 治二百六十種大風及白癜風

當歸　石南　附子　躑躅　秦艽
菊花　乾薑　防風　雄黃　麝香
丹砂　珊瑚　檳榔　連翹　鬼箭羽
石長生　知母　鬼臼　人參　王不留行
石斛　天雄　烏頭　獨活　防己
萆薢　水蛭　蜈蚣　䖟蟲　地膽

右諸藥皆去足翅熬炙令熟爲散以酒服方寸匕日再其病入此令
髮白服之一日白髮還黑

蟾酥散 治大風疾年深久不能愈以至面毛脫落鼻梁崩壞額
顱腫破不至踰月取效如神

白花蛇　細辛　黑烏蛇　地龍
當歸　香白芷　天麻　蔓荊子
威靈仙　荊芥穗　甘菊花　苦參　紫參
沙參　木賊　沙苑蒺藜　不灰木　炙甘草
天門冬　赤芍藥　菖蒲　定風草　何首烏
胡麻子　川芎　草烏頭　蒼朮
木鱉子人

右爲細末每服五錢匕酒調下食後酒多爲妙

烏蛇丸 治大風癩疾若眼昏脫指節墜落脚下有瘡語聲嘶爲
不可治如未有此證宜服

烏蛇　檀香　丁香　茵根
紫菀　防風　苦參　獨活　沙參
梔子人　酸棗人　槐子　白芷　附子
藁本　羚羊角　蒼朮　犀角　羚羊角
防己　桃膠　萆薢　苡薏人　栝蔞根
秦艽　烏藥　桑根白皮　木通

右搗爲末煉蜜丸如赤小豆大每服空心溫酒十丸至十五丸日二
不飲酒薄荷桃白皮湯下如要速差宜同後湯下藥

桑枝湯 治大風癩疾下藥

桑枝　柳枝　槐枝　枸杞根　黃荊根
羚羊角

右並生用剉如麻豆大每用藥五錢匕以水一盞半煎取七分去滓
下前丸藥服一月必覺四肢皮膚痒痛不可忍但宜飲酒不得
搔抓仍須飲食避外風如有汗出腥臭及有蟲從皮膚中出如麵
塵或如鳥尾頭銳尖或如綫縷尖或如麩片頭黑身白形色不定但
痒之後子細看之或從小便中出或從泄利中出者大效此疾少退
終身禁房室及忌動風物時以苦參湯洗浴頻換新衣其舊衣并
床席等並焚之

治大風瘡

草烏　木鱉子　白膠香　五靈脂　白芷
烏藥　麻黃　桔梗　枳殼　天麻
防風　白芍藥　黃耆　虎骨　甘草
大風子　黑神散　消風散　烏沈湯　當歸
牛膝　麝香　烏蛇　川芎　何首烏
大黃　通聖散

右爲末煉蜜爲丸每服二十丸溫酒吞下不拘時候

紫金丸 治大風癩疾

茯苓丸 治諸癩腫毒肢體虛氣熱心不清風癖於脈

白茯苓　石斛　人參　蒺藜子　羚羊角

秦艽 五加皮 酸棗仁 五味子 覆盆子
菟絲子 [illegible] 防風 細辛
獨活 杜仲 鹿角膠 續斷
天雄 [illegible] 當歸
熟乾地黃 甘草 白茯苓
右爲末煉蜜丸如梧桐子每服三十丸至腹內[illegible]

烏蛇丸 治大風

烏梢蛇 防風
威靈仙 [illegible] 萆薢
木香 當歸一兩 白附子 白芷 全蝎
荊芥 何首烏 乾蝎
羌活 菊花 沙參 獨活
苦參 玄參
甘草
右爲細末酒糊爲丸每服五十丸茶酒任下

神應散 治大風疾兒諸風疾

茵芋 附子 天麻 丹參 蜀椒
躑躅花 甘草 石菖蒲 [illegible] 乾薑
烏頭 獨活 地骨皮 秦艽 防風
芎藭 人參 當歸 白芷 萆薢
生乾地黃 白鮮皮
右細剉以無灰酒二斗密封中浸經七日開每日空心[illegible]
加飲每飲了以飯二兩壓之每飲[illegible]
忌熱肉麵雞魚牛肉油膩果子陳臭鹹汁等

第一藥神仙換骨湯 大凡風者有五[illegible] 若大汗入水再汗不[illegible]
從何而得[illegible]入五臟六腑攢成大患[illegible]
毒氣入五臟[illegible]
風而卧所致也[illegible]
手指脫落[illegible]
白仁難治服藥此作不愈[illegible]
人參 梔子 黃芩 天仙子

括蔞根 防風子 白茯苓 羊角
苦參一兩半 肉天麻一兩 何首烏一兩半 白附子一兩
防風 山梔 沙參 枸杞子 遠志
蟬蛻 蜈蚣 白花蛇 [illegible] 川烏
右爲細末每服三錢重日進三五服不拘時候江茶調下服
十日病勢去除輕十分減之

第二藥神仙[illegible]丹

白附子 檳榔 白花蛇 全蝎 沙苑蒺藜
麻黃 大楓油 牛蒡子 防風子
大川烏 白沙蜜 人參 黃耆
獨活 蔓荊子
右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼江茶下立效

第三藥神仙活血湯

人參 黃芩 當歸 白朮
白茯苓 白芍藥 熟地黃 厚朴
白芷 肉桂 輕粉 天雄
木香 桂心 川芎 赤芍藥 防風
大川烏 荊芥 薄荷 沒藥 細辛
天花粉 蒼朮
右爲細末每服二錢茶清下立效
[illegible]
升麻 連翹 黃連
當歸 [illegible] 人參 麝香
生薑 杏仁 地龍
全蝎 白殭蠶 水蛭

右吹咀，除連翹、胡桐淚、白豆蔻各另為細末，入麝香、硼砂、冰腦三味
同為細末，都作一服，水二盞，白麵一匙，入連翹煎至一盞，去滓，入白
豆蔻人二味，并麝香等，再煎至七分，攪熟服，早飯後午飯前，忌酒
麵等八

愈風丸 治大風疾

白牽牛　兔骨　白芥子　山梔子　甘菊花
當歸　骨碎補　硇砂　地龍　草烏頭
牛膝　肉蓯蓉
麻黃　白歛　蒺藜　地骨皮
烏頭　楓香脂　葫蘆巴

右為末，酒糊為丸，如梧桐子大，每服三十丸，温酒下，空心日中
臨臥各一服，加至五十丸，第三日用浴藥

浴藥方

乾茄子莖　香椿　艾葉

右三味細剉，煮取湯浴，洗三日一次，并常服愈風丸

墜涎方

水銀　膩粉　巴豆
半夏　五靈脂　白礬　硇砂
羌活　木鼈子　大黃　乳香　馬牙硝
丹砂

右為末，水浸蒸餅為丸，如菉豆大，每服五七丸，茶酒下，日三服

治一切熱毒風瘡疥癬腫[illegible]水良久，即成大風，並宜此方

生地黃　黃連　苦參　甘草

右於大鍋內用水七石煎取四石，去滓，以白斛澄過，以爐灰火煖
莫令冷，從朝服治風丸散及飽飯後，入甬內浸身，坐令汗出，晚即出洗
身上瘡頭，水令[illegible]便[illegible]以摩風膏指摩[illegible]一兩度起

摩風膏 治風疾[illegible]後服內[illegible]麻偏體[illegible]

防風　羌活　當歸　白歛　細辛
蜀椒　當歸　躑躅花　白芷
丹參　桂　附子　烏頭　杏仁

皂角　荊芥　苦參　玄參 各等分

右細剉，以大醋一斗，拌勻，三宿後，以文武火微炒，令乾，用臘月豬脂二斤
再以文武火炒，日常小沸，莫令火急，以綿濾去滓，於瓷瓶內盛，勿
令水汚，如臘月造，可留十年，每用一少許，於手上，於患處摩令熱

胡麻丸 治大風

天麻　赤芍　白附子　人參　細辛
川芎　威靈仙　定風草　川山甲
丹參　玄參　何首烏　紫參　蔓荊子
防風　威靈仙　金蜈蚣 一對

右為細末，每用二兩，用胡麻一斤，以香為末，拌勻，入安和丸，都分為
九十丸，每服一丸，細嚼，温酒送下，日進三服，不拘時候，淡白粥服一百
二十日，不得喫大服

柏葉散 治瘋風

柏葉　麻黃　山梔子　枳殼　羌活
獨活　白蒺藜　升麻　子芩　防風
牛蒡子　荊芥　蔓荊子　大黃 各等分　苦參 一兩
烏蛇 一條

右為細末，每服二錢，溫水調下，日七八服

柳枝煎防風丸 治大風疾，體生瘡，腫瘡癢，痒出膿風毒
香服

柳樹枝　桑枝　槐枝　天蓼木枝　仙靈脾葉 各三斤

已上並剉，以水七斗，於大鍋中煎取一斗，濾去滓，并眼蠶沙
[illegible]令香熟，為末入藥汁中，相和，再煮，稍稠，仍取出，用瓷
合盛，每用酒調下後丸藥

防風　羌活　人參
五加皮　白蒺藜　五味子　白鮮皮
甘菊花　松子　赤茯苓　露蜂房 各一兩
烏蛇

右為末，煉蜜和杵，丸如梧桐子大，每服以溫酒一中盞，入煎成藥一

茶酒或飯食前下丸藥三十丸

桂枝浸酒方 出聖惠 治大風疾

桂枝 芎藭 獨活 甘草炙 牛膝去苗
薏苡人 附子炮裂去皮臍 乾薑炮 凌霄花 各二兩
防風去叉 天雄炮裂去皮臍 蜀椒 杜仲去粗皮 白术 各半
白茯苓 蒺藜 枳殼 各二兩
右細剉用生絹袋盛以清酒二斗浸七日後每日空心及午臨
臥時煖一小盞服之

柏子人散 出聖惠 治風偏身如蟲行
柏子人 萆薢剉 赤芍藥 防風去蘆頭 桂心
山茱萸 細辛 白术 芎藭各半兩 附子炮裂去皮臍
秦艽 石斛去根 牛膝去苗 羌活 天麻
麻黃去根節 甘草炙
右細擣羅為散每服食前以溫酒調下一錢

黃耆丸 出聖惠 治大風癩面上生瘡身多盜汗腹痛
黃耆剉 防風去蘆頭 丹參 白朮 白茯苓去黑皮
芎藭 枳殼去瓤麩炒 山梔子去皮 蔓荊子 赤芍藥
知母焙 地骨皮 黃芩 遠志去心 苦參
生乾地黃焙 各一兩
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心日午夜臥用
溫水下

黃耆丸 出聖惠 治大風癩疾
黃耆剉 防風去蘆頭 丹參 白朮 白茯苓去黑皮
芎藭 山梔子 赤芍藥 枳殼去瓤麩炒 細辛去苗葉各一兩
大腹皮剉一兩 木香 人參 蔓荊子 獨活去蘆頭
苦參各三兩
右為末煉蜜和丸如梧桐子大空腹荊芥湯下二十丸日再服

神效丸 出聖惠 治癩疾
芎藭 羌活去蘆頭 皂莢去皮子 何首烏 各四兩
杏人湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右除杏人外擣羅為末入膩粉半兩同研勻煉蜜和丸熟搗
如梧桐子大每服[illegible]以[illegible]四兩[illegible]作大片
先[illegible]以[illegible]煮[illegible]不可犯
[illegible]大[illegible]定[illegible]
[illegible]水[illegible]下日三服[illegible]如梧桐子大每服五丸
[illegible]每服加五丸加至五十丸
每服五丸至五七日頭痛牙齦
中出[illegible]只得[illegible]須是忌房

空羊年
地骨皮散
地骨皮 白蒺藜 苦參
人參 細辛 白茯苓 山梔子 山茱萸
小荊子 黃柏 蔓荊實 丁香
木香

右為散每服一錢匕煎水調下如人行十里一服欲治此病須先擇
吉日[illegible]服此藥服至五七日頭不痛[illegible]不可療
若服此藥以次運動[illegible]則必愈之兆以次齒縫涎出則牙齒
[illegible]須是服藥不可食葷物至四十五日可全愈也若涎出則是足
[illegible]指病退漸漸至身[illegible]病退如是涎出大便必秘則可服大黃之
類藥[illegible]之也其[illegible]若服盡一料可更服一料[illegible]既服藥亦須令
人常看之[illegible]牙縫中涎[illegible]飲食[illegible]不[illegible]
殘害也欲治此病必須自九月以後二月已前可也

岐伯神聖[illegible]治[illegible]麻[illegible]癩疾[illegible]骨肉[illegible]敗[illegible]眉毛墮落
身體[illegible]目[illegible]方
天[illegible] 附子 細辛 烏頭 莽草
[illegible]蜀[illegible] 乾薑 石南 萬[illegible] 防風
[illegible]方[illegible] 枳實 獨活 白朮
右[illegible]散[illegible]服方寸匕日三[illegible]加[illegible]不忌[illegible]水生菜桃李雀肉青魚
[illegible]如[illegible]麻[illegible]甘豆湯止之[illegible]一方無防葵枳
實名[illegible]散[illegible]神聖散

茵芋酒 治大風頭眩重目瞀無所見或仆地氣絶半日乃蘇口喎噤
不開半身偏死拘急痺痛不能動摇歷節腫痛骨中酸疼手不得上頭
足不得屈伸不能躡履行欲傾跛皮中動淫淫如有蟲啄[illegible]療之生
瘡盡皆住走有風諸疾並皆主之

羚羊角散 治大風癩疾
羚羊角 羊角 羌活
獨活 麻黃 防風
當歸 黃耆 杏人
右搗羅為散每服一錢匕空心食前溫酒調下

杏人丸 治大風疾初患未生瘡腫頭面皮膚頑黑瘙癢
杏人 羌活 芎[illegible] 白朮
訶梨勒皮 當歸 貫仲 木香
雞頭實 桂心 梔子人 石斛 羚羊角屑
麥門冬

右為末煉蜜和搗丸如梧桐子大每服食前以酒下二十丸

桃枝湯浸浴方 治五藏大風癩
桃枝 柳枝 槐枝 桑枝 楮枝
松枝 桑枝各一 苦參 藿[illegible] 牛蒡根
枸杞根 秦艽 丹參 莽草
右細剉和勻分為四度每度以東流水[illegible]煎取七[illegible]
於煖室內浸洗候水盡用粉避風

苦參大丸 治大風癩疾
胡麻 防風
蒼耳子 何首烏 石菖蒲 桑白皮 白蒺藜
細辛 荊芥子 蔓荊子 枸杞子 牛蒡子
右等分各[illegible]同上剉炒為細末[illegible]
十丸每服[illegible]
室

知聖散 治大風[illegible]

丁荊子 苦參 玄參 厚朴 荊芥穗
紫參 陳皮 沙參 蒲黃
蔓荊子 防風 白芷 威靈仙
右為細末用藥三錢柳枝桃枝各一握[illegible]同煎[illegible]洗忌五辛
物

犀角丸 治一切大風瘡疾
烏犀角 升麻 黃芩 防風 人參
當歸 黃耆 乾薑 黃連 甘草
梔子仁 大黃 巴豆
右為末煉蜜和搗丸如梧桐子大每服三丸溫湯下以利三兩行為
度不利以意加之

百神散 治一切惡疾病風瘙癢癩偏身瘡疹面即床痛眉毛墮落
皆爛耳鼻四肢麻痺
天雄 附子 萆薢 [illegible] 細辛
烏頭 乾薑 菖蒲 甘草 石南葉
防風 白朮 獨活
右為細散每日空心溫酒下四錢匕日三服

莽草散 治風身體如蟲行
莽草 細辛 人參 芎藭 甘草
凌霄花 白蒺藜 當歸 秦艽
杏仁 防風
天麻一兩
右為散每用藥一分水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服又取
此藥二兩用苦參五兩白礬五兩桃柳枝各五兩水一石二斗同煎
至七斗[illegible]浴後[illegible]服前散

雄朱散 治大風
雄黃 朱砂 滑石 阿膠 雌黃
雷丸 硫黃 生犀角屑
芫青 斑蝥 黑豆

右爲細末每服三錢早晨溫酒調下明日再服
丹參散 治大風癩疾
丹參 威靈仙 甘草
玄參 人參 [illegible] 甘草
羌活 獨活 黃芩
右爲散食後溫漿水調服三錢匕臨卧時再服若五心煩熱口不眠
[illegible]在鼻孔下搨服之一月便瘥
[illegible]湯 治大風疾
[illegible] 烏頭 天雄 附子
躑躅花 乾薑 桂心
防風 石膏 甘草 莽草
右細剉以生絹袋盛以清酒一斗五升浸之七日滿後每日空心及
夜臨卧時暖一小盞服之
防風散 治風在頭面眉間如蟲行或頭眩目中淚出
防風 桂心 天雄 細辛 烏頭
朱砂 乾薑 萆薢 白茯苓
附子 人參 當歸
右爲細散每服不計時候以溫酒調下一錢
莽草丸 治風皮膚瘙痒如蟲行頭目旋暈
莽草 烏蛇 天麻 川升麻
蟬殼 細辛 赤茯苓 附子
甘草 麝香
右爲末入麝香同研令勻煉蜜和擣丸如梧桐子大每服食前以溫
酒下十五丸
白殭蠶丸 治大風疾
白殭蠶 蛇蛻 皂莢刺 [illegible] 防風
薄荷根 蒲黃根 藿香 蜈蚣 [illegible]
文巾子灰
右除[illegible]爲末[illegible]爲丸如梧桐子大

每服二十丸至[illegible]爲末酒煎如糊爲丸亦得
烏蛇丸 治大風皮膚生瘡腫癢肢節疼痛心腹痰壅
烏蛇 玄參 沙參 人參
五加皮 防風 苦參 虎脛骨 羚羊角屑
天麻 [illegible]
右爲末用皂莢十挺以水一升挼取濃汁去滓銚子內熬成膏和藥末搗
圓如梧桐子大每服食後以溫水下三十丸
白花蛇散 治大風癩疾[illegible]
白花蛇 露蜂房 苦參
防風 丹參 梔子人 秦艽 玄參
白蒺藜 獨活
右爲細散每日空心用溫酒調下二錢晚食前再服
天南星丸 治毒風攻四肢周身如蟲行搔之不解
天南星 天麻 白附子 羌活 白殭蠶
乾蠍 [illegible] 麻黃 犀角屑
白花蛇 梔子人
右爲末別入膩粉一分研令勻煉蜜和擣丸如梧桐子大每服不計
時候以溫酒下十五丸
麻子湯 治大風周身四肢痹若風行在皮膚身勞虛服之不虛人
又治精神蒙昧者
秋麻子 防風 桂心 生薑
石膏 橘皮 麻黃 竹葉 葱白
香豉一合
右㕮咀先以水二斗半煮麻子令極熟漉去滓取九升別煮麻黃兩
沸掠去沫內諸藥汁中煮取三升去滓分三服空腹服當微汗汗出
以粉塗身極重者不過三兩劑輕者一兩劑差有人患大風賊風刺
風加獨活三兩比之小續命湯準當六七劑一方加細辛仍忌生菜
苦參散 治肺臟風毒攻面生瘡成大風疾
紫參 防風 蘹香子 苦參
威靈仙 天麻 烏蛇 何首烏 白花蛇

右擣羅為散[illegible]胡麻子[illegible]入[illegible]白蜜[illegible]每胡麻子末一斤入藥末二兩[illegible]服三錢匕[illegible]温水[illegible]日三服[illegible]藥三日後[illegible]

天雄散 治[illegible]風[illegible]眉鬚[illegible]

天雄 烏頭 甘草 乾薑

石南 防風 [illegible]

右為細末空腹温酒調下二錢匕日一服 一方名千金散

雄黄散 治大風疾肌肉欲壞有蟲

雄黄 河[illegible] 滑石 朱砂

礬石 白斂 紫石英

雄黄 雷丸三分

右為細散入研了藥都研令勻服時午日或[illegible]

六日預合之每服空心以暖酒調下二錢服藥後[illegible]吐出[illegible]服藥後[illegible]出甚驗[illegible]日再服[illegible]

治風疾[illegible]狀如[illegible]

蔓荊子 白礬 [illegible]

凌霄花 苦參 大戟 [illegible]

右剉以水五升酒三升相和煎取三升[illegible]

五[illegible]以[illegible]之[illegible]

百靈丸 治一切[illegible]

丹砂 水銀 桂[illegible] 乾薑末 烏頭末

菖蒲末 蜀椒 附子

右件同研勻先用醇酒一升於銀器中熬令[illegible]次下諸藥末[illegible]膏更添醇酒一升[illegible]丸如[illegible]子大每服二十丸[illegible]日三服漸加丸數二十日[illegible]二十日後[illegible]合[illegible]每日空心[illegible]

赤箭丸 治大風[illegible]

青葙 赤[illegible] 茵芋 地骨皮 烏蛇五兩

白丹皮 [illegible]

已上細剉以水五斗於釜內煮至一斗濾去滓澄清再煎成膏

防風 天麻 青蒿末

右為末以前成膏和丸如梧桐子大每服食前[illegible]湯下十九

枳殼丸 治[illegible]熱毒風頭面痒如蟲行

枳實 天門冬 獨活 黄連

防風 白蒺藜 苦參 烏蛇

苦參一分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以温水下三十丸

治身體癢或生瘡疥如蟲行浴方

蒺藜子 白蒺藜 苦參 漏蘆

蒴藋 蒼耳草葉 羊桃根 [illegible]

右剉以水一石煎取七斗去滓飽食看冷熱浴浸之出汗出水揩令便出宜避風不過三上效

八葉湯 治[illegible]大風瘡

桑葉 荷葉 地黄葉 皂角葉

蒼耳葉 何首烏葉 菖蒲葉 鶴葉

右等分細剉[illegible]如[illegible]洗手至身體大風惡疾瘡痒

[illegible]骨[illegible]手足指脫[illegible]顏色枯瘁鼻塌眼[illegible]

[illegible]之惡無過於斯[illegible]此病者[illegible]

者名[illegible]不仁之行[illegible]可悲[illegible]一切

[illegible]丹 治大癩疾

白附子 天麻 升麻 丹參

細辛 赤箭 蜈蚣 威靈仙

右同為細末[illegible]兩[illegible]錢[illegible]藥末可[illegible]胡麻子一升重五兩炒令香[illegible]入藥末可[illegible]丸[illegible]分作十丸每日食後米飲嚼下一丸日進三服[illegible]一月[illegible]

有驗且[illegible]出入行動[illegible]是其驗也[illegible]

醉仙散 治大風疾遍身瘾疹瘙痒麻木…
衛生寶鑑
胡麻子 牛蒡子 枸杞子 蔓荊子
白蒺藜 苦參 栝蔞根 防風
右為細末每用十五錢末入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調下晨
甘草貫衆湯漱口晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭黃
涎渾身疼痛次後利下膿血病根乃去…神效
八寶散 治風癩頭髮脫落…
藿香 破故紙 大腹子 […] 雄黃
輕粉 […] 枯白礬
右為細末小油調擦日上數次痒則擦之
石榴皮酒方 治大風頭面…生瘡如癩
酸石榴 […] 人參
苦參 沙參 丹參 蒼耳子 羌活 各二
右細剉絹袋盛以無灰酒一斗於一瓷瓶中浸之密封頭春夏七日秋
冬二七日每於食前服一中盞旋旋添酒味薄再合
苦參散 治癘風
苦參 […] 豬肚一個
右以苦參末入豬肚內用線縫合隔宿煮熟取出洗去原藥先不吃
飯五頓至第二日先飲新水一盞後將豬肚食之如吐了再食之待
一二時用肉湯調無憂散五七錢匕取出小蟲一二升為效
後用皂角一斤不蛀者去皮弦及子搥碎用水四碗熬至一椀用生
絹濾去滓再入苦參末攪成糊膏子相和…入前
藥相和藥附于右
何首烏 二兩 防風 一兩 […] 人參 […] 當歸 […]
右為細末入皂角膏子為丸如梧桐子大每服三五十丸溫酒或茶清
送下不計時候日進三服…荊芥苦參麻黃煎
[…]丸 […]
當歸 熟地黃 川芎 荊芥穗 防風
細辛 桂心 […]

右剉為散先以醋一升浸一宿漉出焙乾拌以生地黃一斤搗汁浸
一宿焙乾酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黃汁釋
蒸餅為丸如梧子大用好…頭一個炮裂荊芥穗半兩浸酒三
升溫下藥五十丸
犀角散 治大風…
犀角 […]
藿香 赤箭 蝎梢 麝香 附子
[…] 乾蝎 […]
右為散每用五錢匕入好臘茶末七錢匕和勻凡患此疾鼻梁未倒
語聲未嘶…者取藥末一錢匕用荊芥薄荷湯如茶點
熱服…入盆…出汗…衣被…出汗慎
外風為…
烏麻子丸 治大風癩病
烏麻子 […] 天麻 […] 丁香 乳香 […]
[…] 黃耆 白朮 […]
右為末拌和勻用米泔一升淨洗以浸木…研膏熟
杵為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食後用溫水下日二
夜一
換肌散 治大風癩
白花蛇 白礬 綠礬 膩粉 水銀
麝香 […]
右件一處細研時點少許水研水銀星盡為度每服一錢至二錢匕
井華水空心調下至午時未動腹空更一服後數出稠黏涎唾或瀉
下五色毒涎為效一月內可二度服若牙齒縫中涎出乃愈更
量虛實用之
六神散 治癩病
蜈蚣 […] 生蠶 […] 生薑汁 […] 綠豆末 […] 蜂房 […]
右一處和勻更用…只作一服約半日許發動惡心涎唾汗
出…吐出涎沫…多為…或更有…

病出也切忌出風中如吐[illegible]後[illegible]下一塊大小如[illegible]有諸般顏色者此是病根也如不出食以甘草二寸黃[illegible]三[illegible]水一盞煎至半盞溫與其病即不以老少強弱都作一服若是半日已來未發動即更服檳榔根等汁投之尚未[illegible]更與無妨面上如有紫瘡未銷者用乾斑猫末以生油調成膏傅上約半日許瘡癩脹起以帔兒子揩拭去藥以針挑破近下令水出自乾即不得剝其瘡及斑猫不得令入口眼若面上有小大瘡疱子者不用斑猫却以熟艾入脂麝少許搓作紋狀大小丈炷灸之每瘡灸一炷如手脚上下有瘡未效亦服草烏湯抹洗更以白藥子三兩甘草一分荊芥十穗一處搗羅爲末乾貼如[illegible]且使之亦[illegible]切忌房室動風發氣鹽醋料物等尺行[illegible]灸[illegible]過一百日

小牛黃丸 治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩瘙痒難忍時出黃水及大風手足壞爛眉毛脫落一切風疾

玄參 荊芥穗 苦參 大川烏 [illegible]

牛黃[illegible]

右爲末水[illegible]丸梧桐子大每服三十丸熟水或茶清下方加升麻防風皂角無患子[illegible]丸

治大風證輕者服此

當歸 羌活 獨活 琥珀 金毛狗脊[illegible]

右搗末入大楓子肉在藥末中[illegible]丸梧桐子大服四五十丸茶清日進三服半月見效

治一切大風癩疾不問久新者[illegible]日取效[illegible]重者半年[illegible]愈

白花蛇[illegible] 大楓子[illegible]

烏梢蛇[illegible] 甘草[illegible]

香附子[illegible] 防風[illegible]

右搗末和合[illegible]以蒸餅糊丸梧桐子大服四五十丸空心食前服白湯下日進三服忌房事[illegible]戒食甘味

療大瘋身體面目有瘡

水銀[illegible] [illegible] 真珠[illegible] 丹砂[illegible]

雄黃[illegible]

右各一兩皆研如粉三歲者酒三石五斗於瓮中貯諸藥令[illegible]日[illegible]室中[illegible]始從足漸至腰浸之日一以[illegible]水洗兩目勿令入目也可七日爲之勿令冷[illegible]動忌狸肉生血等

乳香散 治大風疾肌肉破壞[illegible]眉髮落語聲散

乳香 天麻[illegible] 牛黃 麝香[illegible] 雄黃[illegible]

胡麻[illegible]

右爲研令勻細每日空心及晚食前用[illegible]調下二錢初服三日心[illegible]五日膿[illegible]可如醉是其候也[illegible]漸愈 只須長服此[illegible]愈

治大風癩疾方

金[illegible] 防風[illegible] 桑[illegible]

[illegible]

右先搗烏蛇防風[illegible]三味[illegible]

[illegible]升半研[illegible]取汁[illegible]入[illegible]藥[illegible]茶下空心及晚食前服一百日內[illegible]眉並生如[illegible]

苦參丸 治大風偏身[illegible]瘡

苦參[illegible] [illegible] 甘草[illegible]

右爲末研入末[illegible]和搗丸如梧桐大每服不計時候以溫水下三十丸

神仙退風丹 治大風疾

知母 貝母 烏梢蛇 海桐皮 金毛狗脊[illegible]

右爲細末[illegible]丸如梧子大每日空腹日中臨臥服三十丸每夜第一次[illegible]取三十丸使服並用[illegible]自然汁下大忌酒及房室一切發風之物只喫[illegible]粥一百日[illegible]

[illegible]

疾脈之所以然。右大風方無如此者，若不斷酒色忌口，無益也。

淩霄散 治癘風。右癘風此疾非止而成，有之以其病發於皮膚，俗呼

為肺風也。鼻準腫赤脹大而為瘡，乃血隨氣化也。氣既不施，則血為之

聚，血既以聚，則使肉爛而生蟲也。生蟲者，[illegible]

方升麻湯下瀉青丸，餘病各隨經治之。

蟬殼　地龍　白殭蠶　全蠍各等分　凌霄花半兩

右為細末，每服二錢，酒調下，於浴室內常在湯中住一時許，[illegible]

服藥効。

天麻丸 治大風瘡

天麻　白茯苓　白朮　白芷

芎藭　附子　防風　細辛

獨活　白殭蠶　[illegible]

白龍骨　牛黃　[illegible]

右件研以搗羅為末，次將[illegible]研令和勻，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服

七丸至十丸，溫酒下，空心日午臨卧服。忌一切發毒，生冷、動風、豆、麪、酒

[illegible]

下。厚衣蓋覆。

石斛散 治大風疾，四肢不收，不能自反，兩眉中癢痛，頭重

急痛，空心不可行，復時發熱，足跗似錐痛，及所割皆不覺痛，百節

風且從下上，徧身肌膚頑痺，如蟲行，徧身不仁，精神恍惚，血脈散亂，休惕

不寧，[illegible]

蒼耳酒 療大風惡疾及一切風，令人充悅方

蒼耳[illegible]　鼠粘根[illegible]

右以水兩石五斗煮取六斗，去滓，[illegible]

麴一斗二升，[illegible]，以漬粳米一石二斗，分作五酘，[illegible]

酘一斗，以次四斗米，取藥汁九升拌饙，[illegible]

第二酘三斗米，取藥汁七升拌饙，[illegible]

第三酘[illegible]

和搦如泥下之。第四酘五斗米，取藥汁六升半拌饙，[illegible]

麻子一斗，搗碎[illegible]下。第五酘[illegible]二斗米，取藥汁四升半拌饙

熟取胡麻一斗，搗碎和下之。第五酘九斗米，取藥汁十三升拌

饙下之。已上五酘，沐酒候米消盡而飲，如米未消盡，更取一二斗

下之，使味足。然後去糟，取清酒，常溫飲半升，不能者可量性多少，常

使有酒氣。忌房室，宜補養，益精神，令人充健，去風疾。

服寶散 治大風疾，鬚眉落，肌肉消散，拘攣，及久擁緩不收攝方

取[illegible]酒之，一日瘥。

苦參酒 治諸風[illegible]

蘆葦方 療癩

取蘆葦根[illegible]以水二石煮取一石，以漬法麴，造酒三五度，差。

附子酒 治大風，冷痰癖，脹滿，諸痺等病，亦治拘攣，除風[illegible]

私用大附子一枚，重半兩者，[illegible]亦可，包之，酒漬，春冬五日，夏秋三日，

服一合，以瘥為度，日再服，無所不治。

治大風[illegible]

以蚺蛇肉一截，[illegible]

[illegible]

摩勒香方 治大風疾

摩勒香[illegible]

右細研，入牛乳五升，甘草末四兩，於瓷合中盛，飯上蒸令熟，以小童子

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]三日三夜[illegible]

通天再造散 治大風惡疾

鬱金[illegible]　大黃[illegible]　白牽牛[illegible]　皂角刺[illegible]

右為末，每服[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

神虎丸　治大風癩病

烏頭（炮去皮臍）　莨菪子　吳茱萸　黑豆

右為末，酒糊為丸如梧桐子大，每服十五丸，冷茶下，日三服。瘡腹血潰爛甚者，更用後蛇床子散。

蛇床子散　治大風癩疾

蛇床子　莨菪子

右為散，每量多少，以水煎洗瘡，更日服神丸，十日瘡必乾，半月後須眉新生，如風癩服不效，病退更服二聖散。

二聖散　治大風癩疾，服食不見人物，痛發白[illegible]

皂角刺[illegible]

將皂角刺一二斤燒灰研細，煎大黃半兩調下二錢服之，一方用冷酒調下，瀉出黑蟲如魚口黑色，乃是多年，如口赤色是為方近，三數日又進一服，直候無蟲則絕根也，惡疹者[illegible]

蔓荊丸　治大風

蔓荊子　胡麻子　牛蒡子　黑[illegible]

胡麻　白芷　何首烏　威靈仙　荊芥

獨活　蒺藜　牛膝　苦參　大草烏

右細末，大楓油和丸梧桐子大，每二十四丸，食前茶清下。

[illegible]服丸　治諸癩大風疾

苦參　大楓油

右將苦參為細末，入大楓油及少酒糊為丸如梧桐子大，每服五十丸，臨時用溫酒送下，仍將苦參煎湯洗之。

苦參丸　治大風癩遍身瘡疹，大作瘡[illegible]不愈，甚者毛髮脫落

苦參　生乳　黃[illegible]　乳香

右研勻，煉蜜和丸如梧桐子大，每日空腹溫酒下二十丸，加三十丸，一方無乳香用薰陸香。

松脂餌酒方　治大風癩瘡[illegible]宜此服去胃中伏熱，解松脂香，治風瘙癢，眉[illegible]，久服輕身延年不老

松脂　黍米　糯米

右松脂一石，以[illegible]上取入冷水中，如此凡四五十度，每五度換水，須[illegible]研作粉，得一斗一升二合半，煉松脂初法，用水四斗浸麴，黍米一斗五升，以松脂粉拌飯，一如常醞法，用次成料，每糯米三斗入松粉和合釀，又相及更炊糯米二斗，同松粉拌和入甕，又相及更炊糯米一斗，入松脂粉一升五合拌和入甕，密封，日夜可以五服，漸漸加至一升，隨人量進，服酒常令醺醺，酒有[illegible]氣，又一方加杏人五升，去皮及雙人者，研如膏，入之佳。

治大風癩疾，麻風等，白癜

乳香　白膠香　龍腦

右將上三味，同將入於銀器或石器中，以水一斗五升煎至二十沸，勿使溢出，即瀉入冷水中，漉出曝乾，又依前以水一斗煎二十沸，又瀉入冷水中，漉出曝乾，細研如粉，入龍腦同研令勻，每日空心及晚食前，以冷酒調下一錢，又服一依前法如此三十遍，瀉入冷水中，漉出。

第一浴法

麻黃根　地骨皮　草烏頭

右為剉散，研杵，有三兩，每用藥三兩，水一桶，煎至三十盞，又葉一兩，同煎十沸，入米醋一中盞，打勻，去滓，就室中，且用手巾將四肢淋湯，可令汗出，如珠無汗，上面貼片時，就暖處仍可令汗出，五日再浴，如此兩上，方使服換骨丹。

換骨丹

九龍紫甲（去枕）　每服[illegible]

右以鹽泥固濟，候乾，入鍋，存二分性，研末，已三十兩，去皮膜，須手研青州棗七箇，去核，入巴豆，留在棗中，火燒令焦，存巴豆五分性，將棗巴豆，燒研如泥，入前二味末同研，以醋煑麵糊為丸，如梧桐子大，每服七丸，空心，四五丸，用温酒下，初服[illegible]，如吐血，或惡心，即住，只服三兩服，未退，更加一二丸，次服通仙丹。

遇仙丹

人參　紫參一兩　苦參　白殭蠶[illegible]

右爲末，白麵糊丸如梧子大，每服三十丸，温薑湯下，食前日二次服

疎風散

疎風散　山梔子[illegible]　大黃　白滑石　枇杷葉[illegible]

右爲末，入朴硝半兩令勻，每服[illegible]食後[illegible]茶[illegible]下，次[illegible]佛手膏

佛手膏

斑猫[illegible]　去黑紫瘡核　巴豆[illegible]　杏仁[illegible]　紅娘子[illegible]　雄黃

青礞[illegible]　硇砂[illegible]　輕粉[illegible]　石膽[illegible]　青油[illegible]

黃丹[illegible]　粉霜[illegible]　綠豆[illegible]　桃花[illegible]

亂髮一兩　砒霜[illegible]

右用油煎令焦化，次下紅娘子，次下巴豆，[illegible]用[illegible]

方下硫黃、蓋硝，又将[illegible]

時先將針刺瘡[illegible]用[illegible]一粟米大[illegible]敷[illegible]又[illegible]日[illegible]

朋[illegible]三兩[illegible]次服去毒丹

去毒丹

青芍藥　甘草　白滑石[illegible]　朴硝　大黃[illegible]

巴豆[illegible]　黑牽牛[illegible]

右爲末，麵糊丸如菉豆大，每服十五丸，金銀薄荷湯下，加至三十丸

次服甘草散

甘草散

甘草　白滑石[illegible]　山豆根[illegible]　大黃[illegible]

右爲末，每服一錢，冷水調下，一服次服解毒丸

解毒丸

茶葉[illegible]　甘草[illegible]　大黃[illegible]　朴硝[illegible]

右爲末，麵糊丸如菉豆大，每服二十丸至三十丸，白湯下，次服福神丹

福神丹

訶子[illegible]　巴戟[illegible]　黑牽牛[illegible]　甘遂[illegible]　赤小豆[illegible]

右爲末，麵糊丸如菉豆大，每服十丸至十五丸，薄荷湯下，[illegible]用水[illegible]

木香散　傳[illegible]敷及面[illegible]上瘡令生肉

陳皮[illegible]　陳米[illegible]　藿香　馬蹄香[illegible]　麝香[illegible]

右爲末，入麝香用冷水調，敷瘡上，有膿處如瘡破，即煎槐枝湯洗淨

上藥此十方，通秘得有驗，大要病人須能如法將息，理會家而信之

皂角湯

皂莢刺[illegible]　治大風[illegible]

右爲末，酒調空心服，取下惡物，服藥數日，面上[illegible]一方[illegible]輕粉

桑枝煎丸

東引桑枝[illegible]　治大風癩神効　東引柳枝[illegible]　乾[illegible]子[illegible]

右用童子小便二斗，春秋夏冬浸七日，剉用長流水五斗

同象水二斗同煎至一斗，取汁，[illegible]白蜜五合，更煎如餳

餳，以麄合盛，經一宿後服，餘藥[illegible]入熟銅鍋[illegible]取桃枝[illegible]

各二兩，生用[illegible]三兩[illegible]入瓷內炒黃[illegible]

[illegible]一復時[illegible]不用，只用煎汁三兩，加京墨[illegible]白

[illegible]風各三兩同搗[illegible]爲末[illegible]丸如梧桐子大，每服

[illegible]至[illegible]酒五合調化下二十丸，空心食前，夜臥

又一服剝更入紅雪[illegible]朴硝尤佳

胡麻[illegible]散　治大風癩疾[illegible]

黑豆方　治大風疾

黑豆[illegible]　天雄[illegible]　烏頭[illegible]

右剉烏頭、天雄如豆粒大，用水二斗，使文武火煎，至[illegible]去[illegible]黑豆二

升，一復時[illegible]乾，更[illegible]每服三[illegible]至

七粒，空心食前用酒下，日三服[illegible]一服，一方忌房室

猪魚[illegible]三月四月天雄烏頭[illegible]去土勿洗搗

飲汁清豆

百花煎　治大風癩疾

白蜜[illegible]　石榴[illegible]　生薑[illegible]

右先研生薑、石榴，絞取自然汁，[illegible]令淨[illegible]盛於瓷瓶[illegible]封

口[illegible]令[illegible]於釜中[illegible]重湯煎一復時成煎，空心[illegible]調

二錢匕加至三錢匕日二夜一回月內有惡物隨便而出是病根
散矣
黃精煎 [illegible] 治大風癩疾面赤疹起手足頑麻身發瘡痍及指節
已落者
黃精（[illegible]） 白蜜（[illegible]） 生地黃（[illegible]）
右先將黃精生地黃洗淨細剉以木石杵臼搗熟復研爛入水三斗
絞取汁置銀鍋器中和蜜攪以文武火煎如稀餳每用溫酒調化二
錢匕至三錢匕日三夜一久服却病延年面如童子延年不老
凝水石金方 [illegible] 治大風癩病
凝水石（[illegible]） 水銀（一兩） 膩粉（一分）
右將凝水石研如粉然後用病人唾津先[illegible]調[illegible]
上不食以兩手摩[illegible]熱及夜更[illegible]
然後取下惡物但與溫粥忌一切動風物 一月以後[illegible]
後出患者[illegible]
治風癩
苦參 白大豆 [illegible]
右同九蒸九曝作團食令人不飢延年斷穀又名蒼耳子丸[illegible]服之
治大風 大楓子肉 白花蛇（[illegible]）
右入為末[illegible]煉蜜丸服
追風散 [illegible] 治大風神効
川大黃（[illegible]） 皂角刺（[illegible]） 川鬱金（二兩）
右為細末每服三大錢用真大溫酒入[illegible]
[illegible]只乳[illegible]上取下[illegible]如疾多年[illegible]日近者[illegible]色赤
調兩日日再服直候無存方是病[illegible]
[illegible]藥此藥大有奇効只得丸不可與病知[illegible]
日內發成忌房色一切[illegible]
仍忌酒色[illegible]
乳香煎 [illegible] 治大風[illegible]
乳香 [illegible] 推黃 [illegible] 預知子 [illegible]

右先以香末用水一斗於銀器內以慢火煎至五升入預知子[illegible]
[illegible]成膏入瓷器盛每日空心以溫酒調下一茶匙後有蟲
如馬尾隨大便出即愈
治大風疾神効方
水銀（一兩） 硫黃（[illegible]） 松脂（[illegible]）
右同入瓶子內火上[illegible]以大[illegible]不損者一隻[illegible]
盞又以泥裹作[illegible]乾大火煅令青赤候冷取出研入[illegible]
末[illegible]研令細[illegible]和丸如梧桐子大每服空心以溫酒下五丸晚食
前再服
狼毒散 [illegible] 治五癩疾及大風疾
狼毒 秦艽
右為末每服方寸匕日三服五十日愈
草麻法 [illegible] 治癩[illegible]
方 治風疾
苦參 [illegible] 黃連 [illegible]
[illegible] 白蒺藜 升麻 子芩 防風
牛蒡子 荊芥 蔓荊子 大黃 苦參（一兩）
烏蛇（一條）
右為末[illegible]水調下日七八服
柳枝煎防風丸 [illegible] 治大風疾遍身瘡癬痒出膿風毒[illegible]
香服
柳枝 桑枝 槐枝 [illegible]枝 仙靈脾 各二斤
已上並剉以水七斗於大鍋中煎取一斗去滓[illegible]
[illegible]入香[illegible]為末入藥汁中攪和再煎稀稠得所取出用瓷
合盛每用酒下[illegible]
防風 羌活 五味子 人參
五加皮 白蒺藜 赤茯苓 白鮮皮
甘菊花 松子 露蜂房 各一兩
烏蛇 [illegible]
右為末煉蜜和杵丸如梧桐子大每服以溫酒下一十丸[illegible]前或藥[illegible]

草麻子[illegible] 黃連[illegible]
九蒸曝乾[illegible] 白附子[illegible]
右除南星外，將餘藥為末，入草麻膏中，拌勻，煉蜜和丸如梧桐子大，每
服三十丸，薄荷茶下，日三服。

蝦蟆丸[illegible]
乾蝦蟆[illegible]肥長足者[illegible]
右為末，以竹管引入羊腸內，[illegible]二升，甑中蒸之上為[illegible]
去殼入清[illegible]以腸丸如[illegible]，每三十丸，空心溫酒下，當[illegible]者服
二十九，任意以酒服，解為度，當有大腸內有蟲下即瘥。

治大風瘡[illegible]
用楓木子不以多少，燒存性，又研細，羅過，與輕粉等分，用麻油調傅
瘡上，然後如黑，只乾，輕粉之理驗方[illegible]鼓內匠[illegible]因
語之云，昔嘗患大風瘡，得此方，令[illegible]遂愈矣。

還風煎[illegible] 治大風眉髮脫[illegible]
[illegible]十[illegible] 灰酒[illegible]
右細根莖葉細剉，置鍋內，以酒浸，令[illegible]發氣，青入新瓦
器盛，更取[illegible]根汁別收之，待患者[illegible]一匙許，以麻灰熟
酒調下，厚衣被蓋，出汗，於密室內服藥，至[illegible]
其壞肉，看總[illegible]勿令當風。

苦參丸 治大風瘡及熱毒風瘡疥癩
苦參[illegible] 枳殼[illegible]
右為末，以棗肉為丸如梧桐子大，每服二十丸，用溫酒下，食後以
粟米飲或[illegible]水下，食後服，日二夜一。若苦參枳殼有[illegible]者即[illegible]用

治癩[illegible]
[illegible]細[illegible]擣取[illegible]
取白膠香一斤[illegible]取[illegible]令知[illegible]兩，即下[illegible]中
消之，又[illegible]知[illegible]兩下[illegible]汁[illegible]
修療已成矣，患三十年癩者，早[illegible]服[illegible]丸，一日三服，酒飲任
下，忌生冷醋滑臭物，功用甚多[illegible]不能一一具之。

療大風疾并壓丹石熱毒[illegible]不[illegible]

消石散[illegible] 生烏麻油一大[illegible]
右合內鐺中，以蓋口，以紙泥固濟，勿令氣出，細進火煎之，其藥未熟
時氣腥，候香氣發，即熟，更以生麻油二大升和合，又微火煎之，以意斟
量得所，即內不津器中，服去患大風者，用大大合，使在室中重作小
紙屋子，外以火，令患人在紙屋中，發汗，日服一大合，病人力壯，日二
服，服之三七日，頭面疱瘡皆滅。若諸丹石發熱，不得食熱物，著厚
衣[illegible]者即兩人共服一劑，服法同前，不問大[illegible]，使忌風二七日。
若丹石發即不用此法，但取一匙，內口中，待消，藥汁熱[illegible]忌[illegible]

惟黃丸[illegible] 治大風，身體如蟲行狀
雄黃 松脂[illegible]
右等分為末，和丸，以酒服十丸，如梧桐子大，日二，百日瘥。慎酒肉鹽豉
冷生血物[illegible]子[illegible]服之久服，夜即多夢見有[illegible]
既奇效。

又療眉鬢脫落方
[illegible]二十枚 石灰一升 [illegible]以[illegible]半日許可數
為之。

治大風神驗方[illegible]
白明乳香[illegible] 苦參[illegible]
右先用好酒五升，以苦參[illegible]內以重湯煮[illegible]使時[illegible]下大
亦不用[illegible]令常小沸[illegible]一復時足，即取出，去滓[illegible]將酒
浸乳香[illegible]鍋內煎[illegible]即止，入天麻末四兩，大麻人二兩，別研如
膏，同研[illegible]勻，搜大飲之可丸，即丸如梧桐子大，每日空心及夜臥
前以大麻人酒下二十丸。

大麻人酒法[illegible]
用大麻人二升[illegible]令[illegible]候乾，以酒一斗浸一宿，後和酒取白汁
以生絹濾過，入瓷瓶中，以重湯煮數沸，即止，每服取一小盞[illegible]
下藥，仍兼服後[illegible]服之。

紫茄子根散[illegible]服前藥後宜服
紫茄子根[illegible] 何首烏[illegible] 甘草[illegible]

右和令勻，平旦後至晚，常時了服三服，每服以温水調下二錢

治大風疾（集玉）

乘涼或沐浴（一云）

右先將古人持碎，將入不醉飯服十五廿丸，右人……

法：淳內兎耗中更入丙五廿，同封一宿，……下茶服之

何首烏散（出聖惠）治大風頑惡疾

何首烏……

右為細散，每服食前……溫酒調下，……薄荷茶調下亦得

治大風並身體不遂……

用蓮心兩石，熟水……作直袋三枚，每……七斗……

即取熱袋一枚，薄病處……

熏致汗……出汗，六日後一度……一日八十日上

又方（出千金方）

蒸黑豆……燻之……

治諸癩大風等疾……

浮萍煎湯沐浴亮良

用苦參為末，……丸如梧桐子大，每服二十丸……下，……後

治大風

用烏蛇三條……酒浸……蒸熟……細末……

……為末，……丸……作散……每服三十五丸……

通三五錢即愈

白花蛇造酒方（出聖惠）治大風

每白花蛇一條，……米一斗……

……上，然後麴……

去皮為末，每服酒一盞，温服，蛇末少許，仍將酒……

丸佳

除根方　治大風……

皂角丸……治大風……

肥長皂角……

右以皂角……多用……

皂角刺子大……五十丸不飢……下一方云……治大風病……

淡卻服但藥一方以十……去皮子……用水五……

付麻碎皂角互一升……

行脚方……

是舍……

不仁……

仁……

用……

旧一……

温水下三七丸，日三服，一方……

未大風……

以……

治身上瘡……

以蒼耳子……

天門冬丸……

用天門冬去心……用五斗……

……

林漂方……治大風癩疾

用烏蛇……三斤為細末……

乾……

……

治……

用苦……

未……

烏蛇浸酒方　治大風癩病

……

……

[illegible]

蒴藋湯 右癩風瘴[illegible]一切熱

馬先蒿散 治癩[illegible]

蒿艾酒 治癩疾

取白艾蒿十束如升大 煮取汁 以麴米如釀酒法 候熟稍稍飲之 但是惡疾 遍體面目有瘡者 皆可飲之

又蘇風 身體如蟲行方

用鹽一斗 水一石 煎減半 澄清 溫浴三四過 亦療一切風

又方

以浮萍草 洗浴 不過一二日愈

又方

以大豆漬飯漿中 旦溫洗頭面中 [illegible]沐頭 [illegible]之

驅風蛇丸 治大風疾 皮膚頑麻 [illegible]遍身生瘡

以七月十五日取蛇 [illegible] 散五兩 入水煎[illegible]服之 更[illegible]之

大麻子方 治大風疾

取大麻子 去殼 熬 [illegible]四兩 以水一斗 煎取一升 去滓 時時[illegible]

為細末 服食之 如病在膈上 [illegible]出在腑中 即汗出 在腑下 即[illegible]

宣風散 治大風疾 眼內瘡痒 手足拘攣 久服輕身 [illegible]

用蒼耳 [illegible] 三斤 研如粉 以夾絹袋盛 每服空心 [illegible] 無灰

酒調下二錢 一方 [illegible] 即服之 日三 [illegible] 百日服之

忌鹽 雜食 [illegible] 白日食 一方以蜜為丸 下二十丸

上真散 [illegible] 大風疾

用浮萍草 三月採 不拘多少 [illegible] 三五次 曬三五日 焙乾 為細末 不得見日 食前 空心 二錢 [illegible] 十服 [illegible]

通天再造散 [illegible]

鬱金 大黃 [illegible]

右每服 [illegible] 空心 冷酒下 一方 [illegible]

[illegible]

四聖保命丹 [illegible]

大黃 [illegible] 苦參 [illegible] 蒼朮 [illegible] 蝦蟆灰 [illegible]

右為細末 煉蜜為丸 分作一百二十丸 每服一丸 溫酒送下 食後 日進三服 忌肉 [illegible]

右將雄黃 白花蛇末入在 [illegible] 每服一錢 溫酒調服 日進三服 久服絕根本

雄黃 [illegible] 白花蛇 [illegible] 白 [illegible]

祛風散 [illegible]

大蚕沙 [illegible] 東行蝎虎 [illegible]

右每服一二合 楮葉湯調服 食前 日進三服

搐[illegible]散 [illegible]

東南枝上 [illegible] 水一桶 煎三沸 [illegible] 服湯 [illegible] 三五日 後[illegible] 十日 四肢 [illegible] 便 [illegible] 白 [illegible] 服 [illegible]

蝎[illegible]散 [illegible]

出瘡 [illegible] 四十日 瘡 [illegible] 瘡上 [illegible]

[illegible]

右用桕油二兩 調搽

又方 [illegible] 治諸癩大風等疾

苦胡麻 [illegible] 天麻 二兩 乳香 三分

右為末 每服三錢 荊芥湯 茶下 忌鹽 房事 動風物 一百二十日

用後兩膝眼灸十四壯

活血散 [illegible] 治大風疾 并 [illegible] 風 渾身頑麻 瘡 [illegible] 成瘡

白花蛇 [illegible] 草烏頭 [illegible] 川烏頭 [illegible] 防風 [illegible]

已上四味 用水同 [illegible] 香 [illegible] 為度 [illegible] 去 防風不用 次將白花蛇去皮骨 焙乾 [illegible] 去皮 焙乾 秤取五兩 又次將川烏去皮臍 焙乾 秤取二兩 半 外 [illegible] 入草烏頭 生去皮尖 秤五兩 又川烏頭 生去皮臍 秤二兩 半 [illegible] 細末 入後 [illegible] 二味

血竭 [illegible] 麝香 [illegible]

右件和勻 [illegible] 食後 [illegible] 真大風油一錢 并 [illegible] 酒 [illegible]

[illegible] 酒調服 [illegible]

地龍丸 治大風一切風毒生瘡

全蝎　地龍去土　蛇退　香附子　防風

胡麻子　川烏　蚕沙　荊芥　蒼朮

右碾為細末用醋糊為丸如梧桐子大朱砂為衣每服二十丸至三十丸茶酒任下不拘時候

癘山胡以方嘗患此症此方收效傳方用

杏人　鉄盾　夜明沙　朴硝　枸杞根

右等分為末入猪子油內煎三兩滴去滓用油搽南方少得柏子油以老節有油者代之亦可并治疥瘡諸惡瘡

東垣同此方本云以甲拳子根為枸杞根等分晉以外有服藥法

蒼朮二兩　白芷一兩　天麻一兩　白蛇　遠志肉

全蝎　自然銅　羌活　北細辛　白朮

地龍　甘草　殭蚕　狗脊　青皮

辣皮　南木香　草烏　麻黃　苦參

藁本　當歸　荊芥　川芎　防風

黃芪　乳香　没藥　川山甲　川芎

人參　烏蛇　麝香　龍腦

右為末蜜丸如梧子大不拘時四十丸服茶酒任下

洗藥

蒼朮　防風　荊芥　細辛　川烏

苦參　麻黃　地骨皮　何首烏　百草霜

右剉散煎湯先熏後洗

苦參丸 治肺氣風熱發作遍身成瘡痒皮膚瘙癢痛不已大風瘡疥皆服之

苦參　香白芷　荊芥　蒼耳子

蔓荊子　香附子

右㕮咀於龍內蒸過三次為細末用猪脂十五兩略熬令成油入宿蒸餅五七個為丸如梧子大每服三二十丸

苦參毛一　治心

出黃水及大風手足爛有毛脫落一切風疾

苦參　荊芥

右末水糊為丸如梧子大每服三十丸好茶吞下或荊芥湯食後

一方有…若宜…荊芥大黃…

治癩

餌松脂服之○昔有人得病癩歷年醫不瘥家乃棄捐山穴中其人自恨不幸悲歎經月有仙人經穴見之哀之具問其詳其人知是異人叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅澤肌膚如玉仙人再過視之其人乞其方仙人曰此是松脂山中極多可錬服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜臥常見有光大如鏡者以問左右皆云不見久而漸大一室盡明如晝日又夜見面上有綵女二人長二三寸面體皆具但為小耳遊戲其口鼻之間如是且一年此女漸長大出在其側又常聞琴瑟之音欣然獨笑在人間三百許年色如少童乃入抱犢山去必為地仙也

治大風及諸惡瘡

以蛇肉酒煮服之○昔宣城問山人取蝮蛇一枚舌書器中以醇酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡疥癬皮膚頑痹半身枯死皮膚手足臟腑間重疾并主之不過服一升已來當愈

力亦有小毒不可頓服

治風癩 以胡麻合蒼耳子為散服之

治水癩偏大上下不定疼痛

以牡蠣不限多少盛瓦罐內火三斤煅令火盡冷取二兩乾薑二兩炮又為細末用冷水調稀搽于病處小便大利即愈

治大風

擇香明咀朮人又止

三長

參青香可受無毒服之延人消腑胃去毒利損服不可日毛髮復生

頭鏡如故今并代聞士人多以長松雜甘草乾山藥為湯煎服甚佳

然本草及諸方書皆無載故詳悉於此作長松傳始采之

治大風身癢

用蛇床子煎湯洗之差

治肺毒瘡如大風疾

用桑葉 右一味先蒸熟搗一兩為後日乾為末水調二錢匕服

治癘瘍及癩疾

用苦參五斤剉以好酒三斗漬三十日每飲一合今日二服常服不絕

若覺痺即瘥或取根為末服之亦良

治癩

用乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差也

○白癩

夫白癩之候語聲嘶嗄目視不明四肢頑痹支節火燃心裏懊熱手脚俱緩背膂

[illegible]

作背拘急肉如刀劈手足項頸身體熱疼身生息肉目生白珠當

如針刺或生瘡疹而色斑白故謂之白癩也

方

烏蛇散 出聖惠方 治白癩語聲嘶嗄四肢頑痺生瘡

烏蛇 [illegible] 一兩　苦參　沙參

人參　芎藭　天麻　黃芩　木通

地骨皮　防風 去蘆　防己　蒼耳葉　白朮

萆薢　木蘭皮　黃連 去鬚　附子 炮裂去皮臍　烏頭 炮裂去皮臍

牛膝 去苗　獨活　熟乾地黃　藁本　芍藥

桂 去皮　玄參　龍骨　石膏　升麻

菊花　蒺藜子　秦艽 去苗　細辛　天雄

當歸　甘草　遠志 去心　巴戟天　蒼耳

吳茱萸　麝香 研

右為細散每服二錢匕空腹溫酒調下漸加至三錢匕晚時再服

蛇蛻頭丸 [illegible] 出聖濟總錄 治白癩 [illegible]

鱉甲丸 出聖濟總錄 治白癩

鱉甲 [illegible]　蚺蛇 [illegible]　貓頭骨 [illegible]　京墨 [illegible]

水蛭　蜘蛛　附子　蜈蚣 [illegible]　蛤蚧 [illegible]

蟾蜍 [illegible]　雷丸　水銀　消石

川大黃　桂心　川芎　射罔　滑石

龍骨　蝟皮灰　藁本 [illegible]　白膏 [illegible]　巴豆 [illegible]

川椒 [illegible]

右十三味搗研為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫水下兩丸

以白花蛇散 [illegible] 治白癩 [illegible] 目視不明四肢頑痺關節熱痛

身體瘡疥 [illegible]

白花蛇 [illegible]　天麻

防風 [illegible]　晚蠶沙 [illegible]　[illegible]　槐子 [illegible]　羌活 [illegible]

枳殼 [illegible]　甘草 [illegible]　白鮮皮　威靈仙

右為細散每服一錢匕溫酒調下不計時候

苦參酒 [illegible] 治偏身白點瘡之骨節或痒或痛白色漸展甚

[illegible]

呼白癩

以苦參 [illegible]　露蜂房 [illegible]　蝟皮 [illegible]

右用水六斗煮取三斗去滓浸細麴四斤釀秫米三斗如

常法用釀成每飲三合至五合日二夜一以瘥為度一方無蝟皮

天麻煎 [illegible] 治白癩風

天麻 [illegible]　天蓼木 [illegible] 三斤

右剉如大豆粒用水三斗五升煎至一斗壓去滓於銀器石器中

慢火煎如餳每服半匙荆芥薄荷酒調下不拘時日二夜一

一月見效

治白癩塗方 出聖惠方

蝟上厚長 [illegible]

乾蛇蛻 [illegible]

右將羅生絹袋盛以酒五升浸於瓶中慢火煨煮酒及一半以下將綿

裹藥滓汁摩塗癩上日二夜一如不差常日夜可五七次塗之

商陸酒 出聖惠方 治白癩大風眉鬢墮落入風十三痒前服捐身癩

節錄[illegible]手足攣癬[illegible]

艾葉酒 [illegible] 治白癩亦治大風癩

用乾艾葉濃煮取汁，每一斗米麴用艾葉五兩，重陸麴米多少

用煎濃汁拌浸麴如常法，酒熟，不拘時，隨能飲之，常令酒氣相續[illegible]

治白癩 [illegible]

用烏蛇 [illegible] 不限多少 [illegible]

治白癩

以大蝮蛇一條，勿令傷，以酒漬之，大者一斗，小者五升，以糠火溫令稍熱，取蛇一寸許，以臘月豬脂和傅上，取蛇一條及他蛇亦得[illegible]

其上當有虫出[illegible]馬尾出，仍取蛇肉塞鼻孔中

烏癩論

夫烏癩初覺皮膚中或具不仁，肢之間[illegible]如蟲行動，眼前見物如

絲懸，布時發黑[illegible]言語[illegible]皮肉[illegible]手足頑痹

不知痛癢，或腳下痛不可踐地，凡食之時開口取氣而嗚語亦如[illegible]

身體生瘡[illegible]如[illegible]名黑癩，皆由惡風日漸傷損，血氣不榮

[illegible]也

方

蝟皮丸 [illegible] 治烏癩

蝟皮 [illegible] 海蛤 [illegible]

[illegible]

右件藥[illegible]研同拌細令勻，鍊蜜丸梧桐子大，每服[illegible]下一丸至二丸，

空心臨臥各一服，不[illegible]如一丸小便時[illegible]中[illegible]是蟲，已作如[illegible]不出癩

多[illegible]止[illegible]痛少[illegible]如[illegible]九一方治白癩，有硝石[illegible]日見下

硫黃散 [illegible] 方 [illegible] 治[illegible]癩瘡久不瘥

雄黃　水浮石　枳殼　寒水石　白礬

不灰木　蛇牀子　牡蠣　金星礬石　銀星礬石

蟬殼　[illegible]礬石　密陀僧　馬牙硝　麝香

雄黃　亂髮灰　蜂窠灰　雌黃

右件藥各一錢，惟白礬五錢，搗研爲末，用水銀半兩以津唾殺研如泥，別

入膩粉一分，以生麻油四兩都調令勻，每於患處揩塗之効

大黑神膏方 [illegible] 治烏癩及諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏頭　苦參　雄黃　胡粉　川升麻

木防己　[illegible]　黃連　白礬　藜蘆

黃蘗　巴豆　杏人　松脂　亂髮

右細剉如大豆粒，以豬脂二斤并藥[illegible]以[illegible]有[illegible]去滓，後入

雄黃胡粉[illegible]攪令勻，收於瓷合中，每取塗於瘡上，一日至夜三

度塗之，每度以熱鹽湯先洗，然後更塗之，切令入口眼

雄黃塗[illegible]方 [illegible] 治烏癩皮膚變黑生瘡腫痛膿[illegible]

雄黃　白礬　[illegible]石英　白石英　馬牙硝

太陰玄精石　金星礬石　銀星礬石 各一[illegible]

右[illegible]用白[illegible]然後用炭火五斤燒令通赤，即止

以蓋[illegible]候冷取出於濕地上[illegible]出火毒三日後研

如粉[illegible]汁[illegible]每日用塗之，以瘥爲止

[illegible]浴方 [illegible] 治烏癩

蒴藋浴方 [illegible] 治烏癩

蒴藋草 [illegible]　益母草 [illegible]

右蒴藋取[illegible]上者[illegible]用水二石五斗，煮取一石五斗

去滓[illegible]浸浴一時辰[illegible]

[illegible]被衣覆之[illegible]汗出[illegible]

風，明日復作，如入湯後[illegible]不可[illegible]令傍人扶手[illegible]

食頃[illegible]定後[illegible]日一浴，其藥水[illegible]浴兩次即棄之

馬先蒿散 [illegible] 治烏癩 [illegible]

苦參散 [illegible] 治烏癩浸酒方

用苦參[illegible]五斤細剉如麻豆，生絹袋盛，好酒三斗，浸七日，夏[illegible]

浸四日每溫飲二合至三合日三夜一漸加至五六合

雄黃散塗方 治烏癩及殺蟲

雄黃半兩研以米醋和雞子清如膏塗瘡上乾即更塗 聖惠方用雞子黃

大腹子膏塗方 治白癩

用大腹生者 [illegible] 用皮全者勿令傷動以酒一升浸經火煖令 [illegible] 乾 [illegible] 用豬膏調和如膏傅之

烏頭丸 治 [illegible] 癩遍身黑色肌體如木皮膚麤澀

瘲麻痺

淨烏頭一斤入竹籮內以水浸 [illegible] 如打 [illegible] 法去 [illegible] 乾用麻油四兩鹽四兩入鍋內同炒黃色 [illegible] 去油只留鹽 [illegible] 烏頭 [illegible] 黑色 [illegible] 出為度取一枚劈破心內如米一點白者 [illegible] 為末用醋糊丸如梧桐子大乾之每服三十丸空心食前溫酒下

大風眉鬢墮落

論

夫大風病眉鬢墮落者皆 [illegible] 冷 [illegible] 汗出入水得之或冷水入腠體得之或飲酒臥濕地得之或當風坐臥樹下及濕草上得之或體癢癩之漸漸生瘡經年不瘥即為風疾八方之風皆能為 [illegible] 病久而不去與血氣相干則使榮衛不利淫邪散溢故面色敗皮膚傷鼻柱壞鬚眉落也

方

白蒺藜散 治大風惡疾或二年三年眉鬢墮落手足瘡 [illegible] 身體面色黑皮膚漸破

白蒺藜 芎藭 山梔子 防風

草薢 羌活 白芷 升麻 白茯苓

細辛 [illegible] 當歸 麻黃

龍骨 [illegible] 芍藥 白术

附子 甘草 桔梗

右為細散每服溫酒調下一錢匕至二錢匕空心午時臨臥各一服如口乾舌澀 [illegible] 中 [illegible] 痛是住病也甚即煎少許 [illegible]

[illegible] 參散 治大風病 [illegible] 眉髮墮落熱毒風入五臟身體頭面生瘡

枳殼 苦參 白术 胡麻

白蒺藜 防風 升麻 梔子仁 [illegible] 蘆

黃連 人參 天門冬 防己 乾薑

芎藭 丹參 麻黃 白芷

甘草 當歸 玄參 烏蛇

右為散溫酒調下二錢匕加至三錢匕空心夜臥服

防己散 治大風癩眉鬢墮落及身面瘡痒腫中噤甚者身上癮疹起如麻豆 [illegible] 生瘡

防己 烏蛇 獨活

黃芩 丹參 烏頭 [illegible] 人參

苦參 白术 桂 芍藥 羌活

黃連 蔓荊子 白茯苓 天門冬 [illegible]

乾薑 蜀椒 玄參

右為細散每服 [illegible] 食前夜臥溫酒調下二錢匕漸加至三錢

漏蘆湯 治大風癩身體成瘡瘍眉鬢墮落瘡痛痒搔之黃水出者

漏蘆 烏蛇 獨活 黃耆 白斂

白茯苓 大黃 升麻

麻黃 枳實 芍藥 防己

玄參 甘草 附子 梔子仁

石膏

右剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓溫服要利空心晚食前各一服

白花蛇散 治大風疾鬚眉墮落皮肉已爛成瘡者

白花蛇 烏蛇 乾蝎 白殭蠶

地龍 雄黃 蜈蚣 [illegible]

蟬殼 丹砂 [illegible] 胡蜂 龍腦

右為散每服一錢匕温齏水調下日三五服

側子丸 治大風癩眉鬚墮落身上有瘡手足頑痺痒痛

鼻梁崩壞

側子 [illegible] 白芷 [illegible] 附子 天麻

龍骨 防風 [illegible] 蓮花蕊 白蒺藜

白朮 人參 山茱 生乾地黄 當歸

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心温酒下二十丸日再服漸加至五十

丸覺舌微痺為効漸減之

皂莢丸 治大風眉鬚墮落者

大皂角 [illegible] 羌活 木香

萆薢 [illegible] 白蒺藜 何首烏

獨活 [illegible] 青橘皮

右十一味為末入皂莢膏煉和勻搗杵丸如梧桐子大空心乾薑湯生

薑湯下二十丸加至三十丸病甚者稍增之

山梔子散 治大風疾眉鬚墮落鼻崩手足攣縮

山梔子 黄芩 藁本 當歸

荊芥穗 桔梗 羌活 白蒺藜

側子 天麻 白茯苓

防風

右為散每日空腹温酒調下二錢匕加至一錢去夜臥時再服服至

一料眉鬚再生

莽草散 治十年大風毛髮先落癮瘮膚生瘡冷麻不過撥癢不

痛痒

莽草 附子 乾薑 石根

躑躅花 白歛 川烏頭 天雄

石南 桂心 細辛 川椒

右為細散每服以温酒調下三錢後以手摩下藥日再服勿大飽食

羚羊角飲 治大風癩身上生瘡汁出面部腫眉鬚墮落肌膚瘰

痒

羚羊角 甘草 梔子 山梔子 丹參

防風 茵芋 蔓荊子

玄參 木通

右件搗篩每服五錢匕以水一盞煎取七分去滓温服每日早食後

及夜臥各一服

雷圓散 治大風疾神仙方其風有五種隶五行金木水火土黒

蟲者是業報之病不可治也餘四種蟲但服此藥無不瘥者此方為杳

人之法非凡俗所解凡青黄赤白黒蟲在人骨髓之中往來血脈若蝕

人肝則眉鬚先墮若蝕人肺鼻柱崩折不聞香臭若蝕人脾語聲變

散若蝕人腎則耳鳴啾啾亦無病故不言之若蝕人筋肢節墮落若蝕

人肌則頑痺不知痛痒身上似有蟲行或有疱腫起似桃李小棗或多

生瘡瘢或狀如魚鱗或赤如芙蓉青黒變易不定從頭起者名曰

順從足起者名曰逆風起之由皆因冷熱交通流於五臟入於骨髓

氣血内虚因此生蟲又因房勞過度飲酒後行房汗入

皆因市患斯疾若治者先服此散出蟲為驗見青黄赤白便可治

之若得黑蟲者此病無方對治也

隋落可服

雷圓 消石 朱砂 阿魏

雄黄 雌黄 藜蘆 犀角 紫石英

芫青

右為細散又用苦參五兩紫石四兩搗碎以生絹袋盛入瓷瓶中以

無灰酒一斗浸七日密封頭每取一中盞暖過於食前調

下散二錢

補血散 治

當歸 川芎 白芍藥 地黄

連翹 防風 川椒 小茴香 赤芍藥 皂角

右為細末酒糊為丸如桐子大每服三五十丸煎蘇木薄荷湯不

拘時下

蘇木煎丸 治大風

蘇枋木 附子 烏頭

大麻 乾蝎 草烏頭

乳香研 沒藥研 [illegible]

右除蘇枋木外搗羅為末，以蘇枋木酒和藥末為丸如黑豆大，每

服五丸至七丸，用[illegible]湯下，衣被蓋出汗。婦人用紅花酒下。

乳香丸 治大風[illegible]

乳香 人參 紫參 沙參 玄參

苦參 天麻 菊花 枳殼

右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，食後[illegible]二十丸，日[illegible]從一百日內[illegible]

十日內兩鼻中出血是驗也

治大風眉鬢已落，鄰令再生方

烏麻油一升 丁香一兩 生薑汁 鼓生末 附子

木香 訶黎勒皮 [illegible] 羊[illegible]

右為細散，入油及生薑汁中，以不津器盛，於馬糞中埋二七日，取出

塗藥，法以中指點於生處，每日內摩三七下，即盡生髮，熟搽之，以

乾為度，十五日內眉鬢皆生

何首烏丸 治風疾，鬚眉墮落，多生瘡癬

何首烏 [illegible]

肥皂莢 [illegible] 白蒺藜 乾薑 [illegible]

右搗羅三味為末，用皂莢膏和劑，候膏盡為度，搗丸如梧

桐子大，每服十五丸加至二十九丸，不計時候，溫酒下，日三服

得効方 治大風頭面髭鬢脫落 [illegible]

青鹽散 治大風夜眉鬢脫落，[illegible]頭禪

青鹽 白礬 鹵鹼

右為[illegible]更研令[illegible]入[illegible]子內[illegible]頭[illegible]用炭火[illegible]

燒鐵斫[illegible]火[illegible]

度隔宿[illegible]

中心諸藥[illegible]

憑甲[illegible]香熟搗羅為末，每三兩[illegible]麻末[illegible]兩，曉者[illegible]相

和令勻，每服用荊芥湯下二錢，空心及晚食前服，其効不可具述

連麻法 治大風疾，眉毛脫落 [illegible]

台烏 金[illegible]

苦參 [illegible] 羊蹄根 [illegible]

右為末，生薑自然汁調塗

一聖散 治眉髮自落[illegible]

松葉浸酒方 治大風疾

猪鬃 松葉 麻黃

右細剉，以生絹袋盛，以酒一斗浸，秋冬七日，春夏五日，滿開取，每

服溫一小盞，服常令醺醺，以效為度

側柏丸 治大風疾，令生眉髮

用側柏葉不計多少，九蒸九曝，搗羅為末，煉蜜和丸如梧桐子大，空心

食前夜臥各一服，熟水下，五十九百日毛生

治大風頭面髭鬢脫落

用[illegible]灰[illegible]

烏龍丸 治大風癩疾，骨肉疽敗，百節疼酸，眉鬢墮落，身體瘡痒

以烏[illegible]為細[illegible]為末，每空心及晚食前溫酒調下二錢七。一方治

烏癩，荊芥薄荷湯下。一方治癩，用酒服。一名馬軒蒿，石楠石草

百藥散方 治大風疾

用百藥[illegible]四兩，以水一斗，煎至二升，滓入粗末四合，煮作[illegible]於溫室中

澡浴了服之，衣覆取汗，汗後皮膚風退，[illegible]每隔一日一服，五

六十日後[illegible]即生

治大風瘡未出眉毛落方

生漆 [illegible] 生地黃 [illegible]

已上二味相和，入於銀鍋中，以重湯煮，用柳木篦攪，候成膏，用和後

藥

烏蛇 [illegible] 白附子 [illegible] 雄黃 [illegible]

右為末，更都研令勻，以前膏和丸如梧桐子大，每夜後以溫酒下七

丸，汗出為度

石灰酒 主生毛髮眉鬚，去大風

石灰　上麴　松脂　秦艽

右先以大鍋內炒石灰以木札看灰中大熱爲度以枸杞根剉五斗
水一石五升煑取九斗去滓以淋石灰三遍澄清以石灰汁和漬麴
用多少一如釀酒法日開服常令酒氣相及爲度百無
所忌不得觸風其米食及飲膳得使酒大隨飲食之皆
令盡治部此方九月後二月止恐熱服後退三五日合飯
壓之婦人不能飲食黃瘦積年及蓐風不過一石即瘥其松脂末凡
餟飯用酒散時拌散並飲之待飲令乃後之此酒飲盡令不醉即醒
宜知之一方用餡餅

崔氏陸塘酒方　治大風腎氣腰脊頑痺脫脈不利

烏金丸　治大風疾肩背頭面鼻柱崩倒語音不利

坯子　櫸脂　朱砂　人參　麝香
羊蹄根　青竹茹　烏頭　甘草　細辛
明礬　草烏頭

右件爲細末酒煑糊爲丸每兩作十九丸每服一丸細嚼茶清下

不拘食前食後一方有麥當…

病輕作坊宜汞戒

大風論

夫蟲動物也皆風之所化風入五臟化生五蟲則成五癩入肝其蟲青
入心其蟲赤入脾其蟲黃入肺其蟲白入腎其蟲黑四蟲皆可治惟黑
蟲爲難療或所傷者深身者亦之亦有瘥者

方

雄黃散　治大風病於瘡內服風毒凝積諸病蟲

雄黃　白礬　紫石英　白石英　禹餘糧
太陰玄精石　金星石　銀星石

以上同搗研爲細末入瓷盒中用白土於油見同黃火燒通赤以瓦
蓋日取出於地上用紙襯出合出火毒服時

零陵　寒水石　陽起石　紅膩石　密陀僧

不灰木　硫黃　石灰　定州細瓷末
銀霜　鉛丹　青鹽　亂髮灰　水銀
膩粉

右同研令細以不見水銀星子爲度每以生麻油調塗患上有風毒
處癩出爲度不過一月效

烏蛇丸　治風癩殺五蟲

胡麻子　烏蛇　乾蟾　苦參　檳榔
獨活　天人　白蒺藜　雄黃　皂莢刺
黃蓍　蕪荑　雷丸　硫黃
朱砂　蝦蟆

右細末以長皂角十條水三升挼取濃汁去滓煎成膏和藥末丸如
梧子每三十丸空心温酒下

獨活散　治大風癩出五蟲

獨活　雄黃　青黛　麻黃
水銀　阿魏　雷丸
丹砂　滑石　石膽　牛黃　紫石英
麝香　空青

右爲細散每服一錢匕空心温酒調下不得飽食晚更服當有蟲從小便
中出或當日或三四日至十日方出若瀉出赤蟲如爛櫻桃或如豆
黃或瀉出黃蟲似黃茶青蟲似青茶汁白蟲似馬尾蟲過藥氣
即死或隨大便下惟黑蟲如豆豉汁此爲難治

朱砂散　治大風肌膚不仁頭面身上瘡頗多眉髮脫肉生蟲鼻
柱崩倒

朱砂　紫檀　漏蘆　雄黃　白斂
紫石英　犀角屑　龍骨　石膏
雄黃　石膽　阿魏　牛黃
消石

右爲細散入石藥末更同研令勻每食前以溫酒調下一錢如飢即
宜喫飯及粟爲食勿令過飽飯即其蟲難出服藥後小便似淋
即以盆子盛看當有蟲出或當日便出或三五日方出者或蟲出即

且服藥候蟲盡便瘥

阿魏雷丸散 治大風疾五臟生蟲五種者各隨五臟之色惟黑蟲爲難治當先服藥出蟲以驗其色

阿魏 雷丸 雄黃 丹砂 滑石

石膽 硝石 白斂 犀角 牛黃

斑猫 紫石英 芫青

右爲散每服一錢匕空腹温酒調下須臾即食一豆羹飯爲良慎勿多食但半飽即止常宜覺飢若食飽蟲出遲也日晡腹空時更服一錢若覺小便似淋痛不問早晚即更服一錢大飢即食若覺欲小便似痛盆即就一覺器中承尿出有之其蟲或如烟脂狀各逐其臟顏色色也

熏雄方 治大風癩熏出蟲

艾葉 硫黃 水銀 膩粉 硫黃

丹砂 阿魏 麝香 雄黃

右除艾葉皂莢外同搗爲末外生合細研用紙四張先布艾次摻皂莢末又次摻諸藥末卷刀切如餅餃著枕內燒以小木以瓶四邊塗於上熏以衣覆遍身定不令透出氣汗出即蟲出

黑虎丹 治大風諸癩惡蟲內蝕形骸變壞

天靈蓋 蟾酥 生人中白 桃仁

麝香 雄黃 穿山甲 皂莢刺

輕粉

右爲末煉蜜丸梧子大每三十丸月首五更米飲連日服取蟲盡則愈

療蟲通用

黑虎丸 治大風癩疾下痢蟲及骨痿肢手足堕

天靈蓋 蜈蚣 麝香

桃仁 雄黃 人中白 杏仁

右爲末再研勻煉蜜爲丸如梧桐子大空心日午用蕪荑湯下二十丸至三十丸以蟲盡爲效

雷丸散 治風癩殺蟲

水銀 雄黃 麝香

雷丸 阿魏 貫衆

右研極細每服一錢天明温酒調下此日又服一方無貫衆有萆薢

通神散 治大風癩疾凡是諸惡毒瘡服之蟲出無不愈者

黃長石 殺蟲風藥

用明淨雄黃乳鉢研細空心酒如

煎或合大風油

礬石丸 治大風疾取五色蟲

金星石 銀星石 雲母石 禹餘糧石

自然銅 磁石 生乾地黃 龍仙石

陽起石 密陀僧 寒水石 滑石

右件研以瓶子盛用炭火十斤煅以火盡爲度取出研爲末煮粳米飯爲丸如小豆大每服十五丸用溫藥下

茯苓散

白茯苓 人參 天麻苗 木香 枸杞根

獨活 天麻 芎藭 羌活 景天

青箱子 海桐皮

右各等用爲散每服二錢匕白花蛇酒調下前丸藥日三服忌雞豬

五仙洛湯 治淋洗大風每氣殺五蟲斂瘡口

桃黃 何首烏 苦參 荊芥 朴硝

右件爲麄末用水五升先浸藥三日次煎數十沸用如浴湯法其淋天時常浴湯澡重無人處却熱斜衣服著初易房宜

瘡者以槐花爲末乾摻瘡口其瘡自然長肉

論 白虎風

夫白虎風之狀或在骨節或在四肢其肉色不變晝靜而夜發則痛微

骨髓或妄言妄有所見者是也蓋由風氣留滯之毒乘虛而襲搏在經脈留於血氣蓄聚不散遇陽氣虛弱於陰處目痛如虎嚙故以虎名焉口痛如掣者為寒多脛滿如脹者為濕多汗出者為風多巢氏云飲酒當風汗出入水遂成此疾久而不愈令人骨節蹉跌為癲病者誠有此理也

方

虎骨散 治白虎風走注疼痛發歇不定積年不効者

虎骨　烏梅肉　赤茯苓　白茯苓　人參

鱉甲　甘草　芎藭　當歸　前胡

白术　秦艽　黃耆　常山

枳殼　羚羊角　知母　升麻　柴胡

桔梗　天靈蓋　桂　木香　桃仁

右為散每服溫酒調下二錢匕空心食前各一服若為丸即煉蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸至三十丸

酸棗仁散 治白虎風腰腳疼痛不可忍

酸棗仁　敗龜　虎骨　羌活

防風　芎藭　桂　白芷　當歸

牛膝　附子　枳殼

右為散每服溫酒調下二錢匕空心夜臥各一服

酸棗仁散 治白虎風痛徹骨髓靜夜發

酸棗仁　敗龜　虎脛骨　枳殼

羌活　牛膝　桂心　附子

補骨脂　地龍　當歸　沒藥

赤芍藥

右擣羅為散每服不計時候以溫酒調下一錢

白頭翁煎 治白虎風四肢疼痛至夜轉甚不可忍者

白頭翁　牛膝　桂心　羌活

赤芍藥　赤茯苓　附子　防風　虎脛骨

代赭　牡丹　人參　酥　生薑汁

當歸

右細擣羅為散用好酒五升銀石器內熬如餳每服不計時候溫酒調下一茶匙服藥後仍須火燒沙熨之為效

雄黃散方 治白虎風疼痛走轉不定

雄黃　莽草　斑蝥　赤小豆

白礬　蕪荑　皂莢　地膽子　巴豆　吳茱萸

硫黃　附子

右擣細羅為散都研令勻每用散一錢以生油調塗于痛處

虎骨散 治白虎風疼痛走注不定

虎骨　地龍　牛膝　硇砂　沒藥

芎藭　當歸　麝香　鄉踯躅

杜　延胡索　乳香

右為散拌勻每服一錢匕溫酒入少童子小便調下

虎骨散 治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨　花蛇　天麻　防風　乳香

牛膝　白附子　川芎　當歸　桂心　甘草

右為細末每服二錢溫酒調服或用豆淋酒調服亦可不拘時候

虎杖散 治白虎風血脈結滯骨髓疼痛發作無時

虎杖　桂心　當歸　赤芍藥　天雄

桃仁　芎藭　枳實　羌活

防風　秦艽　木香

右擣篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

虎骨丸 治白虎風骨中疼痛不可忍入夜即甚走注不定

沉香　虎骨　檳榔　生乾地黃

當歸　芎藭　白芷　鬼箭羽　芍藥

地龍　羌活

右麤擣篩每服六錢匕水一盞酒一盞桃枝七寸蔥白二四莖同煎至一盞去滓溫服空心午時各一疾甚即夜食二服

羌活散 治風寒暑濕氣攻於筋脈或在骨節或四肢名曰虎骨

羌活　附子　天麻　防風　牛膝

牽藥子 芎藭 烏頭 乾蝎 白附子

麻黃

右爲散每服一錢匕溫酒調下日再服半錢匕三日後漸加

羌活散 治白虎風毒攻注骨髓疼痛發作不定

羌活 附子 桂心 木香

芎藭 當歸 秦艽 附子 骨碎補

桃人

右搗羅爲散每服三錢水一盞入生薑半分同煎至五分去滓不計

時候稍熱服

虎骨散 治白虎風走疰疼痛發歇不可忍

虎脛骨 乾蝎 白花蛇 當歸 龍骨

防風 附子 桂心 天麻 羌活

麝香 白殭蠶

右搗羅爲散研令勻每服不計時候以豆淋酒調下二錢

沒藥散 治白虎風疰走注筋骨疼痛

沒藥 羌活 虎脛骨 晚蠶沙

芎藭 防風 萆薢 當歸 赤芍藥

桂心

右搗羅爲散每服不計時候以熱酒調下二錢

羌活湯 治白虎風骨節如裂

羌活 防風 秦艽 芎藭 當歸

大腹 桃人

附子

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍破煎至一盞去滓

溫服日二夜一

廣濟療白虎方

犀角 當歸 芍藥 牛膝 沉香

青木香 虎頭骨 豬肉 麝香

右㕮咀以水六升煮取二升六合去滓分溫三服如人行四五里進一服別加

麝香末服之不利 忌生菜熱麪蒜

乾蝎散 治白虎風疼痛遊走無定

地龍 桂 白芷

蒺藜 漏蘆 芎藭 當歸 白殭蠶

右爲散每服熱酒調下一二錢匕日三夜一

烏頭散 治白虎風走注疼痛

烏頭 地龍 羌活 虎骨 延胡索

當歸 沒藥 防風

右搗羅爲散每服一錢匕入溫酒調下空心食前日二服

麝香丸 治白虎風不計日夜走注夜加疼痛走轉不定不可忍

麝香 朱砂 白附子

羌活 斑猫 地龍 狼毒

右搗羅爲末以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下五丸

牛膝散 治白虎風疼痛難忍

牛膝 當歸 虎骨 赤芍藥 芒硝

芎藭 桃人

右爲散每服空心用溫酒調下一錢至二錢匕

七聖散 治白虎風晝靜夜發痛徹骨髓狂言妄見

防風 羌活 桂 地骨皮 芎藭

細辛 虎骨

右等分搗羅細散每服一錢匕溫酒調下

赤芍藥散 治白虎風筋骨疼痛至夜加甚四肢斷墮

赤芍藥 羌活 仙靈脾 虎頭骨

天雄 芎藭 桂心

右搗羅爲散每服不計時候以葱白湯調下二錢

麝香散 治白虎風骨節疼痛不可忍者

麝香 沒藥 乳香 虎牙

天麻 蜈蚣

右爲細散和勻每服二錢匕溫酒調下不拘時日二三服

皂莢散傅之方 治白虎風疼痛

皂莢 放生蒿 麥 白蘞 五靈脂

薑臺子各半兩

右爲細末爲散用[illegible]醋調之[illegible]

麝香[illegible]學之方 治白虎風寒熱發歇骨節微腫微骨疼痛

烏頭 伏龍肝 [illegible] 麻黃 [illegible]

[illegible]

右搗細羅爲散後入研藥末等和令勻每服不計時候以熱酒及水和

如雞子大於痛處貼之痛止即取藥相於熱酒[illegible]中

麝香[illegible]散 治白虎風走疰疼痛

[illegible] 白殭蠶 [illegible] 地龍 [illegible]

右爲散先用乾蒲一斤炙熱[illegible]令病人所苦處當痛處不得令知

其夜痛甚難治痛[illegible]即[illegible]日後[illegible]人[illegible]取蒲看[illegible]色

訖每服用散三錢匕[illegible]每服以[illegible]溫酒[illegible]調下空心服

藥後更喫酒令醉汗出瘥[illegible]

白殭蠶散 治白虎風痛不可忍

白殭蠶 [illegible] 腦子 甘草 [illegible]

[illegible] 一兩 [illegible] 地龍 [illegible]

右爲散每發時空心服兩錢匕午後服一錢匕[illegible]服兩錢匕並用

熱酒調下 又先取蚯蚓[illegible]兩[illegible]子中[illegible]水[illegible]兩[illegible]

上丈令熱服第一服[illegible]取汗[illegible]後用熱[illegible]

服溫酒調下二錢不拘時

阿魏散 治白虎風身體疼痛不可忍轉動不得

阿魏 乳香 [illegible] 木香 [illegible] 地龍 [illegible]

右爲散分二服空心夜食後並用熱酒調下服藥後更喫熱豆淋酒

投之[illegible]以衣被覆取微汗通體當瘥 一方不用[illegible]

麝香散 治白虎風疼痛晝靜夜發

麝香 [illegible] 甘草 [illegible] 乳香 [illegible]

右同研令勻分二服每服用[illegible]酒一盞[illegible]調下不計時

虎骨散 治白虎風走注疼痛不定

虎脛骨 [illegible] 羌活 [illegible] 附子 [illegible] 地龍 [illegible]

右爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時候 一方無附子有防風

附子散 治白虎風走疰疼痛

附子 [illegible] 虎脛骨 [illegible] 桂 [illegible]

右爲散每服溫酒調一錢至二錢匕空心午時各一服

療白虎風痛走不定無問老少[illegible]方

炭灰 [illegible] 紅藍花 [illegible]

右一處搗和令熱取[illegible]痛處[illegible]之[illegible]以故布三四重裹分作

四分更互當痛處熨數數換勿住手換之令熱得所[illegible]

[illegible]

[illegible]皮[illegible]毛出白[illegible]皮白毛出[illegible]皮[illegible]毛出[illegible]心出吾

心神吾口聖吾山山崩[illegible]石石裂[illegible]不去[illegible]頭[illegible]急急如

律令 其呪法先令人坐痛處以手[illegible]之不住手便即誦呪不[illegible]

然以瘥即停[illegible]誦呪不得令病人及傍人聞呪[illegible]

療白虎方

豬肉 [illegible] 大麻子 [illegible]

右和麻子口含呪上將豬肉三串手[illegible]痛處來去呪曰相州張

[illegible]

如意張[illegible]足[illegible]虎[illegible]師急出呪訖將安床下差送[illegible]頭[illegible]

防風散 治白虎風走疰疼痛兩膝熱腫

防風 [illegible] 白頭翁 [illegible] 沒藥 [illegible]

右搗細羅爲散每服不計時候以溫酒調下二錢

虎骨散 治白虎風走注疼痛兩膝熱腫

虎脛骨 [illegible] 附子 [illegible]

右各一兩爲末每服溫酒調下二錢匕日再服

治白虎風走轉疼痛兩膝熱腫 [illegible]

麒麟竭 [illegible] 硇砂 [illegible]

右搗細羅爲散研令勻每服不計時候以溫酒調服一錢

薰藥方 治白虎風疼痛徹骨不可忍

精豬肉 [illegible] 安息香 [illegible]

右將肉裹香用一瓶[illegible]內著灰火火上著一銅片子隔之即安香

於上燒之以瓶子口就痛處薰之以衣遮蓋勿令透氣二兩上瘥

[illegible]散 [illegible] 治白虎風骨髓疼痛坐臥不得

用虎脛骨不計多少打破用酒浸飲亦治之全嬰烏馬散每服半錢
薄荷湯調下一錢匕人參木香散一錢匕前方[illegible]
烏蛇浸酒方[illegible]白虎風朝野僉載商州有人患大風家人惡之
山中爲茅屋遇有烏蛇墮酒罌中病人不知飲酒漸差罌底
尚有蛇骨方知其由
取烏蛇一條先刮去[illegible]一七日後每日飲一盞空腹
如聖散[illegible]取烏蛇[illegible]下一錢匕
獨勝散治風毒腫白虎病方[illegible]
治患白虎風
用鐵釘於患處使血滴熱灸之或燒[illegible]又取熱蜜塗之
於患人牀下一方用蚌殼[illegible]當之
治白虎風所患不以[illegible]痛不可忍者[illegible]
用蛤蚧不限多少細剉炒[illegible]令之[illegible]
右爲細末上者方法用其葉[illegible]
治痛當節鬼痛[illegible]
[illegible]
治白虎病
用雄雞子二個病處咒[illegible]不過三度即差[illegible]

○歷節風

夫歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁瘰其腫如脫漸
至摧落其痛如掣不能屈伸蓋由飲酒當風汗出入水或體虛膚空
受寒濕之邪偏歷關節與血氣相搏而有斯疾也其痛如掣
者爲寒多其腫如脫者爲濕多肢節間黃汗出者爲風多遊走
不定掣痛晝靜夜劇如蟲嚙者謂之白虎歷節治法當以溫藥解其
風寒濕之毒或用和平則獨活寄生湯等可也其白虎歷節遊走疼痛
實爲之說夫脾主肌肉盡則爲痰痰過而飲食[illegible]
飲其弱不至於顛眩[illegible]
歷風貝當大作[illegible]
令人骨節蹉跌變成癱瘓病不可不知古今已來[illegible]
是風之毒害者也[illegible]若爾[illegible]

實不可忽辨者宜風諸湯[illegible]不治但於痛處灸三七壯佳
海桐皮散[illegible]治歷節走注骨節疼痛
獨活　萆薢　川芎　當歸　桃仁
天麻　肉桂　牛膝　麻黃　枳殼
海桐皮　白芍藥　川烏　松節　防風
杜仲　甘草　麝香　虎脛骨
右爲末每服二錢薑五片棗二枚食前煎服
川烏頭丸[illegible]治歷節風疼痛發歇不止
川烏頭[illegible]　白花蛇[illegible]
白僵蠶[illegible]　天南星[illegible]　麝香[illegible]　桂[illegible]
蝎梢[illegible]　天麻　當歸　天雄[illegible]　朱砂[illegible]
麻黃[illegible]　穿山甲[illegible]　獨活　乾蝎[illegible]
乳香[illegible]　芍藥　地龍[illegible]
右搗羅爲末入研了藥更研令細煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐
子大每服[illegible]溫酒下十五丸
[illegible]
[illegible]治歷節風骨節疼痛攣急掣頓
安息香　天麻[illegible]　地龍[illegible]　全蝎[illegible]
雄黃[illegible]　白附子[illegible]　麝香[illegible]　烏蛇[illegible]　天雄[illegible]
當歸　川烏[illegible]　川芎　南星[illegible]　官桂
虎脛骨[illegible]　川獨活二兩
右末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸食前溫酒下[illegible]方有敗龜
地骨皮[illegible]
威靈仁散[illegible]治歷節風疼痛
威靈仁[illegible]　敗龜[illegible]
虎脛骨[illegible]　秦艽[illegible]　防風[illegible]　羌活一兩
牛膝[illegible]　芍藥[illegible]　桂心[illegible]　骨碎補　茵芋
附子[illegible]　枳殼[illegible]　當歸[illegible]木香一兩
右搗羅爲散每服以溫酒調下二錢空心及晚食前服
虎骨丸[illegible]治歷節風疼痛

虎脛骨 硇砂

當歸 芎藭 防風 蓬莪术 桂心

赤芍藥 羌活 海桐皮 牛膝

乾蠍 附子

右搗羅為末，鍊蜜和搗三五百杵，丸如梧桐子大，每服食前以溫酒下二十丸。

鍋龍腦丸 治風寒客搏血氣，壅滯不通，歷節疼痛，甚者腰背汗出，肢節不得屈伸。

鍋龍腦 白蒺藜 芎藭 萆薢 天南星

白芷 甘草 乳香 麝香 羌活

自然銅 骨碎補 糯米

右為末，煮糯米粥為丸如梧桐子大，每服五丸至七丸，溫酒下，食後臨卧服。

茯神散 治歷節風手足疼痛，心神悶亂

茯神 防風 當歸 天雄 麻黃

羚羊角 芎藭 獨活 遠志 丹參

甘草 桂心

右搗篩為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，每於食前溫服。

萆薢散 治歷節風四肢疼痛不可忍

萆薢 黃防己 赤芍藥 松節 桂心

丹參 當歸 芎藭 五加皮 附子

牛膝 枳殼

右搗羅為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，食前溫服，忌生冷豬魚雞犬肉。

松脂散 治歷節風，百節疼痛，久不瘥

松脂

天雄 牛膝 羌活

白附子 桂心 當歸 乳香

右搗羅為散，入研藥令勻，每服食前以溫酒調下二錢。

虎骨散 治歷節風，手足疼痛不可忍

虎脛骨 海桐皮 麻黃 羌活

天麻 白蒺藜 桂心 天雄 道人頭

牛蒡子 仙靈脾 牛膝

右搗細羅為散，每於食前以豆淋酒調下二錢。

桂心散 治歷節風，四肢疼痛，筋脈不利

桂心 麻黃 海桐皮

黑豆 五加皮 防風 牛膝

道人頭 附子 松節

右件藥為散，每服食前以溫酒調下二錢。

羌活湯 治歷節風身體骨節疼痛，不可屈伸，手動不隨

羌活 桂心 芎藭 熟乾地黃 萆薢

甘草 防風 當歸 芎藭 麻黃

右搗篩，每服五錢，以水一盞半，酒半盞，入生薑三片，棗大切同煎至一盞，去滓溫服，空心日午夜臥各一。

茯苓湯 治歷節風手足不遂，言語錯亂

赤茯苓 防風 當歸 白蘞

乾薑 甘草 獨活 遠志 附子

人參

右剉如麻豆，每服先用水三盞，煮黑豆半合，棗二枚，研生薑半分，至一盞半，去滓，入藥末五錢，煎至一盞，去滓溫服，空心日午夜臥各一。

紫桂湯 治歷節風疼痛不可忍

桂 防己 赤茯苓 芍藥 人參

白朮 甘草 防風 烏頭

當歸

右剉如麻豆，每服三錢，以水一盞，酒少許，生薑半分，同煎至七分，去

滓溫服空心日午臨卧各一

烏頭丸 治兩脚疼痛不得屈伸

烏頭 茴香 硇砂 白芷

乾薑 芎藭 天麻 當歸 細辛

右為末鍊蜜丸如彈子大空心日午時臨卧茶酒任嚼下一丸

犀角湯 治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角二兩 羚羊角一兩 前胡 黃芩 梔子仁

射干各三 大黃 升麻各四 豉一升

右㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

桂心散 治歷節風疼痛不可忍四肢無力

桂心 丹參 牛膝 附子 當歸

赤芍藥 木香 草薢 麻黃

右搗篩為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓每於食前溫服忌生冷

赤芍藥散 治歷節風骨節疼痛四肢緩弱行立無力

赤芍藥二兩 附子一兩 芎藭一兩

當歸 漢防己 桂心二兩

海桐皮一兩

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓於食前溫服

海桐皮散 治歷節風身體四肢無力骨節疼痛

海桐皮一兩 附子一兩 麻黃 大麻

牛膝二兩 桂心一兩 防風 當歸 酸棗仁

右搗羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓於食前溫服

天麻散 治歷節風流入腰腳疼痛

天麻 羌活 桂心 當歸各二兩 酸棗仁

木香 乾蝎 虎脛骨 麝香

右搗細羅為散研入麝香令勻每服食前以溫酒調下二錢忌生冷油膩猪魚雞犬肉

茵芋丸 治歷節風疼痛皮折及血出者

茵芋 狗脊 麻黃 丹參 五加皮

杜仲 朱砂 甘草

側子

右搗羅為末研入朱砂令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十丸忌羊血

防己湯 治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者

防己 茯苓 白朮 桂心 生薑各四兩

甘草三兩 人參二兩 烏頭七枚

右㕮咀以苦酒一升水一斗煮取三升半一服八合日三夜一當覺焦熱痹忽忽然慎勿怪也若不覺復合服以覺為度止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人宜慎之一方有附子半兩無烏頭一方不用苦酒

黃耆湯 治歷節風日夜疼痛

黃耆四兩 防風 附子 芎藭一兩

麻黃 當歸 甘草 芍藥

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半入棗一枚去核生薑一分擘破煎至一盞去滓溫服空心日午夜卧各一

人參湯 治歷節風疼痛日夜發歇不可忍

人參三兩 白朮 桂心 防風 防己 甘草

烏頭 赤茯苓

右剉如麻豆每服四錢匕水一盞半生薑三片同煎至一盞入酒少許更煎三四沸去滓溫服日二夜一當覺熱痹未覺如桑末再服如前覺熱痹即止

白朮湯 治歷節風腳服疼痛不可忍

白朮 防己 甘草 附子

桂 人參 當歸 芍藥各二兩

右剉如麻豆每服四錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞入酒少許更煎一四沸去滓溫服空心食前未覺加藥末再服如前法煎服

麝香丸 治歷節風疼痛遊走發歇不可忍

麝香 川烏 木香 全蝎

壁虎 地龍 乳香 草烏頭

右將草烏頭木香細研為末合研為丸如 入少酒煮

梧桐子大每服一十丸 溫酒下

透經散 治歷節風四肢疼痛 汗出

麻黃根 天南星 當歸

人參 天麻 赤小豆

右為末每服半錢 溫酒調 後服

附子八物湯 治歷節 痛如掣

獨活散 治歷節風

獨活 玄參 升麻

防風 生乾地黃

右為散每服三錢 煎

芍藥知母湯 治諸肢節疼痛身體尫羸腳腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂心 知母 防風

麻黃 附子 甘草

右為剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓空心服 一法有

白朮川芎杏仁半夏 方有白朮無麻黃名知母湯

大棗湯 治歷節疼痛

大棗 附子 甘草 黃耆 生薑

麻黃

右㕮咀以水七升煮取三升每服 一服

趁痛丸 治走注歷節 諸風軟癱 中風 跌撲損傷

草烏頭 熟地黃 南星 半夏

白殭蠶

右為末酒糊為丸如梧桐子大日乾每服十五丸空心夜卧溫酒下

如跌撲損用薑汁和酒 數粒 手中 地黃汁茶清研

十五丸 溫酒下

秦艽湯 治歷節風 疼痛日夜不可忍

秦艽 防風 黃耆 附子 當歸

麻黃

右剉如麻豆大每服五錢匕以水 生薑三片同煎至 去

滓溫服 併二服 併一服 汗出

防風湯 治歷節 疼痛 身痿弱

防風 白朮 白鮮皮 桂

薏苡仁 黃耆

右為粗末每服四錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓溫服日

三夜一

附子湯 治歷節風足疼痛日夜不可忍

黃耆 甘草 防風

小黑豆 麻黃

右剉如麻豆大每服三錢匕以水一盞生薑三片大棗一枚擘破同

煎至八分去滓溫服日三夜一服之一方無小黑豆

麻黃散 治歷節無汗宜發汗

麻黃 羌活 黃芩 細辛 黃耆

右為麤末每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服 三四服

通靈丸 治歷節腫痛疼痛

一方無黃芩

茵芋 朱砂 薏苡仁 牽牛子 郁李人

右細末鍊蜜杵丸如梧桐子大輕粉為衣每服十九至十五丸

十九五更初溫水下 可三服快利為度白粥將息

牛蒡子散 治風 成歷節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝

遇暑熱或大便秘即作

牛蒡子 新豆豉 羌活 生地黃 黃耆

右為細末湯調二錢服空心食前日三服此病多因腎虛生痰

腿腳 久不見逐 孫真人所謂 也宜早治之

烏頭湯 治病歷節痛不可屈伸

烏頭 甘草 麻黃 芍藥

黃芪半兩
右為剉散每服四錢水一盞煎至七分去滓投前藥煎一合空腹溫
服 一方有羌活桂心大黃無當歸麻黃治寒濕搏腹中絞痛賊風入
腹攻五臟拘急不得轉側叫呼發作有時令人手足厥冷
乳香大丸 治氣血衰弱風毒攻注兩腳疼痛
乳香研 沒藥各兩 五靈脂四兩 烏頭炮去皮臍一兩半
右為末再同和勻滴水和丸如小彈子大以朱砂為衣每服一丸研溥
荷酒化下日三服
仙靈脾煎 治歷節風痛手足頑痹行步艱難
仙靈脾六兩 黑豆五升 茄子根十斤
已上三味細剉都以水三斗煮豆熟去滓更煎至五升即止
桂心 羌活 芎藭各二兩 牛膝 當歸
虎脛骨酥炙 防風 萆薢 安息香
赤箭 附子 乳香一兩
右搗羅為末入於前藥汁中以慢火煎柳木篦攪勿令住手可
丸 丸如梧桐子大每服二十丸 一日
一次時止空心於羌活湯中每服食前以溫酒下 忌生冷油膩
豬雞犬肉
松節酒 治歷節風四肢疼痛由如解落
松節 椒葉 各用
已上二味清合漬熟用五斤以糯米四石五斗釀之依家醞
法造酒勿令傷食熱冷飲時隨性從少漸飲
柏子人 天雄 萆薢 秦艽
人參 防風 磁石 獨活
右件五兩飲中如常醞法殺足以對所四七日壓取清酒性服之勿
至醉吐
搖勝散 治風毒腫白虎病者歷節作痛
右用三年醋五升熱蔥白 流出布熱裹
當病上熨之一方以
沒藥散 治歷節白骨節疼痛晝夜不可忍
沒藥 虎脛骨

右為末每服二錢匕溫酒調下日三服不計時候一方用虎
脛骨
古聖散 治歷節風筋脈拘攣骨節疼痛
漏蘆 地龍
右為末先用生薑二兩取汁入蜜二兩同煎三五沸入好酒五合以瓷
器盛每用七分盞調藥末一錢半匕溫服不拘時
治歷節風百節疼痛不可忍者
用松脂三十斤煉五十遍若不能五十遍二十遍亦可
用以牛酥三升溫和松脂三升熟攪令極調旦空腹酒服方寸
匕日三數數食麵粥為佳慎血腥生冷物酢果子百日已後瘥
治歷節風亦治腫滿
用壯鹿骨炙作湯浴
虎骨酒 治歷節風百節疼痛不可忍
松葉酒 治歷節風方
用松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五六度或用
松節亦可或用松脂亦可
療歷節諸風百節酸疼不可忍唐梁新見一朝士診之曰風疾已
深請速歸去其朝士復見鄜州馬醫趙鄂乃復診之言疾危與梁
說同惟用此法而愈
用消梨不限多少咀嚼不及絞汁而飲每日咀嚼消梨頗美
搖風酒 治白虎歷節風及諸般風濕流注四肢大風鶴膝
一切風疾
尋風藤 五加皮 虎脛骨 烏藥
石楠葉 青木香 蒼朮 骨碎補
三角尖 威靈仙 川續斷 當歸
滴乳香 川羌活 北細辛 青藤根
川牛膝 防風 蘇木 甘草節
南木香 生薑 石薜荔
川烏頭
右剉碎無灰酒一壜將藥盛於布袋內放酒壜中油紙封縛以鍋

內盛入將酒罌埋於銀內從大自康美至午取出放令每日不
拘時隨意溫服盡酒如夏月恐酒壞只作半料用小罌浸酒亦可

服

虎骨散（出三因方）治白虎歷節走注疼痛不得屈伸

虎脛骨（酥炙） 白花蛇（酒浸去皮骨） 天麻

自然銅（醋淬七次） 防風 白附子 𧐢螂

官桂 當歸 羌活 牛膝 白芷

川芎 槵香 全蝎 地龍（去土） 乳香

檀香 雄黃（各等分） 麝香 分

右末每服二錢食前以暖豆淋酒調下

羌活湯（出三因方）治白虎歷節風毒攻注骨髓疼痛發作不定

羌活（二兩） 附子（炮去皮臍） 秦艽（去蘆） 桂心（不見火） 木香（不見火）

川芎 當歸（去蘆） 牛膝（酒浸） 桃仁（去皮尖） 骨碎補

防風（去蘆） 甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時

治白虎歷節風痛者狀如虎咬骨節疼痛

白芥子 大戟 木鱉子 牙硝 乳香

川烏

右各等分細末米糊丸梧桐子大每服八九丸[illegible]

麝香丸（出本事方）治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲嚙晝靜夜劇一切手足不測疼痛古今以來無問遠[illegible]

川烏（大八角者） 全蝎 黑豆 地龍

右細末入麝香半字糯米糊為丸如菉豆大每服七丸甚者十丸夜間令隔空溫酒下微出冷汗一身便瘥 治諸風歷節痛者[illegible]

劇丸冷酒[illegible]

不測疼痛一服便瘥[illegible]

發如虫齧其[illegible]作[illegible]此正[illegible]病也一服愈

芥子膏（[illegible]）治白虎歷節[illegible]

神授丸（[illegible]）治白虎歷節[illegible]走注痛無定處[illegible]

烏麻末殺傳尸蟲

用正川椒色紅大者去子并合口者以紙二重於熱爐上炒出汗取頓地上用沙盆蓋以灰圍盆弦約時許為末老酒浸白糕為糊丸如梧桐子大每服三四十丸食前鹽湯下治脾辣桂煎湯下腰痛茴香酒下腎冷鹽湯下

又方（[illegible]）

用雞子持[illegible]咒[illegible]須[illegible]真[illegible]反者[illegible]雞子[illegible]者下[illegible]古今[illegible]猶在[illegible]中人[illegible]白虎[illegible]法療[illegible]

陳承[illegible]云白獅子主白虎病向東人呼為[illegible]歷節[illegible]白獅子於病者[illegible]過三度瘥

前白俞此歷伏之義也

定痛丸（[illegible]）治白走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏 蒼朮 晚蠶沙

右為末酒糊為丸赤地為衣溫酒送下

治歷節風丸子[illegible]

川牛膝 木瓜 防風 天麻 細辛

骨碎補 枸杞 附子 乳香 麥[illegible]

[illegible]仁 虎骨 蝸蚓 五靈脂[illegible]

右為細末[illegible]以人參為丸如梧子大[illegible]空心[illegible]五六十丸空心[illegible]一日三服

松節酒方（[illegible]）

當歸 [illegible] 松節 [illegible] 牛膝

右為[illegible]酒[illegible]浸[illegible]三日方可吃如[illegible]

[illegible]服[illegible]入[illegible]東[illegible]數年[illegible]歷節[illegible]

不可[illegible]東之以此方[illegible]之

獨活寄生湯（[illegible]）治腰[illegible]走注[illegible]痛[illegible]

桑寄生 獨活 白芍藥 當歸 杜仲

防風 細辛 牛膝 白茯苓 細辛

秦艽 [illegible] 甘草 各二兩

右以[illegible]每四錢水[illegible]

〔又方〕[illegible]

虎脛骨 [illegible]

右搗羅爲散[illegible] 一方用[illegible]

兎頭骨

〔治歷瘍風〕[illegible]

〔治癘風〕四肢[illegible]

用松脂二十斤[illegible]

〔治風毒骨髓疼痛〕[illegible]

風腰膝疼痛[illegible]

何首烏[illegible]

右二味[illegible]

蜜丸如梧子大每空心食前[illegible]五十丸

紫白癜風

論

夫紫癜風之狀皮膚生紫點搔之狀起而不癢痛是也此由風邪挾濕客在腠理榮衛壅滯不得宣流蘊積皮膚致令色紫故名紫癜風○白癜風之狀皮膚皺起生白斑點是也由肺臟壅熱風邪乘之風熱相併傳流榮衛壅滯肌肉久不消散故成此也○肺有壅熱又風氣外傷於肌肉熱與風交併邪毒之氣伏留於腠理與衛氣相搏不能消散令皮膚皴起生白斑點故名白癜風也

方

〔烏蛇浸酒方〕治白風及白癜紫癜

烏蛇[illegible] 防風[illegible] 桂[illegible]

白蒺藜[illegible] 天麻[illegible] 五加皮 一兩 羌活 二兩

牛膝[illegible]

右細剉以生絹袋盛以酒[illegible]浸[illegible]

日三度量飲一小盞[illegible]

〔白癜風方〕[illegible]

雄黃 硫黃 [illegible] 安息香 天南星

右[illegible]為末[illegible]用[illegible]

每揩患處[illegible]

四神散[illegible]

雄黃 雌黃 硫黃 白礬

右各等分研為末[illegible]以生薑蘸藥揩患處

良久以熱湯[illegible]浴[illegible]五日除根

〔治皮風紫白癜風〕

赤芍藥 當歸 苦參[illegible]

右為細末生薑自然汁[illegible]一兩作一處調藥搗一宿每服一大匙[illegible]

〔治紫白癜風〕

[illegible] 生硫黃 白礬 [illegible]

右為末用茄子蒂揩患處令先使揩

聖濟總錄 卷十八

〔玉粉膏〕治赤疵白斑

硫黃 明白礬

右為末[illegible]調[illegible]

注風刺治八[illegible]

散效速

〔治赤白斑風大有神效〕

貝母 百部

右為細末用生薑自然汁調[illegible]

〔又方〕[illegible]

[illegible]

右[illegible]

粉少許[illegible]

硫黃膏 治紫白癜風 [illegible]

治紫白癜風 [illegible]

用硫黃一兩米醋煮一日 [illegible] 細末 [illegible]

柴胡 [illegible]

追風散 白 [illegible]

治紫白癜風 [illegible]

白花蛇散 [illegible] 白癜風

白花蛇 [illegible] 天麻 [illegible] 白鮮皮 [illegible]

天南星 白附子 [illegible] 向首烏 [illegible]

羌活 [illegible] 防風 [illegible] 皂角 [illegible]

磁石 [illegible]

右件十五味搗羅為散入磁石研勻每服二錢 [illegible] 前湯清調下

忌熱麵雞豬魚蒜等

磁石丸 治紫癜風大 [illegible]

磁石 [illegible] 一兩

羌活 人參 防風 [illegible]

羌活子 白附子 苦參 [illegible]

烏蛇 [illegible]

右除二味外搗羅為末 [illegible] 每服

二十丸 [illegible]

烏蛇散 治白癜風

烏蛇 [illegible] 防風 [illegible] 人參 [illegible]

沙參 [illegible] 白附子 玄參

蒺藜子 [illegible]

右為末每服二錢 [illegible]

灰藋塗方 [illegible]

灰藋 [illegible] 丹砂

[illegible] 礬石 [illegible]

右件 [illegible] 研 [illegible]

[illegible] 之

代赭丸 治紫癜 [illegible]

代赭 [illegible] 金箔 [illegible] 當歸 [illegible]

香 [illegible] 白蘞 [illegible]

右搗研令勻 [illegible] 以水 [illegible] 和丸如綠豆大每服不計時候 [illegible]

[illegible] 下二十丸以 [illegible]

硫黃膏 治紫癜風

硫黃 [illegible] 白礬 [illegible] 白附子 [illegible]

附子 [illegible] 蛇蛻 [illegible]

右搗羅為末入研了藥令勻用 [illegible] 兩 [illegible] 先煎油三兩 [illegible]

[illegible] 入藥 [illegible]

除風散 治紫癜風

防風 [illegible] 白花蛇頭 [illegible]

右為散每服一錢七溫酒調下

五倍子膏 [illegible]

五倍子 [illegible]

右同研勻以 [illegible]

羊蹄根塗方 治紫癜風

羊蹄根 [illegible]

右 [illegible] 硫黃末同研令勻 [illegible]

治雲癜風 [illegible]

硫黃 [illegible] 青 [illegible]

治 [illegible] 用 [illegible] 三五 [illegible]

[illegible]

雄黃散 [illegible] 治紫癜風 [illegible]

[illegible]

胡桃塗方 治紫癜風白癜風

右生用為散 [illegible]

初結青胡桃[illegible] 右將黃以瓷器研

右先取胡桃皮切研如膏入硫黃末和勻塗之一方有白礬

桑枝煎 [illegible]治紫癜風

桑枝十斤 益母草三斤

右以水五斗慢火煮至五斗去滓入小鐺內熬爲膏每服[illegible]

用溫酒調服半合

硫黃膏 [illegible]

療白癜風

雄黃[illegible] 木蘭皮 白朮[illegible] 苦參 芎藭

麻黃[illegible] 山茱萸[illegible] 甘草[illegible] 狗脊 枳實[illegible]

秦艽 [illegible] 細辛 [illegible] 白斂

人參 當歸 薯蕷 白芷[illegible] 防風

附子[illegible] 枲耳子[illegible]

右爲散酒服方寸匕日三服稍稍加至二匕忌生葱生菜海藻菘菜豬

肉冷水

[illegible]

烏蛇散 [illegible]治白癜風身體頑麻

烏蛇[illegible] 白附子[illegible] 胡麻子

天麻[illegible] 烏頭[illegible] 細辛[illegible] 獨活[illegible]

桂[illegible] [illegible] 白附子[illegible] 防風[illegible]

天南星[illegible]

右爲細散每服溫酒調下一錢匕不計時候

防風散 [illegible]治白癜風[illegible]

防風[illegible] 地骨皮[illegible] 山梔子仁 荊芥穗

惡實[illegible] 甘草[illegible] 人參 生乾地黃[illegible]

右搗羅爲細散每服二錢匕水一盞入惡實根二寸同煎至七分去滓溫

服不計時候

苦參散 [illegible]治肺臟久積風毒皮膚生白駮

苦參[illegible] 烏蛇[illegible] [illegible]蜂房[illegible]

附子[illegible] 梔子[illegible] 松脂

右爲細散每服以溫酒調下二錢匕不計時候須常吃[illegible]

忌食熱麪[illegible]魚大小蒜[illegible]一方有防風

白斂散 出聖惠方 治白癜風遍身斑點癢痒

白斂 天雄[illegible] 商陸一兩 黃芩

乾薑[illegible] 躑躅花[illegible]

右爲細散每於食前以溫酒調下二錢

又方 出聖惠方

附子[illegible] 凌霄花[illegible] 川烏頭[illegible] 防風[illegible]

露蜂房[illegible] 躑躅花[illegible]

右細剉以豬脂三斤煎令附子黃焦去滓候冷於瓷合中盛用

摩風疵上以瘥爲度

治白癜風 [illegible]

雞子[illegible] 石硫黃[illegible] 附子[illegible]

[illegible]天[illegible]

右件藥三味搗羅爲末以雞子白調和令稠搗用塗之以葛布揩

患處令赤塗之

追風丹 [illegible]方 治白癜風服之愈

蒼朮[illegible] 何首烏 荊芥穗 苦參各等

[illegible]

右爲細末好肥皂角三斤去皮弦[illegible]以[illegible]爲膏和爲丸如梧桐

子大每服三五十丸空心酒茶任下忌一切動風之物并大葷[illegible]

附子膏 [illegible]

[illegible]患白癜風服之愈 療白癜風

附子[illegible] 天雄[illegible] 烏頭[illegible] 防風二兩

右切以豬膏三升合煎之先服散治癜上以膏摩之一方[illegible]

治白癜風

蛇蛻[illegible] 白芷[illegible]

右爲末先用生薑揩患處如面[illegible]一服[illegible]

又方

蜣蜋[illegible] [illegible]上九[illegible]草 [illegible]

麻鞋底[illegible]

右燒灰研細敷之立效

療白癜風 [illegible]

一黑油麻一[illegible] 生地黃[illegible] 杏人[illegible]

右先[illegible]油麻[illegible]全搗

碎後搗地黃杏人[illegible]相和[illegible]令相著一處[illegible]再厭

和酒[illegible]食[illegible]

治白癜風[illegible]

紅灰藋[illegible] 茄子根莖[illegible] 蒼耳根莖[illegible]

右並曬乾一處燒灰以水[illegible]汁於鐺內煎[illegible]

合藥[illegible]分[illegible]一分相和入

於膏內別用銀或[illegible]每用[illegible]摩所

患處日三用之

又方[illegible]千金方

又以石灰松脂酒主之

治白癜風不拘[illegible]

用烏雞[illegible]

將藥[illegible]在布上日中[illegible]

[illegible]

救起[illegible]發動作[illegible]時行布子於患處擦之而愈

治白癜風[illegible]

草烏[illegible] 巴豆[illegible]

右同末[illegible]和[illegible]以布裹[illegible]

石硫黃膏[illegible]治白癜風皮膚[illegible]毛髮[illegible]

石硫黃[illegible]

右為細末先以布揩患處令赤[illegible]

苦參膏[illegible]治白癜風

苦參[illegible]

右為末先以酒一斤煎至四合入藥二味[illegible]

以生布揩患處令赤塗之

治白癜風[illegible]

蒔日[illegible]白癜[illegible]

搽便無蹤

又方

貝母 天南星

右為細末用生薑[illegible]汁出擦之

又方[illegible]

貝母 乾薑

右等分為末入茶盞內如[illegible]先擦患處[illegible]

又方[illegible]

舶上硫黃[illegible]

右細末用胡桃人擦患處[illegible]頻擦即愈

又方[illegible]

白附子 雄黃[illegible]

右等分為末用巴豆先擦患處後[illegible]擦之

又方 出聖惠方

蜜陀僧 生薑汁

右等分相和先拭所患處

治白癜風[illegible]千金方

[illegible]

平旦以手掬取韭頭露塗之極効

又方[illegible]

以酒服生胡麻油一合日三稍稍加至五合慎生冷豬雞魚

蒜等百日服五斗瘥

又方 出千金方

取蘿摩草煑汁拭之亦揩令傷瑞白汁塗之[illegible]

[illegible]

蛇蛻皮方[illegible]

金水膏[illegible]

又方[illegible]以水銀數數拭之令熱即有瘥乃止

治白癜風[illegible]用杏人去皮尖[illegible]每日早晨爛嚼二七粒

於白點處揩[illegible]夜臥再用

又方 用[illegible]子[illegible]汁[illegible]

又方

用[illegible]

又方
用白茯[illegible]

羊蹄根方 [illegible]

治白癜風
用楸木白皮五斤[illegible]
煎如稠膏用不津器取[illegible]上效

又方
用桑柴灰二斗於大甑[illegible]洗不過五六度

癧

治紫癜風
用船上碗黄不以多少用米醋化[illegible]
又一方不用米醋良久以湯洗去一方細研[illegible]汗
[illegible]患處[illegible]驗之
一方先以塵布揩患處令傷用醋調[illegible]三度瘥

治白癜 治紫白癜風
[illegible]
用大蒜[illegible]揩患處每浴了時用之

苦根散 治白癜風
用苦根和雄黄[illegible]塗之便瘥

防風何首烏散 治白風[illegible]
入鼻[illegible]

何首烏　蔓荊子　石菖蒲
枸杞子　苦參　[illegible]
[illegible]

何首烏散
右為細末每服三錢[illegible]
治[illegible]
威靈仙　何首烏　防風　荊芥穗　[illegible]
甘草　[illegible]
右等分為末每服一錢[illegible]

治紫白癜風
[illegible]

右為末和勻先用熱水揩洗去黑皴抹乾用水調[illegible]薄薄揩拭患上
令入肉啟一日晚用一次三次

又方　治紫癜風
[illegible]　雄黄[illegible]　白礬[illegible]

治白癜風
右件藥細研如粉以猪脂調令勻每取塗於患處日三度用

治白癜風
右用地麻草煮水淋洗四五度立好

治白癜風
以[illegible]葉燒灰淋取汁塗之亦可作[illegible]傅之亦作面膏塗癧

治[illegible]
[illegible]

治白癜風
取白鴿肉炒酒服

治白癜風及癧瘍
以白[illegible]灰重淋取汁和醋先以布揩白癜風破傅之當為瘡切[illegible]

治白癜風
[illegible]
用[illegible]為末每服三二錢[illegible]

治白癜瘍及風惡疥癬
[illegible]汁塗之

治白癜風
用[illegible]和百文青[illegible]為末傅之

治白癜風
先用[illegible]白馬骨[illegible]牛[illegible]皮[illegible]為灰
淋汁塗之[illegible]

白駁

論
夫白駁者是肺風流注皮膚之間久而不去之所致也多生於項面點點斑白但無瘡及不瘙痒不能早療即便浸淫也○白駁之病其狀斑駁如癬遇於癬為但不成瘡爾皆由風熱搏於膚腠脾肺二經不利也

方

又方[illegible]

麻子人[illegible]

礬石[illegible]

附子人[illegible]

右藥搗篩以水二[illegible]石[illegible]一石二斗[illegible]

服如[illegible]用之日六日[illegible]人[illegible]

當中[illegible]後[illegible]

於林先所[illegible]

白斂散方[illegible]

白斂[illegible]　當歸[illegible]

乾薑[illegible]　天雄[illegible]　[illegible]

右四味搗篩為散每服半錢匕日一服七日[illegible]白斂[illegible]

又治白駁方[illegible]

[illegible]

[illegible]　蛇皮

右[illegible]以[illegible]以酒[illegible]

[illegible]治白駁方[illegible]

治白駁方[illegible]

蛇蛻皮[illegible]　[illegible]　半夏[illegible]　[illegible]

右搗羅為散[illegible]

白斂[illegible]令[illegible]

治白駁傳方[illegible]

雄黃[illegible]　石硫黃[illegible]　蛇蛻皮[illegible]

右用[illegible]細用[illegible]

傳藥三兩過即差

大蛇皮散方[illegible]治面項身體白駁風

蛇蛻皮[illegible]　石硫黃[illegible]　[illegible]

右研令極細以清漆調和勿令[illegible]

巴豆一粒[illegible]

又治白駁方[illegible]

雄黃[illegible]

右搗羅為散[illegible]

又方[illegible]

治白駁方[illegible]

[illegible]

右搗羅為散以醋調塗之

治白駁以蘭[illegible]

用桂去皮一兩搗羅為末每用[illegible]

白駁[illegible]

治面項身體白駁傳方[illegible]

用鰻鱺魚[illegible]

[illegible]用荷葉裹[illegible]包[illegible]用荷葉[illegible]如法更用荷葉重裹

令大火[illegible]先以[illegible]拭白駁令[illegible]

冷所傳[illegible]

[illegible]

[illegible]治[illegible]身白駁漸長[illegible]不成瘡

用蛇蛻皮一條[illegible]熱擦摩白駁上[illegible]

中療[illegible]

灵[illegible]治面項身体白駁風[illegible]

[illegible]

[illegible]一夜一隔[illegible]洗[illegible]以面[illegible]一方治白

[illegible]

鼓[illegible]

用鼓[illegible]一度便[illegible]不[illegible]三度

[illegible]論

大[illegible]

[illegible]服大防風[illegible]漸生自然[illegible]如故也

四神丸 治癱瘓風及腰腳疼痛 ...

烏頭 白附子 阿魏

安息香 白芷 木香 天麻 桂心

當歸 川芎 牛膝

羌活 威靈仙

右為末 煉蜜為丸 如彈子大 ... 治手足拘攣

骨碎補 杏仁 ... 治腳膝 ...

乾蝎丸 一名 ...

乾蝎 白附子 ...

地骨皮 威靈仙 ... 桂心 當歸 蒺藜 芍藥

右同杵為丸 如彈子大 每服一丸 溫酒化下 有病者 注手足

指節腫痛不 ... 者服之 兼食 ...

大防風湯 治鶴膝風 ... 治血脈 壯筋骨 除寒濕 ...

[illegible]

鶴膝風 ... 內大小便 ... 治 ... 行履不得 用小

續命湯合 ... 加 ... 川芎 ... 乾木瓜 ... 用 ... 當歸 ... 煎

服 ... 內服之 服至數十服後 加五

...同煎 ... 一方用 ... 全皮老酒煎 ... 常服

川芎 ... 治鶴膝風及諸風疾

大川烏

右為末 ... 不拘 ... 一下 ... 煎 ... 入 ... 膏

... 貼 ... 患處

普濟方卷之四十

普濟方卷之四十一目錄

諸風門 論二道 類二類 方四百八十一方

破傷風 諸風雜治

破傷風 論一道 方一百一十八方

外金瘡散 大烏犀散 木香丸 麥草散 牛黃散
摩風膏 玉神丸 羌活散 硃砂散 羌活丸
附子丸 赤箭散 川芎丸 治諸破傷風痙
羌活湯 乳香散 白殭蠶丸 烏蛇丸 附子散
獨活散 知聖散 追風散 天南星丸 益智湯
靈砂丹 白丸子 麝香丸 阿膠散 金烏散
治破傷風及洗頭風一名 ... 急風一字散
太白散 防風散 天麻散 追風丸 蠍附丸
天南星散 蟬蝎一字散 前胡丸 白术湯
江鰾丸 小追風散 追風散 又追風散 阿膠散
防風散 又方 追風白丸子 白破傷風
白散子 治破傷風背急口噤 鹿角膠丸 烏頭丸
治中破傷風口噤 急風散 辰砂奪命丹
蜈蚣散 治破傷風腑臟死者 白茯苓湯 羌活防風湯
白术防風湯 烏蛇湯 大芎黃湯 羌活湯 防風湯
蜈蚣散 左龍丸 羌活湯 養血當歸地黃湯
治破傷風手足顫掉 治破傷風 天南星散 雄黃散
地榆防風散 白术湯 治破傷風 玉真散一名追風散
治破傷風口噤身強直 治破傷風 神應丸一名奪命丹
天南星丸 乾蝎丸 定命散 寸金丸 烏頭散
三味追風散 銀花散 天南星散 治破傷風無問表裏角弓反張
雄黃散 治破傷風 治破傷風見血 香膠散

蠲痛散　主大豆[illegible]　[illegible]口子[illegible]　治破傷[illegible]　又方[illegible]
治破傷風腫痛　治破傷[illegible]
治破傷風欲死者　治破傷[illegible]　治破傷風[illegible]不省
又方　救顛散　續聖散　[illegible]散　[illegible]
急風散　白殭蠶散　治破傷風　治破傷風[illegible]
治破傷風　治破傷風搐口作[illegible]者　[illegible]
治破傷風　追風散　治破傷風　又方　[illegible]散子
蜈蚣散　治一切破傷風　[illegible]丸　天麻丸
立効散　除風破血　治破傷風　治破傷風入齒[illegible]

諸風雜治

方二百五十五方

烏犀丸　草[illegible]　[illegible]　大排風散　大[illegible]神丸
壽命延真丹　龍虎丹　神妙[illegible]　雄朱丹
大[illegible]草散　雄黃[illegible]膏　千金保命丹
龍腦丸　羌活愈風湯　[illegible]　人[illegible]丸　[illegible]散

神効牛黃丸　小[illegible]草散　牛黃清心丸　大[illegible]丸
小排風散　木香保命丹　大通丹　[illegible]丹
治風偏枯半丸　[illegible]金丸　[illegible]丹　神[illegible]神丹
救聖大通丸　香子[illegible]　大[illegible]白花蛇散　烏蛇丸
神効麝香丸　龍腦散　[illegible]人[illegible]　虎骨[illegible]　虎骨丸
搜風鎮心牛黃丸　[illegible]丹　[illegible]丹　參苓散
玄英丹　羌活散　天南星散　天麻煎　五枝煎
石指煎　烏雞[illegible]方　金砂丹　鐵[illegible]丸
秘傳羌活散　[illegible]風丹　烏犀丸　[illegible]
川芎石膏湯　人參羌活散　大聖[illegible]神丹
防風羌活丸　一捏金　白丸子方　[illegible]本散　追風散
龍麝紫芝煎　遇仙如意丸　[illegible]散　[illegible]　[illegible]丹
雄黃丸　神効[illegible]牛黃丸　花[illegible]　復壽延命丹
[illegible]風順氣丸　[illegible]方　防風通聖散　[illegible]　透空丸
太乙丹　換骨丹　太乙散　蒼耳丸　[illegible]根酒

石斛散　八[illegible]湯　大仙聖[illegible]丹　大[illegible]奪命丹
治一切風疾及[illegible]　大麻丹　狐肝丸　[illegible]枝煎
茄子根[illegible]方　續命[illegible]　乳香丸　黑神丸
黑虎丹　[illegible]龍丸　白花蛇丸　天麥[illegible]煎
[illegible]命青　[illegible]命[illegible]　[illegible]刀[illegible]丸　[illegible]方
白花蛇散　乳香[illegible]丸　[illegible]
大防風湯　[illegible]丸　大黃丸　仙[illegible]　牛黃小烏犀丸
龍腦[illegible]　牛黃[illegible]　[illegible]散　太白丸　太白丹　寒水石[illegible]散
石南湯　[illegible]　[illegible]大[illegible]丹
立効天南星丸　又方　[illegible]皮[illegible]方　仙酒方　至寶丹
石膏丸　皂角丸　[illegible]風餅子　小續命湯　[illegible]金煎
[illegible]風順氣丸　大麻丸
治風[illegible]又及偏枯頑痺　烏頭[illegible]風[illegible]
金[illegible]丹　[illegible]酒　烏[illegible]散　黑神丸
搜風丸　[illegible]　[illegible]不[illegible]散　[illegible]丸

再合[illegible]心丹　[illegible]丸　[illegible]子丸　[illegible]丸　天麻防風丸
[illegible]　太乙丹　[illegible]一粒金丹　[illegible]
龍腦丸　烏頭[illegible]　[illegible]散　追風散　磁石丸
定風餅子　大[illegible]風湯　五[illegible]松[illegible]方　加味苦參丸
又方　大白丹　龍[illegible]丸　[illegible]酒方
經效[illegible]根[illegible]方　[illegible]方　龍腦大麻煎
八風丹　[illegible]　大[illegible]丸　龍腦川芎丸
防風湯　[illegible]散　[illegible]風丸　真方白丸子
[illegible]湯　[illegible]丹　龍腦[illegible]丸　[illegible]白丸子
又方　[illegible]　七生丸　川芎散
[illegible]丹　[illegible]丹　防風湯　[illegible]湯
知母湯　苦參丸　烏金[illegible]酒方　川芎丸
[illegible]丸　加減三五七散　大醒風湯　治[illegible]丹
[illegible]丸　[illegible]湯　當歸川芎散
[illegible]風丸　皂角六一丸　六聖散　拒風丹

續斷湯　犀角丸　獨活散　生地黃飲子
治風黑神丸　萆薢散　[illegible]　防風丸
白龍丸　治諸風癱瘓及[illegible]　大麻仁丸　趁痛丸[illegible]
七寶丹　治鼻[illegible]　[illegible]　碧[illegible]丹
青州白丸子　[illegible]　[illegible]　三[illegible]
四寶丹　治一切手足及[illegible]骨節　[illegible]　[illegible]
牛蒡酒　釀酒法　[illegible]　[illegible]
山桃丸　雄黃救命丹　[illegible]　[illegible]
燒竹瀝法　神[illegible]　[illegible]
南燭酒　烏蛇丸　[illegible]　[illegible]
枸杞菖蒲酒　[illegible]　[illegible]
豆淋酒法　草[illegible]　[illegible]
四仙丹　去風丹　[illegible]
治骨頭中一切風　[illegible]
治諸風及惡瘡風瘡疥癬　[illegible]

治大風癩病頭風赤疥每在骨髓　治偏及一切風
治六十二種風　[illegible]　[illegible]　烏麻[illegible]
又方　[illegible]　治諸風
川芎散　不一散　[illegible]　加味[illegible]散
薄荷湯　荊芥[illegible]　[illegible]
加味勻氣散　烏藥順氣散　[illegible]
烏犀丸　至寶丹　[illegible]　[illegible]
天麻除風丸　省風湯　[illegible]
大羌活丸　治大風[illegible]方　神應[illegible]丹
靈砂丹　獨活丸　[illegible]　[illegible]
天麻丸　燒肝散　[illegible]　[illegible]
萬金丹　[illegible]丹　杜仲[illegible]　[illegible]
十生圓　透骨丹　大[illegible]
川烏圓　[illegible]
菊鉚川　[illegible]　[illegible]　[illegible]

萬金湯　柴胡木香[illegible]　養中湯　桑葉散
治天柱骨倒[illegible]　[illegible]　[illegible]風丸　諸氣不通
主一切風　治一切[illegible]　治[illegible]風疾　[illegible]年不較
治一切風[illegible]令手足疼痺　治[illegible]
治一切三十六種風[illegible]　治一切風　治風疾
治風[illegible]體如蟲行[illegible]　[illegible]
除風　治風　治[illegible]風　治風
治風令人能食　治風疾　[illegible]風甚佳　治頭輕身
治一切風[illegible]惡[illegible]痛　治氣血[illegible]　治[illegible]骨風
主風[illegible]從內及腰腳諸冷　治心風頭風肢體諸風
治皮毛[illegible]如五行風　[illegible]　治腰中風[illegible]
治一切風疾腰腳附子湯　治風血[illegible]　去風血
治風[illegible]自[illegible]　治[illegible]腰痛
治一切風　補虛除風　治[illegible]
治諸風腳[illegible]不可忍　治風疾

普濟方卷之四十一目錄　果

諸風門

○破傷風 論

夫刀箭所傷針灸[illegible]瘡[illegible]
未合不能畏慎觸冒風[illegible]外[illegible]傷[illegible]血脉[illegible]則攻
於臟腑致身體強直口噤[illegible]筋脉[illegible]四肢[illegible]前面目噤
得如此之間便能難救此[illegible]傷之[illegible]故為破傷風也○風
者百病之始也[illegible]有大[illegible]故破傷風
者是於表裏分別陰陽同傷寒證人知有傷寒不知有破傷風[illegible]此
乎下吐三法也諸瘡[illegible]風邪可能外
入於瘡為破傷風之候諸瘡上[illegible]故陽
熱[illegible]也故表脉浮而無力太陽也在表宜汗脉長而
五百七十五[illegible]
有力陽明也在裏宜下脉浮而弦小者少陽也半在表半在裏宜和解
若明此三法而治不中病者未之有也

方

羚羊角散 治打撲破瘡[illegible]中風

羚羊角 石斛 芎藭 知母 山茱萸
薏苡人 白芷 曲牛膝 甘草 [illegible]
蔓荊 天雄 防風 牛膝 [illegible]
[illegible] 石南葉 [illegible] [illegible]
麻黃 [illegible] [illegible] 白朮
草薢 [illegible] [illegible] [illegible]
蒼耳心 車前子 [illegible] 菊花 敗醬人
當歸 [illegible] 細辛 丹參
烏蛇 [illegible]

右為散每服一錢至二錢[illegible]調下[illegible]
蜜丸如梧桐子大每服十[illegible]

天麻散 治破傷中風

犀角 羚羊角 龍腦 麝香 雄黃
乾蝎 [illegible] [illegible] [illegible] 丹砂
水銀 [illegible] [illegible] 皂莢
[illegible] [illegible] 白附子 乾薑 天麻
升麻 [illegible] 狗脊 細辛 天麻
芎藭 杜仲 [illegible] 厚朴 [illegible]
藁本 [illegible] [illegible]
麻黃 [illegible]

右件二十六味搗羅為散與水銀等研令勻每服一錢至二錢豆淋酒調下生薑自然汁[illegible]
匕加至二錢匕日三[illegible]

牛黃丸 治破傷及諸風角弓反張牙關緊急語言不得

牛黃 麝香 [illegible] 雄黃
水銀 膩粉 [illegible] 白龍骨
天麻 半夏 藁本 桔梗 白附子
[illegible]
木香 白殭蠶 [illegible] 當歸 防風
附子 天南星 [illegible] 麻黃
乾蝎 芎藭 蔓荊子 [illegible]
麻黃 羚羊角 [illegible] 殭蠶

右件搗羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗一五百杵丸如梧桐子大每服
不計時候以溫酒下五丸[illegible]三兩服當有汗出為效

蒺藜散 治破傷中風

蒺藜 石斛 草麻 [illegible]
石南 牛膝 芎藭 柏子人
山茱萸 菟絲子 白朮 細辛 羌活
牛黃 松脂 附子 杜仲 [illegible]
烏蛇 桂 天麻 麻黃
[illegible]

右為細末[illegible]每服一錢匕溫酒調下日二夜一若
中風腳手甲青者溫酒調二錢至三錢半匕頻服無慮以生薑[illegible]

滑捷汗出即差

牛黃散 治破傷中風

牛黃 乾蝎 麝香 雄黃 白附子
天南星 白殭蚕 天麻 半夏
丁香 丹砂 犀角 木香 羚羊角
檳榔 麻黃 附子
烏蛇 麦門冬 當歸

右先將十七味擣羅為散次入研者四味和勻每服半錢匕豆淋酒調下
用牙豆張牙關緊急以豆淋熱酒下一錢匕和豆良久汗出即差

麝風膏 治頭面五發瘡腫痛所軍疾瘡入破傷熱不止痛減瘢痕

白附子 白芍藥 白茯苓 零陵香 白芷
白斂 白芷 白檀 藿香 升麻
細辛 甘松 川芎 杏人 當歸
梔子 大栝樓 栝樓根 白麻

右㕮咀以無內灸百日於鼎日便本底火上銀石器內煎至白芷微

黃色濾去滓入蠟攪二味香內慎百沸重綿濾去滓再慢火上燒熔油
下鉛黃淨黃蠟攪勻為度傾在瓷器內收於上熱脫子上用摩

風壅之

黑神丸 治破傷中風身體強直口噤不開

硫黃研 丹砂研 雄黃研 水銀
鉛丹研 消石研 定粉 烏蛇 麝香
乾蝎 白殭蚕 麻黃 天麻 天南星
白附子 白芷 附子 麝香

右將前四味先結砂子研末次入鉛丹消石定粉三味同炒黑色住
火次十味並用酒浸一宿焙乾搗羅為末與前四味并麝香合研
令勻用頭醋和煮為丸如皂子大每服一丸用生薑酒磨下中
風豆淋酒磨下一切風疾荊芥茶磨下

天南星散 治破傷風牙關緊急

天南星 烏蛇 天麻 防風
白附子 藁本 麻黃 白芷 白殭蚕

天南星 芎藭 細辛 附子 晚蚕蛾
桂心 當歸 桑螵蛸 乾蝎

右件藥搗羅為散每服不計時候以溫水調下一錢

硃砂散 治一切破傷急風口噤四肢抽掣

硃砂 麝香 雄黃 天南星 白附子
母丁香 藿香 桂心 白花蛇
蟬殼 芎藭 荊芥 天麻
白殭蚕 麻黃 烏頭

右搗羅為散入研了藥令勻每服不計時候以薑酒調下一錢

天南星丸 治破傷風筋脈拘急疼痛

天南星 芎藭 藁本 麻黃
白附子 牛膝 麝香 白龍骨 木香
防風 桂心 天麻 羚羊角屑 乾蝎
當歸 蒼耳頭

右搗羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每

服不計時候以溫酒下十丸甚者日四五服以汗出為効

附子丸 治破傷中風

附子 烏頭 天麻 天南星

已上四味麁搗篩入絹袋子以好酒三升浸之冬二七日夏一七日不
得透氣日滿將袋子陰乾去滓取汁於瓷石器中慢火熬成膏
入後諸藥

硫黃研 丹砂研 鉛霜研 白殭蚕
蚕蛹 鹿角霜研 鹿胎皮

已上八味搗羅為末同研令極細

龍腦研 麝香研 生金 水銀

右各搗研同和令勻以煉蜜丸如菉豆大每服一丸至二丸空心午
時夜臥溫酒下漸加至三五丸

赤箭散 治破傷風身體強直牙關緊急白直視

赤箭 天南星 當歸 白殭蚕 芎藭
白附子 麻黃 烏頭 羌活 桂

蟬蛻 乾蠍 朱砂
麝香 膩粉
右件十三味搗羅為末與別研味和勻每服用一錢匕溫酒調下
不拘時
雄黃丸 治破傷風身體強直
雄黃 麝香 人參
靈寶 烏犀角 烏蛇
白附子 天南星 乾蝎 天麻
右件十味搗羅為末入五味研者和勻以煉蜜和搗三二百杵
患則入搗羅末一兩如梧桐子丸如菉豆大每服二丸空心
午時臨臥溫酒下漸加至五丸
治諸破傷風腫及頭面者宜服此藥
人參 茯苓 甘草 前胡 芎藭
羌活 桔梗 獨活 柴胡 枳殼
當歸 防風 荊芥 各等分

太平聖惠方卷之四十一 五

右㕮咀每服五錢薑一片
羌活湯 治破傷風身如亂石或不欲宜
羌活 防己 羚羊角 升麻 黃芩
蔓荊實 羊角 茯神 葛根
甘草 防風 麻黃
右麁搗篩每服一錢以水一盞入地黃汁半合煎至六分
去滓空心日午臨臥溫服如人行不拘時服出汗愈
乳香散 治破傷中風
乳香 烏蛇 乾蝎 天麻 赤茯苓
蛇黃 白附子 白芥子 白殭蠶 白蘞
半夏 白斂
右為散每服一錢匕生薑酒調下日三服小兒只一字用薑
湯調下
白殭蠶丸 治破傷中風
白殭蠶 麝香 烏蛇 乾蝎

木香 龍骨 蟬蛻 杜仲 天麻
原蠶蛾 雄黃
右件八味搗羅為末與別研四味和勻煉蜜丸如菉豆大每服二丸
溫酒下甚者三丸併兩服至冷酒下汗出如珠顆服黃蠟得水者可
治若汗出如油直視吐沫心煩躁悶頭髮亂身不轉者難治
烏蛇丸 治一切破傷風
烏蛇 山梔子 獨活 枳殼
防風 白鮮皮 人參 丹參 芎藭
沙參 苦參 玄參
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸溫酒下加至二十丸
附子散 治破傷風身體強直筋脈拘急口噤
附子 川烏頭 乾蝎
烏蛇 天麻 天南星 白附子
防風 白殭蠶 蟬殼 麻黃 藿香
右搗羅為散每服不計時候以溫酒調下一錢

太平聖惠方卷之四十一 六

獨活散 治破傷風四肢不收口中沫出及中指風並治之
獨活 白殭蠶 乾蝎 附子 桂心
防風 芎藭 當歸 麻黃
赤芍藥 天麻 細辛
右搗羅為散不計時候以溫酒調下一錢
如聖散 治破傷風
蒼朮 白芷 細辛 防風 川芎
大川烏 天麻 全蝎 麻黃 白朮
草烏
右為末每服一錢溫酒調下如金瘡血出用藥貼之汗出即愈如諸瘡時
患處頭風口噤只鼻內搐之 一方有桔梗無全蝎麻黃
追風散 治破傷中風牙關緊急口面喎斜身體或硬或軟小兒驚風
並治之
天麻 天南星 半夏 白附子
附子 丹砂 雄黃 牛黃

麝香研 犀角 腦

右丸將六味擣羅為末入五味研令勻每服一錢匕以溫湯調下

千出取差如未汗再服 小兒半丸每服

一字荊芥湯或熱水調下 要丸即為丸如大麻粒大每服三

丸至五丸 吐逆煎生薑湯下 出汗用生薑熱粥飲投之

天南星丸 治破傷中風

天南星 白附子 龍腦 烏蛇

乾蝎 麻黃

麝香 硃砂

右擣羅為末研令勻以煉蜜為丸如菉豆大不計時候以豆淋

酒下十丸

益智湯 治破傷

乾生薑 杏人 白麩 甘草 鹽

益智仁 青皮 陳皮 蓬莪朮

右為極細末白湯點服

靈砂丹 治破傷風一切諸風

威靈仙 黑牽牛 何首烏 蒼朮 香附子

川烏頭 硃砂 乳香 陳皮

右為末把皂角打破用酒二升半浸三日取汁打麵糊為

丸如梧子大每服五丸加破傷溫酒下 如牙緊服研三

五丸

白丸子 治破傷風

安息香 胡桃人 白膠香 牛黃

麝香 丹砂 當歸 乾蝎

巴豆

右將三味擣為細末與別研七味和勻煉蜜丸如梧桐子大每服一

丸至二丸溫酒下量力飲之但令熟睡勿至大醉兼理中風手脚攣

縮及半身不隨日二服不可多

麝香丸 治破傷風

麝香研 牛黃 防風 烏蛇 乾蝎

乾薑 桂 烏頭 丹砂 天南星

右將七味擣羅為末與另研二味和勻煉蜜丸如梧桐子大每服七

丸溫酒下日二夜一 其者空心服良久再用熱生薑稀粥投

千出避外風

獨活散 治破傷風口眼偏斜四肢拘急腰背強硬

地榆 白花蛇 獨活 白附子

防風 乾蝎 乾 天南星 天麻

麝香

右擣羅為散入麝香研令勻每服薄荷半合入酒二合煖令溫

調下不計時候服

治破傷風及頭風

蝎梢 麻黃 蜜 草烏頭 黑附子

白附子 天麻 川芎 烏梢蛇

右為細末每服一錢熱酒調下日進三五服重者二五日必效 此證

只宜早治恐邪氣入臟則難治 有四死證不可治 一頭面青黑色

二額上有汗珠不流 三眼小目瞪 四身上汗出如油

金烏散 治破傷中風牙關緊急四肢強直不下食

烏鴉 天麻 白附子

天南星 白殭蠶 烏蛇

藿香 桑螵蛸

右為散每服一錢匕豆淋酒調下晝夜五服

一字散 治破傷風

雄黃 南星 川芎 金蝎 白附子

白芷 川烏頭 辰砂 麝香

右為末每服半錢溫酒調下忌熱物時

太白散 治破傷風欲死者雖患人口已禁但心腹間微有喘息灌入

口中下咽即生

附子 草烏 天南星 藿香 人參

當歸 水銀 錫 麝香

右為末每服半錢溫酒調下 唯忌冷水如飲冷水再發不可療不拘

[illegible]張一方五首

防風散 [illegible] 治破傷風[illegible]

防風 麻黃 [illegible] 細辛 [illegible] 乾蝎 [illegible]

白殭蠶 [illegible] 天麻 [illegible]

右搗羅為散每服[illegible]

天麻散 [illegible] 治破傷風[illegible]

天麻 [illegible] 細辛 [illegible]

右搗羅為散入[illegible]

追風丸 [illegible] 治破傷風[illegible]

白殭蠶 [illegible] 蜈蚣 [illegible] 半夏 [illegible]

天南星 [illegible]

右並生用搗羅為末以[illegible]丸如大豆大每服以豆淋酒下五丸更用一丸於牙口中生用[illegible]纔至之當追風出如欠動纔為驗也

熊膽丸 治破傷中風

熊膽 [illegible] 大麻 [illegible] 芎藭 [illegible] 防風 [illegible]

牛黃 [illegible] 麝香 [illegible] 龍骨 [illegible] 丹砂 [illegible]

右件四味搗羅為末[illegible]下[illegible]四味[illegible]為丸如梧桐大每服二十丸

天南星散 [illegible] 治破傷風及[illegible]

天南星 [illegible] 附子 [illegible] 乾蝎 [illegible] 麻黃 [illegible]

半夏 [illegible] 天麻 [illegible] 附子 [illegible]

麝香 [illegible]

右搗羅為散每服[illegible]

螵蛸一字散 治破傷風

草烏 [illegible] 麻黃 [illegible] 雄黃 [illegible] 蜈蚣 [illegible]

防風 [illegible] 桑螵蛸 [illegible] 白附子

右為細末每服一字[illegible]食後日進二服

茴香丸 治破傷風

八角茴香 [illegible] 川楝子 [illegible]

[illegible] 蒼朮 [illegible]

右為末酒糊為丸每服五十丸[illegible]下不拘時

[illegible]散 [illegible] 治破傷風大[illegible]不止筋攣搐搦

白朮 葛根 [illegible] 升麻 黃芩 [illegible]

甘草 [illegible]

右以[illegible]每服一兩水煎服無時

[illegible] 治破傷風[illegible]搐搦[illegible]知病在表可用下之

[illegible] 野鴿糞 [illegible] 雄黃 [illegible] 蜈蚣 [illegible]

天麻 [illegible]

右為細末分作二分一分用燒飯為丸梧子大硃砂為衣一分入巴豆霜二錢半同[illegible]燒飯為丸梧子大每服硃衣丸二十丸加巴豆霜丸一丸第二服二丸加至利為度再服硃衣丸病愈止

小烏風散 治破傷風[illegible]頭項[illegible]口噤[illegible]

明雄黃 [illegible] 草烏 [illegible] 蟬殼 [illegible] 烏蛇 [illegible]

防風 [illegible] 蝎梢 [illegible]

右為細末每服一字熱酒調下食前日進三服

烏風散 治破傷風手足搐[illegible]失音不語口吐涎沫喉中作聲

附子 [illegible] 白附子 [illegible] 烏頭 [illegible] 天南星 半夏 [illegible]

乾蝎 [illegible]

右為散入麝香[illegible]分研勻每服一字至半錢以豆淋酒調下不拘時

[illegible]口用此藥[illegible]

全蝎散 [illegible] 治破傷風用此封瘡口其風自出

天雄 [illegible] 桂心 [illegible] 半夏 [illegible] 川烏頭 [illegible]

天南星 [illegible] 蜜陀僧 [illegible]

右生用搗羅為散每取二錢封瘡口其中如風出[illegible]

阿膠散 [illegible] 治破傷風角弓反張者

阿膠 [illegible] 白附子 [illegible] 桂心 [illegible] 羌活 [illegible]

當歸 [illegible] 天麻 [illegible]

右搗羅為散每服不計時候以豆淋酒調下二錢頻服出汗為效

防風散 [illegible] 治破傷風或身體疼痛風邪攻注[illegible]

者瘡痒毒太不仁頑[illegible]風者

防風一兩 蔓荊[illegible] 桃膠[illegible] 鬱金[illegible]

右為細末每服三錢[illegible]

（又方）治破傷風

南星 赤小豆 紫威芰 白芷 草烏

右各等分為末[illegible]貼瘡口燃貼佳可

（追風丹子）治破傷風[illegible]

蜈蚣[illegible] 附子尖[illegible] 乳香[illegible] 白花蛇頭肉

右為末煉蜜丸如彈子大[illegible]調下一丸至五丸或十丸要出汗[illegible]

（治破傷風）

天麻 雄黃 半夏 川芎 草烏

右為細末麝香少許每服三錢[illegible]調服[illegible]令汗風

忌發毒物半月一方[illegible]

（日敷子）治破傷風止疼生肌威麻痺

牡蠣[illegible] 寒水石[illegible] 南星[illegible] 白殭蚕[illegible]

龍骨[illegible]

右研為末擦瘡[illegible]

（治破傷風）背急口噤身強直[illegible]

草烏頭[illegible] 防風 雄黃[illegible] 麝香[illegible]

右每研[illegible]每服一字溫酒調下如是口噤以物斡開灌下[illegible]錢

神效

（麂角丹丸）治一切破傷角弓反張諸風

麂角[illegible] 麝香[illegible]

川烏頭[illegible] 蛤粉[illegible]

右搗羅為末更研令極細煉蜜丸[illegible]和搗二三百杵丸如彈子大一丸分作兩服不計時候以溫酒磨下

（烏頭丸）治破傷風

川烏頭[illegible] 蜀椒[illegible] 乾薑[illegible]

麂角[illegible] 麵[illegible]

右搗羅為末以醋和搗一二百杵丸如梧桐子大於破處用醋研破一兩丸塗之如無風三五日其瘡便可如有風即出却黃水便差

治中破傷風口噤筋脈拘急不知人事宜服此方

天南星[illegible] 乾蝎[illegible] 水銀[illegible] 乾薑[illegible]

附子[illegible]

右搗羅為末用棗肉和丸如菉豆大不計時候以豆淋酒下十丸

急風散 治久新諸瘡破傷中風項強背直腰為反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲及取箭頭

丹砂[illegible] 麝香[illegible] 生烏頭[illegible] 草烏頭[illegible]

右為細末和勻破傷風以酒一小盞調半錢神效如出箭頭先用酒一盞調服半錢却以藥貼箭瘡上一方用生烏頭

（辰砂奪命丹）[illegible]

麝香[illegible] 川烏頭[illegible] 麝香[illegible] 硃砂[illegible]

右為細末棗肉和為丸如彈子大硃砂為衣溫酒送下量病人年甲虛實加減用之小兒半丸以吐為度不止以葱白湯解之

（蜈蚣散）[illegible]治破傷風

蜈蚣頭 烏頭尖 附子底 蝎梢[illegible]

右為細末每用一字或半字熱酒調下如禁了牙關用匙尾斡開灌之

（治破傷風將欲死者）[illegible]

川烏頭[illegible] 天南星[illegible] 半夏[illegible] 天麻[illegible]

右以童男子小便二升半隔夜浸藥明日煎取一大升空心溫服分為三服進之服調藥末三錢如人行十里更一服丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥臊物雞犬等仍忌油膩及麵生冷硬物服至一二劑即吐出蟲子或泄瀉更不須服餘藥若未吐利即當再服病在上即吐在下即利皆出黑物如馬尾人髮即差

若吐瀉後若五臟虛煩燥不安即以白茯苓湯補之

白茯苓湯

白茯苓 二錢　人參 一錢　麥門冬 去心 一錢　防風 一錢

甘草 三錢　大棗 三枚

右以水二大盞煎作一盞，去滓，如人行五里一服，以盡為度。

若覺未安，隔日更作。

羌活防風湯 治破傷風，邪初傳在表。

羌活　防風　川芎　藁本　當歸

芍藥　甘草　地榆　細辛

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎至七分，熱服，不拘時候。量緊慢加減用之。如熱加大黃二兩，大便秘加大黃一兩，緩緩令過。熱甚更加黃芩二兩。

白朮防風湯 出保命集 若服前藥過多，自汗者。

白朮　黃耆 各一兩　防風 二兩

右㕮咀，每服七錢，水一盞半，煎至一盞，去滓服，無時。如破傷風，臟腑秘，小便赤，用熱藥，自汗不休，故知無寒也，宜速下之。先用芎黃湯三二服，後用大芎黃湯下之。若自汗多而風甚者，加桂枝一二錢。

芎黃湯 出保命集

川芎 一兩　黃芩 六錢　甘草 二錢

右㕮咀，每服五七錢，水一盞半，煎至一盞，溫服。不過三服，即止，再用下藥。

大芎黃湯 出保命集

川芎 五錢　羌活　黃芩　大黃 各一兩

右㕮咀，依前煎服，宜利為度。

羌活湯 出醫壘元戎 治半在表半在裏。

羌活　菊花　麻黃　川芎　白茯苓

防風　石膏　前胡　黃芩　蔓荊子

細辛　甘草　枳殼　薄荷　白芷 各半兩

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，生薑五片，同煎至一盞，去滓，稍熱服，不拘時候，日進二服。

防風湯 出保命集 治破傷風，同傷寒表證，未傳入裏，宜急服此藥。

防風　羌活　獨活　川芎 各等分

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎至七分，溫服。後宜調蜈蚣散，大效。

蜈蚣散

蜈蚣 一對　鰾 五錢　左蟠龍 五錢

右為細末，用防風湯調下。如前藥解表不已，覺直轉入裏，當服左龍丸服之，漸看大便硬軟，加巴豆霜。一方無左蟠龍。

左龍丸 出保命集 治直視在裏者。

左蟠龍 炒　白殭蠶 炒　鰾 炒　雄黃 一錢

右為細末，燒飯為丸，桐子大，每服十五丸，溫酒下。如裏證不已，當於左龍丸內一半末加入巴豆霜半錢，燒飯為丸，桐子大，同左龍丸一處，每服加一丸，漸加至利為度。若利後，如有搐搦不已，亦宜服後藥羌活湯。

羌活湯 出保命集

羌活　獨活　地榆　防風 各一兩

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，溫服。如有熱加黃芩，有涎加半夏。若病日久，氣血漸虛，邪氣入胃，全氣養血為度。

養血當歸地黃湯 出保命集

當歸　地黃　芍藥　川芎　藁本

防風　白芷 各一兩　細辛 五錢

右為粗末，水煎服。

治破傷風，手足顫掉不已者。

朱砂 另研　南星 薑製　獨活　人手足指甲

右為細末，分作三分，酒調服之，立效。

治破傷風

魚鰾　全蝎　江子　筋膠

右為細末，每服二三錢，用好酒調下。

天南星散 治破傷風，入四肢口不能語，及四肢強硬。

天南星 生用　防風 生用　草烏

蜈蚣

右為細末，每服一錢，酒調下，不拘時候。

[illegible]黃散 治破傷風。

南星 三錢　半夏 五錢　天麻 五錢　雄黃 二錢

右為末每服一錢[illegible]加大黃[illegible]之

〔地榆防風散〕[illegible]

發于宜服

地榆　防風　地丁[?]　馬齒莧[?]

右為末米飲下三錢

〔白术防風湯〕治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白术　黃芪[?]　[illegible]

右剉散水二盞煎服[illegible]

〔治破傷風〕烏蛇尾一條[illegible]　兩頭尖[illegible]

右為細末另用石灰[illegible]入水[illegible]

之鐵鍋內熬成膏[illegible]

藥細時[illegible]水一日[illegible]以新水[illegible]

〔玉真散〕治破傷風及金刃傷打

撲傷損

天南星　防風[illegible]

右為細末破傷風以藥敷瘡口[illegible]調下一錢如牙關緊

急角弓反張用藥二錢童子小便調下[illegible]

藥二錢溫酒調下打傷[illegible]

進三服天南星為防風[illegible]

方無[illegible]

清流日以此二[illegible]

二方極効

〔治破傷風口噤身強直〕

藿香　草烏[illegible]

右等分為細末每服[illegible]下後用藥貼瘡口

〔治破傷風〕

白芷[illegible]

右各等分為末[illegible]水[illegible]服之

〔神應丸〕[illegible]治破傷風[illegible]不省人事

半夏[illegible]

右為細末[illegible]

皆為天南星一兩[illegible]輕者不須服更審量之

初發熱[illegible]加減之

〔天南星丸〕治破傷風牙關緊急口噤不語口目斜[illegible]

天南星[illegible]　地龍[illegible]

右為末醋麵糊丸如[illegible]每服三丸至五丸生薑酒一盞[illegible]

復汗出如[illegible]此得効

〔乾蝎丸〕治破傷風

乾蝎[illegible]　天麻[illegible]　蟾酥[illegible]

右件三味為末[illegible]如[illegible]大每服一丸至二丸豆淋

酒下[illegible]

〔又命散〕治破傷風項強身體強直

蜈蚣[illegible]　白花蛇[illegible]　烏蛇[illegible]

右為細散每服二錢至三錢[illegible]煎[illegible]調服

〔守宮丸〕治破傷風身如角弓反張及筋脈拘急口噤

守宮[illegible]　天南星[illegible]

右同研勻以[illegible]糊丸如菉豆大每服[illegible]口[illegible]

不出得[illegible]

亦名碎宮子

〔[illegible]頭散〕治破傷風發熱頭痛心悶

草烏頭[illegible]　白芷[illegible]　蜀椒[illegible]

右為細末[illegible]水出是效[illegible]

三味追風散

烏頭[illegible]

右為細散每服一錢[illegible]同

〔[illegible]散〕治破傷風[illegible]

天南星[illegible]　白附子[illegible]防風[illegible]

右為細散每服二錢已重者童子小便調下[illegible]如外傷

[illegible]瘡口仍依去服之如破傷風[illegible]以小便[illegible]瘡口用藥

乾坤是出風毒之[illegible]便[illegible]開口灌之即

甦打至死但心頭微煖者灌一服[illegible]今以備急用

（天南星散）治諸破傷風[illegible]

天南星 [illegible]

右同研為細末[illegible]

（治破傷風）[illegible]

地膚子 [illegible] 秋蟬 [illegible]

右為末每服[illegible]

（雄黃散）治破傷風[illegible]

草烏頭 去皮 防風 [illegible]

右等分每服一字[illegible]

體強硬更用天南星 防風 [illegible]

紫汗出 [illegible] 方東 [illegible] 可服

（治破傷風）[illegible]

白芷 生用 草烏 [illegible]

右為末每用半錢令滿一盞入[illegible]

急以熱水投之汗出[illegible]

（治破傷風見血）[illegible]

半兩雷丸螺螄二錢合[illegible]

萬全

（香膠散）治破傷風口噤強直如中風

魚膠 [illegible] 麝香少許

右為細末每服二錢[illegible]

以蘇木煎酒調下

（蘄香散）治破傷風

麝香 研 蘄蛇 [illegible]

右為末傳患處[illegible]

（生丈豆）治破傷風神効

黑豆 [illegible]

右同研[illegible]

[illegible]治破傷風身體[illegible]

[illegible]子 [illegible]

右同研勻以熱酒[illegible]

下七丸[illegible]汗出差未汗再服

（治破傷風）[illegible]

病人耳塞[illegible]

又方

用白麵燒鹽各一撮新水調塗瘡上

又方

[illegible]二兩半[illegible]入花椒[illegible]同[illegible]炒熱再入酒二盞半溫

熱服之如重車行五里地遍身汗出神効

（治破傷風腫方）[illegible]

取杏仁研成膏[illegible]麻[illegible]灸之

（治因瘡腫痛者）皆由水中風寒所作腫入腹則殺人方

溫桑灰汁漬冷復溫之當令熱神効

一八

（治破傷風欲死者）

用[illegible]為細末[illegible]吐出涎末立瘥

（治破傷風）[illegible]

[illegible]大小[illegible]不[illegible]

（治破傷風）[illegible]不省人事[illegible]心[illegible]可治

用[illegible]

[illegible]皮上灸百壯不効如瘡口痛者灸至不痛不痛者灸至痛然

後用火[illegible]

又方 [illegible] 治緊急破傷風

用[illegible]一[illegible]以熱酒[illegible]服之立差[illegible]

（[illegible]散）[illegible]治破傷風口噤強直

以[illegible]取末[illegible]以末二錢[illegible]

（獨聖散）治破傷風

用[illegible]不拘多少[illegible]為細散每服二錢[illegible]酒調服之立效 一方

用巴豆七粒[illegible]同用

必效散 治破傷風

用蟬蛻白色者不拘多少……

細散每服一錢……

急風散 治破傷風……

用草烏頭不拘多少……

羅為細散每服一字……

白殭蠶散 治破傷風……

用白殭蠶直者不拘多……

瘡口掃之勿令乾……

方治瘡疹及大腸風秘……用蒜散之

本調塗之

治破傷風

用蟬心草……如棗核大……

治狗咬破傷風

以人參不計多少……

太平聖惠方卷第二十一 十七

治破傷風

用天雄末一兩加蜈大……

治破傷風瘡口作白痂無血者殺人……

用雄雞糞黃……

舒筋法 治破傷後筋……

尺餘……

救此方出……

治破傷風

黃明膠燒存性研二錢以熱酒調……

追風散 治破傷風

蟬蛻……

右件為細末……

治破傷風

蜈蚣二錢……

又方

赤散子 生天南星一兩為細末水調塗四面水出為效 治破傷風

雄黃 草烏頭 天南星

右為細末看瘡口大小以新水調塗之用紙覆面蓋如瘡痛

即以半夏服治之

半夏 黑附子 天南星 蟬蛻 藿香

烏蛇……

右件六味同為末每服一字豆淋酒調下如瘡上認痛即併進三服

立瘥……不汗不效

蜈蚣散

蜈蚣 鯉魚 左盤龍 野鴿糞是也

右件為細末每服一錢匕用酒調下治次依前用表和至可服仍有

……不可服……下之用前蜈蚣散四錢巴豆霜半錢燒飯為丸如

菉豆大每服一丸漸加至七丸煎酒調蜈蚣散少許送下宜利為度

內外風亦可常服羌活湯……不拘時候服之羌活湯者治中

聖濟總錄卷第……

……在表也

治一切破傷風 不可……

每時……破傷瘡口中……不定……

水煮……

妙功丸 治破傷風……

……

天麻丸 治破傷風

右為細末……為丸如梧桐子大每服一丸……以吐為度

天麻 川烏頭 草烏頭 雄黃

右為細末……為丸如梧桐子大每服十丸……送下不拘時候

白散 治破傷風及……中風……方

右以亂髮如雞子大……研為末以好酒……

何首烏末一錢……下……一二劑再進立效

除風散方 以草石藿香[illegible]

蠶葉散方

治破傷風方

防風[illegible] 天南星[illegible]

右二味等分為末每服[illegible]二錢童子小便五升煎至四升

服愈即止

治破傷風入瘡腫方

天南星 防風

右等分為末以醋調貼瘡上

○諸風統治

素問云九諸風掉眩皆屬於肝[illegible]皆足厥陰風木之位肝膽之氣也風者[illegible]所謂[illegible]氣甚而[illegible]運曰風木王則是金衰不能制木而木能生火故風大多為熱化皆陽熱多也風為病者或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或為[illegible]病各異其名不同經云[illegible]熱而悶風氣俱入行於諸脈分肉[illegible]致使肌肉憤䐜而有瘍[illegible]分肉之間衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也氣道不利故使肌肉[illegible]得傳偏癖發而不行[illegible]如木石也經曰[illegible]所發也以四時五運六氣[illegible]而絕也故春甲乙傷於風者為肝風[illegible]季夏戊己傷於邪者為脾風[illegible]傷於風者為肺風[illegible]日時[illegible]言不可快[illegible]

[illegible]當[illegible]而[illegible]腫痛不能[illegible]之始生[illegible]人之[illegible]風之用也[illegible]運[illegible]風者[illegible]熱[illegible]大主於熱以熱為本而風為標[illegible]頭目昏眩[illegible]強[illegible]咽嗌不利胃膈痞悶咳嘔喘滿[illegible]汗咬牙[illegible]語[illegible]小便多出[illegible]淋悶者或因[illegible]往來而[illegible]合并入於[illegible]或[illegible]者或胃氣[illegible]不能[illegible]時[illegible]之陽[illegible]太陽[illegible]寒[illegible]不已者[illegible]皆言邪熱[illegible]入於裏則[illegible]出之於表則發熱[illegible]則病作[illegible]則病已或風熱[illegible]者或胃水真除表[illegible]寒而[illegible]或卒中久不語或一切暴瘖而不語語不出聲或暗風癇者或洗頭風或破傷或中風諸潮搐并小兒諸癇積熱或驚風積熱傷寒疫癘不能辨者或熱甚怫結而反出不快者或熱黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑[illegible]身[illegible]學[illegible]或[illegible]生赤風刺癮疹[illegible]或風熱[illegible]為大風疾或腸風痔漏[illegible]酒過熱毒[illegible]諸邪所傷及調理傷寒已發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液損虛以致陰氣[illegible]陽氣[illegible]甚為諸搐[illegible]痛[illegible]喘[illegible]諸[illegible]骨[illegible]熱[illegible]生風而風熱燥[illegible]強口禁[illegible]陽內[illegible]一切風熱[illegible]而[illegible]物不下[illegible]痛[illegible]物[illegible]多[illegible]吐者[illegible]之[illegible]除大小瘡及惡毒[illegible]遠[illegible]傷[illegible]或[illegible]結大小便[illegible]或[illegible]者[illegible]風[illegible]感不一當隨證而治也

方

烏犀丸 治丈夫婦人卒中諸風……多涎或語蹇[illegible]
眼喎斜用薄荷……與酒……又治
癱瘓……風痛手足……不……麻痹風……腎……風毒上
攻下疰婦人血風頭旋吐逆皮膚瘙癢……痛

白术 [illegible] 白芷 [illegible] 枳殼 [illegible]
天竺黃 [illegible] 厚朴 [illegible] 獨活 [illegible]
何首烏 [illegible] 桑螵蛸 [illegible] 細辛 [illegible] 蔓荊子 [illegible]
丁香 [illegible] 萆薢 [illegible] 細辛 [illegible]
藁本 [illegible] 阿膠 [illegible] 陳皮 [illegible] 羌活 [illegible]
天南星 [illegible] 麝香 [illegible] 天麻 [illegible] 茯苓 [illegible]
半夏 [illegible] 犀角 [illegible] 人參 [illegible] 虎骨 [illegible]
藿香葉 [illegible] 肉桂 [illegible] 沉香 [illegible] 麻黃 [illegible]
川烏 [illegible] 檳榔 [illegible] 白殭蠶 [illegible]
白附子 [illegible] 防風 [illegible] 白花蛇 [illegible]
烏蛇 [illegible] 木香 [illegible] 石斛 [illegible] 水銀 [illegible]
蟬殼 [illegible] 川芎 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 附子 [illegible]
硫黃 [illegible] 牛黃 [illegible] 龍腦 [illegible] 硃砂 [illegible]
雄黃 [illegible] 鐵粉 [illegible] 龍齒 [illegible]
[illegible] 烏蛇 [illegible] 膩粉 [illegible]
當歸 [illegible] 熊膽 [illegible]

右爲細研令細……白蜜合和入臼……再杵五千下丸如……大常服一丸
不時薄荷湯或茶嚼下

草靈寶丹 ……治一切風疾及風……手足……
麻……身……其……味……
一切中風及八風五痺……
……神情如醉……身……
若……又治陽……
風雨之……
痛不得……臥……

川芎 [illegible] 枸杞子 [illegible] 當歸 [illegible] 細辛 [illegible] 菊花 [illegible]

白芷 [illegible] 荊芥 [illegible] 五加皮 [illegible] 白鮮皮 [illegible] 枳殼 [illegible]
薄荷 [illegible] 威靈仙 [illegible] 木香 [illegible] 甘草 [illegible] 皂莢 [illegible]
川附子 [illegible] 草烏頭 [illegible] 香附子 [illegible]
金毛狗脊 [illegible] 人參 [illegible] 地骨皮 [illegible] 防風 [illegible]
羌活 [illegible] 香白芷 [illegible] 柴胡 [illegible] 升麻 [illegible] 麻黃 [illegible]
烏藥 [illegible] 天麻 [illegible] 川楝子 [illegible] 何首烏 [illegible]
白术 [illegible] 石斛 [illegible] 車前子 [illegible] 自然銅 [illegible]
白牽牛 [illegible] 地龍 [illegible] 麝香 [illegible]
乳香 [illegible] 朱砂 [illegible] 川烏頭 [illegible] 烏梢蛇 [illegible] 皂角子 [illegible]
大黃 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 花蛇 [illegible]
風前 [illegible]
蕪荑 [illegible] 定……分兩
右件爲細末煉蜜爲丸如大龍眼大每服一丸空心臨臥細嚼用
溫酒送下茶清亦可服一月愈可修合
……

鐵……酒……
台……風……三十年……及諸惡風眉毛墮落

乾地黃 獨活 丹參 礬石
附子 甘遂 赤石脂 乾薑 麥門冬
芫花 栢子人 蘇子 蓯蓉 茵芋
金牙 紫菀 白术 杜仲 茯神
牡荊子 山茱萸 款冬花 白芷 石南
烏頭 人參 狼毒 蜀椒 烏喙
細辛 礬石 寒水石 牛膝 防風
芎藭 當歸 柴胡 芍藥 麻黃
桔梗 狗脊 天雄 石斛 牡蠣
桂心
右㕮咀以……二十……日夏三日春秋七日冬九日一服半合……
第……切令女人六畜見之三日清齋乃合一方無芎藭加大棗四十枚

大排風散 ……治一切風
天麻 [illegible] 羚羊角 [illegible] 萆薢 [illegible] 防風 [illegible] 芎藭 [illegible]
甘枸杞 [illegible] 山茱萸 [illegible] 薯蕷 [illegible] 細辛 [illegible] 藁本 [illegible]
蜀椒 [illegible] 秦艽 [illegible] 麻黃 [illegible] 枳殼 [illegible]

蔓荊子 肉蓯蓉 [illegible] 安息香 人參 三分
丹參 鹿角膠 [illegible] 地骨皮 [illegible]
白鮮皮 黃耆 [illegible] 牛膝 [illegible] 附子 二枚炮去皮臍
當歸 生乾地黃 [illegible] 石斛 [illegible]
蒼耳苗 乾薑 [illegible] 人參
羚羊角屑 白朮 [illegible]
萆薢 甘草 杏人 [illegible]
右件藥搗羅為散每服食前以溫酒調下二錢 [illegible]
忌生冷雞豬肉

大黑神丸 治一切風
曾青 雌黃 水銀 [illegible]
雄黃 白石英 紫石英 白礬 黃丹 [illegible]
金薄 五十片 銀薄 五十片 青石 定粉 大陰玄精
已上藥研令細入水銀同研了 [illegible] 于中先研子上 [illegible] 一小盒子內出陰 [illegible]

氣 細以水入食 [illegible]
以硃砂土 [illegible]
白龍腦 麝香 牛黃 天竹黃
真珠末 琥珀
已上細研與前藥臨時合勻
鹿胎 烏蛇 狸骨 虎脛骨 甘草
敗龜
已上並塗酥炙搗羅為末
天南星 白附子 天麻 麻黃 乾蝎
蟬殼 桂心 木香 [illegible] 羌活
細辛 白朮 附子 白僵蠶
犀角屑 羚羊角屑 [illegible]
右件藥搗羅為末與諸藥同研令勻 [illegible] 一千杵丸如酸棗大
每服以溫酒研下一丸 [illegible] 不救 洗頭風驚
奪命丹 [illegible]

方 治 [illegible] 風血風婦人產前產後血氣不調及諸筋骨節疼痛神效
天麻 人參 木香 白朮 菟絲子
藁本 [illegible] 川芎 白殭蠶 黃芩
全蝎 半夏 熟地黃 蔓荊子 甘草
桂 生地黃 地骨皮 薄荷葉 黃連
菊花 防風 [illegible] 知母 杜仲
茯苓 柴胡 桔梗 [illegible] 枳殼
石膏 當歸 羌活 白芷 麻黃
細辛 蜈蚣 全蝎 [illegible]
右為細末煉蜜為丸每服十丸細嚼茶清 [illegible] 不拘時婦人調
血 [illegible] 酒調下食前日進三服

龍虎丹 治丈夫婦人新得久患癱瘓風半身不遂手腳筋衰
風毒攻注遍身瘙癢頭風多饒白屑面上生瘡刺風狀如針
刺癱風手足偏作 [illegible] 頭風不思 [illegible] 頭生 [illegible] 眼黑

瘡風面生赤點肝風鼻悶眼瞤偏風眼暗斜嚲曳風肢節筋攣
風心多驚逆頂風行步不穩麻風鼻塞頭疼腦風令人不 [illegible] 風內
[illegible] 行肝風耳內蟬鳴陰風瘙癢
黑牽牛 藿香葉 天麻 朱砂
硫黃 天竺黃 細辛 半夏 白乾薑
附子 何首烏 羌活 獨活 柴胡
川芎 桔梗 寒水石 通草 前胡
甘松 肉桂 五靈脂 白芷 菊花
川烏 白殭蠶 縮砂仁 牙硝 木香
水銀 雄黃 麝香 地龍
硃砂 白蒺藜 防風 龍腦 烏蛇
右為細末煉蜜為丸如雞頭大用薄荷酒嚼下日進一
服 [illegible] 產後身多虛壅血風
[illegible] 下日進兩
[illegible] 小兒驚風 [illegible]

化下小兒大人急風口噤失音[illegible]化服之常服茶酒任下不
拘時候服
神効活絡丹[illegible]治男子婦人中風不省人事倒地不能起坐
諸藥不効此藥一丸[illegible]大氣化開[illegible]口眼喎斜語言蹇澀半身
癱瘓拜口噤失音[illegible]手足不能屈身骨節疼痛
不能轉側精神昏憒[illegible]不便[illegible]
千金汗[illegible]
扶策行動至日四五服[illegible]
量微[illegible]一丸[illegible]
酒送下半時不省再服一丸[illegible]
丸亦可以汗出為驗凡人[illegible]
諸風之證其藥神驗[illegible]
痰數年不瘥因得此藥服[illegible]安[illegible]
及宁用以醫治風疾無不效[illegible]今二十餘年[illegible]此藥[illegible]
賦謹錄此方以廣其傳

烏蛇 麻黃 木香
白芷 全蝎 當歸
兩頭尖 防風 [illegible]
沒藥 血竭 硃砂
甘草 [illegible] 乳香
片腦 官桂 草豆蔻 天麻
香附子 玄參 人參 牛黃 藿香
威靈仙 何首烏 天竺黃
川附子
右為細末煉蜜為丸[illegible]一兩半重作十丸[illegible]大[illegible]
送下[illegible]
續朱丹[illegible]
雄黃 [illegible]
白花蛇 [illegible]

[illegible]
白附子 [illegible] 牛黃 羚羊角屑
天南星 [illegible] 當歸 草[illegible]
藿香
地龍 乾薑 羌活
白菊花 麻黃 天雄 藁本
人參 [illegible]
蠶蛾 白芷 白茯苓
防風 [illegible] 牛蒡子 龍腦 麝香
乾蝎 [illegible]
[illegible]為末入[illegible]令勻煉蜜和擣一二十杵丸如櫻桃大
以硃砂[illegible]令[illegible]人至十[illegible]大等見[illegible]
研下一丸忌生冷[illegible]滑動風物
大蓁草散[illegible]治一切風[illegible]文[illegible]
蓁草 木香 人參 白朮
草[illegible] 仙靈脾 [illegible]子人 石斛 牛膝
石[illegible] 細辛 山茱萸 松脂 桂心
白附子 乾蝎 杜仲 赤芍藥
防風 芎藭 [illegible] 牛黃 麝香

雄黃 松香 天南星 牛蒡子
羌活 巴戟 白僵蠶
附子 天麻 烏蛇
麻黃
右[illegible]為[illegible]入研了藥同研令勻每服以溫酒調下一錢忌生冷諸
雞肉
雄黃[illegible]丸 治癱風及白虎風腳膝筋脈不利攣痛抽掣鬼
疰風并骨節攣痛
雄黃 硫黃 硃砂 鬼箭羽 犀角屑
側子 羚羊角屑 鹿角 附子 [illegible]
川烏頭 木香 防風 牛膝 細辛
虎脛骨 石斛 敗龜 菖蒲 熟乾地黃
[illegible] 薑黃 巴戟 芎藭 續斷
杜[illegible] 當歸 桑[illegible] 狗脊 萆薢
肉桂 白朮 桂心 杜仲 川椒

天雄（生去皮臍）一兩

右細剉以煉了臘月猪脂八兩於鐺中慢火煎天雄又入白牙
候藥味盡用新綿濾去滓更入研黃雄黃
砒砂等以柳木篦攪令勻又以於鐺中慢火煎青羊脂
二百遍候凝上件空心以溫酒下如綠豆
子大

全保命丹 治諸風緩急頭目
暈眩胸中煩鬱痰涎壅塞又治心氣不足神志不
定驚悸怔忡悲憂慘戚少精昏悶
兒驚風搐搦不定及大人諸風如當此藥大能
治之

朱砂　真珠　麻黃　白附子
雄黃　龍腦　犀角　枳殼
犀角鎊　門冬子　琥珀　茯神
遠志　人參　柴胡　全蝎　牛黃
天麻　殭蠶　蟬子　麝香　牙硝
藁本　天竺黃　防風　甘草　桔梗
白朮　升麻　蟬蛻　黃芩　荊芥

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下不拘時候忌
猪羊鷄桃動風引痰之物又加大川烏炮去皮臍半夏
生薑汁浸白礬川芎各一兩猪牙皂角一兩和前藥作末為丸

龍腦丸 治一切風

龍腦　麝香　真珠　琥珀
雄黃　犀角屑　人參　羌活
白花蛇　附子　白茯苓
琥珀　附子　蔓荊子　防風
烏蛇　乾蝎
天麻　芎藭　白殭蠶
半夏　藿香　丁香
硃砂　沉香　木香

右搗羅為末與研了藥同研令勻煉蜜和搗一二千杵丸如菉豆大
每服以溫酒下五丸至七丸薄荷湯下亦得忌猪雞肉毒滑動風物

羌活愈風湯（出保命集） 療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憒及
治風濕內弱者是風熱體重也或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂或
恐而健忘喜已多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生靜則萬
病息是以此藥能安心養神調陰陽無偏勝及治一切諸風無問新久

羌活　甘草　防風　黃耆　蔓荊子
川芎　細辛　枳殼　人參　地骨皮
麻黃　知母　甘菊　薄荷　枸杞
當歸　獨活　白芷　杜仲　秦艽
柴胡　半夏　厚朴　熟地黃　防己
芍藥　黃芩　白茯苓　石膏
生地黃　蒼朮　桂　前胡

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生薑煎三片
空心一服吞下二丹丸為之重劑臨臥一服吞下四白丹為之輕劑立其法是動以安神靜以清肺
假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生
薑五七片空心服之以粥投之得微汗則佳○如一旬之通利用愈
風湯三兩加大黃一兩亦勻作四服如前臨臥服之得利為度○常
服之藥不可失四時之輔如望春大寒之後加半夏二兩柴胡二兩
人參二兩通四兩謂迎而奪少陽之氣也○望夏之月加石
膏二兩黃芩二兩知母二兩通六兩謂迎而奪陽明之氣也
○季夏之月加防己二兩白朮二兩茯苓二兩通六兩謂勝脾土之濕也
○初秋大暑之後加厚朴二兩藿香二兩桂一兩通五兩謂迎而奪太陰之氣也
○望冬霜降之後加附子一兩官桂一兩當歸二兩通四兩謂勝少陰之氣也

大通丸 治一切風疾不能動

黃丹　雌黃　雄黃　紫石英　朱砂
定粉　曾青　鉛霜　水銀

金箔[illegible] 銀箔[illegible] 生銀屑[illegible] 磁石一兩
滑石[illegible] 鉛霜[illegible] 白礬[illegible] 硇砂[illegible]
已上藥各細研入一固濟了瓶子中[illegible]
初以火半斤[illegible]瓶子二寸[illegible]以大火五斤
燒令通赤便去火放令冷[illegible]在上以盆
蓋之四畔以土擁閉經二伏時出火毒[illegible]細入後藥末
猪牙皂角[illegible] 檳榔[illegible] 茯神[illegible] 麝香[illegible]
丁香半兩 檳榔[illegible] 木香[illegible] 沉香[illegible]
乾蝎[illegible] 麝香[illegible] 龍腦[illegible]
蛇蛻皮[illegible]
右擣羅為末入龍腦麝香[illegible]研令勻以[illegible]和擣五七百杵
丸如梧桐子大每服以薄荷酒研下[illegible]忌生血物
赤箭散方治一切風
赤箭一兩 烏蛇[illegible] 犀角屑[illegible] 藿香[illegible]
檳榔[illegible] 麻黃[illegible] 乾蝎[illegible] 晚蠶蛾[illegible] 殭蠶[illegible]

[illegible]卷第二十一 六 [illegible]

麝香[illegible] 龍腦[illegible] 蟬殼[illegible] 牛黃[illegible] 芎藭
防風[illegible] 白朮 人參[illegible] 茯神 當歸
木香 牛膝[illegible] 蔓荊子 白殭蠶[illegible] 細辛
蟬殼 附子[illegible] 乾薑[illegible] 天南星[illegible] 桑螵蛸[illegible]
白附子[illegible]
右件藥擣羅為散入研了藥更研令勻每服以溫薄荷酒調下一錢忌生冷
豬雞肉
神効牛黃丹[illegible]治一切風[illegible]
牛黃[illegible] 龍腦[illegible] [illegible] [illegible]
金薄[illegible] [illegible] 天麻[illegible]
羌活[illegible] 獨活[illegible] [illegible] 白殭蠶[illegible]
麻黃[illegible] 烏蛇[illegible] 桂心[illegible] 乾蝎[illegible]
白附子[illegible] 天南星[illegible] 羚羊角[illegible] 芎藭[illegible]
人參[illegible] 當歸[illegible] [illegible] 白芷[illegible]
細辛[illegible] [illegible] 桑螵蛸[illegible] 白茯苓[illegible]

[illegible]
右件藥擣羅為末入研了藥令勻煉蜜和擣一二千杵丸如雞頭實大每
服以溫[illegible]酒下[illegible]
小麻黃散[illegible]治一切風
麻黃[illegible] 天麻[illegible] 萆薢[illegible] 防風[illegible]
甘草[illegible] 羌活[illegible] [illegible]子[illegible] 白朮 細辛
芎藭 牛膝[illegible] 山茱萸 澤瀉 赤芍藥
松脂[illegible] 附子[illegible] 白附子[illegible] 天南星[illegible] 乾蝎[illegible]
枳殼[illegible] 當歸 石龍芮 犀角屑
烏蛇肉[illegible] 白殭蠶[illegible] 半夏[illegible]
杜仲[illegible] 麝香[illegible]
鉤藤[illegible] 牛黃[illegible]
右件藥擣羅為散入研了藥更研令勻每服溫酒調下一錢忌生冷豬雞
[illegible]

[illegible]卷第二十一 八 [illegible]

牛黃清心丸[illegible]治諸風緩縱不隨語言蹇澀心忪健忘恍惚去來頭
目眩冒胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憒又治心氣不足神志不定驚恐
怕怖悲憂慘慼虛煩少睡喜怒無時或發狂顛神情昏亂
白芍藥[illegible] 麥門冬[illegible] 黃芩[illegible] 當歸[illegible] 防風[illegible] 白茯苓[illegible]
白朮[illegible] 柴胡[illegible] 桔梗[illegible] 芎藭[illegible] 人參[illegible]
杏仁[illegible] 神麴[illegible] 蒲黃[illegible] 大豆黃卷[illegible]
羚羊角末[illegible] 麝香[illegible] 龍腦[illegible] 肉桂[illegible] 牛黃[illegible]
阿膠[illegible] 白斂[illegible] 乾薑[illegible]
[illegible] 雄黃[illegible] 乾山藥[illegible] 甘草[illegible] 金箔[illegible]
大棗[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

黃芪 [illegible] 羌活 [illegible] 芎藭 厚朴
柴胡 桔梗 [illegible] 官桂
乾薑 貫眾 [illegible] 巴豆霜 人參
羌活 肉蓯蓉 檳榔 [illegible] 大黃 當歸
陳皮 防風 麥門冬 熟地黃 [illegible] 防己
車前子 白朮 細辛 [illegible] 川烏頭 [illegible]
右爲細末，入巴豆霜勻，煉蜜和，搗千下，出爲丸，如桐子大。每
服三丸，溫酒下，米飲亦得。

小排風散 治一切風

天麻 防風 羌活 桂心 附子 [illegible]
白附子 人參 [illegible] 白蒺藜 朱砂 [illegible]
芎藭 麻黃 [illegible] 白茯苓 木香
威靈仙 白殭蠶 [illegible] 細辛 藁本
白朮 檳榔 [illegible] 羚羊角 海桐皮
白芷 枳殼 [illegible]
右搗羅爲散，入研藥拌令勻，每服一錢，以溫酒調下二錢，忌生冷油膩
豬肉。

木香保命丹 治男子婦人[illegible]中風，[illegible]口眼喎斜，手
足偏枯，四肢拘攣，不能屈伸，麻痺不仁，[illegible]
昏暗，風入腹內，胸[illegible]心中[illegible]
病語[illegible]
婦人產前產後中風[illegible]
止藥引血[illegible]
動氣之物不能[illegible]
酒[illegible]過酒[illegible]清[illegible]
之藥下立效[illegible]
骨[illegible]
一[illegible]子大，如人[illegible]手足[illegible]是中風之[illegible]
服此藥[illegible]
木香 [illegible] 附子 [illegible] 赤[illegible]

羌活 [illegible] 菟絲子 [illegible] 萆薢 大防風
藁本 [illegible] 甘菊花 威靈仙 官桂 全蝎
厚朴 [illegible] 杜仲 白花蛇 [illegible]
牛膝 獨活 虎骨 當歸 [illegible] 乾[illegible]
大麻 天南星 [illegible] 白芷 麝香
硃砂 [illegible]
右爲細末，其藥分作十分，[illegible]麝香一分，[illegible]煉蜜和丸，如彈子大。每
服一丸，細嚼，[illegible]下，不拘時候。

大通丹 治[illegible]癱瘓，并一切風，口眼喎斜，語言謇澀，手足不便。

雄黃 硫黃 丹砂 [illegible] 水銀 金
鉛[illegible] 鉛丹 胡粉 消石 白礬 [illegible]
右[illegible]一處和勻，入固濟瓷餅內，餅子上注一小眼，用火養之，養加
火，若餅內有煙出，便用鹽泥塞，更養一日。
鵝[illegible] 龍腦 麝香 玉屑 犀角
烏蛇 [illegible] 白花蛇 [illegible] 附子 [illegible]
牛黃 [illegible] 當[illegible] 蟬蛻 白殭蠶 天竺黃
蓽澄茄 天麻 白附子 [illegible]
右爲末，并前十味同研勻，糯米飯和丸，如小彈子大。若初得
患，先洗浴，豆淋酒化下一丸，心膈不煩，津液俱生，如人行十里以來，
用稀粥飲投之，良久汗出便解，三日服一丸。

前胡湯 治八風十二痺，五緩六急，半身不遂，四肢偏枯，筋脈拘
攣，肩髀疼痛，腰脊不能俛仰，胸腹膨脹，心煩目眩，耳聾，咽喉不利，或時
腳中痛如錐刺，行人皮中，或有風處，或四肢肌體偏有冷痺，狀如風
火，並宜服。

前胡 [illegible] 細辛 [illegible] 大黃 [illegible] 漢防己
川烏頭 [illegible] 石斛 [illegible] 山茱萸
梔子人 甘草 木通 桂心 秦艽
黃耆 乾薑 熟乾地黃 茯苓 附子
杜仲 芎藭 五[illegible] 澤瀉 石南
防風 遠志 牛膝

右件藥細剉，每服三錢，水一盞[illegible]，煎至[illegible]，[illegible]一小盞服，
食前，以服以差為度，忌生冷油膩動風物。
治風偏枯，半身不遂，行步艱難，[illegible]四肢不遂，不能行步，不自[illegible]掌，
[illegible]五臟六腑，婦人產下[illegible]中風，五痹[illegible]
乾薑　麻黃　桂心　甘草　芎藭
續斷　細辛　附子　秦艽　天雄
石膏　黃芩　當歸　杏仁　防風
栀子人　[illegible]天　石斛　石南　山茱萸
石龍芮　[illegible]　牛膝　獨活　蜀椒
右㕮咀，以水五升漬之一宿，煎[illegible]升，[illegible]一升，分[illegible]三[illegible]
[illegible]一三服，三宿[illegible]，[illegible]合日[illegible]，[illegible]
乾末服
審金丸　治男子婦人風邪，志不定，恍惚，[illegible]心忪，[illegible]口噤，
舞手足[illegible]及風癇，[illegible]，[illegible]中風，
不省人事，小兒驚癇[illegible]。

甘草[illegible]　[illegible]　[illegible]　甘草
羌活　麻黃　茯苓　[illegible]　[illegible]
白芷　附子　[illegible]　人參
防風　[illegible]　[illegible]　[illegible]
白附子　天竺黃　[illegible]　天麻
金箔　[illegible]　[illegible]
右為細末，以[illegible]，[illegible]丸，以金箔為衣，每服一
丸，細嚼，溫酒下，[illegible]，[illegible]三丸，用[illegible]
[illegible]，[illegible]
薄荷小兒每服[illegible]，[illegible]大[illegible]一方[illegible]二
丙
敗龜丸　治[illegible]，[illegible]風寒不足之氣，
[illegible]，[illegible]不[illegible]行，[illegible]左[illegible]右，
[illegible]偏枯，起止不前，[illegible]，[illegible]日[illegible]之
[illegible]　[illegible]一　川烏[illegible]

草[illegible]　牛膝[illegible]　虎骨[illegible]　麝香一錢
芎藭　羌活　全蠍　[illegible]　乳香
沒藥　木鱉子　[illegible]　五加皮　威靈仙
薏苡仁　白附子　[illegible]　地龍　木香
骨碎補　朱砂
右為細末，[illegible]為丸，[illegible]桐子大，每服五十丸，[illegible]酒送下
神妙[illegible]神丸　[illegible]一切風
雄黃　[illegible]　水銀　[illegible]　朱砂
金星石　太陰玄精　白石英　紫石英　赤石脂
磁石　[illegible]　消石　定粉　黃丹
已上藥細研入[illegible]，[illegible]子[illegible]上[illegible]，[illegible]口以六一泥固濟，
令乾，先以文火養，[illegible]令[illegible]，[illegible]以泥塞穴，[illegible]以大火煅，令通
赤，[illegible]用[illegible]子一日，出火毒，[illegible]取出，研入[illegible]
烏蛇肉　天麻　天南星　麻黃
犀角屑　桂心　白附子　[illegible]　牛黃

麝香　白花蛇
右將[illegible]為末，[illegible]，[illegible]丸如櫻桃大，每服以豆
淋酒下一丸，[illegible]一切風
[illegible]大通丸　[illegible]一切風
硇砂　水銀　[illegible]
朱砂　[illegible]　定粉　黃丹　消石
雄黃　自然銅
已上藥細研入[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]子四[illegible]泥
合[illegible]用炭火三斤[illegible]，[illegible]，[illegible]盞子，[illegible]用炭
火一十斤，[illegible]，[illegible]以[illegible]二斗，[illegible]子切
令[illegible]一[illegible]，[illegible]以盆蓋一宿，出火毒，研令
[illegible]
天麻　白僵蠶　[illegible]　桂心　犀角屑
[illegible]　芎藭　白附子　天南星
附子　[illegible]　麻黃　白龍腦
川烏　[illegible]　麝香　牛黃

右搗羅為末入前藥末及龍腦等都研令勻細煉蜜和搗五七百杵

丸如雞頭大每服以豆淋酒研下一丸不計時候[illegible]

物[illegible]

麝香丸 [illegible] 治一切風

牛黃 細研 麝香 [illegible] 乾蝎 [illegible]

鹿角膠 [illegible] 朱砂 [illegible] 白附子 [illegible]

白花蛇 [illegible] 天麻 [illegible] 白茯苓

白芷 [illegible] 天南星 [illegible] 蔓荊子 麻黃 [illegible]

獨活 木香 烏蛇 [illegible] 桂心

藁本 [illegible] 當歸 [illegible]

右搗羅為末入研了藥更研令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子

大每服以溫酒下[illegible]

香丸有風氣[illegible]

女人孝子[illegible]

大通聖白花蛇散 [illegible] 治諸風 [illegible] 手足 [illegible]

不正精神昏憒口面喎斜語言[illegible]

皮膚瘙癢骨節[illegible]

麻痹[illegible]

白花蛇 [illegible] 天麻 [illegible] 烏蛇 [illegible]

牛膝 [illegible] 蔓荊子 [illegible] 肉桂 [illegible] 羌活 [illegible]

菊花 [illegible] 藁本 [illegible] 萆薢 [illegible] 赤箭 [illegible] 厚朴 [illegible]

虎骨 [illegible] 甘草 [illegible] 杜仲 [illegible] 白附子 [illegible] 乾蝎 [illegible]

海桐皮 [illegible] 萆薢 [illegible] 乾山藥 白芷 [illegible]

右為細散每服一錢[illegible]

風氣通行[illegible]

又一方用[illegible]

烏蛇丸 [illegible]

不仁及[illegible]

[illegible]

烏蛇 [illegible]

全蝎 [illegible] 甘草 [illegible] 生犀 [illegible] 川芎 [illegible]

殊砂 [illegible] 天南星 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 羌活 [illegible]

遠志 [illegible] 牛黃 [illegible] 白附子 [illegible] 獨活

防風 人參 [illegible] 麻黃 [illegible] 藁本 [illegible] 吳白芷

桂心 甘草 [illegible]

右為細末入[illegible]藥再勻煉蜜為丸每兩作一十丸以殊砂為衣每服

一丸薄荷茶清化下或加至二丸茶酒化下亦得孕婦人不宜服

之

神效麝香丸 [illegible] 治一切風及破傷風不可忍者

麝香 [illegible] 殊砂 [illegible] 牛黃 [illegible] 天麻 [illegible]

烏蛇 [illegible] 芎藭 [illegible] 獨活 [illegible] 防風 [illegible] 乾蝎 [illegible]

白殭蠶 [illegible] 甘菊花 [illegible] 天南星 [illegible] 敗龜 [illegible]

桂心 [illegible] 白花蛇 [illegible] 附子 [illegible]

木香 [illegible] 荊芥 [illegible] 人參 [illegible] 地龍 [illegible] 海桐皮 [illegible]

乾薑 [illegible] 當歸 [illegible] 細辛 [illegible]

右搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸如小豆大每服以暖酒[illegible]

[illegible]五七丸忌生冷毒滑[illegible]

麝香散 [illegible] 治一切風

犀角屑 [illegible] 羚羊角屑 [illegible] 人參 [illegible] 防風 [illegible]

白芷 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 麻黃 [illegible] 芎藭 [illegible]

天麻 [illegible] 茯苓 [illegible] 桂心 [illegible] 天門冬 [illegible]

牛膝 [illegible] 麝香 [illegible] 桑螵蛸 [illegible] 甘菊花 [illegible] 白附子 [illegible]

乾蝎 [illegible] 藿香 [illegible] 辰砂 [illegible]

右為細散入研了藥更研令勻每服以溫酒調下二錢忌毒魚動

風物等

豨薟丸 [illegible] 治一切風

豨薟 [illegible] 萆薢 [illegible] 羌活

海桐皮 [illegible] 牛蒡子 [illegible] 石斛 [illegible] 牛膝 [illegible]

巴戟 [illegible] 當歸 [illegible] 桂心 丹參

防風 [illegible] 牛膝 骨碎補 羚羊角屑

大香 [illegible]

右搗羅爲末以好酒[illegible]於銀鍋中以慢火熬後入諸藥末用柳木篦不住手攪[illegible]入麝香末一錢令勻於瓷器中盛每服[illegible]

(虎骨酒) 治諸[illegible]體袒運動艱[illegible]

虎脛骨 [illegible] 附子 [illegible]

一兩 [illegible]

獨活 [illegible] 赤芍藥 [illegible] 杜仲 [illegible] 萆薢 [illegible] 羌活 [illegible]

防風 [illegible] 牛膝 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible]

黃耆 [illegible] 金毛狗脊 [illegible] 白茯苓 [illegible] 白蒺藜 [illegible]

人參 [illegible] 天麻 [illegible] 當歸 [illegible]

右剉如麻子大以生絹袋盛[illegible]浸[illegible]春夏五日夏三日秋七日冬十日[illegible]

焙[illegible]爲末酒糊爲丸空心酒下[illegible]

(虎骨丸) 治風氣[illegible]筋骨[illegible]手足不[illegible]

虎脛骨 [illegible] 當歸 [illegible]

牛膝 [illegible] 獨活 [illegible]

金毛狗脊 [illegible]

蝎爪子 [illegible] 天麻

石斛 [illegible] 防風 [illegible]

右除[illegible]以[illegible]爲末[illegible]丸如梧桐子大每服十五丸溫酒

或制[illegible]下不[illegible]

(搜風[illegible]丸) [illegible]

牛膝 [illegible] 羌活 [illegible]

天麻 [illegible] 赤茯苓

羌活 [illegible]

[illegible] 五加皮 [illegible]

白附子 [illegible]

右爲細末煉蜜和丸[illegible]丸如雞頭大每服一丸嚼破温酒或荊芥茶下日三

(牛黃丹) 治一切諸風[illegible]

犀角屑 天麻 防風 川羌活 白芷

木香 甘菊 甘草 白殭蠶 南星

山茱萸 [illegible] 地骨皮 川芎 薄荷葉 蔓荊子

麻黃 [illegible] 當歸 桂 [illegible] 乾蝎 [illegible] 麝香 [illegible]

硃砂 [illegible] 白花蛇 [illegible]

右爲細末煉蜜和丸每兩作八丸用前硃砂爲衣每服一丸不拘時候細嚼人參湯化下或茶酒化亦可

(紫星丹) 治一切風

曾青 綠青 胡粉 桃花石 紫石英

白石英 [illegible] 硃砂 [illegible] 雄黃 九明砂

黃丹 定粉 水銀 [illegible] 生金屑 [illegible] 山澤銀屑 [illegible]

眞珠末 [illegible]

已上藥搗羅入水銀研令細內瓶子中蓋頭以鹽泥固濟候乾以慢火養七日後用大火煅之候冷取出用甘草水浸掘地以紙

襯藥埋於地上以盆合之一復時後細研

龍腦 牛黃 [illegible] 麝香 [illegible]

雄黃 犀角屑 [illegible] 光明砂

右件藥[illegible]細研以麵糊和丸如皂莢子大每服以熱酒下一丸忌

毒滑魚肉動風物

(秦艽散) 治一切風熱[illegible]

秦艽 [illegible] 人參 [illegible] 白术 當歸 天雄 [illegible]

附子 [illegible] 川烏頭 [illegible] 乾薑 [illegible] 川椒 [illegible]

[illegible] 防風 [illegible] 桂心 漢防己 萆薢 [illegible]

白歛 [illegible] 黃耆 [illegible] 桔梗 [illegible] 麻黃 [illegible]

山茱萸 細辛 [illegible] 麻草 五味子 甘草 [illegible]

右搗羅爲散每服以温酒下二錢忌生冷豬肉

(玄英丹) 治一切風

雄黃 白附子 天麻
白花蛇 白僵蠶 半夏
天南星 天雄 麝香
乾蝎 芎藭 [illegible]
犀角屑 馬牙消 硫黃 水銀
[illegible]
右搗羅為末研令勻以煉蜜和搗三二百杵丸如雞頭大每服以溫薄
荷酒研下七丸日三四服病在四肢經絡即於食後服病在臟腑
汗避風忌豬雞魚動風物

羌活散方治一切風

羌活 天麻 麻黃 香附子 人參
胡麻子 細辛 藿香 木香 犀角屑
芎藭 桂心 當歸 天雄 [illegible]
白附子 地龍 烏蛇肉 [illegible]
乾蝎 麝香

右搗羅為散研入麝香令勻每服以溫酒調下一錢[illegible]
得忌豬雞魚等

天南星散方治一切風[illegible]

天南星 防風 羌活
附子 丹參 藁本
天麻 白殭蠶 桂心 藏[illegible]
牛膝 [illegible] 牛黃
[illegible]
右搗羅為散[illegible]一錢

天麻散方[illegible]

天麻 桂心 防風
白附子 石斛 [illegible]
鹿角膠 當歸 芎藭
山茱萸 仙靈脾 巴戟

沉香 木香 麝香
右搗羅為末入無灰酒五升入白蜜五合同於銀鍋中慢火熬成膏先
下天麻末以柳木篦攪勿令稠得所於瓷器中
盛每於食前以溫酒調下一茶匙忌生冷雞豬魚等物

五枝煎方治一切風

桃枝 柳枝 槐枝
黑豆
已上藥於釜中用水三斗煮至一斗去滓却以慢火煎至五升入
後藥

附子 肉桂 天麻 羌活 沉香
牛膝 仙靈脾 天蓼木子 芎藭 當歸
海桐皮 [illegible] 安息香 乳香 [illegible]

右搗羅為末入前煎中入白蜜一升以慢火熬以木篦攪不得住
手令稀稠得所於瓷器中盛每服以溫酒調下半茶匙空心及晚食
前服忌生冷豬雞魚滑物

石斛煎方治一切風

磁石 天麻 羚羊角 防風 羌活
芎藭 牛膝 附子 五加皮 仙靈脾
白附子 桂心 木香 薏苡人 天蓼木子
丹參
已上並搗羅為末
竹瀝 薄荷汁 牛蒡汁 白蜜
右件藥以無灰酒五升先煎石斛等三升濾去滓次下諸藥末以柳
木篦攪不住手攪令稀稠得所以瓷器盛
每服以溫酒調下一茶匙空心及晚食前服忌生冷豬雞魚滑
動風物

烏雞煎方治一切風

烏雞 [illegible]
羌活 桂心 芎藭 防風
附子 [illegible] 熟乾地黃 烏頭

獨活 石斛 虎脛骨
當歸 海桐皮 川芎 白膠香 地骨皮
五加皮 百靈藤 松節
右件藥都細剉和勻以水一石煮取五斗與麴米如常法同醞酒候
熟取日飲三四盞忌生冷毒滑動風物
金砂丹 治中風涎潮失音不語頭目昏眩大便秘澀口眼喎斜
但係風熱之疾半身不遂或偏身麻痺並宜服之
白花蛇 烏蛇肉 牛黃 白殭蠶
犀角屑 琥珀 天麻 人參 白茯神
甘草 龍腦 麝香 桂心 真珠
天竺黃 鐵粉 朱砂 全蝎 銀箔
右為細末煉蜜和丸每兩作十丸以金箔為衣每服一丸人參
湯化下或竹葉湯調灌如中風不語者斟酌與服
鎮風丸 治一切驚癇搐搦
人產後角弓反張
烏頭 五靈脂 白附子 莽草
防風 地龍 半夏 白殭蠶
乳香 沒藥 全蝎 麝香
陳皮 當歸 蔓荊子 乾蠍
天麻 白花蛇 海桐皮
右為末用生薑自然汁和丸如櫻桃大每一丸分作四
服豆淋酒下
下偏頭疼夾腦風攻注四肢或麻痺或瘙癢
羌活散 治一切風疾
痛當歸
甘草 芎藭 生地黃 山梔子
蔓荊子 當歸 香白芷 荊芥
石膏 薄荷 白芍藥 赤芍藥
細辛 防風 桔梗 防風
右每服四錢水一盞半煎八分去滓加大黃朴硝

數行俱退則痛之甚者更加或春冬多則數行夏減一二行便
補自後每日一貼不加大黃利清用火煎至分數如病人血色如黑
芍多加當歸生地黃病人麻木或走刺痛甚多加羌活白芷麻黃芎
藥煎必當用文武火於沙石器內煎存下藥粗細能多加朴硝在內
煎湯法各如無當歸以蘇木代之
醉風丹 治諸風疾無問新久者半身不遂口眼喎斜語言蹇澀
精神昏憒痰涎併多咽嗌不利及風虛頭痛目眩旋運顛倒或心悸健
忘恍惚不寧手足麻痺顫掉無力筋脈拘急骨節煩疼行步艱難並宜
服之
獨活 防風 吳白芷 麻黃
藁本 白芍藥 天麻 川烏頭
藿香葉 甘草 全蝎 白花蛇
川芎 羌活 白殭蠶 遠志
朱砂 白附子 牛膽南星
右為細末煉蜜為丸每兩作十丸朱砂為衣每服一丸細嚼茶或化服
烏犀丸 治一切風
用生薑湯下或溫酒下病傷風豆淋酒下急風痛病人急調下
不拘時候此藥攻効不可具述
烏犀角屑 天麻 桂心 防風 羌活
附子 人參 獨活 當歸
芎藭 乾蠍 羚羊角屑 草薢 藁本
蔓荊子 麻黃 白附子 白殭蠶 龍腦
麝香
右為細末入龍腦麝香研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如櫻桃
大每服一丸嚼破以溫酒下
御摩風膏 治風根即多疾肌肉頑痺或偏體瘙癢或癱瘓
宜用
躑躅花 羌活 防風 芎藭 杏人
細辛 當歸 白斂 白朮 白芷
丹參 苦參 玄參 桂心 附子

川烏頭　皂莢　甘草　川大黃
右件藥細剉以米醋一升浸…後入皂莢炒令乾…
月豬脂二斤以慢火…以新布絞去滓更以綿
濾過再入鐺中…收於瓷合中每服…經久不壞也
一彈子大…

〔川芎石膏散〕治一切風熱上攻頭目昏眩或膈上風痰
喘嗽或目疾時發塞生瘡…便秘淋閉或
癬瘡搔癢宜服之清利…解
中外諸邪…調理…

川芎　山梔子　荊芥穗　當歸　芍藥
大黃　菊花　人參　白朮　甘草
石膏　防風　藿香葉　連翹　滑石
寒水石　黃芩　桔梗　縮砂

右為粗末每服三四錢…分去滓食後溫服日進二三服
或為細末溫水調下二三錢亦可…

〔人參羌活散〕治一切風疾

人參　羌活　獨活　天麻　甘草
半夏　川烏　白芷　川芎
細辛　藁本　白茯苓　陳皮
天台烏藥　木香　赤芍藥　當歸

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片同煎至一盞入麝香少許攪勻
空心食前服如手足麻痹…如熱多加荊芥穗半兩

〔大聖黑神丸〕治癱瘓…疾

木香　…花　烏頭　烏蛇
…　…　防風　白芷
麻黃　…　芫花
桂　…　天南星
吳茱萸　…

右為末入…丸如雞頭大每服一
丸溫酒化下…

服以…之疾…

〔防風羌活丸〕…常服永除風疾之患

防風　羌活　五加皮　芍藥　人參
丹參　薏苡人　玄參　麥門冬　生地黃
大黃　青木香　松子人　磁石　檳榔子
枳實　牛膝　茯神　桂心

右搗篩蜜和為丸如梧子大以酒服十五丸日再服稍稍加至三十
丸為度…生蔥…

〔一捻金〕治一切諸風

甘草　人參　天麻　芍藥　薄荷
荊芥　川芎　乳香　沒藥　白芷
甘松　鬱金　藜蘆　桔梗　甘菊花
藁本　茯苓　防風　細辛

右各等分為細末每用大許…鼻內…

〔白花蛇丸〕治一切風

附子　白附子　半夏　白花蛇肉
天南星　天麻　乾蝎
…　羌活　防風　芎藭
桂心　甘菊花　白鮮皮　木香　巴豆
…　硃砂　雄黃　麝香

右搗羅為末入硃砂雄黃麝香等研令勻以糯米粥和搗二三千杵
丸如梧桐子大…每服以…下二丸

〔…〕治一切風…婦人血風丈夫…
…
…風氣諸疾

藁本　赤箭　羌活　獨活　芎藭
防風　肉桂　附子　續斷　五加皮
甘菊花　麻黃　赤芍藥　細辛　乾蝎
當歸　牛膝　枳殼

右搗羅為散每服以溫酒調下一錢…

毒魚獸[illegible]物一[illegible]乾嚥

頭風散 [illegible]又治肝風及產後血氣[illegible]頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞身重項背拘急皮膚瘙痒面上游風狀若蟲行[illegible]一切頭風無問婦人血風攻注頭目昏痛並皆治之常服清頭目消風化痰涎

川烏[illegible] 防風[illegible] 川芎[illegible] 白殭蠶[illegible]

荊芥[illegible] 石膏[illegible] 白附子[illegible] 羌活[illegible]

白芷 全蝎[illegible] 天麻[illegible] 地龍[illegible]

乳香[illegible] 雄黃[illegible]

右為細末每服一錢入好茶[illegible]食後茶清調服

龍麝追風散 [illegible]塞咽乾四肢麻木[illegible]因傷飲食生冷[illegible]

何首烏 天麻[illegible] 防風[illegible] 草烏[illegible]

甘草[illegible] 胡椒 荜撥[illegible]

零陵香 川芎[illegible] 白檀[illegible]

麻黃[illegible]

右為細末[illegible]每服一錢[illegible]入好茶[illegible]人日三服

退風如意丸 [illegible]物並[illegible]之大有[illegible]

白茯苓[illegible] 丁香 木香

人參[illegible] 細砂人 宦桂[illegible]

荊三稜[illegible] 乾山藥[illegible]

甘草[illegible]

右為細末[illegible]每服一百十丸有[illegible]加減丸數服[illegible]可大能可食物五七日[illegible]物不泊魚鮭[illegible]消此藥[illegible]便住利後[illegible]即補之

甘露散 [illegible]服如意丸後便服此藥即補能分陰陽大有[illegible]

白滑石[illegible] 澤瀉 甘草[illegible] 人參 茯苓

白朮 木猪苓[illegible]

右為細末每服三錢白湯調服欲分陰陽寒和丸如彈子大用湯化

羌活湯 治偏風癱瘓腳氣等疾如觸氣熱濕服之

羌活[illegible] 麻黃[illegible] 防風[illegible] 木香

檳榔[illegible] 附子[illegible] 烏頭[illegible] 草豆蔻[illegible]

陳橘皮[illegible] 白朮 牛膝[illegible] 當歸[illegible] 杏人[illegible]

人參 白茯苓 甘草 芎藭 桂[illegible]

右剉如麻豆每服一兩水三盞生薑七片煎至一盞去滓取七分溫服大腑不通加大黃末一錢量老少加減久不通者加至三五錢小腸不通心胸煩加芒硝滑石末各一錢骨節痛[illegible]化下上喘[illegible]咳嗽氣急加半夏升麻天門冬知母末各三錢服訖衣覆取汗不過三五服差

走馬丹 [illegible]治一切風

硃砂[illegible] 雄黃[illegible] 硫黃[illegible] 水銀[illegible]

已上四味同研極細[illegible]定取巴豆一斤和皮[illegible]以定合內巴豆一半鋪底入前四味藥在巴豆中心上又以巴豆蓋之如法同[illegible]乾入[illegible]中用[illegible]大[illegible]取出并巴豆灰與四味藥同研極細更入後藥

木香[illegible] 天麻[illegible] 羚羊角[illegible] 白附子[illegible] 天南星[illegible]

丁香[illegible] 肉桂[illegible] 麝香[illegible] 龍腦[illegible] 白花蛇[illegible]

[illegible] 白殭蠶[illegible] 乾蝎[illegible] 附子[illegible]

藿香[illegible]

右為細末與前藥同研令勻用[illegible]和為五七百丸[illegible]每日空心以溫酒下十丸[illegible]忌動風物

雄黃丸 [illegible]治一切風

雄黃[illegible] 牛黃[illegible] 乾蝎[illegible] 麝香[illegible] 白殭蠶[illegible]

天南星　白花蛇　天麻　白附子
天雄　半夏
蟬殼　獨活　白殭蠶　犀角屑
[illegible]膠 一兩
右搗羅為末，煉蜜和搗三二百杵，丸如皂莢子大，每服以溫酒嚼下五
丸，如心煩壅悶驚風，則以荊芥薄荷湯下之。

神効無比牛黃丸 治一切風
牛黃　朱砂　麝香　龍腦
附子　白殭蠶
白附子　乾蝎　天南星　當歸 一兩
桂心 一兩　木香　天麻　[illegible] 一兩
獨活 一兩
右搗羅為末，入研了藥，同研令勻，煉蜜和搗三五百杵，丸如櫻桃大，
每服以薄荷酒研下一丸，荊芥茶下亦得。

花桑枝煎 治一切風
花桑枝　海桐皮　仙靈脾　五加皮　牛膝根
已上五味細剉，以水三斗，煎取一斗，濾去滓，却入鍋中，使火熬至五
升
附子　羌活　桂心
萆薢　羚羊角屑　續斷　防風
當歸　大黃　檳榔　人參
右搗羅為末，以前藥汁中煎，入……
三升，後下諸藥末，以柳木篦攪……
空心及晚食前以溫酒下……不過

復壽延春丹
且顏見者，補五臟……
志記，添精髓……
人參 一兩　白茯苓　牛膝　杜仲
黃耆　[illegible]　菟絲子　甘菊花
地骨皮　天花　生地黃　熟地黃

五智　萆薢　羌活
右為細末，酒糊為丸如梧桐子大，每服三五十丸，空心以溫酒送下。

搜風順氣丸 順三焦，和五臟，潤腸胃，除風氣，又治冷熱壅結，津
液耗少，令人大便閉澀不通，及年高氣弱，及有風人大便閉澀，尤宜服
之
大黃 五兩　車前子 二兩　檳榔 一兩　火麻子 二兩　山藥 二兩
郁李仁　菟絲子　牛膝　木香　羌活
白茯苓　續斷　防風　枳殼　獨活
人參　白朮　甘草
右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三十五丸，加至五十丸，溫水送下，
不拘時，此方加味，補藥在內，用之屢驗。

換骨丹 治癱瘓一切風疾，傷寒等
烏蛇　天麻　蝎梢　天南星　厚朴
犀角　羚羊角　丹砂　藿香葉　白檀香
零陵香　天竺黃　麝香　牛黃　雄黃
烏犀
右除別研外，搗羅為末，與別研者和勻，煉蜜和杵三五百下，用瓷器
盛，每服一丸，薄荷湯下，大人如白豆大，小兒如菉豆大……
服，治卒中風入臟，粉少許水調同藥化下，小兒驚風，金銀薄荷湯下，
婦人血風，產後中風手足拘攣，當歸紅花酒下，傷寒豆淋酒下三五丸。

防風通聖散 治一切風熱鬱結，氣血蘊滯，筋脈拘倦，肢體
焦痿，頭目昏眩，腰脊強痛，耳鳴鼻塞，口苦舌乾，咽嗌不利，胸膈痞悶，咳
嘔喘滿，涕唾稠粘，腸胃燥熱結，便溺淋閉，或夜臥寢汗，咬牙睡語，筋惕驚
悸，或腸胃怫鬱結，水液不能浸潤於周身，而但為小便多出者，或濕
熱內甚，而時有汗泄者，或因亡液而成燥淋閉者，或因腸胃燥鬱，水
液不能宣行於外，反以停濕而泄，或燥濕往來，而時結時泄者，或表之
正氣與邪熱并甚於裏，陽極似陰，而寒戰煩渴者，
或熱甚變為瘧，久不已者，
或風熱走注，疼痛麻痺者，或腎水真陰衰虛，心火邪熱暴甚，而僵仆，或卒中
久不語，或一切暴瘖而不語，語不出聲，或暗風癇者，或洗頭風，或

破傷中風或諸風癎[illegible]或吐[illegible]
熱傷寒疫癘不能辨別者[illegible]
欲死者或大人小兒風熱瘡[illegible]久不愈者或頭生白屑[illegible]
白斑頑或面鼻紫赤風刺癮疹[illegible]肺風者或成癘風[illegible]大風疾
者或腸風痔[illegible]
解或不經發汗頭項身體[illegible]或諸濕[illegible]
致陰氣衰[illegible]
極生風而風熱燥[illegible]一切風[illegible]
物不下腰脚[illegible]
或墮墜打撲損傷[illegible]
指背風[illegible]
散

防風 [illegible] 石膏 [illegible] 滑石 [illegible] 當歸 [illegible]
芍藥 [illegible] 甘草 [illegible] 荊芥穗 [illegible] 薄荷葉 [illegible]
麻黃 [illegible] 山梔子 [illegible] 連翹 [illegible]
黃芩 [illegible]

右為麁末每服二三錢[illegible]生薑三片煎至八分[illegible]
時日三服病甚者[illegible]
或無生薑[illegible]
熱涎[illegible]不可[illegible]作細末
通關丸[illegible]下化小兒服大人[illegible]
[illegible]一切風[illegible]目[illegible]
手背顫動
香附子 [illegible] 地龍 [illegible] 川芎
白殭蠶 [illegible] 乾蝎
白芷 [illegible] 天麻 [illegible]
麥[illegible] 細辛 [illegible]
石為細末[illegible]大[illegible]
空[illegible]新[illegible]發[illegible]
太一丹 治諸風一切風

川烏頭 [illegible] 乾蝎 [illegible] 白附子 [illegible] 天麻
天麻 [illegible] 羌活 殭蠶 [illegible] 硃砂 [illegible] 乳香 [illegible]
白附子 [illegible] 附子 [illegible] 牛黃 [illegible] 雄黃 [illegible] 龍腦 [illegible]
安息香 [illegible] 麝香 [illegible] 白花蛇肉 [illegible]
右[illegible]為末入研了藥令勻以麻黃五兩去根節搗碎以酒五升
煎至二升去滓入[illegible]一兩更熬成膏次下諸藥末和搗三五百
杵丸如菉豆大以[illegible]不[illegible]過不[illegible]令乾每服以溫酒下七丸忌動風物
[illegible]血[illegible]氣[illegible]筋血之間內
[illegible]不[illegible]之病[illegible]風血氣五[illegible]一切
風[illegible]之服之[illegible]言宣
[illegible]川芎
荊芥子 [illegible] 人參 [illegible] 威靈仙 [illegible] 蒼朮 [illegible] 白芷
五味子 [illegible] 硃砂 [illegible] 香附子 [illegible] 何首烏 [illegible] 防風 [illegible]
麻黃 [illegible] 苦參 [illegible] 麝香 [illegible]

[illegible]麻黃去根不去節用河水三石三斗三升小半七升是也熬六
斗[illegible]去[illegible]黃[illegible]二升半入其餘藥末[illegible]兩三錢作一十
丸硃砂為衣每服一丸[illegible]一[illegible]至[illegible]服之神清[illegible]
[illegible]五日服之如中風[illegible]服[illegible]自汗服之是
[illegible]也若[illegible]入於密室溫臥取汗
大乙散 [illegible]陽明[illegible]風[illegible]入令人口眼喎斜麻木不仁及驚
[illegible]手足搐搦不省人事
羌活 [illegible] 川芎 熟乾地黃 甘草 [illegible]
人參 防風 當歸 [illegible] 肉桂 [illegible] 白茯苓 [illegible]
黑附子 [illegible] 杜仲 [illegible] 牛膝 [illegible] 白芍藥 續斷 [illegible]
細辛 [illegible]
右為麁末每服三錢水[illegible]大[illegible]七分去滓[illegible]服無時
[illegible]頭足諸熱風[illegible]令不便熱
[illegible]大[illegible]一大[illegible]水三[illegible]取四斗[illegible]大
斗[illegible]三[illegible]小[illegible]三日如[illegible]法[illegible]日二三
[illegible]

[illegible]
大朴丹參[illegible]天門冬[illegible]枸杞[illegible]
一大升去[illegible]
取六大斗[illegible]
人[illegible]
熱[illegible]
散中下[illegible]甘菊花[illegible]
瓶中下[illegible]
更可餌[illegible]
服至三月服[illegible]
者是
單[illegible]
是良藥[illegible]
香頭[illegible]
獨活　山茱萸　[illegible]　甘菊花

防風　天雄　[illegible]　防己　[illegible]
茯苓　牛膝　[illegible]
磁石　[illegible]
右切以[illegible]
治主腫脚[illegible]
石斛散主　治大風四肢不[illegible]
筋攣不能行[illegible]
大風[illegible]
消令人不[illegible]
足方
石斛　[illegible]　牛膝　[illegible]　杜仲　[illegible]　柏子人
石龍芮　[illegible]　山茱萸
澤瀉　[illegible]　防風　細辛
遠志　[illegible]
右治[illegible]

[illegible]
不能行[illegible]以棗膏丸如梧子大每
服七丸一[illegible]
九風湯　治[illegible]風疾
天台[illegible]　沉香　香附子　甘草　陳皮
青皮　木香　木通　檳榔　厚朴
桂皮　人參　藿香　白茯苓　半夏
菖蒲
右為粗末[illegible]服入分不拘時通口服
天仙聖化丹　治一切風證
川芎　防風　羌活　獨活　胡麻子
金毛狗脊　苦參　[illegible]　皂角　當歸
荊芥　[illegible]　全蝎　[illegible]　何首烏
香白芷　蒼耳草
右為細末用大楓子二[illegible]如泥與藥和勻用陳米糊打

糊為丸如梧桐子大每服四十丸加至六十丸如病人面上浮腫[illegible]
中年不止或是風[illegible]手足拘攣先服此藥一料亦用荊芥茶送
下茶清亦得日進四服空心食後午後臨卧服之或病人四肢麻木
手足[illegible]天仙聖化丹一料後服聖化丹藥十日後仍用
[illegible]打針先於面上放血次於[illegible]上後放[illegible]上血如過天道
晴明五六日間如此放血一次量病輕重不可放血太多若婦人[illegible]
病放血多不妨
天麻[illegible]丹
當歸　[illegible]　防風　[illegible]　川芎
[illegible]　羌活　[illegible]　金毛狗脊
獨活　[illegible]
右等分[illegible]為細末用新大楓子四斤去殼不用其肉爛杵如
泥入前末子藥和勻用[illegible]為丸如梧桐子大每服五
十丸至七十丸病在下以荊芥茶清空心送下食後用茶清送下[illegible]
在上可空心用茶清送下食後臨卧以荊芥湯送之日進三四服切忌

經風動氣毒物上食白粥白飯六忌勿[illegible]

治一切風疾又服皆[illegible]

胡麻 威靈仙 [illegible] 苦參 甘草

石菖蒲

右六味各等分研爲細末每服一錢溫酒一盞調下食後臨卧調服之

天麻丸 治一切風

天麻 [illegible] 羌活 [illegible] 桂心 [illegible] [illegible]

附子 [illegible] 防風 [illegible] 細辛 [illegible] 乾蝎 [illegible]

白附子 [illegible] 犀角屑 [illegible] 牛黃 [illegible] [illegible]

硃砂 [illegible] 龍腦 [illegible] 麝香 [illegible]

右搗羅爲末入研了藥[illegible]令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子

大每服以溫酒[illegible]下[illegible]中風不語口噤不識人[illegible]

悶者研化服之

狐肝丸 治一切風

狐肝 [illegible] 烏蛇 [illegible] 天南星 [illegible]

天麻 [illegible] 藿香 [illegible] 白附子 [illegible] 烏蛇 [illegible]

桑螵蛸 [illegible] 乾蝎 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 麝香 [illegible]

白蒺藜 [illegible]

蟬殼 [illegible] 牛黃 [illegible]

右搗羅爲末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以溫酒[illegible]下

槐枝煎 治一切風

嫩槐枝 [illegible] 牛蒡根 [illegible]

已上二味細剉以水五斗煎取[illegible]至二斗已來即去滓澄濾

用煎後藥

石楠 [illegible] 生杏仁 [illegible] 桑根白皮 [illegible] 羚羊角屑 [illegible] 生薑 [illegible]

烏雞糞 [illegible]

已上六味以前槐枝汁煎之[illegible]入後藥末

烏蛇 [illegible] 天麻 [illegible] 羌活 [illegible] 防風 [illegible]

[illegible] 白蒺藜 [illegible] [illegible] 附子 [illegible]

右件[illegible]入[illegible]二升同煮至一升去滓[illegible]每服[illegible]

[illegible]食前[illegible]

下[illegible]

[illegible]

牛膝 [illegible] 蒼耳子 [illegible]

牛蒡 [illegible] 大麻子 [illegible]

枸杞子 [illegible] 防風 [illegible] 萆薢 [illegible]

虎脛骨 [illegible] 羌活 [illegible] 桔梗 [illegible]

[illegible] 敗龜 [illegible] [illegible] 附子 [illegible]

右件藥[illegible]以生絹袋盛用好酒三斗浸[illegible]密封[illegible]

日開之[illegible]時不得面對瓶口每日空腹日午[illegible]和衣量力[illegible]服一盞

重者不過[illegible]劑[illegible]

[illegible]續命散 治[illegible]風[illegible]主之

麻黃 [illegible] 芎藭 [illegible] 獨活 [illegible] 防己 [illegible] 甘草 [illegible]

杏仁 [illegible] 桂心 [illegible] 附子 [illegible] 茯苓 [illegible] 升麻 [illegible]

細辛 [illegible] 人參 [illegible] 防風 [illegible] 石膏 [illegible] 白朮 [illegible]

右[illegible]以五方寸匕內小絹袋子中以水四升和生薑三兩煮取

二升半分三服日日勿絕[illegible]令大良[illegible]中風言語[illegible]四服[illegible]

[illegible]此方日服四服十日[illegible]服之不絕[illegible]

乳香丸 治一切風疾[illegible]

[illegible]

何首烏 [illegible] 大淑 [illegible]
羌活 [illegible] 白芷 [illegible]
草烏 [illegible] 桔梗 [illegible]

右為細末每[illegible]打一千餘錠為丸[illegible]頭
大每服一丸[illegible]不省人事節骨
疼痛手足戰顫[illegible]麻[illegible]下[illegible]胃攻衝腸
胃虛弱溫酒下小兒天吊風[illegible]湯下[illegible]攻衝心腹疼
瘡生薑湯下[illegible]風[illegible]婦人血[illegible]
風當歸湯下小兒驚風[illegible]湯下[illegible]不伏水土[illegible]
孕婦當歸化下服七丸勿過飲[illegible]

異虎丹一 治諸風神驗
蒼术[illegible]　麻黃[illegible]　川烏[illegible]　防風
荆芥　白芷　金釵　石斛　天麻
川芎　甘草　何首烏　當歸
一兩[illegible]　一兩[illegible]　一錢[illegible]

右為細末煉蜜為丸如[illegible]彈子大每服一丸[illegible]治男子婦女
三十六種風疾[illegible]遍身[illegible]酒下[illegible]胃風[illegible]湯下
遍身紫癜白癜風防風湯下[illegible]下手心
遠年癱瘓風大麻湯下[illegible]風[illegible]腰脊疼痛
氣下注乳香[illegible]湯下[illegible]風生薑
湯下心腹[illegible]湯下[illegible]
痛下發狂[illegible]湯下
資[illegible]可異能丸[illegible]
足拘攣[illegible]

一俱靈散 理諸般風[illegible]
、白然銅[illegible]
、川烏[illegible]
、香附[illegible]
、蒼术[illegible]　川烏　陳皮
、黑附子[illegible]　烏蛇[illegible]　羌活

、白术[illegible]　、南星[illegible]　吳茱萸 一兩
右為末與白蒺藜[illegible]和勻[illegible]煉蜜為丸如梧桐子大每服[illegible]酒下一丸六十
[illegible]中[illegible]身不遂起上能者空心服[illegible]酒下一丸[illegible]
日[illegible]腰膝疼痛走注不定[illegible]
行[illegible]入[illegible]服[illegible]不[illegible]酒下[illegible]出汗
[illegible]一[illegible]如前法服[illegible]入口
手[illegible]出汗[illegible]依法服二十日[illegible]治[illegible]風[illegible]麻風[illegible]偏風[illegible]
[illegible]下一錠[illegible]二錠[illegible]見功[illegible]腿膝下[illegible]痛不可忍者
[illegible]一[illegible]磨一[illegible]入生薑自然汁[illegible]許同煎五七沸研二錠服
之[illegible]以小[illegible]攤[illegible]下[illegible]治[illegible]氣[illegible]時[illegible]
勝[illegible]者[illegible]一[illegible]一[illegible]入生薑[illegible]許同煎五七沸
中[illegible]生[illegible]一[illegible]童[illegible]一[illegible]但[illegible]以上
疾者服以下[illegible]不[illegible]可服三服[illegible]一方[illegible]疾加[illegible]
[illegible]三[illegible]各二兩[illegible]以下疾[illegible]食前服[illegible]上疾[illegible]食後
服一方[illegible]一兩半服之

白花蛇丸 治一切風
白花蛇肉[illegible]　天南星[illegible]　白殭蠶[illegible]
[illegible]　桂心　草薢[illegible]　藁本　附子[illegible]
白附子[illegible]　天麻　羌活　芎藭　防風[illegible]
麻黃[illegible]

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後臨時特
[illegible]服十丸以[illegible]酒[illegible]下[illegible]行即[illegible]汗出如[illegible]
[illegible]服以汗出為度[illegible]避風[illegible]

天麻丸 治一切風
天麻[illegible]　[illegible]　牛膝[illegible]　獨活
[illegible]　[illegible]　仙靈脾　天雄[illegible]
山茱萸　[illegible]　萆薢[illegible]　茵芋　海桐皮[illegible]
桂心　[illegible]

右搗羅為末入白蜜五合相和於銀鍋中[illegible]大熱以柳木篦攪
[illegible]以[illegible]服[illegible]溫酒下一丸[illegible]空心及晚食前服

液泉膏[illegible]治諸風拘攣手足麻痺不仁風痺疼痛[illegible]
中寒痛積聚並可治之

當歸[illegible] 木瓜[illegible] 地黃[illegible] 大[illegible]
附子[illegible] 桂[illegible] 秦艽[illegible]
乾薑[illegible] 白芷[illegible] 生地黃[illegible]
豬肪脂[illegible]

右以地黃汁大米醋漬[illegible]煎之十五沸[illegible]成膏[illegible]濾去滓入[illegible]砂[illegible]婦人亦當見之每用少許摩揉患處[illegible]為度又治[illegible]有痰是心腹積冷酒調半匙日三服病無不愈一方有[illegible]

獨活續命湯[illegible]治[illegible]中風不省人事涎壅身不遂舌眼喎斜手足戰掉語言蹇澀[illegible]精神昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸手足[illegible]及治諸風服之[illegible]若治[illegible]先[illegible]以防痛疾

麻黃[illegible] 人參[illegible] 黃芩 芍藥 芎藭
甘草[illegible] 杏仁[illegible] 桂[illegible] 防己
附子[illegible] 防風[illegible] 獨活
乾[illegible]

右為粗末每服三錢以水一[illegible]入生薑五片煎取一[illegible]去滓稍熱食前服

剪刀股丸[illegible]治一切風

白茯苓[illegible] 山芋[illegible] 天麻[illegible] 防風[illegible] 全蝎[illegible]
羌活[illegible] 川芎[illegible] 甘草[illegible] 麥門冬[illegible] 枸杞[illegible]
白附子[illegible] 殭蠶[illegible] 藿香[illegible]

右為細末水[illegible]服之[illegible]

治風痿通[illegible]

防風[illegible] 秦艽[illegible] 乳香[illegible] 牛膝[illegible]
人參[illegible] 當歸[illegible] 鼈甲[illegible]
萆薢[illegible] 松節[illegible] 杜仲[illegible] 前根[illegible]

右[illegible]酒[illegible]浸之過一宿後[illegible]每日早午晚各飲一盞酒盡以其藥焙乾再[illegible]為酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸酒下不拘時

治[illegible]花蛇散[illegible]治[illegible]風

白花蛇[illegible] 白殭蠶[illegible] 麝香[illegible] 硃砂[illegible]
羌活[illegible] 天麻[illegible] 附子[illegible] 桂心[illegible]
當歸[illegible] 牛膝[illegible] 芎藭[illegible] 萆薢[illegible]
乾蝎[illegible] 防風[illegible]

右搗羅為散入研了藥更研令勻每服以溫酒調下一錢忌生冷雞豬肉等

乳香丸[illegible]治男子婦人[illegible]風[illegible]血脉[illegible]筋骨疼痛手足麻痺半身不隨[illegible]偏正頭風小中急風手足疼痛手[illegible]四肢軟弱[illegible]頭下注腰脚生瘡[illegible]疼痛並宜服之

川芎[illegible] 躑躅花[illegible] 木鱉子仁 白膠香[illegible] 乳香[illegible]
白殭蠶[illegible] 五靈脂[illegible] 白芷[illegible] 當歸[illegible] 地龍[illegible]
麻黃[illegible] 草烏[illegible]
何首烏[illegible]

右為末[illegible]丸如梧桐子大每服五丸不可多服食後用荊芥茶下忌[illegible]婦人不可服

乳香丸[illegible]治一切風疾左癱右瘓口眼喎斜身不遂語言蹇澀經絡[illegible]疼痛筋脉拘攣[illegible]身癢[illegible]腳膝[illegible]行步艱難又名打撲傷損瘀血不散痛不可忍或行路勞傷腳膝浮腫疼痛或[illegible]攻面腫[illegible]下注腳膝[illegible]偏正頭疼攻注眼目並皆療之

龍骨[illegible] 赤小豆[illegible] 糯米[illegible]
虎骨[illegible] 白殭蠶[illegible] 草烏頭[illegible]
白膠香[illegible] 天麻[illegible] 川牛膝[illegible]
全蝎[illegible] 乳香[illegible] 木鱉[illegible] 川當歸[illegible]

右為細末用醋糊為丸如梧桐子大每服五丸至七丸冷酒吞下或冷茶清下日得不計時候忌諸熱物一時辰久此藥但臨臥服尤妙忌濕麵炙煿鮓醬發熱動風等物

大防風湯 [illegible] 袪風 [illegible]
[illegible] 不能行履名鶴
風或兩膝腫大痛 [illegible] 不能屈伸名鶴膝風
服之氣血流暢肌肉漸生 [illegible] 如故 [illegible] 其奇方也

川芎 [illegible]　附子 [illegible]　熟乾地黃 [illegible]　白朮
防風 [illegible]　當歸 [illegible]　白芍藥 [illegible]　黃耆 [illegible]
杜仲 [illegible]　羌活 [illegible]　人參 [illegible]　甘草 [illegible]
牛膝 [illegible]

右爲麁末每服五錢水一盞半入生薑七片大棗一枚同煎八分去
滓溫服空心食前 [illegible]

鐵彈丸 [illegible] 男子婦人一切 [illegible] 表 [illegible] 中風口眼喎斜
語言蹇澀手足亸曳難以轉側 [illegible] 或如蟲行或失音不語
腰脚不能行步 [illegible] 頭 [illegible] 神不爽頭重昏悶夜臥不
安 [illegible] 不能 [illegible] 口乾 [illegible] 如破傷風身如角弓口噤不開
手如 [illegible] 頭風 [illegible]
[illegible] 手足頑
多情 [illegible] 婦人血風手足頑麻
頭旋倒地並皆治之

白附子 [illegible]　全蝎 [illegible]
烏頭 [illegible]　白花蛇 [illegible]
辰砂 [illegible]　五靈脂 [illegible]　木鱉子 [illegible]
乳香 [illegible]

右爲末蜜丸如彈子大 [illegible] 每服一丸分二十服 [illegible]
分三十服 [illegible]

大黃丸 [illegible]
大黃 [illegible]　麻黃 [illegible]
羌活 [illegible]　白附子 [illegible]
雄黃 [illegible]　麝香　白花蛇 [illegible]

右爲末煉蜜和丸如 [illegible] 服 [illegible] 飲酒一兩
[illegible]

仙靈脾煎 [illegible] 治一切風
仙靈脾 [illegible]
肉桂 [illegible]　芍藥 [illegible]　牛膝 [illegible]　附子 [illegible]
萆薢 [illegible]　五加皮　酸棗仁　虎骨膠 [illegible]
木香　乳香 [illegible]　石斛 [illegible]　當歸

右搗羅爲末於銀鍋中入蜜煎 [illegible] 合下諸藥末 [illegible]
[illegible] 攪令稠 [illegible] 收於瓷器中 [illegible] 每食
前以 [illegible] 下 [illegible]

牛黃小烏犀丸 [illegible] 治諸風筋脈拘急手足麻痺語言謇澀 [illegible]
心怔忡 [illegible] 頭目昏眩 [illegible] 痛 [illegible]
風上攻面 [illegible] 頭 [illegible]
男 [illegible]
天麻 [illegible]　川烏 [illegible]　地榆 [illegible]　玄參 [illegible]
已上爲細末以水少許化蜜同於石鍋內 [illegible]
入後藥
[illegible]
[illegible] 龍腦 [illegible] 薄荷 [illegible]
朱砂 [illegible]　生黃 [illegible]　麝香 [illegible]　犀角 [illegible]
右爲細末與前膏子 [illegible] 搜和丸如雞頭大每服一丸細嚼 [illegible] 茶
下溫酒亦得不計時候

龍腦芎犀丸 [illegible] 消風化痰除心肺邪熱去頭面諸風治偏正頭疼
心膈煩熱面熱目赤 [illegible] 鼻塞 [illegible]
石膏 [illegible]　川芎 [illegible]　生龍腦 [illegible]　生犀角 [illegible]　山梔子 [illegible]
朱砂 [illegible]　人參 [illegible]　茯苓 [illegible]　細辛 [illegible]
甘草 [illegible]　阿膠 [illegible]　麥門冬 [illegible]
右除 [illegible] 後入 [illegible] 爲細末煉蜜爲丸 [illegible] 每服一丸至二丸細嚼
茶酒任下食後服

牛黃丸 [illegible] 治卒暴中風 [illegible] 精神昏塞不省人事 [illegible]
目直視 [illegible] 口噤 [illegible] 手足 [illegible]
直 [illegible]
[illegible] 散 [illegible] 治諸風上攻頭目 [illegible]

目眩痰運[illegible]

人血氣風痰[illegible]

荊芥穗 [illegible]

防風 茯苓 [illegible] 當歸 人參

右為細末每服二錢[illegible]日三服

[illegible]

調下不拘時候[illegible]

[illegible]

藿香 [illegible] 方風

太白丸 治諸風痰[illegible]

頭重目眩不利清爽[illegible]

天麻 芎藭 [illegible] 白附子

半夏 [illegible] 細辛 [illegible]

寒水石 [illegible]

右同為細末[illegible]

太白丸 治諸風頭目[illegible]

頭重目眩不利清爽[illegible]

天麻 [illegible] 細辛 附子

半夏 [illegible] 寒水石 [illegible]

右為細末生薑汁[illegible]

薑湯下不拘時候

石南湯 治[illegible]

急手足拘攣[illegible]

出頭[illegible]

石斛 乾薑 細辛 人參

桂心 麻黃 芎藭 甘草

乾薑[illegible]

右㕮咀以水六升煮取二升分三服大汗勿怪

獨活 射干 [illegible] 苦參 [illegible]

黃柏 山梔子 地骨皮 荊芥 [illegible]

[illegible] 蔥白

右剉碎二兩重水[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

防風 [illegible]

川烏 [illegible] 蒼朮 [illegible]

草烏 [illegible]

右用川烏草烏[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

寒水石煮散 療一切風

寒水石 石膏 滑石 白石脂

桂心 甘草 牡蠣 赤石脂 龍骨 乾薑

大黃 犀角 [illegible]

右搗以為末[illegible]

[illegible]

立效天南星丸 治一切風

天南星 白花蛇 附子 [illegible]

殭蠶 [illegible] 肉桂 [illegible] 白附子 [illegible] 天麻 [illegible]

麻黃去節 [illegible] 蚖蛇 [illegible] 乾蝎 [illegible] 麒麟竭 [illegible] 半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以溫酒下十丸 [illegible]
清得汗出為效 [illegible] 動 [illegible]

又方 [illegible]

天麻一兩　乾蝎 [illegible]　天南星 [illegible]　附子 [illegible]
芎藭三分　細辛 [illegible]　半夏 [illegible]　川烏頭 [illegible]
白附子 [illegible]　白殭蠶 [illegible]　麝香 [illegible]　麻黃 [illegible]

右為末以棗肉和搗三二百杵丸如菉豆大以膩粉 [illegible]
以溫酒下三丸

海桐皮浸酒方 出聖惠 治風 [illegible]

海桐皮　五加皮　獨活　側子 [illegible]
桂心　防風 [illegible]　[illegible]　杜仲 [illegible]
[illegible]　薏苡仁 [illegible]　生地黃 [illegible]

右細剉如豆以生絹袋盛以無灰酒二斗浸春夏七日秋冬二七日
每日隨性飲一盞常令有酒力不得大醉

至寶丹 [illegible] 療卒中急風不語 [illegible] 中諸物毒 [illegible] 熱 [illegible]
產後血暈口鼻出血 [illegible] 難產 [illegible] 氣 [illegible]
[illegible] 汁三五滴入 [illegible] 小便內 [illegible] 五七 [illegible] 心 [illegible]
熱 [illegible] 吐 [illegible] 目 [illegible] 不 [illegible] 口乾
傷寒狂語 [illegible]

生烏犀角屑　[illegible]　琥珀 [illegible]
[illegible]　麝香 [illegible]
牛黃 [illegible]　安息香 [illegible]

右將生犀 [illegible] 為末入 [illegible] 丸如梧桐子大 [illegible] 人參湯化下三
諸藥中 [illegible] 小兒 [illegible] 丸 [illegible] 下
丸至五丸又 [illegible] 二歲以下 [illegible]
搗 [illegible] 每二歲服二丸 [illegible]

右青丸 [illegible] 白 [illegible] 眩旋運欲倒心忪悸動 [illegible]
不寧神思昏憒 [illegible]

石膏 [illegible]　半夏 [illegible]　川芎
菊花 [illegible]　天麻　白殭蠶 [illegible]　白附子 [illegible]
全蝎 [illegible]　旋覆花　陳皮 [illegible]　天南星 [illegible]

右為細末生薑十斤取自然汁為丸如梧子大每服五十丸新加至百
丸食後生薑湯下忌黏滑生硬等物

皂角丸 [illegible] 治風氣攻注頭面腫痒遍身拘急痰涎壅
[illegible] 目眩 [illegible] 乾咳 [illegible] 大便風秘
[illegible] 及咳嗽 [illegible] 語澀 [illegible] 手足麻痹 [illegible]
頭痛夾腦風 [illegible] 婦人血風攻注 [illegible] 痛 [illegible] 宜服之

皂角 [illegible]　[illegible]
[illegible]　薄荷葉
牽牛子 [illegible]　青蒿花 [illegible]　青橘皮　半夏 [illegible]
白礬 [illegible]　貝母 [illegible]　知母 [illegible]

右為末以皂角膏搜和為丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑
湯下如痰實咳嗽用蛤粉齏汁下手足麻痹用生薑薄荷
下搖夾風用荊芥湯下偏正頭疼夾腦風用薄荷湯下

槐角 [illegible]

俞風餅子 [illegible] 治諸風疾

川烏 [illegible]　川芎 [illegible]　白芷
細辛　天麻　羌活　荊芥　防風
[illegible]　薄荷

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅子細嚼茶酒
送下不計時候

[illegible] 治風疾并大風偏風

牛膝 [illegible]　蔓荊子 [illegible]　防風 [illegible]
[illegible]　[illegible] 桔梗 [illegible]　枸杞子 [illegible]
牛蒡子 [illegible]　牛蒡根 [illegible]　蒼朮 [illegible]　羌活 [illegible]
大麻子 [illegible]

右為末 [illegible] 二十 [illegible] 封口 [illegible] 七日開封 [illegible]
[illegible] 人服 [illegible] 每服一盞空心服日進三服溫服之 [illegible]
[illegible] 方更加天麻 [illegible]
[illegible] 一兩 [illegible] 二兩 [illegible] 今斷絕 [illegible]
[illegible] 二十 [illegible] 御史 [illegible] 文 [illegible]

拘攣半身不遂[illegible]
能循北方獨活[illegible]
不能自動飲食二升[illegible]飲酒二升能伸縮[illegible]
方不能悉錄

搜風順氣丸[illegible]治三十六種風七十二般氣，下冷腰腳疼痛，四肢無力，多睡少食，漸漸羸瘦，[illegible]寒毛焦，積年癥癖氣塊，丈夫陽事斷絕，女子久無子嗣[illegible]
痃癖[illegible]百節酸疼[illegible]
順氣丈治大腸秘澀[illegible]

車前子[illegible] 白檳榔[illegible]
牛膝[illegible] 兔絲子[illegible]
防風 獨活[illegible]

為細末，煉蜜和為丸，如梧桐子大[illegible]
忌早[illegible]
增四月[illegible]

受此御驗[illegible]
風淫[illegible]
痛連[illegible]
香各二兩[illegible]

天麻丸[illegible]治腎氣[illegible]
天麻[illegible] 玄參[illegible] 防風
地榆[illegible] 乾薄荷
烏頭[illegible]
不蛀肥皂莢[illegible]
牛黃[illegible]
右除[illegible]為末[illegible]煉蜜和搗百餘下，丸如雞頭大[illegible]
處方[illegible]

小續命湯[illegible]
系神清[illegible]
令人[illegible]

與[illegible]金前[illegible]加風
[illegible]上三味以水二十盞，煮至二斗，慮去滓，[illegible]中，以慢火煮至三升 生薑[illegible]
復采末
牛膝[illegible] 青前 附子[illegible] 羌活 桂心
防風[illegible] 木香 大麻子[illegible]
右搗羅為末，入前煎中，用慢火熬[illegible]
[illegible]

與大[illegible]
治風氣[illegible]不仁[illegible]
芍藥 狗脊
附子[illegible] 川烏頭[illegible]
牛膝[illegible] 防風[illegible] 桂心[illegible] 獨活[illegible]
右件藥細剉和勻，以生絹袋盛，用好酒二斗浸[illegible]七日[illegible]
小盞日三服[illegible]

烏頭摩風膏[illegible]
烏頭 附子[illegible] 當歸[illegible] 羌活 細辛
桂心 防風[illegible] 白朮 川椒 吳茱萸[illegible]
[illegible]
右件藥並細切如大豆，以[illegible]豬脂[illegible]
人將之以[illegible]
大風明[illegible]

金牙酒[illegible]治積年八風五疰，舉身亸曳，不得轉側，行步跛躄，不能收攝[illegible]
[illegible]
獨活[illegible] 附子 防風 細辛 乾地黃
蜀椒[illegible] 甘草[illegible]

右㕮咀盛以絹袋用酒四斗於瓷器中浸密封頭勿令泄氣春
夏三四宿秋冬六七宿開取溫服一合[illegible]日再無毒更可小醉常令
酒氣相接不盡一劑病無不愈又令人肥健酒盡可加諸藥更一
兩椒蜀椒五兩用四如前[illegible]加全[illegible]乾薑四兩服如酒勿絕
治三十諸風[illegible]伸驗[illegible]用外麻黃乾薑各四兩人參三兩石斛
牛膝各五兩不日[illegible]為十四味[illegible]地黃[illegible]為十三味一
方用獨活四兩萆薢三兩[illegible]續斷四兩為十一味[illegible]用
茅四兩無萆薢
馬灌酒[illegible]除風氣通血脈[illegible]骨髓耳目聰明[illegible]髭鬚
白更黑[illegible]延年益壽[illegible]二十日力勢倍[illegible]六十日[illegible]八十日能夜書百
日致神明[illegible]三十日[illegible]服之[illegible]有子病
在腰膝衆患主之
天雄 蜀椒 [illegible] 蜀[illegible] 烏頭
附子 桂心 白斂 茵芋 乾薑
右㕮咀以絹袋盛酒三斗[illegible]秋冬七日去滓初服半合稍

醫方類聚卷[illegible]

加至兩三合[illegible]為度[illegible]
[illegible]
陸有牛膝名大[illegible]
烏藥順氣散[illegible]
頭麻頭目眩運[illegible]
氣步履艱難脚膝軟弱婦人血[illegible]
腹脹[illegible]
麻黃 陳皮 烏藥
枳殼 甘草 白芷 桔梗 乾薑 川芎
右為細末每服二錢水一盞[illegible]煎至七分溫服如[illegible]
時傷寒[illegible]
有如[illegible]
煎服[illegible]
黑神丸[illegible]
急骨節疼痛[illegible]

[illegible] 白芍藥 川芎 麻黃 赤芍藥
甘草 荊芥 草烏 [illegible] 何首烏
右為細末水調為丸如雞頭大每服一丸細嚼茶酒任下不計時候
婦人血風[illegible]金銀湯下傷風咳嗽酒
煎服[illegible]
捉風丸 治諸風疾
人參 茯苓 [illegible] 半夏 乾生薑
白礬 水石 白粉 薄荷 藿香
右為細末[illegible]每服[illegible]
[illegible]散 治一切風疾
藿香 石膏 人參 [illegible] 荊葉
[illegible] [illegible] 石膏 川芎 甘草
右各為細末每服二字[illegible]
搜風丸 治手足一切風疾
[illegible] 乳香 麝香 [illegible]

醫方類聚卷[illegible]

草烏 川[illegible] 海桐皮
[illegible] 麻[illegible]
右為細末煉蜜[illegible]
丸為[illegible]
(再合[illegible]) 治一切風
白茯苓 山藥 防風 羌活 川芎
香附子 [illegible] 天麻 甘草 全蝎
右為細末煉蜜為丸[illegible]每服四十丸[illegible]溫酒下[illegible]
[illegible] 治風[illegible]一切風疾[illegible]治之
乳香 沒藥 木鱉子 [illegible] 虎骨
麝香 全蝎 [illegible] 草烏 自然銅
右為細末用墨一定[illegible]為丸[illegible]用酒化開服
黑附子丸 治癱瘓中風及婦人血風等疾
附子 烏頭 虎脛骨 五靈脂 防風
[illegible] 地龍 [illegible] 狼毒 [illegible]

自然銅

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服一丸爛嚼溫酒下空心日午臨臥服

通關赤丸 治中風癱緩并痰厥一切風疾

烏蛇 麻黃 川烏 附子

半夏 乾蝎 乾薑 天南星 附子

麝香

右並生用爲末以酒糊為丸如大麻子大以生蘇蔵豆

不得過食 酒下三丸至五丸

微服 何 不

七丸服之小兒中諸風

服之

天麻防風丸 治一切諸風

人參 天麻 防風 全蝎 硃砂

雄黃 甘草 白殭蠶 牛黃 麝香 一字

右為細末煉蜜丸如櫻子大每服二丸薄荷湯下

治一切諸風

大風 香白芷 荊芥 苦參 何首烏

川椒 防風 荊芥 威靈仙

右用水一煎湯服洗汗出

不可太多

太一丹 治諸風及左癱右瘓手足頑麻

治頭風偏正頭痛

及瘧傷風傷寒頭疼不可宜服之

川芎 川烏 甘草 白附子

黑附子 細辛 半夏 天麻 天麻

右等分並用細末

水和丸如彈子大

如傷風傷寒

此之

天聖保命金丹 治男婦人一切風疾 氣血俱虛 陰陽偏

廢 中風 塞 不省人事 失音 項強 手足 口眼

喎斜 偏 不 言 錯亂 麻 癱瘓 目

瞤 不 作 身 閉絕 開 風 經

目 可 嚼 指 多 項 拘急不能 腎 風

脚 麻 不 伸 並治之

有風 補益五臟 真元通 和

大功

白殭蠶 硃砂 沒藥 麝香 五靈脂

川 牛黃 白附子 大川烏頭

大黑附子

右細末各和 一兩 井花水 汁 每丹作六丸 用金薄

二百片為衣 一丸

熱

以汗出為 不拘時

方中 天麻防風 硃砂 一分

治一切風

右大聖 金丹 防風 一兩

不語 手足麻痺 大聖 不可服

疏風丸 治一切風

雄黃 硃砂 麝香 阿膠

天麻 牛黃 天竹黃

右 取三月三日 和丸如 大每服以

長壽丸 治 四肢

烏 草 羌 桂心

乾 當歸 吳茱萸 甘草 細辛

右 以水七升 二十 分二服

〔妙香散〕治[illegible]風癇變化痰涎[illegible]心悸[illegible]痛不[illegible]
重□驚悸[illegible]精神[illegible]
麝香[illegible] 人參[illegible] 茯神[illegible]
甘草[illegible] 石膏[illegible] 細辛[illegible]
右為末每服一錢[illegible]人參[illegible]
〔白附散〕治[illegible]無[illegible]延[illegible]
白僵蚕[illegible] 全蝎[illegible] 朱砂[illegible]
附子[illegible] 石膏[illegible] 川芎[illegible] 麝香[illegible]
右為細末每服[illegible]
〔礞石丸〕治一切痰疾[illegible]
礞石[illegible] 焰硝[illegible] 不[illegible]
雄黃[illegible] 輕粉[illegible]
右細研以猪[illegible]內[illegible]之[illegible]大每
服一丸薄荷酒化下[illegible]
粉少許白蜜[illegible]研用[illegible]二丸
兒動[illegible]一丸[illegible]
〔定風餅子〕治風客[illegible]
寒痰風頭目疼痛[illegible]
[illegible]如生[illegible]五臟[illegible]
天麻 川烏炮[illegible] 半夏[illegible] 川芎
川芎 白茯苓[illegible] 防風
右等分[illegible]為丸[illegible]
〔[illegible]〕不以[illegible]
無 防風
〔大[illegible]湯〕治[illegible]
及[illegible]風痛[illegible]
川芎 半夏[illegible] 甘草[illegible] 全蝎[illegible]
附子[illegible]
右剉散每服四錢水一盞[illegible]

[illegible]加[illegible]天麻半兩
全蝎[illegible]入[illegible]
[illegible]
〔五[illegible]〕[illegible]
[illegible]
羌活[illegible] 蚕[illegible] 防風[illegible] 黃耆
[illegible]
法[illegible]
合[illegible]
〔加[illegible]〕治一切風疾
荊芥[illegible] 何首烏
川芎[illegible] 大黃一兩 人參[illegible] 香白芷
右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸不拘時溫茶清下
〔[illegible]〕
白附子[illegible] 白殭蚕[illegible] 乾蝎[illegible] 天麻一兩
丸[illegible]風[illegible]
右[illegible]溫酒下五丸
[illegible]一十丸[illegible]
〔太白[illegible]〕治一切風
[illegible] 天南星[illegible]
[illegible]
右為末入[illegible]麝香[illegible]每服
[illegible]
〔[illegible]〕治一切風
朱砂[illegible] 天南星 附子[illegible]
右為[illegible]大每服以溫酒下二丸
[illegible]八風十二痺
防風[illegible] 甘草 附子炮[illegible]

川芎 [illegible] 天麻 [illegible] 牛膝 [illegible]

右細剉 [illegible] 隨性溫飲一小盞

[illegible] 一切 [illegible]

[illegible] 湯 [illegible]

獨活 [illegible] 防己 [illegible] 桂 [illegible] 附子 [illegible] 麻黃 [illegible]

生地黃 [illegible]

右細剉用生絹袋盛 以無灰酒 [illegible] 浸之 密封 春夏七日 秋冬十日

取每日空腹日午夜臥 各量飲一小盞

[illegible] 治風 [illegible]

[illegible] 杜仲 [illegible] 羌活 [illegible] 牛膝 [illegible]

黑豆 [illegible] 附子 [illegible] 桂心 [illegible]

右細剉 [illegible] 用好酒 [illegible]

[illegible]

天麻丸 [illegible]

[illegible]

已上為細末 [illegible]

天麻 [illegible]

[illegible]

生龍腦 [illegible] 麝香 [illegible]

右為細末 [illegible] 天麻 [illegible]

八風散 [illegible] 治諸風 [illegible]

[illegible]

[illegible] 天麻 [illegible] 龍腦 [illegible] 麝香 [illegible] 白殭蠶 [illegible]

右為細末入研勻 [illegible] 煉蜜和丸如櫻桃大 每服一丸 細嚼

[illegible] 一切諸風 [illegible]

[illegible] 藿香 [illegible] 乾薑 [illegible] 零陵香

[illegible] 甘松 [illegible]

右 [illegible] 用水二 [illegible]

[illegible]

天麻 [illegible]

防風 [illegible] 細辛 [illegible] 薄荷 [illegible]

天麻 [illegible] 川芎 [illegible] 甘草 [illegible] 白芷

右為細末煉蜜 [illegible] 每服一丸 細嚼 [illegible]

下 [illegible] 清 [illegible]

[illegible] 川芎 [illegible] 甘草 [illegible] 防風 [illegible] 桔梗 [illegible]

右為細末 [illegible] 每服二丸 細嚼 [illegible] 茶清送下 食後服

防風 [illegible] 治諸風疾

防風 [illegible] 麻黃 [illegible] 獨活 [illegible] 當歸 [illegible]

右 [illegible] 每服四錢 水二中盞 入生薑 [illegible] 食後服

川芎 [illegible] 人參 [illegible] 白茯苓 [illegible] 白殭蠶 [illegible]

右 [illegible]

搜風丸 治風寒傷經邪傷腠理皆骨痠氣口眼喎斜體熱惡寒
痰厥頭目疼痛肉瞤筋惕辛頞鼻淵及飲酒過多嘔吐痰沫頭
目眩暈如坐車船常服解五臟留滯氣安神清頭目利腦生
南星 半夏 川芎 白芷 羌活 獨活
藁本 細辛
右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大每服三十丸薑湯下食後服
真方白丸子 治風癱瘓半身不遂手足頑麻口眼喎斜 一切風痰
大半夏 白附子 人參 天南星 川芎
全蝎 枳殼 木香
右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服二十丸食後
臨卧茶清熟水送下癱瘓風以溫酒下日服小兒驚風薄荷
湯下二丸服之
醉語湯 治中風喜怒心腹[illegible]不省人事身不遂口喎眼斜
伸氣不清一切風氣並皆治之
附子 防風 人參 [illegible] 羌活
官桂 甘草炙
右為粗末每服[illegible]水一盞半生薑三片[illegible]煎八分去滓溫服
蒸臍一法 併煎一方專治中風口噤失音有痰[illegible]大麻石桂心散
聖寶丹 治一切諸風癱瘓偏風等疾
川烏 草烏 五靈脂 没藥 胡椒 木香
乳香 研 硃砂 研 麝香
右將前五味為細末擇辰時取[illegible]花水入乳香末和成劑末為
丸如豆大將硃砂麝香為衣每服[illegible]丸生薑二片同嚼茶酒任下不拘
時 如傷風頭痛並腦風荊芥湯下
龍腦健丸 治一切風
天南星 半夏 麝香
膩粉 胡椒 乾蝎
白薑蠶
右研自然汁米糊丸如皂子大每服一丸荊芥湯溫酒下如急
風口噤用青皂角子煎湯化下

蝎梢丸 治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅
盛及一切風他無不能治治小兒驚風大人頭風光腦風婦人血風
全蝎 防風 川烏一兩 白附子二兩 天南星二兩 天麻
半夏 生麝香
右為末薑汁糊為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯下
一切痰風溫酒下日三服一二日後當有汗便能舒展經三五日頗
可又走常服除風化痰治頭痙小兒驚風薄荷湯下二三丸
又方 治一切風
人參 天南星 白附子
附子 白僵蠶 白花蛇肉
右為末研入麝香[illegible]和搗三二百杵丸如梧桐子大[illegible]
又方 每服以溫酒下三九忌毒滑物
天麻 雄[illegible] 茯[illegible] 天南星
白附子 牛黃 麝香
乾蝎 水銀
右為末研如水銀令勻以棗肉和丸如綠豆大[illegible]每
服三丸溫酒下三丸
百靈藤煎 治一切風不以遠近服之皆効
百靈藤 仙靈皮 何首烏 牛膝 附子
虎脛骨 乳香
右為末入前煎中別入白蜜五合同熬以柳木篦攪令勻如稀
餳即止收於瓷器中每服以溫酒調下一茶匙空心及晚食前
服忌毒滑物
七生丸 治丈夫婦人三十六種風五般腰疼打撲傷損入骨疼痛
[illegible]手足頑麻走注不定筋脈攣縮久患風疾並皆療之
地龍 五靈脂 松脂 荊芥 川烏
天南星 草烏
右[illegible]為丸如梧桐子大每服五丸至七丸茶湯任
下[illegible]不可服[illegible]亦可
小[illegible]散 治[illegible]風疾

川芎　荊芥　甘草　薄荷　蟬殼

蔓荊子　甘草

右爲細末茶調服二三錢食後

愈風丹）治諸賊風[illegible]頭[illegible]

通聖散　四物湯　羌活

細辛　蔓荊　天麻　何首烏　薄荷

獨活

右爲細末鍊蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下

靈寶丹）治一切風疾

麝香　乳香　沒藥　安息香　朱砂

木鱉子　五靈脂

右爲極細末酒糊爲丸如彈子大每服一丸[illegible]丁服之[illegible]辰年辰

月辰日辰時生人修合

防風湯）治風寒汗出[illegible]使穀而哭者風邪東

其肺使肺氣[illegible]也當瀉[illegible]

一只[illegible]一只[illegible]

柴胡　升麻　黃芪　羌活　防風

橘皮　人參　甘草　當歸

白芍藥[illegible]　藁本

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞[illegible]氣鬱者至痰而

脫色氣短者勿服之小便遺[illegible]安臥養氣禁勞役以

黃耆人參之類補之不愈當[illegible]不可

迴顧此手太陽氣鬱而不行[illegible]

肩上衝頭痛又足太陽經不行[illegible]羌活勝濕湯主之

羌活勝濕湯

羌活　獨活　藁本　防風　蔓荊子

川芎　甘草

右㕮咀都作一服[illegible]

經中有寒濕[illegible]如黃檗[illegible]如腿腳沉重

無力者加酒洗防己[illegible]川烏頭少許以爲引

用[illegible]行經也如[illegible]多驚[illegible]太陽經

藥[illegible]柴胡[illegible]如[illegible]下焦風寒二經合病也腎

之病同一治爲[illegible]在下焦非風藥行經不可也如大便

便白[illegible]者因[illegible]氣虛傷大腸也以黃耆人參湯補之如裏急頻

見者血虛也更加當歸如肺脹[illegible]而[illegible]氣盛而上奔

者多加五味子人參少之麥門冬[illegible]之黃[illegible]許如[illegible]

[illegible]氣大虛也[illegible]短加黃[illegible]五味子人參氣盛加五味子人參黃

[illegible]如[illegible]茶[illegible]甘草[illegible]

[illegible]

知母湯）治本[illegible]四肢[illegible]

麻黃　黃芩　甘草　羌活

知母

白朮

右[illegible]末[illegible]牛蒡子

苦參丸）治一切癘風

荊芥　防風　何首烏　蔓荊子　威靈仙

苦參

右[illegible]苦參[illegible]爲細末[illegible]丸如梧桐子大每

[illegible]下茶[illegible]

[illegible]生[illegible]神[illegible]

[illegible]治風

防風　牡蠣　附子

烏[illegible]

右[illegible]中[illegible]

藥[illegible]子內有香氣即止每日三度溫飲一小盞

川芎丸　消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋運心忪煩
熱頸項拘急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙痒腦昏目疼鼻
塞聲重面上遊風狀如蟲行
川芎　龍腦薄荷葉[illegible]　細辛[illegible]　防風[illegible]
桔梗[illegible]　甘草[illegible]
右為細末煉蜜搜和每一兩半分作五十丸每服一丸細嚼臘茶
清下食後臨臥
薄荷煎丸　消風熱化痰涎利咽膈清頭目治遍身麻痺
百節酸疼頭昏目眩鼻塞腦痛語言聲重項背拘急皮膚
瘙痒或生瘡疥及治肺熱喉腥脾熱口甜膽熱口苦又治鼻衄
血大小便出血及脫着傷風並沐浴後並可服之
龍腦薄荷[illegible]　防風[illegible]　川芎[illegible]　縮砂仁[illegible]
桔梗[illegible]　甘草[illegible]
右為末煉蜜為丸每兩作三十丸每服一丸細嚼茶酒任下
加減三五七散　治[illegible]風[illegible]合眼[illegible]耳內蟬鳴
[illegible]
頭目昏[illegible]牙關緊急[illegible]身體[illegible]骨節煩疼
肌肉麻木[illegible]不仁[illegible][illegible]治陽虛頭痛風寒入
腦目旋運轉[illegible]如舟車之上[illegible]如風雨[illegible]有寒濕
痺[illegible]脚[illegible]弱等疾並[illegible]又名大三五七散
山茱萸　乾薑[illegible]　附子[illegible]
細辛[illegible]　防風[illegible]
右為細末每服二錢溫酒調下食前
天麻[illegible]　治中風[illegible]手足搐搦半身不遂及
歷節疼痛[illegible]
薑[illegible]山茱萸各五錢　防風各七錢
南星[illegible]　防風[illegible]　[illegible]　羌活　全蝎[illegible]
甘草[illegible]
右㕮咀每[illegible]錢重水一盞生薑三片煎至八分去滓
溫服不拘時候日進[illegible]服
活絡丹　[illegible]
[illegible]
心忪[illegible]
痛[illegible]走注[illegible]身疼痛
川芎[illegible]　草烏[illegible]　地龍[illegible]　乳香[illegible]
右為細末入研藥和勻酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心
日午冷酒下[illegible]茶下亦可
[illegible]治一切風疾左癱右瘓半身不遂口眼喎斜
牙關緊急語言蹇澀筋脉拘攣百骨節痛上攻下注遊走不
定腰腿沉重耳鳴重聽脚弱頭暈不得屈伸步履艱難遍身
麻痺皮膚瘙痒又婦人血風攻注身體疼痛面生乳癧口苦舌乾
頭[illegible]偏正頭疼並治之
[illegible]　狗脊[illegible]　何首烏
乳香[illegible]　五靈脂[illegible]　川烏[illegible]
右[illegible]為末[illegible]丸每服三十丸[illegible]酒下[illegible]溫酒亦
[illegible]身體壯筋骨[illegible]除[illegible]可服
[illegible]治一切風頭目昏眩咽[illegible]面目浮腫
菊花[illegible]　羌活　獨活　旋覆花　牛蒡子
[illegible]
右為末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服食後
[illegible]川芎散　治諸風疾一方治風壅頭目昏痛肩背筋脉拘倦
手足[illegible]皮膚瘙癢調和榮衛
[illegible]　川芎[illegible]　甘草[illegible]　黃芩[illegible]
[illegible]　細辛[illegible]
右為細末每服二錢食後[illegible]下日三服
[illegible]　[illegible]　羌活
[illegible]　[illegible]　甘菊
右[illegible]木[illegible]和丸如彈子大每[illegible]為末每服一丸細嚼茶酒下

皂角六七丸……踈風右四味……除……法紅顏肌肉不緊
胃風諸切宜此藥服之
川烏 草烏 天台烏藥 烏梅
豬牙皂角 烏豆
右剉如指面大用無灰酒醃浸……
焦搗何首烏一味引爲末……
錯及何首烏爲末和丸每服三十丸……下
六聖散
川芎 石膏 雄黃 乳香 沒藥
盆硝
右爲細末每搐之亦治……
疾便定
損風丹 治一切風
川芎 防風 天麻 甘草
細辛 羊擲
右細末煉蜜和劑作三十丸每服一粒細嚼荊芥湯或溫酒下……
小傷風頭痛……
不……多……
此用藥非止……
作中風以大……粒丁之大下數……
證治化蘇合香丸四五粒……
治之無不……
則……審……不服……
寒在右……
……肝臟……
肺……
……
……
……

故……以熱藥治之則風愈甚以冷藥治則氣已虛肺屬金金爲
清化……不調今用中和溫藥抑肝補肺漸可安愈
今心……也胃之大絡名曰虛里絡胸膈及兩乳間虛而有痰
則……須時發……熱者是其候也服續斷湯并丸獨活散除
……少知者……
……
續斷湯 治一切風……
胃損丸 治一切風
薯蕷 人參 遠志 防風 真珠母
……茯神 虎骨 ……龍……
龍骨 ……五味子 丹參
右爲細末煉蜜爲丸梧子大每服十九至五十丸金銀薄荷湯下
獨活散 治一切風
食後臨卧服一方有茯苓
白朮 白茯苓 羌……
……人 甘草 羊角 川芎 秦艽
……白芷 官桂 人參 熟乾地黃
右……每服二錢水一盞生薑……同煎至七分不拘時
……一切風及偏風發……及言語蹇澀其湯不應
人……命湯特宜老人服之
……防風 羌活
……蜀附子……
……
……
治風……
……
砂……用一丸含……

用鹽泥固濟，只留孔子放氣，先以火[illegible]子四兩[illegible]已來至
一食間取入[illegible]加火放冷[illegible]用[illegible]片子搭合上孔子[illegible]
則按至三十片為度，其藥已成，候冷，細研入後藥
麻黃 天麻 白附子 白僵蠶 烏蛇
天雄 桂心 乾蠍 天南星
獨活 川烏頭
麝香
右為末，每石藥一兩，入麝香[illegible]二兩，拍和入[illegible]和搗三二百杵，丸
如紅豆大，每服以豆淋酒下二丸[illegible]
菊花煎 治一切風，其功如神
甘菊花 枸杞子 柳[illegible]
生地黃 肉蓯蓉 桂心
右以無灰酒三斗，與前藥拌和[illegible]之上，以[illegible]蓋定，用紙
蓋泥，固濟，待乾入[illegible]時待[illegible]年至十年，其色
黑，其味苦香，每服以暖酒調下一茶匙，日三服

聖濟總錄 卷一[illegible] 八五

牛蒡子浸酒方 治一切風
牛蒡子 牛膝 生地黃 枸杞子 乾[illegible]
大麻子
右細剉，用生絹袋盛，以無灰酒三斗浸，春夏七日，秋冬二七日，開每
飲一小盞，常令酒氣相續[illegible]
防風丸 治一切風及瘡[illegible]項背拘急，頭昏
腦運，心忪，悶，手足無力，骨節疼，語言蹇澀，口眼瞤動，神思
恍惚，痰涎[illegible]健忘
防風 川芎 天麻 朱砂
右為末，煉蜜丸，每兩作十丸，以朱砂為衣，每服一丸，細嚼，荊芥湯化
服，茶酒亦得，不拘時
白龍丸 治男子婦人一切風，身體[illegible]，手足頑麻，偏正頭
疼，鼻塞聲悶，大解傷寒，治頭風
藁本 細辛 白芷 川芎 甘草
右為細末，各等分，每四兩入石[illegible]末一斤，水搜為丸，[illegible]

兩八[illegible]荷茶[illegible]下[illegible]食後臨臥[illegible]分作三服 乾[illegible]
後用鹽湯[illegible]之，更用蔥茶[illegible]下
[illegible]
[illegible] 荊芥 川芎 甘草 麻黃
右為細末，每服[illegible]兩，水[illegible]蔥白[illegible]服[illegible]汗出
[illegible]當歸
天麻煎 治[illegible]入胃[illegible]
[illegible]婦人[illegible]風[illegible]攻注
[illegible]偏正頭痛
川烏頭 [illegible]
乾[illegible] 當歸 天麻
右為末[illegible]丸[illegible]茶清下二十丸
[illegible]治[illegible]中氣[illegible]口噤[illegible]
川烏 益智 附子 乾薑 青皮
右[illegible]每服[illegible]水二盞，薑十片，棗一個，煎至[illegible]入麝香少許，空心溫服

聖濟總錄 卷[illegible] 八六

大[illegible]治風[illegible]大風為最[illegible]四肢頑麻
[illegible]溫服不動元氣
大附子 南木香 沈香 當歸 防風
右先將大附子[illegible]為末和合[illegible]木香
[illegible]為細末，每服[illegible]乾服之
[illegible]一字方
[illegible] 川烏頭 麝香
右為末[illegible]○大[illegible]病人鼻塞[illegible]湯
[illegible]入鼻[illegible]
[illegible]如半日病人鼻不塞[illegible]
搐鼻[illegible]不問遠近
甘草 荊芥
上三味，以水五升，煮取二升[illegible]
白[illegible] 藜蘆 甘[illegible]
右[illegible]以[illegible]入

從初五更服至日出後即止每[illegible]小盞日三服

碧霞丹 [illegible] 治卒中急風眩暈[illegible]作痰涎壅塞心神迷悶牙關緊急目睛上視[illegible]五種[illegible]

石綠 [illegible] 附子尖 [illegible] 烏頭尖 [illegible] 蠍梢 [illegible]

右件為末入石綠令勻麵糊為丸如雞頭大每服急用薄荷汁半盞化下一丸更入酒半盞溫暖服之須臾吐出痰涎然後隨證治之如牙關緊急斡開灌之立驗

青州白丸子 [illegible] 治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫手足不遂頭痛麻口眼喎斜痰涎壅塞及一切風他藥所不能療者小兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風○治一切痰涎為患及中風偏癱之疾常服[illegible]有功效咳嗽痰實咽喉作聲老人小兒皆可服

半夏 [illegible] 川烏頭 [illegible] 南星 [illegible] 白附子 [illegible]

右為細末以生絹袋盛用井花水擺未出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋擺盡為度放磁盆中日中曬夜露至曉去水別用井花水攪又[illegible]去水曬乾候如玉片碎研以糯米粉[illegible]粥清為丸如綠豆大初服五丸加至十五丸生薑湯下不計時候如癱瘓風以溫酒下二十丸日三服至三日後浴當有汗便能舒展服經三五日[illegible]常服十粒已來永無風痰膈壅之患小兒驚風薄荷湯下四三丸[illegible]

[illegible]研末白豆蔻[illegible]下吐痰立[illegible]白[illegible]二陳湯加荊芥[illegible]服一方加[illegible]為丸[illegible]大[illegible]仍[illegible]合香丸[illegible]與[illegible]散[illegible]天下[illegible]

[illegible]流但藥[illegible]服[illegible]

百全丸 [illegible]

右[illegible]細[illegible]和[illegible]丸如

週[illegible] 治諸風疾

石膏 [illegible] 川芎 [illegible] 藁本 [illegible]

右為細末[illegible]

防風[illegible] 治風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒不欲飲食

[illegible]麻黃 [illegible] 當歸 [illegible] 黃芩 [illegible] 獨活 [illegible]

右為[illegible]每服[illegible]錢水一盞半煎七分去滓不以時服取汗為效加入[illegible]一兩[illegible]加[illegible]附子一枚[illegible]入一方有細辛

[illegible] 治男女一切風疾

全蠍 [illegible] 羌活 [illegible] 川烏 [illegible] 蘇木節

右各等分為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或鹽湯下病在上食後病在下空心服

治一切[illegible]麻痺口眼喎斜一切風疾 [illegible]

[illegible] 皂角 [illegible] 黑牽牛 [illegible]

右[illegible]為末入[illegible]中熬成膏却入[illegible]二子許為丸如[illegible]大[illegible]不拘時每服三十丸

治風[illegible]

[illegible] 地黃 [illegible] 菊花 [illegible]

右[illegible]服之

治一切風乃至十年二十年不差者方

[illegible] 生地黃 [illegible] 牛膝 [illegible] 枸杞子 [illegible]

右[illegible]以[illegible]盛之春夏七日秋冬十日每服[illegible]

空[illegible]

酸[illegible] 防風 [illegible] 蒼耳子 [illegible]

右[illegible]大麥一斗[illegible]於瓷器中[illegible]著一周時即熟[illegible]

[illegible]合加五味子一斤

百靈藤丸　治一切風

用百靈藤五斤剉以水三斗[illegible]

大[illegible]

不老丹

蒼朮[illegible]何首烏[illegible]

地骨皮[illegible]

右於石臼內搗為細末[illegible]

平[illegible]高三指[illegible]

乾[illegible]

物

三倍湯　治風痺[illegible]手足[illegible]

仙桃丸　治男女手足麻痺[illegible]

治白氣不足[illegible]

雄黃散　治[illegible]中風[illegible]

家[illegible]

生川烏[illegible]五靈脂[illegible]

右各[illegible]為末[illegible]

香[illegible]

癱瘓痿[illegible]

雄黃[illegible]川鬱金[illegible]

右為細末[illegible]

右[illegible]

每服七丸[illegible]

錢[illegible]

腦[illegible]

湯下[illegible]

食[illegible]

治老氣[illegible]

竹瀝[illegible]大金中[illegible]煎服[illegible]

[illegible]

神[illegible]

治一切風

右[illegible]

[illegible]

不可多服[illegible]

百靈藤[illegible]治風

右[illegible]

三[illegible]

[illegible]

南[illegible]

右[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

七十餘種復發疑白者[illegible]下血人[illegible]

服此而差者[illegible]之內救人如[illegible]

三味苦參丸[illegible]治心肺積熱背膚[illegible]

丹時當見本又大風手足[illegible]有毛脫治一切風[illegible]

苦參天麻[illegible]清利頭目消風化痰[illegible]

倒頸項[illegible]肩背拘急[illegible]肢體[illegible]

鼻塞[illegible]目浮腫並宜服之

苦參[illegible] 天麻[illegible]

右為細末煉蜜為丸每服[illegible]丸[illegible]食後[illegible]茶酒

任下

拘把蒼術湯治[illegible]四肢不隨行步不正[illegible]四體不得屈伸[illegible]

苦參[illegible]

葛根湯[illegible]治風癱瘓手足不舉[illegible]

金銀[illegible] 蒼朮[illegible]

右為細末[illegible]每服四錢[illegible]

陰[illegible]

丹[illegible]

右研[illegible]

蒼耳[illegible]

馬[illegible]

壽[illegible]明日

右煎[illegible]

治一切風

用蒼耳[illegible]

豆淋酒法[illegible]治一切風

用[illegible]

用之亦可常服即汗出[illegible]

萆薢散治諸風

以五月五日午時[illegible]

[illegible]

面浮腫注來背膊冷重變熱咳嗽氣急坐臥不安[illegible]赤痢[illegible]月水

不來動經多少血氣衝心[illegible]汗[illegible]是然[illegible]悉不堪[illegible]

更用熱酒[illegible]日頭洗明[illegible]治[illegible]身[illegible]

手愈按子黑[illegible]食藥[illegible]絞結其治[illegible]

以麻黃[illegible]一味洗[illegible]下[illegible]入竹筒內

細塞[illegible]丸[illegible]如乾[illegible]下[illegible]和丸如[illegible]大每

服三丸至二十丸[illegible]酒任下[illegible]

日採蒼耳[illegible]月[illegible]清[illegible]一[illegible]七[illegible]服之[illegible]

性[illegible]可加[illegible]七[illegible]

春不[illegible]但[illegible]可也[illegible]用[illegible]

主和丸

（四）仙丹 治一切諸風常服烏髭鬚[illegible]延年

春甲乙採枸杞葉夏丙丁採花秋庚辛採子冬壬癸採根[illegible]

以[illegible]為丸每服五十丸茶酒任下

（五）風丹 治癱風偏風大風一切諸[illegible]

[illegible]

天堂[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右以紫色[illegible]竹[illegible]上下[illegible]水[illegible]

[illegible]

（六）虎骨酒 治[illegible]風[illegible]骨節[illegible]

（七）五積膏 治[illegible]風痰[illegible]

用[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

雜病人[illegible]

經[illegible]

[illegible]治一切風[illegible]

[illegible]令[illegible]汁[illegible]空心和飲使醉衣覆臥取

汗明日更[illegible]服忌[illegible]

[illegible]治一切諸風并癱風等疾

以[illegible]酒服之

治諸風及惡瘡風[illegible]

以[illegible]河[illegible]取洗瘡[illegible]可在[illegible]問者

[illegible]治一切風疾等病服之[illegible]輕身延年明目黑髭鬚

用[illegible]春夏取枝葉秋冬取根[illegible]細剉五斤水五斗煎

[illegible]如[illegible]過[illegible]

三服之[illegible]

醉仙方 治五臟[illegible]十二風[illegible]作膳

用[illegible]空腹[illegible]食[illegible]汗出如白膠汗

[illegible]汗[illegible]五木湯浴[illegible]一日更三四日一服并治

[illegible]

治[illegible]

以[illegible]三月[illegible]七月[illegible]日乾為散夏水服冬酒服日二服

[illegible]二十丸[illegible]服[illegible]百日[illegible]出如[illegible]汗

[illegible]如[illegible]令人[illegible]治[illegible]

[illegible]耳目聰明輕身[illegible]

[illegible]服之忌食豬肉米泔

治[illegible]

用[illegible]大升[illegible]大升以水一大升[illegible]二大升每

日[illegible]服[illegible]人[illegible]身[illegible]

[illegible]大升佳

[illegible]

[illegible]

天門冬[illegible]治五臟六腑大風[illegible]五勞七傷[illegible]諸風

[illegible]風[illegible]皆主之久服延

年輕身[illegible]更生髮白再黑

用天門冬[illegible]十斤[illegible]搗汁二升令[illegible]以[illegible][illegible]春夏極冷下

飯秋冬溫如人肌酒熟取[illegible]服[illegible][illegible]酒[illegible]勿[illegible]遺[illegible]

冷酢骨豬魚蒜韭[illegible]鯉魚[illegible]忌由賦此[illegible]年汁法絲一石二石亦

准此以為大率服[illegible]十日[illegible]身體[illegible]二十日[illegible]三十日乃能

止此是服[illegible]也四十日[illegible]得五十日

更骨[illegible]之[illegible]風不[illegible]人身中諸[illegible]

累切[illegible]取[illegible]時更[illegible]取[illegible]汁[illegible]取天

門冬汁法[illegible]天門冬[illegible]搗[illegible]

乃此酒初熟味酸仍作臭泄腥氣但依[illegible]天絲[illegible]

不夜封四七日佳九八月九月[illegible]合至十月合[illegible]到來年五

月三十日以來相續釀之春三月亦得合[illegible]四月[illegible]酒則石

得數更[illegible]倍家方如左又以天門冬[illegible]作末[illegible]

酒服方寸匕日三加至三匕久服長生[illegible]酒亦得服

紫苑丸 治一切風疾有[illegible]不可服[illegible]小兒[illegible]

疼痛婦人腹內久患[illegible]者來不起

丁香 廣木香 藿香 [illegible]

白茯苓 官桂 大黃 白朮 桔梗

[illegible] 紫胡 黃連 防風 [illegible]

石菖蒲 熟地黃 吳茱萸 [illegible] [illegible]

皂角[illegible] 天門冬 檳榔 厚朴 川烏

砂仁 肉豆蔻 黃芩 防己 [illegible]

羌活 紫苑 川椒 巴豆 [illegible]

右為細末[illegible]為丸[illegible]梧桐子大[illegible]

利為度如[illegible]飲酒未[illegible]湯下[illegible]不止[illegible]

若[illegible]風[illegible]下[illegible]

伏[illegible]湯下一切風[illegible]下[illegible]

瀉[illegible]食不消[illegible]湯[illegible]

下[illegible]湯下[illegible]

送下[illegible]湯[illegible]

[illegible]五勞七傷[illegible]湯送下傷

[illegible]風[illegible]人[illegible]薄荷[illegible]湯送下[illegible]花水柯

[illegible]下[illegible]防己湯送下小兒乳癖[illegible]送下氣痛乾

[illegible]送下小兒[illegible]白湯送下婦人[illegible]川芎湯送下酒

氣[illegible]後血氣[illegible]送下產難益智湯送下解內外

陣[illegible]血氣不通[illegible]送下死胎茅子湯送下

赤白帶下[illegible]送下[illegible]不通[illegible]湯送下

又方[illegible]五十二[illegible]五勞七傷及婦人

[illegible]水[illegible]

礬石 桂心 白朮 根[illegible] 半夏

石[illegible] 白石脂 紫[illegible] 藜蘆 芫花

白石英 代赭 [illegible] 石韋 玄參

大[illegible] 防風 山茱萸 桔梗 [illegible]

[illegible] 細辛 [illegible] 烏[illegible] [illegible]

蜀椒 白芷 秦艽 菖蒲 礬石

附子 遠志 石膏 蜈蚣一枚

右[illegible]二十[illegible]日每服[illegible]日再十日後法[illegible]

[illegible]以知為度明[illegible]十二味[illegible]桂心[illegible]

[illegible]山黃芩黃連大黃麻黃[illegible]甘草[illegible]

[illegible]用水三斗[illegible]三斤[illegible]

三[illegible]以[illegible]中[illegible]七日[illegible]十日[illegible]日酒成

服[illegible]三服[illegible]為末[illegible]方寸匕[illegible]身[illegible]為度

[illegible]耳[illegible]目[illegible]出[illegible]身[illegible]生[illegible]

[illegible]生[illegible]工氣[illegible]胃[illegible]手[illegible]不能[illegible]

[illegible]不仁[illegible]以[illegible]風[illegible]身不[illegible]四

[illegible]伸[illegible]風[illegible]不[illegible]人

[illegible]不[illegible]五[illegible]在心下或在[illegible]四肢[illegible]

[illegible]少[illegible]五勞七傷[illegible]百病[illegible]治之

[illegible] 白[illegible] 蜀椒 天雄 方已

口[illegible] 柏子 牛膝 甘草 柏子人

通草 桂心 [illegible] 秦艽 茵陳 山茱萸
茵芋 [illegible] 附子 [illegible] 瞿麥 乾地黃
杜仲 王不留行 [illegible] 澤瀉
石南 防風 遠志 [illegible]
右㕮咀以酒四斗漬十日每服一合加至四五合以知為度 [illegible]
[illegible]
[illegible]
雞子大日一服稍稍飲之以知為度

黑虎丹 [illegible] 治一切風疾
白芷 [illegible] 草芎 [illegible] 正芎 [illegible] 川烏 [illegible]
白薑 [illegible] 殭蠶 [illegible] 蒼朮一兩 石膏
當歸 [illegible] 甘草 防風 羌活 [illegible]
黑豆 [illegible]
右為末搗末糊丸如雞頭大每服一丸細嚼茶清任下
左癱右瘓生薑酒下傷寒傷風[illegible]
破傷[illegible]偏正頭風生葱茶湯下 [illegible]
角弓反張湯送下風牙腫痛殭蠶[illegible]藥換 [illegible]
淬酒送下 [illegible]

治諸風 [illegible] 如 [illegible] 用十三味藿香正氣散 [illegible]
防風 [illegible] 南星 [illegible] 全蝎 [illegible]
右為末用無灰酒調服或用桐油[illegible]食 [illegible]

烏麻地黃酒 治風虛補不足除百病已效大效
六月六日麴 [illegible] 王斯油麻 [illegible]
生地黃 [illegible]
[illegible]
[illegible] 丹 [illegible] 生石斛 [illegible]
牛膝 杜仲 草薢 生薑 人參 [illegible]
右七味切以生絹袋盛同丹前件和地黃 [illegible]
取浸 [illegible]
八斗 [illegible] 三淋 [illegible]

[illegible] 頭及
[illegible] 中其 [illegible]
[illegible] 中封閉
[illegible] 封閉經七日其 [illegible]
[illegible] 加少許
[illegible]
[illegible] 每一斗
[illegible] 酒去更
[illegible] 即得酒一斗
八升 [illegible] 料以料以
四斗清酒淋其 [illegible]
[illegible] 五斗許
藥 [illegible] 加五斗許飲每次如此 [illegible] 即內藥 [illegible] 上
[illegible] 封閉 [illegible]
[illegible] 入自外婦人不得入室中

川芎 [illegible] 治 [illegible] 風手口掣動不能舉者
[illegible] 乾薑 [illegible] 肉桂 [illegible] 牡丹皮 川芎
右 [illegible] 水一盞 [illegible] 每煎 [illegible]
錢 [illegible] 不拘時候服

不 [illegible]
[illegible] 麝香 [illegible]
右每 [illegible] 水調但是風賠時服半錢 [illegible] 加減
何首烏丸 [illegible] 下元 [illegible]
[illegible]
駐顏 [illegible]
[illegible] 熟乾地黃 [illegible] 附子 [illegible] 牛膝 [illegible]
[illegible] 菟絲子 [illegible] 柏子仁 [illegible] 五味子 [illegible]
[illegible] 鹿茸 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible]
[illegible] 兔絲子 [illegible]
右為 [illegible] 和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心以 [illegible]

十九

加味烏藥順氣散 專治男子婦人三十六種風……
偏身不遂口眼喎斜腰脚疼痛……
頭面腫麻痺……手脚不能動止癱瘓一切……
癱脚氣……

天台烏藥 枳殼 陳皮 桔梗 天南星
白芷 茴香 縮砂 …… 半夏
當歸 川芎 香附子 …… 木香
檳榔 甘草 萆薢 ……

右為粗末每服三錢水一大盞薑三片……煎至七分去滓
香病上下服如婦人……用好當歸服之
消風……頭……目眩……

薄荷湯 治……精神不爽
荊芥穗 鹽 ……
縮砂仁 甘草 ……

衛生易簡方卷之一 風

右為末每服一錢用湯……食後服
荊芥散 治……頭目……
客於足太陽之經……
日久而發謂之風痓其脉三部……
則口噤……
荊芥穗四兩 大豆 ……
右用水三升并酒同煮至一升去滓……服

神仙丹 ……一切風及癱緩偏枯癱風……
足不隨
天麻 附子 牛膝 防風 ……
蝎梢 …… 獨活 ……
烏…… 白附子 ……
天南星 白附子 ……
右件為末煉蜜為丸每兩作一十五丸硃砂為衣每服一丸
溫酒化……不拘時候

麝香散 治一切風疾筋脉拘攣四肢頑痺口眼喎斜足膝不能行履……並宜服
牛蒡子 …… 犀角屑 細辛 白花蛇
…… 丹參 沙參
全蝎 白殭蠶 獨活 人參 藁本
羌活 防風 上菊花 海桐皮
…… 天竺黃 天麻 赤箭 牛膝
白附子 石斛 …… 虎骨 槐實
半夏 …… 續斷 酸棗仁 肉桂
朱砂 麝香 龍腦
右件為細末入研者藥和勻每服一錢……調下空心服

加味勻氣散 治諸風疾必先須氣助脾為本神效
白朮 人參 沉香 烏藥 白芷
陳皮 甘草
右為細末每服三錢用紫蘇木瓜煎湯調服不拘時服之

衛生易簡方卷之一 風

烏藥順氣散 治男子婦人一切風疾攻注四肢骨節疼痛
偏身頑麻頭目旋暈及療癱瘓語言蹇澁筋脉拘攣又治脚
氣步履艱難脚膝軟弱婦人血氣老人冷氣上攻胸臆兩脇刺痛
心腹膨脹吐瀉腸鳴並宜治之
麻黃 陳皮 烏藥 殭蠶
枳殼 甘草 白芷 桔梗 川芎
全…… 獨活 羌活 防風 天麻 細辛
乾薑
右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片棗一枚同煎七分去……
溫服不拘時……
孔…宜……治男子婦人……
遂手足……
右……
筋脉……
痓……

不可忽男子病氣膀胱上下每衝婦人月[illegible]作脫痛皆服

活血脈止疼痛補虛損壯筋骨

天台烏藥 威靈仙[illegible] 京[illegible] 茴香[illegible] 陳皮[illegible]

川楝子肉各一兩半 草烏[illegible] 五靈脂[illegible] 木香[illegible]

黑牽牛[illegible]八錢

右爲細末和入乳香拌勻醋糊爲丸如梧桐子大每服三十丸

空心下空心食前衛生寶鑑方有防風[illegible]木香[illegible]陳皮

烏术丸[illegible]治一切風疾

草烏頭[illegible] 蒼朮[illegible]

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服五丸加至十九丸如麻[illegible]

稍至五丸食後茶酒任下

至寶丹[illegible]治諸風

草烏頭[illegible]用大豆二升鹽四兩入沙鍋內[illegible]三伏時[illegible]

頭[illegible]爲度其豆取出埋土中[illegible]

二百[illegible]作餅子[illegible]乾

[illegible]

右爲末酒[illegible]爲丸如桐子大每服[illegible]十丸至三十丸空心

食前鹽酒或鹽湯下

摩風膏[illegible]治一切痛方

當歸二兩 白芷一兩 附子[illegible] 桂[illegible]

天雄[illegible] 乾薑一兩 芎藭二兩 川[illegible]

朱砂[illegible] 雄黃[illegible] 生地黃[illegible]

[illegible] 豬脂[illegible]

右件藥細剉以地黃汁[illegible]

色黃爲度[illegible]去滓入朱砂[illegible]

於瓷器中[illegible]每取少許摩於痛上如[illegible]

門[illegible]又用[illegible]

合[illegible]大小[illegible]

[illegible]花[illegible]治丈夫婦人[illegible]

[illegible]中風[illegible]

[illegible] 甘菊花 山茱萸[illegible]

[illegible]茯苓[illegible]

天雄二兩[illegible] 牡丹二兩 人參[illegible] 白朮一兩

牡蠣[illegible] 黃耆二兩 紫菀[illegible] 菖蒲二兩

石斛[illegible] 柏子人[illegible] 杜仲[illegible] 蛇床子一兩 遠志[illegible]

附子[illegible] 乾薑[illegible] 赤芍藥二兩

牛膝[illegible] 萆薢一兩 狗脊[illegible] 蒼耳子[illegible] 虎脛骨[illegible]

[illegible] 蔓荊子[illegible] 羌活[illegible] 牛蒡根[illegible]

枸杞子[illegible] 菟絲子[illegible] 續斷[illegible] 桔梗[illegible]

右件藥都細剉[illegible]每斤藥以生絹袋盛用酒二斗於瓷甕中浸

密封三七日開封每日平旦午時近晚各溫飲一盞常令有酒氣

可[illegible]每取[illegible]一盞即添一盞如覺酒力稍減即取滓

除乾[illegible]爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心以溫酒下三

十丸忌生冷油膩豬雞肉粘滑物

天麻[illegible]風丸[illegible]治一切風氣上壅頭昏目澀鼻塞耳鳴

[illegible]急肢[illegible]服[illegible]風[illegible]項[illegible]清[illegible]頭目

[illegible]

天麻[illegible] 防風[illegible] 細辛[illegible] 藁本[illegible] 川芎[illegible]

[illegible] 黃耆[illegible] 蠍梢[illegible] 當歸[illegible]

甘草[illegible] 白附子[illegible]

右件[illegible]細末煉蜜和圓每一兩作十丸每服一丸茶酒嚼下

清風散[illegible]

[illegible] 防風[illegible] 甘草[illegible]

右㕮咀每服四錢重水兩盞生薑十片煎八分熱服氣弱加紫

[illegible]各二錢[illegible]加生附子一兩沉香二錢[illegible]不利

加[illegible]半夏[illegible]仁[illegible]半兩頭昏頭痛加天麻半兩全蝎一錢

[illegible]

[illegible]治諸風

[illegible]

右[illegible]生地[illegible]爲丸如[illegible]加醋糊爲丸每服四

[illegible]麻人[illegible]

[illegible]二十八種風疾[illegible]

天麻 [illegible] 天南星 白附子 [illegible] 全蝎 [illegible]
川烏 [illegible] 羌活 乾蝎 [illegible]
麝香 [illegible] 龍腦 [illegible]
右件十一味各要上好藥淨洗了同搗 [illegible] 細末煉
蜜為丸如 [illegible] 大諸色風疾 [illegible] 荷湯下 [illegible] 女人血風 [illegible]
少嚼 [illegible] 溫酒下 [illegible] 癱瘓風 [illegible]
筋骨 [illegible] 溫酒 [illegible]
服補 [illegible] 如是男子婦人 [illegible]
[illegible] 每服 [illegible]
大羌活丸 [illegible] 癱瘓驚風 [illegible]
服此大効
官桂 茯苓 麻黃 [illegible]
枳殼 麝香 烏蛇 [illegible]
白烏脂 [illegible] 犀角 [illegible]
羌活 獨活 [illegible]
右件二十六味同搗為末煉蜜為丸如梧子大 [illegible]
功効 [illegible] 不及一一具述
治大風疾 [illegible]
威靈仙 丹參 [illegible]
[illegible] 仙靈脾 [illegible]
苦參 甘草 [illegible]
右為末 [illegible] 臨臥用溫熟水調下三錢 [illegible]
鼻 [illegible] 不過服之一月日便痊
神寶丹 [illegible] 大治一切風疾 [illegible]
[illegible] 金星礜石 [illegible] 銀 [illegible]
先將 [illegible] 味 [illegible] 用炭火 [illegible]
了放 [illegible] 細羅為末 [illegible]
上 [illegible] 汗出 [illegible]
服 [illegible] 內諸藥 [illegible]
[illegible] 威靈仙 茯苓 [illegible]

天 [illegible] 白茯苓 旋覆花
前胡 [illegible] 藿香 [illegible]
[illegible] 檳榔 [illegible]
[illegible] 白龍砂 [illegible]
上件藥 [illegible] 用一下項藥
朱砂 [illegible] 龍腦 [illegible] 麝香 [illegible] 輕粉
右以六味藥研 [illegible] 用前藥 [illegible] 和令 [illegible] 和得所
入鉢 [illegible] 丸如 [illegible] 大 [illegible] 每服五服
後 [illegible] 小兒 [illegible] 大小 [illegible] 加減 [illegible] 服用薄荷金銀
湯 [illegible] 下神効不可具述
龍膽 [illegible] 治大風疾神効
冬 [illegible] 消梨一顆
右件藥三味 [illegible] 三尺 [illegible] 淨 [illegible] 冬 [illegible] 其
內以 [illegible] 即 [illegible] 之至三七日 [illegible] 度 [illegible] 末
[illegible] 化為 [illegible] 取出 [illegible]
[illegible] 三兩 [illegible] 服 [illegible] 愈之
靈砂丹 [illegible] 治諸 [illegible] 風疾 [illegible] 之 [illegible] 足不 [illegible] 服
此丹 [illegible]
朱砂 [illegible] 天南星 白附子 [illegible]
白殭蠶 [illegible] 狼毒 [illegible] 蟬蛻 [illegible]
[illegible] 肉桂 [illegible] 川烏 [illegible]
五靈脂 [illegible]
右 [illegible] 一丸
至 [illegible] 溫酒下 [illegible]
獨活丸 [illegible] 五加皮 白芍藥 [illegible]
[illegible] 黑參 丹參 大黃 [illegible]
磁石 [illegible]

右爲末，[illegible]石[illegible]，[illegible]煉蜜爲丸，如梧桐子大。[illegible]一十丸，加至三十丸。[illegible]溫酒下，寒則加桂[illegible]分，而不用大黃。[illegible]

治風三十六[illegible]法，凡男子、女人骨節酸疼，行步[illegible]，服藥又[illegible]，可療之。

白芷 [illegible] 菊花 [illegible] 生乾地黃 [illegible] 防風 [illegible]

兔絲子 [illegible] 人參 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible] 柏子仁 [illegible] 五兩

天麻 [illegible] 牡丹皮 [illegible] 茯苓 [illegible]

杜仲 [illegible] 茶苑 [illegible] 菖蒲 [illegible] 石斛 [illegible]

川芎 [illegible] 芍藥 [illegible] 蛇床子 [illegible]

牛膝 [illegible] 金毛狗脊 [illegible]

虎脛骨 [illegible] 桔梗 [illegible] 蒺藜 [illegible]

枸杞子 [illegible] 蛻蛇皮 [illegible] 山茱萸 [illegible]

右並杵羅爲細末，入生絹袋盛，以無灰酒一斗浸，[illegible]，次紙封，頭滿二七日可開。每日平明，飯食前服一[illegible]盞，[illegible]酒氣在，只不得過，[illegible]骨[illegible]大忌鹽一年，一月後[illegible]精[illegible]入，[illegible]滿疊將[illegible]

[illegible] 補[illegible]

內藥[illegible]，末[illegible]蜜和爲丸，如梧桐子大，[illegible]空心溫[illegible]下三十丸。[illegible]方刊[illegible]承之兵部[illegible]服得[illegible]，又[illegible]處州知州日[illegible]中風，[illegible]吳[illegible]揚[illegible]服此[illegible]大[illegible]末[illegible]，[illegible]常[illegible]其[illegible]味平[illegible]，[illegible]神[illegible]用[illegible]處方者之[illegible]，[illegible]使人不能[illegible]王[illegible]其文[illegible]王[illegible]

治風何首烏[illegible]

何首烏 [illegible] 陳州[illegible]

右不得[illegible]羅爲末，煉蜜[illegible]丸[illegible]，[illegible]溫酒下四五十丸，[illegible]，不[illegible]桐子大，[illegible]

以[illegible]

天麻丸 [illegible]

天麻 [illegible] 玄參 [illegible] 當歸 [illegible] 地黃 [illegible]

[illegible]

右爲[illegible]丸，如梧桐子[illegible]服[illegible] 心[illegible]

[illegible]敵，[illegible]用[illegible]中勝單[illegible]

蘇[illegible]當[illegible]地黃[illegible]

[illegible]，[illegible]慶[illegible]不思

飲食，[illegible]其[illegible]不[illegible]且[illegible]此

去[illegible]

黃芩 [illegible] 白术

[illegible]防風 [illegible]紫參

[illegible] 人參 [illegible]枯梗

[illegible] [illegible]

右一十五[illegible]，[illegible]具如[illegible]，[illegible]之分作三分，[illegible]去[illegible]服，細切，用[illegible]五錢，[illegible]白[illegible]和[illegible]東[illegible]枕內，[illegible]

以大[illegible]宜[illegible]下[illegible]三[illegible]見效。

何首烏丸

治風，[illegible]大[illegible]

何首烏 [illegible] 赤芍藥 四兩

[illegible]

右[illegible]本[illegible]如梧桐子大。每服[illegible]，[illegible]成服[illegible]，[illegible]食[illegible]，[illegible]精[illegible]合[illegible]，[illegible]以[illegible]臣同官[illegible]，[illegible]平[illegible]，[illegible]是[illegible]，[illegible]自[illegible]此藥一年，[illegible]汗[illegible]，[illegible]切不[illegible]，[illegible]其[illegible]，[illegible]，[illegible]之效可[illegible]

[illegible]首烏文[illegible]，[illegible]念[illegible]宜[illegible]尚書[illegible]

[illegible]仙[illegible]

[illegible] 大[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] 麻黃 [illegible]

[illegible] 乾薑 [illegible]

右[illegible]兩[illegible]，[illegible]頭，[illegible]二兩[illegible]，[illegible]，[illegible]丸[illegible]是天[illegible]

[illegible]一切[illegible]風[illegible]攻疰，婦人血

[illegible]風[illegible]等疾，[illegible]服此藥，無不見効。

藿香[illegible]　麝香[illegible]　天南星[illegible]　白附子[illegible]

甘草[illegible]　川白芷　甘松[illegible]　半夏[illegible]　[illegible]香[illegible]

川烏　何首烏[illegible]　五靈脂[illegible]

[illegible]粉[illegible]各一兩　没藥[illegible]　丁香[illegible]

右件除[illegible]粉為末外十五味並[illegible]為末[illegible]用一斤煮[illegible]圓如雞頭大每服一圓茶酒化下[illegible]不拘時候

〔古路丹〕[illegible]　治一切風疼痛

赤芍藥　川芎[illegible]

五靈脂[illegible]　破故紙[illegible]　山梔子[illegible]　草烏頭[illegible]

[illegible]　何首烏[illegible]　黑牽牛[illegible]

白[illegible]　[illegible]

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服五七圓[illegible]下[illegible]

〔乳香圓〕[illegible]　治一切風疾

没藥[illegible]　川烏頭[illegible]　木香[illegible]

[illegible]　乳香[illegible]　麝香[illegible]

朱砂[illegible]

右為細[illegible]糊為圓如梧桐子大每服三[illegible]圓[illegible]任下

〔杜仲圓〕[illegible]　治風疾及腰背風[illegible]脚氣[illegible]

杜仲[illegible]　牛膝[illegible]

續斷[illegible]　木瓜[illegible]　萆薢[illegible]　金毛狗脊[illegible]

右為細末[illegible]醋煮[illegible]糊為圓如梧桐子大每服[illegible]圓空心[illegible]温酒下日進三服忌[illegible]

〔增減續命湯〕[illegible]　治諸風[illegible]

〔聖濟〕[illegible]

麻黄[illegible]　人參[illegible]　黄芩[illegible]　川芎[illegible]

甘草[illegible]　杏人[illegible]　防己[illegible]　[illegible]

官桂[illegible]　防風[illegible]　附子[illegible]

右件[illegible]附子[illegible]每服[illegible]

[illegible]

〔十生丸〕[illegible]　治[illegible]及痰疾

[illegible]　天南星　半夏

[illegible]子[illegible]　人參　乾薑

[illegible]　金蝎[illegible]

右為細末[illegible]糊為圓如梧桐子大[illegible]為衣每服三[illegible]圓生薑自然汁破[illegible]下[illegible]不拘時[illegible]藥治[illegible]

[illegible]　麝[illegible]

〔透骨[illegible]風[illegible]〕[illegible]　治諸風疼痛

[illegible]烏[illegible]　黑牽牛[illegible]　甘草[illegible]

右為末入麝香一錢和勻酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸温酒送下不拘時候

〔大効小風丹〕[illegible]　治一切風疾

[illegible]首烏[illegible]　草烏頭[illegible]

右件[illegible]為細末酒糊圓如梧桐子大每服[illegible]酒任下食後

〔[illegible]圓〕[illegible]　治一切風疾并脚氣等病

[illegible]　川烏[illegible]

[illegible]　[illegible]香[illegible]

右[illegible]為圓如雞頭大[illegible]為衣每服一圓生[illegible]茶酒下頭風薄荷茶酒下[illegible]進二服

〔宿州[illegible]〕[illegible]

[illegible]　草烏頭[illegible]

[illegible]　香白芷[illegible]

[illegible]　没[illegible]　藿香[illegible]

右[illegible]為末[illegible]餅子一寸大一餅分作八服茶酒嚼下

〔南[illegible]〕[illegible]　[illegible]治諸風

[illegible]　川芎[illegible]　蒼术[illegible]

[illegible]　大甘草[illegible]

[illegible]　石膏[illegible]

右[illegible]末[illegible]五[illegible]泡糊為如彈子大每服一圓食後茶[illegible]下

白大通[illegible]治[illegible]一切大風左癱右瘓口眼喎斜手脚[illegible]
寮[illegible]治偏正頭風[illegible]
川烏[illegible] 甘草[illegible] 白芷[illegible]
軟石膏[illegible] 白[illegible]
麻黃[illegible] 桔梗[illegible] 羌活[illegible]
當歸[illegible] 白术[illegible] 荆芥[illegible]
藿香[illegible] 香白芷 川芎 細辛[illegible] 大南星
真細辛[illegible] 乳香[illegible] 没藥[illegible] 人參
川當歸 甘菊花[illegible]
右為末煉蜜為丸如彈子大每日一丸[illegible]分服一丸
薄荷茶酒嚼下如胃氣寒以茴香酒下[illegible]
青龍膏[illegible]治[illegible]不和[illegible]必發[illegible]御[illegible]方
白花蛇[illegible] 狗脊[illegible] 天麻[illegible]
右細末銀石器內好酒[illegible]
加麝香[illegible]汁[illegible]內收[illegible]酒[illegible]
[illegible]
或湯[illegible]食前服之[illegible]日二服神効
通州[illegible]男子婦人[illegible]
何首烏 天南星 川芎[illegible]
烏藥[illegible] 草烏[illegible] 藿香[illegible]
右除[illegible]為末[illegible]
土[illegible]用[illegible]
[illegible]節酒下[illegible]
[illegible]
萬金湯[illegible]治風補虛[illegible]
手足風[illegible]
秦艽[illegible] 桂心[illegible] 防風[illegible]
川[illegible] 杜仲[illegible] 當歸[illegible]
[illegible] 川芎[illegible]
右[illegible]五錢[illegible]服[illegible]
紫胡[illegible]

遍身[illegible]手足重[illegible]有[illegible]便[illegible]
再見風其病便發
羌活[illegible] 紫胡[illegible] 升麻五分
蒼术[illegible] 藁本[illegible] 白茯苓
右件㕮咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服
養神[illegible]活精神[illegible]宜苦味
當歸[illegible] 人參[illegible] 甘草[illegible] 蒼术[illegible] 白术三分
紫胡[illegible] 升麻[illegible] 神麴[illegible] 木香[illegible]
川芎[illegible] 橘皮[illegible] 黃芩[illegible] 黃連[illegible] 黃蘗三分
半夏[illegible]
右㕮咀如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食後
萆薢飲 治一切風溼脚氣痛微骨酸[illegible]風去濕止痛
活血[illegible]
萆薢 川續斷 川烏[illegible] 防風 萆薢
麻黃[illegible] 熟地黃 獨活 白芷 沒藥
杜仲[illegible] 乳香[illegible] 白术[illegible]
右細末煉蜜為丸如梧桐子大每五十丸空心[illegible]
[illegible]脚足[illegible]行[illegible]
天麻[illegible]
用[illegible]每五十丸[illegible]錢[illegible]
烏頭[illegible]三方同煎[illegible]服之
愈風[illegible]
[illegible] 芍藥 天南星
麻黃[illegible] 甘草 當歸[illegible] 川芎
[illegible] 附子
[illegible]丸[illegible]下[illegible]
[illegible] 山[illegible] 木瓜[illegible] 草烏頭[illegible]
[illegible] 金毛狗脊[illegible]
[illegible] 蒼术[illegible]

右爲細末湯浸[illegible]丸如梧桐子大每服四五十丸[illegible]下[illegible]名

淮

諸氣不[illegible] [illegible]背痛[illegible]宜服[illegible]

[illegible] 天南星[illegible] 白附子[illegible] 地龍[illegible]

右件[illegible]爲末[illegible]酒[illegible]丸如彈

子大每日食後臨卧[illegible]一丸[illegible]出効偏枯[illegible]

皆[illegible]虛[illegible]

去一切風 [illegible]

以手[illegible]作[illegible]食之

治一切風[illegible]宜[illegible]

以絡石草[illegible]汁服[illegible]

治患風[illegible]事不較[illegible]人[illegible]云[illegible]

[illegible]令患者[illegible]衣[illegible]以[illegible]湯[illegible]復[illegible]

治一切風[illegible]手足[illegible]一切[illegible]

以小夫[illegible]浸酒[illegible]汁服之[illegible]日[illegible]出如[illegible]

[illegible]

治風[illegible]

以[illegible]作[illegible]代[illegible]

治一切[illegible]風[illegible]

[illegible]如令[illegible]三斤以[illegible]

[illegible]封[illegible]百日出[illegible]

封[illegible]日開飲[illegible]

治一切[illegible]

以[illegible]

治風[illegible]

以石[illegible]之

治風[illegible]

[illegible]稻[illegible]

療[illegible]

治風[illegible]

以[illegible]

瘵風[illegible]

以[illegible]人閭[illegible]以名之

瘵[illegible]

五加[illegible]服[illegible]

療[illegible]

[illegible]

[illegible]閭[illegible]出[illegible]

月[illegible]

[illegible]有[illegible]

治酒[illegible]

[illegible]何[illegible]

日病[illegible]

酒[illegible]何[illegible]

[illegible]各[illegible]以三指[illegible]後飯

治風[illegible]

[illegible]一斤[illegible]七日[illegible]

[illegible]

除風[illegible]

入[illegible]食之

治風[illegible]

[illegible]節不[illegible]頭[illegible]腹內[illegible]腰脚疼冷

[illegible]乾[illegible]令[illegible]服[illegible]

去風[illegible]

[illegible]

治風[illegible]

[illegible]

治一切[illegible]

[illegible]

治[illegible]

[illegible]腰脚[illegible]

[illegible]服亦佳

治[illegible]

[illegible]

治心風頭風肢體諸風及解肌發汗 出本草
以牡荊根水煮服
治皮毛間習習如蟲行風 出本草
煮牛蒡根汁浴之夏浴避風秋取其子炒過末之如茶服三錢
已通利小便
治手去風令光潤 出本草
以桃人五合去皮用粳米飯研之令細以水稍稍洗取汁洗手[illegible]
治風舌中風 方見風門第二十六卷
治一切風疾疼痛附子湯
右用生附子及六七錢者用半箇切碎以水二盞薑三十片煎至一盞
以下濾過盞盛水中沉微冷服若不去多睡臨服入少[illegible]
治風血積冷氣
用溫藤浸酒服之
去風血
用見腫消藤浸酒服 [illegible]

治風虛除百病杏酥法
用搗爛杏仁一石好酒一石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪
勻封於新甕中勿泄氣三十日看酒上酥出即掠取酥著甕中貯
之取其下酒澤用如刻大置空屋中作格安之候成飴餔狀旦服
一枚以前酒下其酒任性飲之
治風水腹大臍腫重痛不可轉動
用麻子半升杵碎水研濾取汁以米二合以麻子汁煮作稀粥
着葱椒薑豉空心食之 [illegible]
治一切風
用馬齒莧細切煮粥
補虛療風
用忍冬草煮汁釀酒可常服
治丈夫心腹中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣痛皮膚瘙
痒癮疹飲食不多日漸瘦損兼有發熱心悶少氣等
用菊花春收苗及花陰乾入冬採根切貯於屋[illegible]有患者取
苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身令汗
出五六度浸然浴其瘡癬風皮膚痒即止每歲四時常用則瘡
瘍風永差心中客熱膀胱間連脅下氣常妄煩不樂心悶者取
根大斛切以今春以生絹袋盛於三大斗無灰清酒中浸之春三月
浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空服一盞日夜三四
服之常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩
菊花三兩和擣為散以蜜和為圓擣一千杵圓如梧桐子大每空腹
酒及薑蜜湯飲汁等下二十圓日再服漸加至三十圓以差為度 [illegible]
治諸風腳膝疼痛不可踐地
用鹿蹄四隻燂洗如法熟煮了取肉於豉汁中著五味煮[illegible]
治風疾
取消梨不限多少榨汁而飲昔有一朝士見梁奉御[illegible]風疾已深[illegible]
[illegible]

普濟方卷之四十 畢

寺庵宮觀常住濟人 考論官教授縣碩
有求方者皆許抄錄 對方儒士[illegible]
勿得借出恐防失落 寫書儒士吳等
刊字 王勇等

中

普濟方卷之四十三目錄

寒暑濕門 論三道 方一百二十八方 法四道

類

中寒 論一道 方二十一方 法二道 中暑 中濕

神聖復氣湯 附子理中湯

三五七散 養胃湯 茵附湯 白朮調中湯

人參白朮散 丁香煉丸 薑桂散 丁附湯 回陽湯

熨法 又法 生料五積散 大橘皮丸

溫中除濕丸 加減白通湯 飲不及寒

中暑 論一道 方一百一十三方 法二道

御愛紫蘇丸 瑞蓮飲 解暑三白散

香薷益氣湯 白朮茯苓乾薑湯 青金散

加減十味香薷湯 桑丸散 十味香薷飲

黃頓散 大黃龍丸 龍發散 五物香薷湯

玉壺丸 香薷散 黃連香薷散 消暑丸

地仙散 桂苓甘露飲 桂苓丸 治中暑不拘老少

香薷散 治中暑昏眩 治夏月大熱悶欲中暑暈倒昏塞者

去暑方 治伏暑悶絕 救生散 解人中大熱方

六和湯 枇杷葉散 香薷丸 冷香湯 來復丹

大順散 桂苓甘露散 白虎湯 玉露散 石膏散

人參散 黃龍丸 水瓢丸 水葫蘆丸

治傷暑煩熱煩渴小便不利 桂苓丸 五苓散 胃苓湯

冷香飲子 發火散 黃龍丸 二陳湯 水浸丹

三氣丹 冰黃散 通草散 益元散 穀神散

一黃丸 治心暑暴渴憂去暑毒 玉壺丹 異功斂暑丸

治伏暑吐瀉陰陽不分 檀香丸 香薷劑散

解一切暑毒欲死者使服之立甦 治熱暍心悶方

鎮靈丹 治熱暍方 又方七方 治夏月中熱暍死

又方 中熱不能食 治暑渴方

白梅湯 竹葉石膏湯 滌煩丸 五聖湯

茅根散 橘皮湯 玉壺丸 續傳信方造桂漿法

熟水法 烏梅丸 十全飲子 黃耆湯 四君子湯

治中暑迷悶欲死 二香散 橘皮半夏湯

飲靈丸 水瓢丸 金露解毒丸 玉壺丹

良薑香薷湯 滑石甘桔湯

凡中暍死不可便得冷得冷便死療之方 人參益氣湯

治熱暍方 主腳中伏熱下氣自實化食 治暑氣

治傷暑 治夏月熱煩悶不止 去熱

治煩熱火熾多渴 療熱止渴 吟熱病 水沉散

治時暫伏暑 又方 治人中大熱

中濕 論一道 方一百一方

金液流星丸 除濕丹 桂苓白朮丸 桂苓白朮散

舟車丸 蒼朮復煎散 滲濕湯 括樓根湯

拳痛丸 滲濕湯 三花神祐丸 人參紫菀散

換骨丹 除濕湯 黃耆建中湯 赤茯苓丸

牛黃白朮丸 五加酒方 補骨脂丸 牽牛湯 茯苓白朮湯

加味朮附湯 朮附湯 白朮酒 舉斂丸 大橘皮湯

生附湯 防己黃耆湯 天門冬湯 人參附子湯

七物獨活湯 活血應痛丸

療風濕身體疼痛惡風微腫方

治風濕肢浮身重汗出惡風 麻黃湯

薏苡麻黃湯 療風濕百節疼痛不可屈伸時汗出 甜瓜子丸

木瓜丸 治風濕手足腰腿疼痛等證 蒼朮散

乳香沒藥丸 上丹丸 麒麟竭散 應痛丸

普濟方卷之四十二目錄

[illegible]當歸散　生附除濕湯　附子麻黃湯　麻黃白朮湯
芎朮除眩湯　續斷丸　薑黃丸　補骨脂散　黃連丸
白朮茯苓乾薑湯　茯苓白朮湯　曾損續斷丸
小金丹　小金丹真方　續斷丸　桂枝附子湯
撫芎湯　羌附湯　治濕[illegible]不得
治風濕痹麻木不仁腳去　台腳腳筋　薏苡仁散
加劑除濕湯　當歸拈痛湯　苓朮湯　萆薢木香散
不換金正氣散　白朮散　左經丸　牽牛丸
五苓散　獨活散　知母乾葛湯　五痹湯
除濕湯　輕腳丸　薏朮湯　七味除濕湯
十八味流氣飲　消風散　黃芪六一湯　翻肉丹
除濕丸　茵陳湯　藿香正氣散　獨活散
薑附湯　附子湯　二生湯　薇脚湯　秘傳獨活[illegible]
滑石丸　滲濕湯　又方　薏苡仁散　蒼朮丸
朮附湯　大羌活湯　腎著湯　除風濕羌活湯
治當風臥濕遇令所中筆病　羌活湯

普濟方卷之四十三

寒暑濕門

○中寒

論

夫諸寒收引皆屬於腎腎者少陰也少陰者至陰也至者為極也少陰者冬脈所歸者北方黑水為寒為歸藏為閉藏寒中收引拘急寒之用也其病上下所出水液澄澈清冷清者不濁其氣寒冷水穀不消化吐利腥穢水自清也素問云大凡受寒血凝為瘕太陰受寒氣聚為瘕但欲急而寒之象也急出於痛故緊急也又內經云數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒脈當遲緩寒為內熱共數為熱所養心之脈也寒氣主腎水清數於腹故下利清穀此乃腸胃寒則化物不常飢則鳴不通寒勝則火衰火衰金衰吐利腥穢腥者金肺之臭也然則春傷寒則水腫只如四肢逆冷堅痞腰痛不能俯仰[illegible]腰謂陰水主之舒卷不便於其脉沉伏而遲病之[illegible]也若身涼不渴而實從足而臥惡聞人聲不欲言皆陰證也陰陽偏則病如陽氣暴絕陰氣獨盛則為寒證陰氣暴絕陽氣獨盛則為熱證經云陽虛陰盛汗之而死陰盛陽虛下之而死若陽實外熱陰虛內寒陰實內熱陽虛外寒當伐其陽當涼解散承氣湯主之陰實當伐其陰當白朮散四逆湯主之寒者當溫發陽之氣也人以腎為根本損腎則受寒性寒則傷腎腎氣一虛寒邪交作急痛拘攣戰掉強直昏迷厥冷口噤失音或[illegible]然發熱面赤多汗此中寒也無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足微寒此傷寒也霍亂轉筋何也丁氏曰乾嘔吐逆嘔飲停痰此寒邪入腸胃也以至為咳為嗽為虛為痢為疝為瘕為腳氣為痺為疼為遂為痿為痺為諸痛其本生之人惟腎氣不足蹶於邊[illegible]於霜雪水冰之[illegible]寒或若炎天暑月當風取涼臥地又不便寒邪之氣由皮膚而達經絡自經絡而入臟腑女痢泄瀉皆由以恣胞四出[illegible]不[illegible]吐[illegible]子八爲天樞華注之以養正氣以此固藥龍血[illegible]大[illegible]氣先知溫暖而不知溫血忌未必在[illegible]之[illegible]定[illegible]以[illegible]是血之[illegible]藥也[illegible]素問曰冬三

凡此謂聞戴水地拆撫擾手陽早以晚起必待日光此去寒就温之
意也不善謂握則為寒戶生大抵出寒時以溫暖於日則手肢重不
[illegible]
身合於熏端對于六腑中之下得往細而當裝之無力腹中時痛心
胃控天陰陰而痛或大便難其不聞香臭肩背不上目中白出喘喝
痰數嗆出日未發咒苦痛項背肩背作作脂目中痛口鼻惡寒特
頭痛目眩苦振寒不止或欬或吐或喘或嘔[illegible]而[illegible]如坐
中心得去衣居寒處或飲冷水[illegible]見其振寒[illegible]氣而促留中痛間
而痛必有腸咽不通欲絕之候甚見目瞑鼻[illegible]外而淡手足厥大作
方通其發踈須臾而已振寒復至或面白而不澤者脫血也悲愁不樂
惜惓惓意悲悲健忘或善嚏嗝出此風熱大推寒水欲全之候也如六
脉細弦而濇按之控虚此大寒證亦傷精氣以辛苦並其熱前聞之館
大寫西方北方則愈○夫大寒在外留而補之鍼所不爲灸之所宜灸
當鍼經以大寒在外留而補之入於中者從合寫之鍼所不為灸之所
宜除陽陷火自當之厥而與甚腑康陷下寒甚於膝下取三里經陽
八日六字
下者火自當之熱輔堅實其所治之○夫大寒在外留而補之云外者
天外也大寒發北方寒化也中於人則言大寒在外乃皮毛之上也故
曰寒甚則浮是足太陽膀胱寒氣中其本經乃方以類聚故頂項與為
之先病合在風府穴久留鍼瀉手太陽小腸丙熱當傳是足太陽膀胱
寒經其經復受外來客邪兇安毛皆陽分也大寒隊來寓之經曰寒病
久留鍼目有軛補者補丙熱也補陽也令陰消鍼而邪退也留而補之
者以火伐之又謂寒入於中者火之所宜云謂左右寸脈皆火不持凡
脈也左寸者乃天之陽脈也右寸者乃天之陰脈也是天之陰陽俱不
足也而不待尺脈者言地之陰陽於臟也若強緊之脈更浮於上按之
則洪大脈盛於下是地下陰火亦伏藏也兄天地之陰陽已不足於外
是上下之陽皆伏匿矣以因陷下者灸之正謂此也故經云厥在於足
宗氣不下脈中之血凝而留止非火調弗能取之○刺有五邪論黃帝
問於岐伯曰余聞刺有五邪何謂五邪岐伯對曰病有五一曰振埃二曰發
矇三曰去爪四曰徹衣五曰解惑黃帝曰夫子言五節余未知其意岐
論曰振埃者刺外經去陽病也發矇者刺府腧去府病也去爪者刺關

節支絡也徹衣者盡刺諸陽之奇腧也解惑者盡知調陰陽補瀉有餘
不足相傾移也○且論經脈一法云刺府腧去府病也啖者天外陽邪
也陽者無形也天外者陽病在陽故從陽引陰治在背腧背腧府穴是
也若五臟病有形之證皮肉筋骨血脈者是也君部於寸者故言陰病
在陽乃從陽則諸邪在天外也其法取穴在背上五臟之腧假令史
病內熱治在天外鍼灸肺腧是也假令血脈內絕不得周流故曰是亦
陰病在陽其穴則背之心腧是也餘三臟有形病皆絕依此皆治在腧
腧○黃帝鍼經曰上熱下寒視其虛脈而陷之於經絡者取之氣下乃
止此所謂引而下之者也○經云聖人以上熱下寒是謂有春夏秋冬
也當從天外陽下降入地中乃天上群陰出也殽而反助六陽不能衰
退先於六陽中央血絡出血使陰氣下降雖六氣而能逐六陽下伏陰
血自降故也亦可謂老陽變陰之象也故經云上熱下寒視其虛脈陷
下於經絡者取之此所謂引而下之者是也但言絡脈皆是以三焦大者
以三稜鍼決血去陰之熱輔皆手太陽小腸中血絡有火熱之邪致此
老陽不肯退化為陰而下降故宜決手太陽之血熱使三陰得時之用
八日五六字
而降下以行秋令奉收道下入地中而奉藏者也乃瀉其血在天不肯
退化行陰道者也[illegible]
[illegible]
○凡人由寒者多見其人身消瘦熱色和者未見凡得病者來
脉望之口燥者未出善嘔是久此人中寒其人下利以裏虛故也欲吐不
能此人腹中痛凡寒脈弦脈實弦者寒也弦緊狀如弦弓弦按之不
移脈數弦者當下其寒脈雙弦而遲者心下堅脈大而緊者陽中有陰
可下之○若右手寸口脈弦者即脇下拘急而痛其人嗇嗇惡寒脈已
遲者為寒為虛為無血寸口脈微而中緊和緊即為寒微即為虛虛則
為血不足故知發汗而復下之大寒宿食主寒令百病

方

神聖復氣湯　治復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水之旺子
能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胸膈閉塞痛善嚏
口中涎目中泣鼻中流濁涕或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下

寒痰水濕作唾氣目中流淚或欲物恍惚耳鳴耳聾頭旋口苦或惡風寒
善嚏喉痺夜臥不安營衛虛損因不通口失味兩脇縮急而痛牙齒動
搖不能嚼物陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒風痺麻木小便
數而晝多夜頻而欠氣短喘渴少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶
陰戶中大風寒心而痛面黑失色男子控睪牽心腹陰陰而痛面如赭
色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而腹皮色白後出餘氣腹不
能努或腸鳴膝下筋急肩胛大痛皆此寒水來復火土之讎也
柴胡一錢 藁本八分 防風 羌活各一錢 人參五錢
炙甘草 甘草 升麻各七分 半夏湯洗七次
白葵花五朵去萼 當歸身酒洗 郁李仁湯浸去皮尖另研如泥
黑附子炮裂去皮臍一分
右㕮咀水五盞煎至二盞入
黃芪 草豆蔻仁各一錢 橘紅三分
入在內再煎至一盞再入下項藥
黃蘗三分酒洗 黃連三分酒洗 枳殼五分 生地黃二分

已上四味預一日另用新水浸又以
細辛根 川芎細末 蔓荊子各三分
右預一日用新水半大盞分作二處浸此三味并黃蘗黃連
一大盞不去滓入此浸藥再上火煎至一大盞去滓稍熱服空心
又能治齒痛喉啞唇瘡舌肉根強硬等證如神忌肉湯宜食肉不助經
絡中火邪也如無上證婦人白帶下寒男子二丸冷痛引心兩脇
中痛手心或寒兩尺脈弦細按之不鼓小便遺失或數而欠大便秘
結或大便軟濕色或氣不足以息窮寒鼻不聞香臭
喘紅膝舌澀多悲多恐心神不樂健忘多怒擾汗出惡風小便頻數往
自遺失腎下冷痛中風或寒不出腹食難癰疽患或腹皮白或黑或
鼻流清涕目中流下不止精神不爽宜服之不必謁泥老見大抵皆
與腎膀胱經中有寒元氣不足者並宜服之於月生月滿時隔三五日
與一服如病急不拘時候即宜治之一方有桃仁無甘草
大概若濕熱乘腎肝也當急去之不然則下焦
元氣竭盡而危致敵心腹下脹心煩悶而不止也若身重減

每小便如常及有熱之令退除或加以增之為寒證甚者亦用五味子澤瀉
茯苓豬苓黃蘗知母蒼术白术之藥只依本病中證候加減常服藥亦
可用二兩黃芪二分或三分如更時令清凉之氣大行却加辛温瀉之若
胃氣中風不足胸暈麻木不已
黃芪一兩 防風一錢 柴胡五分 藁本三分 藿香五分
茯苓二分 羌活一分 豬苓去皮 黃耆一錢 炙甘草半錢
橘皮一分 黃蘗 黃連 蒼术
升麻七分 川芎四分
右㕮咀每服秤二錢或五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱服食前
風如有天氣寒涼加去甘用之
附子理中湯 治五臟中寒口噤四肢強直
失音不語
人參 白术 乾薑炮 附子炮 甘草炙各一兩
右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片食前煎服少頃如當歸口噤則斡開灌之
一方無薑用木瓜服無時

三五七湯 治感太陽風寒口眼喎斜耳聾
大附子 山茱萸五兩 山藥七兩
右為末每服二錢酒調服或㕮咀每服四大錢水盞半薑五片煎
溫服七分去滓服
養胃湯 治外感寒邪內傷生冷憎寒壯熱頭目昏痛肢體拘急
風寒二證俱治先宜微汗進此令四肢微汗未汗以熱粥助之先有汗
則勿服亦須是溫和服或有餘熱參蘇飲調之兼治飲食傷脾發為痎
瘧辟山嵐瘴氣四時瘟疫
蒼术 厚朴 半夏麴各一兩 人參 茯苓
草果 藿香 橘紅 甘草炙半兩
右剉為散每服三錢加桂半錢薑七片烏梅半箇水二盞煎至一盞
去滓服熱及寒者加乾薑三分
星附湯 治中寒口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒口吐涎
沫狀如暗風手足厥冷或腹煩燥兼治陰證傷寒大便自利而發熱者
邪謂未辨表證不見

虛太　不

附子炮

古以水盞煎四錢水一盞半煎至七分去滓溫服意此藥太深耶

小兒手足中暑相似服無[illegible]氣短下之後又復作下[illegible]

俱虛自無大熱者則煩躁夜則安靜不渴不渴大便[illegible]宜服此

不知熱者更須審之兼治中脘虛寒久積痰飲心腹冷痛霍亂轉筋

四肢厥逆入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加白术入心加茯苓隨

證加之一法風加防風藥具加白术[illegible]加木瓜發熱[illegible]加

桂入參白术各等分一方附子烏頭生用名[illegible]加白术倍

之其方[illegible]名生附白术散治中風[illegible]痰涎[illegible]

[illegible]失音不語便利不禁一方有草果用生薑煎服

白术調中湯 治中寒痞悶急痛寒濕相搏吐瀉腹痛上下所出

水瀉[illegible]令[illegible]不化小便清白不渴身凉不熱本未[illegible]經自見陽熱

證其脉遲者是也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而爲中寒也或冷熱

相擊而反陽氣[illegible]不能宣散[illegible]內伏以成[illegible]者不可亦言為冷

當以脉證别之夫濕熱吐瀉當見陽脉若亡液氣虛亦能反見諸陰脉

也當以脉本明之不可妄治若熱證誤服此白术調中湯[illegible]

發明集宜通而愈[illegible]加寒熱久就無宜服之可或有[illegible]

歸等[illegible]為散以[illegible]宜[illegible]不宜服

白术　茯苓去皮　紅皮去白　澤瀉　乾薑炮

官桂去皮　縮砂仁　藿香葉各一分　甘草一兩

右為末白湯化蜜少許調下二錢日三服或煉蜜和丸每兩作十丸

名白术調中丸小兒一服分三服

人參白术散 出宣明論 此方論同第中湯去去服

人參　白术　茯苓　甘草　桂皮

葛根　藿香　滑石　藿香各[illegible]

右爲末每服三錢水一盞煎至六分[illegible]加蒼术三[illegible]

[illegible]香[illegible]治中暑心腹冷痛霍亂轉筋等證[illegible]

[illegible]　[illegible]　官桂

[illegible]

右各一兩爲細末用新醋煮麵糊丸如桐子大每服五七十丸

米飲送下空腹食前日進二服忌生冷硬物

桂苓散 出直指 溫中散寒

乾薑　良薑各[illegible]　肉桂　木香　半夏麴

甘草炙各二

右剉散每服三錢薑五片棗二枚煎服

[illegible]附湯 出直指 治[illegible]

附子　乾薑炮　木香　白术　甘草

右剉每服三錢薑五片煎食前服

通脉[illegible] 治陰證[illegible]不除失[illegible]

或少腹急痛並皆治之

丸宋[illegible]　草香附子

磁石[illegible]

右用向陽卯泉水一碗同上件藥煎至七分[illegible]

器貯於瓶中提地戶三七遍[illegible]

熨法 治三陰中寒一切虛冷厥逆嘔噦陰盛陽虛之證及陰毒傷寒

四肢厥冷臍腹痛[illegible]下[illegible]青面黑

諸虛冷證皆宜用之

吳茱萸[illegible]　麥麩[illegible]　食鹽一兩

右三件入水一大盞同和拌勻分作二次於銅鍋內同炒極熱用重

綃製作二包盛熨病人臍[illegible]下連陰部前後必使陰陽往來不

往熨之一包將冷更換一包既冷再用鹽水拌炒熱熱換前

用之至肚腹不用[illegible]日夜不住相續之至身體温熱氣出陽

氣復來而正氣[illegible]之

又法 治陰寒傷冷[illegible]痛吐[illegible]青黑身背拘急四肢冷[illegible]

用[illegible]

愛去[illegible]

[illegible]散[illegible]

[illegible]

經絡[illegible]

白芷三錢　陳皮去白　厚朴去皮薑製　桔梗去蘆　枳殼麩炒
川芎　甘草炙　茯苓去皮　蒼朮米泔浸　青皮去白
當歸去蘆　麻黃去節　肉桂去皮　芍藥各三兩　乾薑四兩
半夏湯洗
右㕮咀每服四錢水一盞薑三片葱白三根煎七分去滓食前溫服
薑附湯見上　吳茱萸湯入陽證衛生見入艾論
大橘皮丸　治中寒氣痞飲食不下
陳橘皮去白　生薑　丁香
甘草炙各二兩　神麴炒　麥蘗炒各一兩　人參去蘆
右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸食前生薑橘皮湯
化下
溫中益氣丸　治中寒氣痞不飲食腹脅痛食不中
酒吐逆胸膈不利
附子炮去皮臍　乾薑炮　半夏湯洗　白朮各一兩　乾生薑
白朮　人參去蘆　陳皮去白　神麴炒　半夏洗七次
衛生寶鑑卷二十二　八
白附子炮　當歸洗焙　天南星炮　高良薑　丁香
木香　沉香　胡椒　肉桂去粗皮
右為細末用生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸生
薑湯下不拘時候
副使大人年六十八六年秋住之過揚州千里作客病
目利完穀不化臍腹冷痛足胻寒以手撫之不熱痛痒常喜石品之熱
不得暖其脈沉細而微予思之年高氣弱深入敵境軍事煩冗朝暮形
寒飲食失節多飲乳酪履於卑濕陽不能外固由是清濕襲虛則病起
於下故胻寒而逆內經云感於寒則受病微則為咳甚則為痛為泄此
乃寒濕相合而為病也法當急退寒濕之邪峻補其陽非灸則不能已
以大艾炷先於氣海灸百壯補下焦陽虛次灸三里二穴各三七壯
治胻寒而逆且接引陽氣下行又灸三陰交二穴以散足受寒濕之邪
也遂處方云寒淫所勝治以辛熱濕淫於外平以苦熱以苦發之以附
子大辛熱助陽退陰溫經散寒故以為君乾薑官桂辛甘大熱助陰寒
為臣木生真其苦辛溫而求腸故以為臣草豆蔻炙甘草辛甘大
溫益中益氣生薑辛大熱從骨肉之卵節白辛温以通上焦陽氣故
以為佐又云補下治下制以急急則氣味厚故大作劑投之不數服
而止痛減足胻添溫飲食進十日平復明年秋八月寒陰復寒兩
閒何餘殆於後再作更灸之服湯輔之元三七壯投以前服藥數數
由是到此以後同益道為飲待予以序
加減回陽丹　治脈微沉細飲食不化臍腹冷痛足胻
寒而逆
附子炮去皮臍　乾薑炮　官桂去皮　日本五錢　炙甘草三錢
草豆蔻去皮　益智仁　人參去蘆　半夏湯洗
右㕮咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞去滓空心服三分去
穴在臍下三寸附子膚間所謂當臍之足陽明胃脈之所入也為丹
里在膝下三寸膀外廉兩筋間足陽明脈之所入也為合
可灸三壯入五分日三陰交二穴在足內踝上三寸骨下陷中足
太陰少陰厥陰之交會可灸三壯入三分
臍內腔疼下有骨控陷中
衛生寶鑑卷二十二　九
穴又在足內踝上四寸骨前絕骨端如前三分去立坊七寸是也
陽脈之所行也
於不足實
癸天門冬並治於八月未服方寸匕日再服大實時草木汗杵
○中暑
論
夫傷暑者乃夏至前後各三十日有炎火陽相火用事之時也受熱大
行煩躁石走金草萎河涸人或傷之是發熱自汗而面垢背寒惡氣
少暑有氣無力避暑傷寒相類此是夏間即病不即病至秋為痎瘧
名熱病暑以脈別之傷暑脈虛傷寒脈緊也傷暑者身熱或頭痛或發
過而脈弱不知大不同也傷暑而病者身熱而惡寒頭痛或時來寒
熱如瘧煩躁渴甚也傷寒則皆同不汗而脈洪大而緊
皆由傷暑之所致也暑者之一氣也與濕相合為病偏熱而來
滅氣但與寒才相得故有暑熱風暑之類暑風暑癉寒反食冷

晝夜頭目昏眩手足倦怠不自勝持此係傷暑熱所致也風暑者頭痛
身熱常汗出體重喘息四肢不收嘿嘿欲眠此由先傷風後傷暑所致
也風暑為病或煩渴引飲心腹令氣燥口乾面垢惡寒風熱不能食
眩暈嘔噦此伏暑中風之所致也○中暑所以然者虛者是熱傷氣而不
傷形也且暑者在天為熱在地為火在人臟為心是以暑喜傷心令人
身熱頭痛狀類傷寒但背惡寒面垢此為異耳甚則昏悶不知人事手
足微冷煩渴口燥或吐或瀉或喘或滿此皆暑氣所為也○暑氣入脉
則眩暈頓踣入腑則昏眩不覺入胸則喘滿痿躄入腎則消渴小便不
利若發其汗則惡寒甚加溫鍼則發熱甚下之則淋甚傷暑中暍其
一病但輕重不同耳○中暑身熱惡寒而其面如垢也類暴之面坑者陽
證也名曰中暑若寒熱之者乃手足微冷煩渴口燥但寬息四肢却不
痛重其脉微弱按之無力白虎湯主之痰逆惡寒者橘皮湯主之云
惡寒者竹葉湯主之頭痛惡心煩躁心下不快者五苓散最妙

四時之內惟夏一季是人之精神
之時最難調攝心旺腎衰腎化為水至秋衛氣及冬始堅當此之際正
宜保養補攝飲食亦當揖熱飲食令人生疾故夏之月也凡暑毒多從口
鼻入於牙甲是打作漿入透止息良久放口勿涼如見入咽手飲去之
蓋夏月伏陰在內腸胃冷骨易於傷敗暑毒入傳于五臟六腑急救
最急夏月小有感冒無問風寒暑氣頭痛寒熱煩躁昏悶霍亂吐痢皆
當先服五苓散然後隨證以他藥主之其實猪苓茯苓利水道白术肉
桂有實表之功若用以治病無有不愈其或士夫高年嗜暑之飲無病以
五苓散例為夏間常服之藥但知可以解暑嗜須而不知肉有肉桂
能使人胃氣胃者人之根本當根本不充之時擾胃氣豈可以為利且
以為害可不謹哉瑣碎錄云隔年五苓散不可服服之殺人良以此也
一時傷暑中者切不可便與冷水并臥濕地古方書以熱湯先灌及用布
衣蘸熱湯熨臍下及氣海續續以湯淋布上令暖氣透徹臍腹俟其醒
者以溫熱水化蘇合香丸灌之進以黃連香薷散五苓散甚者霍亂吐瀉
香飲子霍亂吐瀉來復丹二氣丹皆可用胃苓湯若氣虛則其脉沉
而弱證冷痛按當方黃連香薷散內加人參茯苓服如不可依痛甚多

致不救若途中卒熱暈倒急扶在陰涼處掬道上熱土於臍上撥開作
竅令人尿於其中以待求熱湯并生薑或蒜各一塊嚼爛以湯送下立
醒或生薑一二塊亦可或灸兩乳頭各七壯或令人口呵心亂令熱易
人嚥皆備急之法也○夏月炎熱人皆以途路所犯毒入內與五臟相和
客邪熾盛竟不宜致陰氣卒絕陽氣暴絕不通閉而詞
之證狀此乃外邪所擊真臟未虛若便與救療氣可回救也夫熱弱不
得太冷將息得令即因此消外卒以冷觸其熱不得

枇杷葉散 治中暑心悶頭疼煩燥生津止渴
紫蘇葉　烏梅肉　甘草　桂心
生薑　木瓜　檀香
右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸細嚼新水送下
縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂飲食生冷過多致霍
亂吐瀉太多致煩躁者並宜服之
縮砂仁　草果仁　烏梅肉　粉草　白扁豆
乾葛
右㕮咀每服四錢水一大盞煎至八分去滓以水浸令極冷服以解煩渴
熱欲溫任意○高年人加附子二兩煎如前去暑月以此代熟水飲之極
妙名曰損縮脾飲一方用乾姜炮一兩㕮咀每服治脾弱胃寒不
思飲食口舌乾燥不喜飲切切如一方有生薑無粉草一方有香薷
傷暑發熱頭目痛用以香薷消暑丸方無乾葛一方無白扁豆緊古云解
暑吐瀉不止或其人陰陽交而不加發而為痛也此最為急病也
可與分水飲消暑氣可則吐死也台有兩者欲飲水者是為陽氣多
五苓散主之不欲飲水為陰多理中湯主之
消暑三白散 治傷暑大熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔吐小便不利
臟腑不調惡心頭暈並皆治之
澤瀉　白术　白茯苓 各等分
右㕮咀每服一貼水一盞薑五片燈心十莖煎八分去滓不拘時每貼重半兩
清暑益氣湯 治長夏濕熱傷暑
遇大熱而渴則陽氣內伐內伐則舍于腎腎者水藏也今水不能勝

人骨枯髓虛足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也此濕熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取於陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黃而數大便溏而頻或痢出黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中得洪緩若濕氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之陽氣者衛外而為固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃芪甘溫補之為君人參橘皮當歸甘草甘微溫補中益氣為臣蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根甘苦平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麴甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃柏苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷於庚金為佐

黃芪 人參 升麻一錢 澤瀉

蒼朮 炙甘草 葛根一分 五味子九粒

神麴 麥門冬 黃柏 當歸身三分

橘皮 青皮 二分半

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去渣大溫服食遠劑之多少臨病斟酌此病皆由飲食勞倦損其脾胃乘天暑而作病也但藥中犯澤瀉豬苓茯苓燈心通草木通淡滲利小便之類皆從時令之旺氣以瀉脾胃之客邪而補金水之不及也此正方已是從權而立之若於無時病濕熱脾旺之證或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其兩目也復立變證加減法於後○心火乘脾乃血受火邪而不能升發陽氣復于地中地者人之脾也必用當歸和血少用黃柏以益真陰○脾胃不足之證須少用升麻乃足陽明太陰引經之藥也使行陽道自脾胃中右遷少陽行春令生萬化之根蒂也更少加柴胡使諸經右遷生發陰陽之氣以滋春之和氣也脾虛緣心火亢甚而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須用黃芪最多甘草次之人參又次之三者皆甘溫之陽藥也脾始虛肺氣先絕故用黃芪之甘溫以益皮毛之氣而閉腠理不令自汗而損其元氣也上喘氣短懶語須用人參以補之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補脾胃中元氣甘草最少恐資滿也若脾胃之急痛并脾胃大虛腹中急縮者卻宜多用之若從權加升麻以引之恐左遷之邪堅盛卒不肯退反行陰道故使引陽道上行若中滿者去甘草咳甚者去人參如口乾嗌乾者加乾葛○血虛以人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又宜加黃柏以救腎水蓋甘寒瀉熱火火減則心氣平安如煩亂猶不能止少加黃連以去之○如氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之如心下痞亦少加黃連氣亂于胸為清濁相干故以橘皮理之能助陽氣之升又助甘辛為用○長夏濕土客邪大旺可從權加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麴以消之復加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三伏中長夏正旺之時藥也

凡[illegible]男女老幼皆有不省人事手足搐搦或角弓反張如小兒急驚風之狀或上吐下瀉[illegible]服化痰藥如鄉村僻地無醫藥者[illegible]用湯下一[illegible]法[illegible]不論素不省之證[illegible]十有九死近俗[illegible]風寒飲食所傷[illegible]手足[illegible]又煎湯試如吐即是其證及有嘔痢手足冷者亦是[illegible]用五月者連根葉[illegible]中以[illegible]蓋之以百沸湯[illegible]半碗許仍以別紙封[illegible]熱服之取汗以厚被蓋之出汗○又方[illegible]人多看兩額上及背前兩旁有小紅點在於皮膚者卻用紙燃蘸燕油點燈照燒於紅點上[illegible]是名水火[illegible]前藥服了如愈如腹痛不止又用針於兩手指甲[illegible]針出血愈○又有用青麻蘸水下頭項兩肘臂等處蘸捋見血起更膚[illegible]紅點如粟狀然後蓋被飲食粥湯或蔥頭湯或看[illegible]生見汗[illegible]汗即愈此皆使皮膚腠理開發[illegible]之良法也

白朮散[illegible] 治伏暑中風濕頭目引飲心腹疼煩悶口乾面垢洒洒惡寒淅淅惡風微汗體不能食[illegible]

青金散[illegible] 治中暑煩躁大渴口渴不止

生硫黃 寒水石 玄精石 焰硝 青黛

右等分為細末每服一錢新汲水調下不拘時候

加減十味香薷湯 夏月常服清頭目去暑濕順氣和脾胃

香薷穗 白扁豆炒 厚朴製 茯神 紫蘇葉

甘草 陳皮 檀香 乾木瓜 丁香

右為細末百沸湯點調服治秋用香薷二兩木瓜半夏生薑各等分

錢八分每服用鹽湯點服並井水亦可不拘時候服

秦艽散 治中暑

秦艽 當歸 桔梗 黃連 烏梅

甘草 青皮 柴胡 乾薑 厚朴

右各等分為細末每服三錢煎暑氣煩躁心腹下心痛煩躁乃瀉痢並飲

下當服熟水下夏月熱湯青皮湯下二錢

十味香薷飲 治脾胃不和乘冒暑氣脹悶飲食無味嘔

噦惡心五心煩熱手足倦怠常服消暑氣健脾進飲食

香薷葉 人參 白朮 陳皮 白茯苓

黃耆 厚朴 乾木瓜 白扁豆

甘草 各等分

右為粗末每服三錢水一盞棗一枚煎七分去滓不拘時服一方為

細末每服二錢或冷水調下亦可

冰黃散 治中暑煩躁

甘草 肉桂 乾薑 紫蘇葉 烏梅

右為末每服二錢冷水調下薄荷湯調服亦得

大黃龍丸 治中暑身熱頭疼狀如脾寒或手熱手足厥冷

從來或傾倒吐瀉昏悶不省或不能飲食此方治暑毒

中暍已昏欲死者灌之立甦

細上硫黃 硝石 白礬 雄黃 滑石

白麵

右為細末入麵在內滴水為丸如梧桐子大每服十九至二三十丸新

汲水下小兒黍米大如無硝石以焰硝代之李侍郎言能大抵性治

道途中暑昏仆即扶起以手巾蘸熱湯熨其臍腹即醒然後以此

丹為末井水調下與服并以大蒜細研新水調灌之仍以少許

置氣中或調中暑取急須冷水灌之復與龍丹以水調下者何蓋其藥

性溫因冷而發用也 ○同壺相當問有病暑之患而疾昏欲死之

日暑晤月得疾不省暑日熱塵煎茶湯服之令漸下三黃丸愈愈

龍鬚散 治冒暑伏熱心膈煩悶飲水過度不知人事及霍

亂作惡作渴飢血吐血小便下血頭旋目暈

五倍子 烏梅 甘草 飛羅麵

白礬

右細末每服二錢新汲水調下一服即愈亦治暑毒物雖半日不飲

冷春服之亦有所效一方加訶子以煎水為丸每服延丸仍以茶

調下甘草公吳茱萸湯名湯熱散以乾水下

五物香薷湯 治驅暑和中除煩熱止渴補益食不節饑飽失時或冷物過多或傷

五臟飲食單便睡不暑寒夜或坐臥久傷動氣便欲飲食致令脾胃不和

三臟病冷內傷外傷寒熱頭昏暈熱毒泄瀉翻胃嘔逆霍

亂吐瀉皆傷暑寒冷不服四時傷寒疫癘并陰陽二毒傷寒可服

益脾溫胃散痰疾能進食辟風寒暑濕之氣大能解暑

香薷 三兩 白扁豆 厚朴 白茯苓 甘草

右剉每服三錢水煎溫服入鹽煎亦得不拘時一方用茯神

玉壺丸 治中暑有丸死功

細上硫黃 滑石 白礬

右為細末入上等白麵六兩拌和令勻用新汲水為丸如梧桐子大每

服二十丸新汲水吞下如悶亂欲死者以水調灌之立效其效如神

香薷散 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居

不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃

脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於

腸胃之間致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者

有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹

刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脈欲絕或煩

悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

香薷 去土 厚朴 白扁豆

右為散每服五錢水一盞半入一分同煎七分去滓水中沉冷連吃二服立
效不拘時候一方加黃連治中暑復傷冷擶叛不省心胸煩燥
只依本方宜香薷煎並冷服若用纈濕亦加烏梅煎半前手一錢陳木
一張香白虎人參扁鴨加丁香白术地附子木瓜各半錢生薑五
片亦名六和湯治復暑單白頭痛正方加山茵陳多服效以上並揀
服宮服治暑健脾或為末煎湯調服亦效一方無白扁豆
香連香薷散 治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為霍亂由飽
食腥膾復啖乳酪海陸百品無所不食多飲寒漿眠臥冷席風冷之
氣傷於脾胃諸食結而不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣
發升陰陽交錯變成吐利不已百脈昏亂榮衛俱虛冷搏於筋並宜服之
香薷穗一兩 厚朴去皮 黃連各半兩
右麁散每服三錢水一盞酒半盞石器內慢火同煎至七分去滓用
用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之令人中暑其效特甚香氣腥
中暑病大渴煩躁四肢並冷不可用春須井水
浸令頓服乃效
消暑丸 治傷暑發熱頭痛脾胃不和傷冷變寒熱
半夏醋五升煮乾 甘草炙 茯苓去皮
右為末生薑汁作薄糊為丸如梧子大每服五十丸水下此藥合時須
用好醋煮半夏薑汁作糊無見生水合用之神效中暑為患
藥下即蘇傷暑發熱頭痛用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲
水亦不為害應是暑藥皆不及此若痰飲停積並用薑湯下入
夏之後不可缺此丸常書尤好此五苓散春以五苓有治冷淨濕者
茯苓能滲脾經兼有白朮者不止服故有非宜也一方以為丸
○脾虛痰濕嘔吐不食宜以前方與枳芍香干散作細末湯煎香薷下之
十丸立效另本○平食生冷等物過多或因暑者嘔吐或渴水或霍亂唯有
宜以生薑鹽湯調小烏為香下即差○江湖間有消暑丸用醋煮半
夏湯浸黃連各兩枳殼半兩茯苓各四兩為丸依此服小不[illegible]
服之多驗
地仙散 治傷寒後伏暑後煩熱不安及虛煩熱煩勞
地骨皮去心 防風去叉 甘草炙

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時溫服
桂苓甘露飲 治伏暑中暑胃經飲引水一切所傷暑
受暑熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利閉小便赤澀大便急痛暑熟霍
亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風並宜服
茯苓去皮 澤瀉各一兩 甘草炙 寒水石
滑石四兩 白朮 桂去皮 豬苓 石膏各二兩
右為細末每服三錢溫湯調下新水亦可生薑湯尤良小兒每一錢
同上或此藥下神金丸止瀉痢若不效也并解內外諸邪所傷○
躬瘦痛者方却不用豬苓或日三服不計時候
桂苓丸 治大解暑熱煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤少
肉桂去皮 茯苓去皮
右為細末煉蜜為丸每兩作八丸每服一丸用新汲水或熱水嚼化
下
治中暑不拘老少
右用不蛀皂角不計多少刮去黑皮燒煙欲盡用盆合於地上周回
用土壅定候令透冷每一兩皂角灰用甘草末六錢每服一錢新汲
水調下氣虛人溫漿水調下昏迷者不過兩服又六內雞卵急方用
皂角五斤去皮弦炙焦存性甘草五兩中暑人
能辟利去痰故也一方米飲下
香薷散 治伏暑煩渴
硫黃 消石
右同研勻每服一錢新汲水調不拘時候
治中暑頭暈
右用上黃重羅細麵以薑汁及水和成餅子暴乾劫碾末以之每用
二三錢新汲水調服
治夏月大熱因飲中暑暈倒昏不省人事者
左為至細末取本人汗頭巾或頭髮一盞入青黛一錢調灌須臾
吐出惡痰水定後以白粥飲役之愈
去暑方

以平胃散用大小麥粉糊為丸服之

【守伏暑丸】用香附子為細末冷水調服

【救生散】治暑毒 用新胡麻一升炒令黑色取出攤冷碾末新汲水調二錢或丸如彈子大新水化下此為熱外不得以冷物逼外得冷即死

【解人中大熱方】取鳥古屋前湯服

【六和湯】治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎前產後並宜服之

縮砂仁　半夏湯洗七次　杏仁去皮尖　人參去蘆　甘草炙各一兩
赤茯苓去皮　藿香葉拂去塵　白扁豆薑汁略炒　木瓜各二兩　香薷
厚朴薑汁製各四兩

右剉每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至八分去滓不拘時服附傷生冷通用

【枇杷葉散】治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胸膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲

枇杷葉去毛炙　陳皮湯浸去白焙　丁香各半兩　厚朴去皮薑汁炙各四兩
白茅根　麥門冬去心焙　乾木瓜　甘草炙各一兩　香薷

右搗羅為末每服二錢水一盞入生薑二片煎至七分去滓溫服溫湯水調下亦得如煩躁用新汲水調下不計時候小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

【香薷丸】治大人小兒傷暑伏熱燥渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷去土　紫蘇去土　乾木瓜各　丁香
藿香葉　甘草炙　茯神去木
檀香

右為細末煉蜜和丸每兩作三十丸每服一丸至二丸細嚼溫湯下

或新汲水化下亦得小兒一丸分四服不計時候

【冷香湯】治夏秋暑濕飲食生冷遂成霍亂陰陽相干臍腹刺痛脇肋脹滿煩燥引飲無度

良薑　檀香各二兩　甘草炙　丁香　附子炮去皮臍
川薑炮　草豆蔻去皮

右為細末每用藥末五錢水二升煎十數沸貯瓶內沉井底作熟水服大能消暑止渴服之永無霍亂之疾

【來復丹】治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

太陰玄精石研　硫黃　硝石
五靈脂　青橘皮去白　陳橘皮去白

右五靈脂二橘皮為細末次入玄精石末及前二氣末拌勻以好醋打糊丸豌豆大每服五十丸空心米飲下五歲三丸小兒[illegible]研灌亦得此藥可冷可熱治法當與養正丹黑錫丹相類但性輕不驟溫燥

新增右氣血虛衰[illegible]其性[illegible]黃且能利人[illegible]吹止瀉[illegible]霍亂一證吐利交作[illegible]由飲食[illegible]冒暑[illegible]之[illegible]乾霍亂[illegible]吐利[illegible]三焦分理[illegible]嘔吐其證[illegible]此藥最[illegible]小兒[illegible]用[illegible]盡已[illegible]皆由[illegible]以致之此藥[illegible]證老[illegible]男子婦人心腹[illegible]服[illegible]利之[illegible]得[illegible]未[illegible]徐徐服之令大便常通則[illegible]不復作[illegible]用之其[illegible]不可不知[illegible]服[illegible]且[illegible]老人[illegible]此[illegible]一法治老人升虛損之人[illegible]大小便不通者[illegible]一[illegible]豆豉五十粒[illegible]研[illegible]依[illegible]用之以利[illegible]也

【大順散】治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草　杏仁去皮尖　肉桂去皮　乾薑各四

右先將甘草用白沙炒及八分黃熟次入乾薑同炒令裂次入杏

伏又同以候者仁不作瘧為度同歸隔飲後入桂一處為散每服
二錢水一中盞煎至七分去滓温服如喝發并化水調下不計時候
以沸湯點服亦得

桂苓甘露散 治夜熱止欬嗽調補脾胃和中嘔吐霍亂渴燥服之
令人通快且伏宣平及瘡水瀉暑痢不止

官桂 人參 藿香 茯苓 白朮
甘草 葛根 澤瀉 石膏 寒水石
滑石 木香

石為細末每服三錢白湯調下新水或薑湯亦可 一方無石膏

白虎湯

知母 甘草 粳米 石膏

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至六分去滓温服日三
四服欬嗽不能臥加半夏半兩 如伏暑作寒熱未解宜和五苓散
同煎服伏熱後或冷水沐浴或與冷物冷熱相搏不覺頭痛今日作寒
惟壯熱渾身西折宜加桂煎服出汗便解

玉露散 治暑渴

寒水石 滑石 石膏 栝蔞根 甘草

石為細末每服五錢新水調下

石膏散 治暑

石膏 人參 甘草

石為細末新汲水調三錢生薑湯亦可

人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒蓄熱發熱煩渴
或利或同及口瘡咽喉腫痛風壅欬嗽涕唾稠粘煩勞嗽不已者

石膏 甘草 滑石 寒水石 人參

石為末每服一錢溫水調下食後

黃龍丸 治丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心年深者無不痊者

黃連

石細末麵糊丸如梧子大每服三十丸熟水下○傷暑多服無妨下
大便泄瀉當未飲食前二服○凡夏於道途間為暑氣所中
問倒不省人事者急扶在陰涼處切不可與冷水當以布巾衣物等

熱湯蘸臍下及丹田氣海續以湯淋布上令徹臍腹暖即漸醒
○若途中倉卒無湯則掬路中熱土於臍上仍撥開作竅
令人溺其中次以大蒜嚼爛研水調灌下○一用道上熱土與大蒜
等分爛研水調服仍以大蒜嚼少許置中熱道中暑急將
蓋冷水一大碗灌下暑氣中人謹不可投以冷水不宜單用冷水灌
之未復休以暑者丸皆可定也○中暑殺頃六脈沉伏汗自出昏
不知人先以湯中如前法次用來復丹為末冷調用之仍用白
虎湯竹葉湯參服之此一定之法不可改易多有所以無主急之
銀此際各立一說各傳一方皆謂屢經作效卒者既眾議論紛紜
不知孰是猶豫之間遂以困篤矣石斛以下不求意服藥無功
以貽後悔

水鼓丸 治暑者每解煩渴

烏梅肉 甘草 青鹽 乾木瓜
白茯苓 麝香 檀香

石除麝香別研餘並為細末煉蜜為丸每兩作三十丸每服一丸含化
此我新汲水溫之咽下不拘時候 一方有人參

水葫蘆丸 治暑

川百藥煎 人參 甘草 麥門冬 烏梅肉
白梅肉 乾葛

石為細末麵糊為丸如雞頭大每服一丸含化或出行一丸可度一日

治傷暑煩熱煩渴小便不利

石以通苓散每服三錢水一盞半燈心二十莖麥門冬二十粒去心
竹葉十片車前草五莖同煎不拘時候服甚效茅根少許白茅根五
莖枇杷葉二片去白毛蜜塗微炙煎服

桂苓丸 治中暑煩渴飲水無度

桂心 白朮 赤茯苓 烏梅肉 乾生薑
甘草

五苓散 治傷暑煩渴引飲無度兼治傷寒溫熱表裏未解頭痛
石為末每服如彈子大每服一丸細嚼水下或至二丸
水水入即吐或小便不利及汗出未解煩渴不止又治霍亂吐利

瘟疫瘧疾煩渴小便赤澁
白朮 桂心 豬苓去皮 赤茯苓去皮 澤瀉各一兩半
右爲末每服二錢熱湯調下不拘時服欲多飲熱湯汗出即愈○
濕熱病加甘草一兩炙○若熱在裏身黃茵蔯湯下
治疸發黃身中暑病白水調服○小兒加白朮末少許○發虛熱
每料加黃芪人參麥門冬去心各一兩○治溏泄實熱山梔仁煎湯
氣短每服各二錢○上實加七分蘇陳皮各少許薑汁煎○又加
內莖發熱每服鹽梅一枚○有痢烏梅一枚粟殼二枚去蒂赤
白痢○白痢粟殼二枚到入同上粟米一撮○腹痛加木香
梅二箇枇杷葉二片去白毛糯米一撮○伏暑鼻衄白茅花一握○
小便血加生料者每服加梔子三箇車前子一撮○煩熱心神恍惚
辰砂一字燈心二十莖麥門冬二十粒去心淡竹葉十片車前草二
根○傷暑吐血白茅花一握○熱渴車前草子一握麥門冬三十粒去
心○暑毒黑疹赤蘇五葉木瓜三片車前子一撮○傷寒頭痛加荊芥
白湯○大便水瀉小便不利加車前子末少許○不省人事者宜

醫方類聚卷之四十二　六十二

先服蘇合香丸次服其餘者卻以此藥加黃連煎湯各一錢○暑暍腹
滿者藿香正氣散和加生薑三片木瓜二片車前草一根○伏暑頭疼小
便赤澀加山梔仁陳皮車前草各二根○霍亂吐利加木瓜二片香薷少
許生薑三片○傷暑腹痛加陳皮大黃二寸陳皮一寸去白木瓜二
片○臟腑有熱便血加黃連酒炒枳殼烏梅一錢○小便血加本參總
一錢車前子一撮燈心二十莖並加之○感暑濕手足攣痛麻木令
和香蘇散每服四錢生薑三片木瓜三片陳大棗三寸去皮車前加
蔥葉桔葉枇杷葉陳大棗各一握水一斗煎七分先熏後洗立效
作膈衍辛每料加入木瓜羌活蒼朮枳殼去白
單各一兩或十味每服加生薑三片蔥白二根○腳膊月不利忌
心肩膊背心腹脹滿者去羌活加藿香烏藥各一錢○嘔熱加黃熱
或五心熱加燈心二十莖麥門冬去心白茅根各一錢淡竹葉十片
腕木根洗一握四肢感冒一握洗亦合和香蘇散每服四錢加生薑
五片木瓜二片○諸熱毒小便赤每服四錢加車前子
各一錢則清利以上皆溫服暑月燥熱

茵竹葉十片山梔子三枚煨子乾○又方治煩渴去桂心加人參謂
之春澤湯○治濕身痛加蒼朮少許多溫兩人參溫瘧在表時
服之效尤妙一方加辰砂以療熱心煩
北辰堂收此藥但五苓散用桂小柴胡用人參正氣用厚朴備急丸用乾
姜之類欲其剛柔相濟亦寓攻守之意故方書謂五苓散無桂及隔
年者俱不可用近日諸家有去桂五苓散不知者爲其所誤若去桂
而入參卻謂之春澤湯彰定秘傳良方又謂五苓散可用生薑
汁爲丸雞頭大如前五苓散服道嘗亦可

【胃苓湯】一名對金飲 治傷暑頭痛有飲水下切片
五苓散　平胃散
右二藥相合每服二錢紫蘇烏梅煎湯下未效加木香縮砂白朮
丁香煎服未復再可

【金香飲子】治老人虛人伏暑煩躁引飲無度惡心疲倦服京藥
不得者此方主之夏宜常服
草果仁 蓮子 橘紅 甘草

醫方類聚卷之四十二　六十三

右㕮咀每服一兩水二盞生薑十片煎至半熱去滓冷旋旋服不
拘時候一方無生薑煎服

【濯大散】治傷暑煩躁發渴口苦舌乾頭痛惡心不思飲食
昏迷不省人事欲死者及治血痢婦人崩
青皮 赤芍藥 黃連 地榆
右爲細末每服三錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行加甘草等
分一方㕮咀水調服治血痢水一盞煎服

【黃龍丸】治傷暑毒解煩渴頭疼暈運
半夏 甘草
右爲末生薑自然汁丸梧子大食後新汲水下三五十丸

【二陳湯】治傷暑後感冷及內傷生冷
半夏 橘紅 茯苓 甘草
右㕮咀每服三錢生薑七片烏梅一枚煎服或冷更添生薑

【水瓜丹】治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利口乾煩渴飲食
精緊並宜服之

構　督　曼由　大勘　日　和　碑　力延

巴豆[illegible]去殼[illegible]

右同研勻用蒸餅[illegible]作汁和爲丸如梧桐子大每服五丸以水送下

嘔則入新汲水吞下不拘時候一方有輕粉一錢此藥性伏暑方是

取下內積之物即安[illegible]自養將不得傷[illegible]其所以而食病即發矣

二氣丹 出[illegible]方 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心並皆治之

硝石　硫黃 各等分

右爲末於銀石器內文武火上炒令鵝黃色再研細用糯米糊爲丸

如梧桐子大每服四十丸新汲水送下不拘時候一方水丸如指大

每一丸細嚼臘茶下

水葫蘆丸 出御藥院方 治冒暑伏熱頭目昏暈嘔吐泄瀉[illegible]

麥麪炒

赤茯苓去皮　甘草半生半炒　寒食麪　生薑[illegible]

右爲細末每服二錢新汲水或冷水熱水調下不拘時候[illegible]

[illegible] 治伏暑下血[illegible]崇寧二年自大府出[illegible]

夏及秋患痢每月一日夜三四十次累血多白少名曰[illegible]

[illegible]

陶隱居青箱雜記中如[illegible]即得此非

[illegible]之餘即之[illegible]血多白少小便[illegible]其言中[illegible]之

疾也已[illegible]之方[illegible]因伏暑小便[illegible]入大腸[illegible]心經而[illegible]血

由大腸而下故其狀[illegible]而非痢也但令大小便各歸本[illegible]即安

木通　燈草[illegible]　車前子　竹茹[illegible]

右剉如大米粒或爲細末[illegible]每服抄三錢水一盞煎至七分

[illegible]每服二錢以[illegible]食後[illegible]一服使[illegible]

天下有如此[illegible]數得遇又服之[illegible]記傳後

[illegible]丸散 治身熱[illegible]

脾胃中積聚寒熱[illegible]九竅六腑津液[illegible]

[illegible]中除煩熱心[illegible]胸膈[illegible]

魂定[illegible]五勞七傷一切虛損[illegible]

飲食不下肌肉[illegible]明目[illegible]

氣血[illegible]水穀[illegible]元解百藥酒食[illegible]

傷久服[illegible]中暑傷[illegible]

彥　致　○　唱　玉

[illegible]

[illegible]宣通氣血而愈及婦人下乳催生并產後損[illegible]

[illegible]熱證並宜服之重者不過[illegible]

之妙藥惟有孕婦人不得服恐墮胎也

滑石[illegible]　甘草[illegible]

右爲細末每服三錢蜜少許溫水調下無蜜亦得日三服欲冷新

汲水調下發汗[illegible]葱白豆豉湯調三四服此藥解散甚多服無害

有益

[illegible]神散[illegible]治中暑泄瀉

陳倉米[illegible]　乾薑[illegible]　甘草[illegible]

右爲末每服二錢食前[illegible]

三黃丸[illegible]治伏暑發狂躁及下血痢泄瀉並宜[illegible]

黃連[illegible]　黃柏[illegible]　黃芩[illegible]

右爲細末水糊爲丸如梧桐子大每服三十丸[illegible]

[illegible]甘草湯下水[illegible]

[illegible]

[illegible]伏暑[illegible]

枇杷葉[illegible]　生薑[illegible]

右[illegible]用水二大盞[illegible]一合[illegible]

溫服一服即愈[illegible]

[illegible]暑而[illegible]當用五苓散六和湯[illegible]此方

玉壺丹[illegible]

硫黃[illegible]

右各生用爲末[illegible]如櫻桃大每服一丸[illegible]

[illegible]水下或[illegible]生薑[illegible]丸如梧子大新水吞數十丸亦可

[illegible]散[illegible]治伏暑或吐或瀉[illegible]

黃連[illegible]　陳倉米[illegible]

右於銅內如[illegible]法[illegible]爲末以水爲丸如梧子大每服

三五十丸飯湯下不以時

治伏暑吐瀉煩渴不止[illegible]

白芷[illegible]

右為細末每服一錢新水調下不拘時

撮香丸 解暑毒

撮香末一錢 杏仁 烏梅肉 紫蘇葉 茴香

百藥煎 甘草

右為細末煉蜜為丸如彈子大非時含化

香薷散 治解暑止霍亂

香薷 厚朴 茯苓 陳皮 甘草

良薑

右剉細每服二錢米泔一盞水煎服一方有乾薑無良薑

解一切暑毒欲丸者使服之五苓散 桂

半夏 甘草 桂 赤茯苓

白茯苓

右為末用生薑汁作麵糊為丸如小豆大每服五十丸熱水下右身大

熱頭痛忽寒心中煩悶欲飲水不禁飲頭目昏悶因冷痛忽百丸

熱悶如飲當飲食又宜同中空腹服留其味渴大而數渴之中暑

治熱暍心悶方

用飲熱湯可用少許薑橘皮甘草煮飲之稍稍咽勿頓使絕但以

熱土及熱灰土壓臍上佳一方五蛇喜有生意

鎮靈丹 治中暍水雪不能飲者陰湯文錯中脘痞塞

煩痛患心

大陰玄精石 硫黃 硝石

石細研入銀器內炒令鵝黃色候冷入鉛粉一錢同研極細面糊

水浸過細研搜和丸如雞頭大食後井花水下七丸

下一兩丸一方五鈴拔

治熱暍方 及暑渴迷悶絕不救

取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止又以熱土壅臍上令人

乘之臍中溫即愈一方以大蒜二瓣研爛水調服之石林暑錄云

須治一御馬之僕五跌

又方 治夏月中熱暍死

用濃墨研汁二升灌之即不廢吏

夏　清　暑　飲　服

又方 出千金

以使人溺其心令暖易人為之

又方 出千金

用拖泊子若飯著心上尉之

又方 出聖惠

用萵地黃一兩即愈如人行數步旋以刀深掘地深一尺入水其水攪

之取濁燭少飲死者即活

又方 出聖惠

用黃連去兩大碗一大盞煎至五分去滓溫服之

又方 出聖惠

用地黃汁一盞服之

又方

用水半升和麵一大匙攪服之

治夏月中熱暍死

以搗菖蒲汁飲之一二升

又方 出千金

取屋上南畔瓦熨心為之

中熱不能食

用生薑搗汁和蜜服

治中暑渴方 出局方

用百藥煎蠟茶為末烏梅肉丸如雞頭大含化名為水鐵丸

白梅湯 治中熱五心煩躁霍亂嘔吐口乾煩渴津液不通

白梅 檀香 甘草 鹽

右為末每服一錢擦生薑新水下兩後乾燥煩悶心悸嘆

竹葉石膏湯 出仁齋 治伏暑內外熱熾煩躁大渴不可攻者

石膏 半夏 麥門冬

人參 甘草

右為末每服二錢生薑五片青竹葉七片粳米百粒水煎服

濃煎丸 治積年伏暑頭痛眩暈精神恍惚不食飲氣煩悶多渴

茴香 大黃 橘柳

服序　　枚　　煩　桂末　新瓦紀　置上　茯代代中

右爲細末用白麵糊丸如梧桐子大每服五丸
臨臥溫酒送下
五聖湯 治伏暑積年每遇夏月不進飲食瘦乏倦怠
頭目昏痛愛心多驚
青皮 黃連 甘草 吳茱萸 白茯苓
右㕮咀每服二錢水一盞半煎至一盞去滓放冷連日午服
先取青皮甘草收於...十二...吳茱萸...二服送
下小兒...一二服...
換...不動...是...大...服之
苧根散 治...傷...不止...不思飲
白茅根 人參 厚朴 香薷
右爲細末每服二錢水一盞入...同煎至一盞水中沉冷服不
枸杞...
補虛湯 治傷暑虛乏...宜補虛湯
非... 大 ...
甘草 人參 陳皮
右㕮咀每服三錢加竹茹一...水煎熟服
五苓丸 治中暑伏熱不省人事
白麵 白礬 ...黃...
右爲末滴水丸如梧桐子大每服三五十丸新水下
醍醐方 治中暑夏月飲之...
烏梅...二大兩 白蜜一斤以水二斗煎...一升...入新...中...
下二物攪二三日...
每日...七日...
升...其...水...
熟水方 ...
白...
蠟梅丸
蠟梅花 乾薑 甘草 枇杷葉

答　　頃

烏梅...
右搗...枸杞...和上件...搗二三百下丸如雞頭大每服
一日一丸
十全飲子 治傷暑...中暑...
人參 白茯苓 乾山藥 白扁豆 紫蘇葉
香薷葉 甘草 厚朴 半夏 白朮 各等
右爲粗末每服二錢水一盞薑三片煎七分去滓以新汲水沉令冷
如若煩渴...方可沉全服如脾胃弱只是取常服
黃耆湯 治...口乾...不思食
黃耆 熟地黃 芍藥 五味子 麥門冬
茯苓 甘草
右爲散每服三錢以水一大盞生薑三片棗一箇烏梅一箇
非...
四君子湯 治...胃弱人用...
皆...
四...
人參 茯苓 白朮 甘草 各等
右爲散每服四錢煎服
治中暑...丸
右...生...新水送下或不...
...
一...
二香散 治...夏月...
香薷散
右...
王...
若...
...

橘皮半夏湯 治中暑伏暑及痰在胸膈服此大有神効

陳橘皮 去白 白朮 [illegible] 白茯苓 [illegible] 人參 [illegible] 枳殼 [illegible]

當歸 [illegible] 半夏 [illegible] 甘草 三分

右除半夏外㕮咀同拌勻每服三大錢生薑六片棗二箇水一盞煎

至七分去滓溫服不拘時候

飲靈丸 治中暑神効

半夏 [illegible] 天南星 [illegible] 人參 茯苓 桔梗

乾葛 麥門冬 [illegible] 桂 [illegible] 紫蘇葉 [illegible] 甘草 [illegible]

烏梅肉 [illegible] 甘子 [illegible]

右為末以[illegible]煉蜜[illegible]和勻入臼杵數百下先以[illegible]白[illegible]丸

如櫻桃大生[illegible]為衣常用一丸含化去[illegible]下[illegible]出此藥大去

水息痰[illegible]下氣[illegible]宜服此藥若[illegible]三二丸[illegible]水送

下此藥仍[illegible]石氣味

水[illegible]丸 治[illegible]暑毒

[illegible] 白梅肉 [illegible] 烏梅肉 [illegible] 紫蘇葉 [illegible]

檀香 [illegible] 香 [illegible]

右為末[illegible]和為丸如彈子大[illegible]水嚼下不

拘時候每服一丸

金[illegible]丸 治[illegible]大[illegible]暑[illegible]

[illegible]上[illegible]各一斤右為末用[illegible]

[illegible]汁為丸如彈子大陰乾每服一丸生薑[illegible]研細入鹽一小匙新

水調下

玉壺丸 [illegible] 治暑[illegible]

硫黃 [illegible] 寒水石 石膏 [illegible] 甘草

菉豆粉 [illegible] 太陰玄精石 [illegible]

右為細末[illegible]餅丸如彈子大[illegible]生[illegible]可嚼[illegible]新水下

良薑香薷湯 [illegible] 治伏暑傷冷致作霍亂

陳皮 藿香葉 香薷葉 甘草 生薑

良薑 [illegible] 麥子 [illegible] 紫蘇葉 木瓜 [illegible]

右[illegible]每服三錢重煎服一方用木瓜香薷高良薑等分[illegible]

用藿香葉良薑[illegible]木瓜[illegible]兩水二[illegible]煎[illegible]溫服一方用[illegible]白扁豆各

四十九粒研碎水煎服或為末研木瓜湯調一方以平胃散五錢[illegible]

等分和為一服熱湯調服若因暑[illegible]霍亂[illegible]香薷

散或[illegible]服[illegible]不宜[illegible]陽明[illegible]

暑[illegible]七情[illegible]

[illegible]

滑石甘草湯 [illegible]

伏暑[illegible]小便[illegible]

滑石 [illegible] 甘草 [illegible] 桔梗 [illegible]

右為末每服二錢[illegible]

[illegible]滑石六一湯

凡中暍死不可使得冷得冷便死[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

恐[illegible]

[illegible]

人[illegible]

者[illegible]元氣也

黃芪 [illegible] 生甘草 [illegible] 人參 [illegible] 升麻 [illegible]

白芍藥 [illegible] 五味子 [illegible] 柴胡 [illegible]

右㕮咀[illegible]作四服每服水二[illegible]

[illegible]

安[illegible]

白[illegible]方

張[illegible]死人[illegible]

蘇

主[illegible]

以[illegible]

治暑[illegible]

用甜瓜暑月服之永不中暑氣

治傷暑 出本

以建茶再飲之

治夏月熱渴煩悶不止 出本

擣小薊葉取汁半杯服之立瘥 方用苗生擣汁服

去熱 出本

以樗樹皮削取東畔去上皮煎夏日作飲服之

治煩熱少攝多渴 出本

用小麥作飯水淘食之

解熱止渴 出本

以芋莖煮食之

除熱病 出本

以天名精擣汁夏月服之良

冰苑散 東垣 治伏暑傷冷霍亂轉筋嘔吐煩躁[illegible]

[illegible]回散逆冷

香薷散 三 白茯苓一兩 厚朴 薑汁炒 白扁豆 [illegible]

丁香 甘草 [illegible]

右件爲細末每服三錢水一盞入好酒半盞同煎至一盞水中沉冷

服不拘時候

治時暑伏暑

右用香附子手中搓去皮入銀器中炒香取出爲末和少粉[illegible]

或用白麻以[illegible]令水送下[illegible]服便[illegible]

又方

右用薑一大塊搗爛不炒同前

治冷中大熱

用蒜菜作薤韮食之或煮食亦得

○中濕

再論

夫濕者天之雨露地之山澤人之汗[illegible]或中之必溢於血脉而流於

關節也其或久處卑濕常住水濕或冒雨露或勞而汗出[illegible]令人[illegible]

惡人

若 若 若

皆能爲病經不能爲停著左得曰雨患腹疾是以受濕之人一身痛重

百節疼痛四肢擊痛筋脉弛長或發熱發實小便澀泄大便溏泄也若濕

不和乎病中熱熏身不遂口眼喎斜或起麻痺[illegible]自汗[illegible]

之之法宜利小便若濕不利其小便非其治也宜於[illegible]方下表之

惡不得以大汗發之若妄轉爲濕家誤汗必作痙令人角弓反張如中

風狀下之則額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死○寒熱

風濕皆能并合爲病故有風濕寒濕濕熱各不同而治亦不可不

明辨也風濕者風與濕相搏也其證肢體煩重不可轉側前後

痛不得屈伸頭上微汗不欲去衣或身微腫欲發其汗但微微身則

風濕俱去若大發其汗則風氣去而濕氣相并也其證身體煩疼無汗

惡寒發熱脉浮緩而細宜與麻黃白朮湯以散寒表除熱去表也○

中濕者脉沉而細緩以濕注人之肌膚肌肉則沉大濕者在天爲雨

在地爲土在人藏爲脾故濕喜歸脾脾虛喜中濕故曰濕流關節之

多使人腹脹四肢關節疼痛而頑久則浮腫喘滿昏不知人者皆屬

痛身重如坐水中着脾者四肢浮腫不能屈伸挾風則眩暈嘔噦挾寒

則拳攣掣痛或濕泄發黃身熱肩背重直視鄭聲[illegible]

堅大之○夫風濕者是風氣與濕氣共傷於人也風者八方之虛風濕

者水濕之蒸氣若地下濕復少霜露其山水氣蒸[illegible]長是人勝理

開便受風濕其狀令人懈惰精神昏慢若經久亦令四肢緩縱不隨入

藏則瘖瘂口舌不收或腳痺弱變爲腳氣其證頭目昏悶緩弱多過

濕而血脉難風濕致易更濕署用之○大濕且者其人常傷於濕因而

中濕或汗未乾即浴濕熱相搏則發濕痺苦腰脛逆冷又胸多汗頭

目痛苦妄言惡寒反熱關節盡疼手足倦息不自勝持其脉陽弱而

弦小而急皆在太陰宜與小茯苓白朮爲不可發汗汗出必不能言耳聾

不知所在身青面色變名曰重暍如此者醫殺之耳○凡男子婦人小

便手足麻痺肌肉不仁者風寒濕三氣相雜至合爲痺先用黃芩芍藥

瀉吐之吐訖次用通經散通經而瀉之瀉訖更用辛苦之劑汗之汗濕

之後可用當歸清涼飲子無鳥多丸除濕丹和血行經之藥則愈矣○

凡男子婦人病水濕瀉注不止宜服豆蔻烏梅薑附散熱之劑經曰陽

氣耗散於內陰精損削於外三焦閉塞水道不行水滿皮膚身體疼腫

面黃腹大小便赤色兩足浮之陷而不起內經云諸濕腫滿皆屬脾土
可用獨聖散吐之如脾月虛宜於衛氣不清風氣傳入而發者大力
出天以荳子水為功量病人虛實寫十余行濕去腫消則愈矣是汗下
吐三法俱行三法行後臟腑空虛先宜以淡粥米粥養腸胃三次又服
五苓益元固氣散增心湯調下亦可加大部未害用重服神助散可以流
暴閉燥分滲濕利水自既平之後宜大將息忌濕油鹽酒葉房室等事
三年則不復作矣

方

金砂散星丸 治男子婦人雜證及風蠱酒濕
木通去皮一兩 草蔚一兩半 木香一兩 白茯苓去皮 大黃去皮各一兩
滑石五兩 海金砂五錢 牽牛頭末五兩 郁李仁一兩
右為細末滴水丸如梧子大每服五十丸至八十丸生薑湯下忌濕麵
麵湯下○如小便不通燈草湯下○如傷酒生薑湯下○酒積食積
湯下○痢疾高良薑湯下○婦人血氣不調當歸湯下○腹脹陳皮
溫酒下○心積者韭根湯下○臍氣和寫湯下○中風槐角湯下

除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫
檳榔 甘遂 赤芍藥 威靈仙 葶藶各二兩
乳香另研 沒藥各一兩另研 牽牛半兩 大戟炒三兩 陳皮四兩去白
澤瀉二兩
右為末麵糊為丸梧桐子大每服五十丸加至七八十丸食前溫水
送下得更衣止後服前後忌酒二日與後忌濕麵甘草三兩日食溫
米粥補胃 一方無葶藶

桂苓白朮丸 消痰止嗽 治痰疾止咳嗽散痞滿壅塞開鬱氣痛悶宣
飲食調和臟腑無問寒濕熱嘔吐瀉利皆能開發滲令通其氣濕開鬱結
氣衰宜平而愈怨解酒毒療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能者服之
止為度隨證調之
官桂 茯苓去皮 半夏各一兩 乾生薑一分 白朮
紅皮去白 澤瀉各半兩 黃連半兩 黃柏二兩
右為末麵糊為丸如小豆大每服二五十丸生薑湯下食後

桂苓白朮散 河間先生治傷寒中風胃暑飲食內外一切所傷傳受濕熱
內甚或頭痛口乾或吐瀉搐頓或小便赤澀大便急痛或濕熱內甚而下
一切濕熱霍亂吐瀉轉筋急痛腹滿或中外諸邪所傷而吐瀉者溫
熱之時尤用之

舟車丸 治積聚瀉熱有時胃氣不和遍身腫滿或水腫氣喘腫
腹脹氣急不得臥腸間結聚大便不通宜皆治之
甘遂 陳皮 青皮各一兩 木香半兩 芫花醋炒
大戟各一兩炒 大黃二兩 牽牛一兩 取盡加黃芪
五兩
右為細末水丸梧子大每服六十丸量虛實加減食前溫水送下以
利為度

蒼朮復煎散 治寒濕相合腦痛惡寒項筋脊骨胛眼痛膝髖痛麻
況無力行步身沉重
蒼朮一兩水二碗煎至一碗去渣 羌活一錢 升麻
澤瀉 柴胡 藁本 白朮各半錢 黃柏三錢
紅花少許
右㕮咀精粗服令空心取微汗為度忌酒濕麵

滲濕湯 治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澀或利大便溏
泄皆因坐臥濕處或因雨露所襲或因汗出衣裏冷濕久久得之腰下
重疼兩腳疼痛腿膝或腫或不腫小便利反不渴悉能主之
蒼朮 白朮 甘草各三 乾薑 茯苓各二
橘紅 丁香各一
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚去滓食前溫服煎至
六分與渠治脾瀉下和嘔逆惡心大便時時溏泄也須宜一方減
橘紅丁香名曰腎著湯治腎虛而冷失溺大宜服之或不因虛氣所致了
是風寒濕搏以致腰痛或腰重腰脚痛不能轉側加桃仁散治腰痛者宜服者腎
虛弱腰痛服補藥

栝樓根湯 治風溫加渴甚者
石膏二兩 栝樓根三兩 人參 防風 甘草炙各二兩
葛根一兩半去皮白者只用一兩五錢
右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一中盞去滓服

導痛丸　治走注及兩足[illegible]腰[illegible]疼痛

檳榔 炒 一兩半　菟絲子仁 炒 二兩　當歸 酒洗焙

乳香 另研　沒藥 另研 各　川山甲 一兩炒　木香 三兩　麝香 別研 三錢

右同為細末，黃麪糊和丸如梧桐子大，每服五十丸，不拘時候，溫

酒下，或木瓜湯下。

參朮湯　治坐臥濕地，或為雨露所襲，身重腳弱，關節重疼，發熱惡

寒，或多汗惡風，或小便不利，大便溏泄，或有痰急，手足時腫，周身麻痺，

肢體微腫。

白朮 二兩　人參 去蘆　乾薑 炮　白芍藥　附子 炮去皮臍

白茯苓 去皮　桂枝 去皮　甘草 炙 各

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑五片，大棗一枚，煎至八分，去滓，溫

服，不拘時候。

三花神佑丸　治中滿腹脹，喘嗽淋閉，一切水濕腫滿，濕熱腸垢沉

積，變生疾病，久病不已，黃瘦困倦，氣血壅滯，不得宣通，或風熱燥鬱，肢

體麻痺，走注疼痛，風痰涎嗽，頭目旋運，瘧疾不已，癥瘕積聚，堅滿痞悶，

酒積，一切痰飲嘔逆，及婦人經病不快，帶下淋瀝，無問赤白，并男子婦

人傷寒濕熱，腹滿疼痛，久病黃瘦，服餘藥不能取效，[illegible]為轉動之藥，

兼治久新腰痛，并一切不測及小兒驚癇，積熱乳癖，腫滿，並宜服之。

甘遂　大戟　芫花 各半兩醋拌濕炒　牽牛 二兩

大黃 一兩為細末　輕粉 一錢

右為末，滴水為丸，如小豆大，初服五丸，每服加五丸，溫水下，每日三

服，加至快利，利後卻服，保養宣通氣血，消進酒食。病痞悶極甚者，便

多服則困攻不開，轉加痛悶，則初服兩丸，每加兩丸，至快利為度，以

意消息。小兒丸如麻子大，隨強弱增損，三四歲者三五丸，依前法。一

方　摩宣丸　神佑丸加黃柏。

人參紫菀散　治濕熱流注，足脛浮腫，痰嗽等症。

人參　川芎　木香　防己　白朮 各一

紫蘇 去土　苦葶藶 炒二錢

右為散，每服三錢，水一大盞，生薑四片，烏梅一個，煎至八分，去滓，

溫服，食前，日進三服，須溫熱溫酒等物。

[illegible]骨丸　[illegible]風氣[illegible]久前腫浮並皆治之

骨碎補 去毛 酒炒　生地黃 去土　萆薢 等分

肉桂 二斤

右為細末，[illegible]用[illegible]千[illegible]，[illegible]

[illegible]五用[illegible]調[illegible]如此七次，同[illegible]之，大有神效，一料分作七處，七

日用之。

[illegible]湯　治[illegible]身體重著，[illegible]，大便溏泄，小便自利

平胃散 加半夏麴 炒

右各等分，用水二盞，生薑[illegible]一寸，去白朮，用赤茯苓

[illegible]湯　治[illegible]身[illegible]

蒼朮 浸　桂枝 各二　甘草 各三

右為粗散，每服三錢，水一盞半，生薑四片，棗一枚，煎至八分，去滓，食前服。

一方，入[illegible]少許，[illegible]稍熱服。

赤茯苓丸　治脾濕脹滿，腿腫，喘逆，氣不宣通，小便赤[illegible]

葶藶 二兩　防己 二兩　赤茯苓 一兩　木香 半兩

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三十丸，煎桑白皮湯下，食前服。

牛[illegible]白朮丸　治腰腳濕氣

黑牽牛 頭末　大黃 二兩　白朮 一兩

右為細末，滴水為丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前生薑湯下，如要快利加

至百丸。

五加酒方

五加根莖 細剉　六月六日[illegible]　糯米三斗 [illegible]

右三味，以水五斗，共五加同下，於大釜中，以木[illegible]與水平，煎之

即更合水一石五斗，共前計兩石，閉下火煎，旋旋添水，取藥汁一[illegible]

至末[illegible]

在[illegible]密封蓋之，[illegible]五加[illegible]以水[illegible]

之，如別有五加[illegible]

用前五加[illegible]

故而[illegible]

之[illegible]

補骨脂丸　治溼傷內外衆疾俱作陽氣衰絕乳石補益之藥百
端不應唐鄭相公為海南節度七十有五越地卑溼服諸藥不應元和
七年有訶陵國舶主李摩訶獻此方經七八日而覺應驗自爾常服其
功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之

破故紙十兩淨擇去皮洗過曝乾　胡桃肉二十兩湯浸去皮細研如泥

右研桃肉泥入破故紙末更以好煉蜜和勻如飴盛瓷器中旦日以
溫酒化藥一匙服之不飲酒者以熟水化下彌久則延年益氣悅
心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血

牽牛湯　治腹中有風氣疰腹微腫中滿氣息喘嗽為患小便不利

黑牽牛一兩半炒　厚朴半兩薑製

右為末每服二錢煎薑棗湯調下或作丸時以水丸梧桐子大薑棗湯下
三十丸亦得

茯苓白朮湯　治胃兩溼着于肌膚或因汗出浸漬或冒雨溼得病
覺腰重腳弱身體煩疼頭眩等症其脈細弱

白朮二兩　附子一兩去皮臍炮　茯苓去皮半兩　官桂去皮半兩

甘草半兩

右㕮咀每服四錢水二盞生薑七片煎至一盞去滓食前服

加味朮附湯　治中溼脈沉而微緩溼喜歸脾流於關節中去則快
人體脈緩四肢關節疼痛而煩或一身盡重久則浮腫喘滿昏不
知人挾風則眩暈嘔噦兼寒則攣拳掣痛治之不得發汗灼艾通泄唯利
小便為佳此方主之及治大小便皆自利

白朮二兩　甘草炙一兩　附子炮一兩半　赤茯苓一兩

右剉散每服五錢水一盞半薑七片棗二枚煎七分日三服才見
身痺又三服當如冒狀勿怪蓋朮附并行皮中逐水氣故爾大合加
桂一兩大便堅小便利則勿加

朮附湯　治風溼相搏身體疼煩不能轉側不嘔不渴大便堅硬小
便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止自汗

白朮二兩　甘草炙一兩　附子炮去皮半兩

右剉細每服三錢薑七片水一盞半煎至一盞食前溫服

白朮酒　治中溼口噤不知人

用白朮半兩去皮以酒三盞煎至一盞頓服不能飲酒以水代日三服
夜一服歸氏方云暑溼中脾則腹脹四肢痛久則浮腫挾風則眩暈
挾寒則攣拳不可大發汗不可灼艾為當利小便大汗大下皆死

五皷丸

赤土二兩　川山甲　蒼朮　自然銅大火燒七次　赤小豆五兩

當歸　山梔子　陳皮　木鱉子　香白芷

木瓜　蘇木　生地黃　熟地黃　荊芥

地龍去土炒　骨碎補二兩　晚蠶沙二斤　當歸一兩

紫金皮半斤　乳香一兩　沒藥一兩　大烏頭一斤

右為細末用酒糊為丸如梧桐子大每服五六十丸酒送下或茶清
亦得用好醋為丸亦妙

大橘皮湯　治溼熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄及治
喘嗽不能臥不欲食

橘皮一兩半　木香一分　滑石六兩　檳榔三錢　茯苓一兩去皮

豬苓去皮　澤瀉　白朮　官桂各半兩　甘草二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服大小便秘
先服十棗湯三五服後再服此藥一方不用甘草

生附湯　治受溼腰痛

附子生　蒼朮炒　杜仲炒去絲　牛膝酒浸　厚朴製

乾薑生　白朮　茯苓　甘草炙各二

右㕮咀每服四錢薑三片棗一枚水一盞煎至八分去滓食前服

防己黃耆湯　治風溼相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩
疼自汗惡風不欲去衣及風水客搏腿腳浮腫上輕下重不能屈
伸　防己四兩　黃耆五兩　甘草二兩炙　白朮三兩

右為粗末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至一盞去滓稍
熱服不拘時候血覆至腰汗出差明驗是治溼不利小便非其治
也喘者加麻黃胃中不和加芍藥氣上衝加桂下有陳寒加細辛服
藥後當如蟲行皮中腰以下如水服後以下令微汗出瘥

天門冬湯　療風溼體疼惡風微腫

天門冬三兩去心 葛根四兩 生薑三兩 桂心四兩 麻黃三兩去節
芍藥二兩 杏仁五十枚去皮尖 甘草二兩炙
右切以水一斗煮取二升分三服取汗忌海藻菘菜生葱鯉魚
人參附子湯 治風足身體疼痛如折肌肉如刀所刺
人參 黑附子炮去皮臍 乾薑炮裂 芍藥 茯苓去皮
甘草炙 桂心去皮 白朮二錢
右為細末每服二錢水一大盞同煎至七分去滓溫服不拘時候
一方去桂用乾地黃二兩
七物獨活湯 療腳弱及中風濕緩縱不隨
獨活四兩 葛根四兩 乾薑二兩 桂心四兩 半夏四兩洗
甘草炙二 防風二兩
右㕮咀以水一斗煮取三升每服三升日三服以微汗出忌羊肉
餳海藻菘菜生葱
七聖散 治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或腳膝疼痛不能
步履

卷之四十二

續斷 獨活 防風 杜仲 萆薢
牛膝酒浸 甘草
右各等分焙乾為細末每服二錢溫酒調下
活血應痛丸 治風濕客於腎經血脈凝滯腰腳重疼不能轉側皮
膚不仁遍身麻木上攻頭面虛腫耳內常鳴下注腳膝重痛少力行履
艱難亦治項背拘攣不得舒暢常服活血脈壯筋骨使氣脈宣流
狗脊去毛四兩 蒼朮米泔浸一宿去皮六兩 香附子炒一斤
陳皮去白四兩 沒藥別研一兩 威靈仙二兩 草烏頭炮半兩
右為細末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五粒至二十粒用溫
酒或熟水任下不拘時候久服忌桃李雀鴿諸血物
療風濕身體疼痛惡風微腫方
桂心四兩 麻黃二兩去節 芍藥二兩 天門冬二兩去心 生薑二兩
杏仁五十枚去皮尖
右㕮咀以水一斗煮取三升一服一升日三忌鯉魚生葱海藻菘菜
治風濕脈浮身重汗出惡風

甘草二兩 黃耆五兩 漢防己四兩 生薑 白朮各三兩
大棗十二枚
右㕮咀以水六升煮取三升分三服服了坐被中欲解如蟲行皮中
臥取汗
麻黃湯 療頭風濕面如針刺之狀身體有腫惡風汗出短氣不能飲食
麻黃四兩 芎藭二兩 茯苓二兩 當歸二兩 杏仁二十枚去皮尖兩仁
右剉以水五升煮取二升去滓分三服日三慎粥將息佳
薏苡麻黃湯 療風濕身煩疼日晡發熱劇者 [illegible]
薏苡仁半升 麻黃二兩去節 甘草二兩 杏仁二兩去皮尖雙仁碎
右㕮咀以水五升煮取二升分再服汗出即愈或家病痛可以甘草麻黃湯發汗
不差更合飲加白朮四兩名白朮麻黃湯忌海藻菘菜桃李雀肉等
療風濕百節疼痛不可屈伸痛時汗出
芍藥四兩 甘草炙二兩 芎藭四兩 附子二兩炮
右㕮咀以水五升煮取二升分再服相去如行十里頃忌豬肉海藻菘菜等
附子丸 治風濕相搏腰腳疼痛大有神效

卷之四十一

附子二兩炮裂去皮臍 乾木瓜二兩 威靈仙一兩
川烏頭炮去皮臍
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下避風寒忌
汗出當風勿乘酸冷毋食熱物及桐灰柴炭忌半夏令毒長毋白
芨之類凡病在上食後在下食前服之
木瓜丸 治風濕客搏手足腰膝不能舉動
木瓜 吳茱萸二兩
右以茱萸入木瓜內用線繫定蒸爛入青鹽半兩研勻丸如梧桐子大
每服四十丸空心茶酒任下或溫酒服之尤佳
治風濕手足腰腿疼痛等疾
用豬牙皂角不蛀者一斤剉碎為細末用多年米醋熬成膏子丸如
雞頭大七粒
蒼朮散 治風濕常服壯筋骨健步
蒼朮 [illegible]
用春五日夏三日秋七日冬十日取出蒼朮於淨地上掘一坑以炭

大棗紅去核待乾香木通酒浸焙于杭內為末以杭丸用鹽湯
金鹽用鹽紅一兩以水各半煮為細末每服二錢空心鹽湯或酒
調服令痛止為度明目

乳香宣痛丸　治遠年日近風寒濕氣攻注腰脚或痛或疼筋不能
屈伸脚不能踐地一切痛往來不已並宜服之

乳香　五靈脂　骨碎補　威靈仙　檳榔仁
白附子　甜瓜子　牛膝　當歸　乾木瓜
地龍　木鱉子　白牽牛

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸木瓜湯下鹽酒亦
可不拘時候服

上烏丸　治寒濕骨痛腰疼筋骨攣疼

川烏炮　木香　虎骨酥炙　牛膝　杜仲
木瓜　當歸酒浸　破故紙炒　白附子炮　黃芪蜜炙
白茯苓

右為細末用麵糊為丸如梧桐子大每服三四十丸酒下

麒麟竭散　治寒濕傳於經絡疼痛不可忍

血竭　南乳香　沒藥　白芍藥　當歸
水蛭　麝香　虎脛骨

右為末和勻每服三錢溫酒調下食前服痛立止甚者不過二服

愈痛丸　治寒風攢手脚疼痛不堪忍

生蒼朮　舶上茴香　破故紙
骨碎補　川山甲　生草烏

右除草烏一斤用生蔥一斤連皮生老薑一斤搗爛拌草烏一處
同蒼朮等藥作一處日乾或焙乾碾為細末酒煮麵糊為丸如
梧桐子大日一服每服五十丸酒或湯下病在上食後病在下
空心服如服此忌一時熱物

當歸散　治寒濕留經腰腿疼痛經脈逆滯不得通

防風　當歸　藁本
獨活　荊芥穗

頓刻散
右為麤末每用藥一兩生鹽四兩慢火炒令熱用絹袋
盛去痛處熨之

生附除濕湯　治寒濕交攻身體冷痛

生附子　蒼朮　白朮　杏仁　木瓜
甘草

右為末每服六錢重水四盞薑十五片煎取兩盞分作
二服　又名除濕湯

附子麻黃湯　治寒濕所中昏暈緩弱或腰背強急口
噤語澀心腹膨脹氣上喘不能動轉

附子炮　麻黃去節　白朮　乾薑　甘草炙
人參

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

麻黃白朮湯　治寒濕身體疼痛煩躁汗出惡寒發熱脈浮緩細

麻黃　桂心　甘草　杏仁　白朮

右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

芎朮除眩湯　治感寒濕頭目眩暈

官桂　甘草　川芎　附子　白朮

右㕮咀每服二錢薑七片水一盞半煎至八分去滓食前服

續斷丸　治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

續斷　萆薢　牛膝　杜仲
乾木瓜

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸溫酒下食前服

應痛丸　治寒濕氣骨頭疼痛不止

甜瓜子　乾木瓜　川烏頭　五靈脂

右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服三四十丸熟湯
下病在上食後服病在下食前服

補骨脂散　治寒濕氣腰腿脚疼腫

破故紙　黑牽牛

右為細末用煉蜜煎湯調下一錢用核桃酒下

當歸丸 治濕熱流遍四肢不通氣滯不散肩背強直
用當歸好者不以多少為末酒麵糊為丸如小豆大每服二十丸溫
水下不計時候日三服
白朮茯苓乾薑湯 治傷暑伏暑中風濕頭目昏眩心腹疼痛腰腳
面浮或痛或重或寒或熱不能食
白朮　乾薑炮　茯苓　細辛　桂心
乾葛　甘草炙　陳皮　烏梅去核　豆豉
右等分為細末每服二錢白湯點服不拘時
茯苓白朮湯 治暑濕加以著濕或汗未乾即浴皆成著濕宜
服此湯
茯苓去皮　乾薑炮　甘草炙　白朮　桂心去皮
右為剉每服四錢水一盞煎七分去滓食前服一方加蒼朮炒
續斷丸 治風濕流注四肢少寒濕從之痹滯關節不利而痛
川續斷　薏苡仁　牡丹皮　桂心　山芋
白茯苓　黃芪　山茱萸　石斛　麥門冬去心
乾地黃三兩　人參　防風　白朮　鹿角膠炒
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十丸溫酒下空心食前
小金丸
草烏頭　黑牽牛　蒼朮米泔浸　地龍　川山甲
殭蠶炒　白芷　蠶沙　滑石　虎骨炙
白膠香　破故紙　何首烏　川萆薢　乳香
沒藥　杞子各
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七丸至十五丸茶酒任下
神効
小金丹方
蒼朮一斤米泔浸去皮　草烏五兩不去皮尖　蔥白四兩
乳香四兩
已上共四味一處搗為餅焙乾後加
川烏半兩　何首烏半兩　白膠香半兩　地龍半兩
二蠶沙半兩　破故紙炒半兩　川山甲炒半兩　白芷半兩

右為細末用好米醋糊為丸如梧子大每服十丸加至十五丸茶酒
任下忌魚肉豬羊血豆粉
續斷丸 治風濕四肢浮腫肌肉麻痺手足無力筋脈緩急
川續斷　萆薢　當歸　附子　防風
天麻　乳香　沒藥　川芎
右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒或飲湯下空心食前
桂枝附子湯 治風濕相搏身體疼煩掣痛不可屈伸汗出短氣
小便不利惡風不欲去衣或身微腫
桂枝　白朮　附子　甘草
右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗子二枚煎至七分去滓空心
溫服或大便秘則去桂小便不利者加茯苓三兩痺加防己四兩
腹痛加芍藥四兩身腫汗出加防風一方加白朮
加芎朮湯 治濕流關節臂疼手重不可俯仰或自汗頭眩痰逆惡心
芎藭　白朮　橘紅　甘草
右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片煎至八分去滓溫服不拘時候
羌附湯 治風濕相搏身體疼痛不可屈伸或身微腫不仁
羌活　附子　白朮　甘草
右等分㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓溫服不
拘時候
治腳腫脛痛步行艱不隨
威靈仙　木瓜　吳白芷　甘草
右各等分用酒煎空心食前服
治風寒濕痹麻木不仁粥法
右川烏生為末用香熟白米作粥半碗藥末四錢同米用慢火熬熟
稀薄不要稠下薑汁一茶腳許蜜三大匙攪勻空心啜之溫為佳如
是中濕更入薏苡人末二錢增米作一中碗○此粥大治手足四
肢不隨痛不能舉者有此證循服防之左氏云風淫末疾謂四肢為
四末也脾主四肢風邪客于肝則淫脾為肝剋故疾在末穀氣引
風濕之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有力予每制此方以授
人服甚驗

治脚轉筋急伸脚拇脚緊豹向前痛即止

薏苡仁散 治濕傷脾腎不養肝自生風遂成風溼流注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛或入左指中

薏苡仁一兩 當歸 小川芎 乾薑
官桂 川烏 防風 茵芋 甘草
羌活 白朮 麻黃 獨活 人參

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

當歸拈痛湯 治[illegible]氣重濕身腫腰疼四肢[illegible]

蒼朮 白朮 甘草 乾薑 茯苓
橘皮 辣桂 厚朴

右剉每服三錢薑棗煎服

當歸拈痛湯 治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利遍身疼痛下注手足足脛腫痛不可忍

羌活 甘草 黃芩 茵陳 人參
苦參 升麻 葛根 蒼朮 當歸身
知母 防風 澤瀉 豬苓 白朮

右㕮咀每服一兩水二大盞先以水浸一時煎至一大盞去滓溫服空心食前待少時以美膳壓之[illegible]本草十劑云宣可去壅通可去滯[illegible]羌活透關節防風[illegible]苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮味甘溫和中除濕蒼朮體輕浮氣力雄壯能去皮膚腠理之濕故以為臣血壅而不流則為痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫補脾養正氣使苦藥不能傷胃[illegible]參黃芩苦寒[illegible]苦以泄之者也凡酒製炒以為因用治濕不利小便非其治也豬苓甘平澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以為佐氣味相合上下分消其濕使壅滯之氣得宣通也

蒼朮膏 治[illegible]者遇雨者極難[illegible]四肢不仁半身不遂骨節拘攣[illegible]口眼喎斜手足[illegible]濕[illegible]

附子炮去皮臍 茯苓 白朮 乾薑炮 澤瀉
桂心 各等分

右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

葶藶木香散 治濕熱內外餘熱水腫腹脹小便赤澀大便滑泄脾胃腫

葶藶 茯苓去皮 豬苓去皮 白朮各一 木香半錢
澤瀉 木通 甘草各半 辣桂 滑石二兩

右為末每服三錢白湯調下食前此藥下水濕消腫脹止瀉利小便[illegible]
是[illegible]

以[illegible]
一方無白术

不換金正氣散 治[illegible]

厚朴 藿香 甘草 半夏 蒼朮
陳皮 加木瓜

右各等分剉散每服三錢水一盞生薑三片棗子三枚煎至八分去滓食前[illegible]

白朮散 治五臟傷濕咳嗽痰涎憎寒發熱上氣喘急

白朮二兩 五味子 茯苓各一 甘草 半夏一兩

右剉散分作十帖服每服水一盞半生薑五片紅棗二枚煎至七分

左經丸 治筋骨諸疾手足不能行步運動

草烏 木鱉子去殼 白膠香 五靈脂
當歸 班猫一百個去翅足

右為細末用黑豆去皮生杵一斤醋煮糊為丸雞頭大每服一丸溫酒磨下此藥能[illegible]活經絡[illegible]三經[illegible]得小[illegible]大有奇驗但不曾[illegible]四五丸[illegible]

牽牛丸 治一切濕[illegible]

黑牽牛 黃芩 大黃 大戟 滑石

右為細末滴水為丸如梧子大每服五丸至七丸生薑湯下食[illegible]

後量虛實加減

五苓散 治傷風自熱小便少[illegible]

獨活散 治傷風[illegible]

羌活 [illegible] 人參 知母 [illegible] 防風 黃芩 [illegible]

麻黃 [illegible] 細辛 [illegible] 甘草 [illegible]

官桂 [illegible] 川芎 [illegible] 石膏 [illegible]

右㕮咀為末每服[illegible]錢水一盞生薑二片薄荷同煎至七分

去滓服[illegible]年高[illegible]

知母乾葛湯 治[illegible]

知母 乾葛 [illegible] 石膏 [illegible] 甘草 [illegible]

黃芩 木香 升麻 人參 防風

[illegible] 黃[illegible]

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓[illegible]

五[illegible]

五[illegible]

羌活 防己 白朮 [illegible]

當歸 白芍藥 甘草 [illegible]

右㕮咀[illegible]

除[illegible]一切[illegible]

氣[illegible]風[illegible]表實[illegible]

[illegible]小便[illegible]

白朮 白茯苓 蒼朮 當歸 [illegible]

橘紅 厚朴 半夏 附子 [illegible]

右[illegible]

[illegible]

經[illegible]

[illegible]

[illegible]

右[illegible]一[illegible]丸如[illegible]下二五

末[illegible]五十[illegible]心[illegible]下加[illegible]有

熱[illegible]之[illegible]不[illegible]之[illegible]

發此方[illegible]

而眼之[illegible]

薑[illegible]中[illegible]頭痛惡風

辰[illegible]

調胃[illegible]散[illegible]

羌活 [illegible] 白朮 [illegible] 茯苓 [illegible] 附子 [illegible] 甘草 [illegible]

右為細末每服一錢[illegible]至八[illegible]去[illegible]不拘時候

七味[illegible]白[illegible]大便[illegible]小便

或[illegible]

半夏 [illegible] 厚朴 [illegible] 蒼朮 [illegible] 藿香葉 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

赤茯苓 [illegible] 甘草 [illegible]

右[illegible]

[illegible]

八味[illegible]

羌活 獨活 人參 陳皮

白朮 木香 防風 [illegible]

生[illegible] 甘草 [illegible]

天台烏藥 [illegible]

右等分為細末[illegible]

[illegible]

[illegible]

羌活 [illegible] 白茯苓 [illegible] 木香 [illegible]

人參 [illegible] 白朮 [illegible] 南星 [illegible]

[illegible]

[illegible]

姙

右等分㕮咀以一盞[illegible]空心服

[illegible]

骨碎補[illegible]川芎[illegible]

草烏[illegible]牛膝[illegible]地龍[illegible]五靈脂

當歸　乳香　沒藥　川芎　萆薢炙

羌活　藁本　天麻[illegible]　威靈仙[illegible]

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸溫酒下病在上食後服

病在下食前[illegible]

二[illegible]

黑牽牛[illegible]破故紙[illegible]桃子[illegible]地龍[illegible]

白膠香[illegible]

右用不蛀皂角二十挺[illegible]入[illegible]肉[illegible]如梧桐子

大每服四十丸空心鹽湯下[illegible]老人虛人不宜服〇臨[illegible]

南山[illegible]說文[illegible]

年足不能[illegible]

五卷　二十八字　醫方類聚卷之二百二十一　[illegible]

是[illegible]依方製服同下[illegible]

[illegible]湯[illegible]治[illegible]

[illegible]

大附子[illegible]乾薑[illegible]甘草[illegible]

右爲㕮咀每服四錢加生薑五片水一大盞不計時煎服

附子酒[illegible]

附子[illegible]

右[illegible]

令酒[illegible]不[illegible]食後一[illegible]前如[illegible]更入生薑五片同

煎亦得

二生湯[illegible]治[illegible]

生附子[illegible]

右㕮咀每服四大錢水一盞半生薑十片慢火煎至八分去滓服戊

午年十月在新安有此疾服得子[illegible]此方[illegible]

薇銜湯[illegible]治[illegible]中[illegible]

薇銜[illegible]澤瀉[illegible]白朮[illegible]

右爲細末每服二錢匕米飲調下

[illegible]

二百十九字　醫方類聚卷之二百十二　[illegible]

[illegible]

右爲末酒[illegible]爲丸如[illegible]

[illegible]

[illegible]治風濕[illegible]

[illegible]

蒼朮 陳皮[illegible] [illegible] 厚朴

附子 乾薑[illegible] [illegible]

右為散每服[illegible]不計時候以溫[illegible]調下[illegible]十餘服

大方[illegible]

蒼朮 附子 厚朴 肉豆蔻

陳皮 細辛 桂 硇砂 甘草

丁香

右為散每服二錢生薑五片棗一枚同煎

薏苡仁散[illegible]治寒濕[illegible]難

宜服之

薏苡仁 [illegible] 天麻 附子

羌活 桂心 乳香二兩

右為細末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸煎防風湯下不

以時候

[illegible]丸[illegible]治寒濕筋骨冷痛不能舉動

川烏頭[illegible]生 鹽豉 [illegible] 乳香

沒藥

右為細末用[illegible]一兩[illegible]用麥醋[illegible]

醋一半[illegible]慢火熬成膏[illegible]水中不散[illegible]

如桐子大每服一十丸[illegible]

木附湯[illegible]

白朮四兩 [illegible] 附子

右為麁末每服五錢[illegible]

有足[illegible]

[illegible]

[illegible]

元參 [illegible] 防風五分

茯苓 [illegible] 當歸 [illegible] 白朮

內經曰[illegible]以苦發之以淡滲之[illegible]能勝濕羌

活獨活[illegible]苦[illegible]蒼朮防風苦

辛[illegible]甘草甘

甚益[illegible]茯苓甘平[illegible]小便導其濕[illegible]之者

心[illegible]上下分散其濕也

右㕮咀[illegible]一服[illegible]服食[illegible]服

忌酒[illegible]生冷[illegible]物不[illegible]

腎著湯[illegible]中濕小便自便○經云[illegible]不利小便[illegible]

中濕[illegible]身盡痛

人參 乾薑 白朮 甘草 茯苓

右㕮咀[illegible]水煎服

除風濕羌活湯[illegible]元氣

[illegible]不能[illegible]心煩[illegible]不止[illegible]小便

如常[illegible]

[illegible]

[illegible]一分或三分如[illegible]

[illegible]不[illegible]麻木不[illegible]

[illegible]當風臥[illegible]中[illegible]

[illegible]飲食之

羌活[illegible]

川芎 羌活 防風 肉桂

牡丹皮 當歸 檳榔 [illegible]

用[illegible]

普濟方卷之四十二 畢

普濟方卷之四十二目錄

積熱痼冷門 論三道 類二類 方二百十三方

總論

諸熱 論一道 方一百四十五方

紫雪 消痞丸 [illegible]丸 犀角丸 麝香上清丸
真珠散 防風散 碧雪 天門冬飲 涼膈散
七寶洗心散 天竺散 朴硝煎 治積熱方
治熱壅煩痛不進食 [illegible]氣香[illegible] 消毒麻仁丸 青解毒丸
犀參散 清心丸 玄明粉 又方 [illegible]
既濟清神散 麥門冬散 導赤丸 [illegible]丸
龍腦飲子 牛黃膏 加減大府丸 消毒犀角飲 [illegible]
龍腦丸 四順清涼飲 導赤散 人參丸
導赤丸 涼神散 石膏散 [illegible] 雄黃丸
梔子丸 加減辛[illegible]散 紅雪通中散 抱龍丸
牛黃涼膈丸 甘露丸 玉露散 甘露湯
治卒煩熱 解煩熱止渴[illegible]大湯[illegible]
調中下熱氣方 治胸中煩熱或渴心燥
治膈上煩熱多渴通利九竅 治胃熱[illegible]不和
治煩熱止渴[illegible]湯 人參除熱湯 茯苓丸 桔梗湯
竹葉散 利膈湯 黃芩[illegible]丸 神芎丸
通膈丸 牛黃[illegible]丸 治膈上熱方 人參散
[illegible]丸 青金丹 地骨皮 [illegible] 防風[illegible]
[illegible]湯 [illegible] 和中丸 人參湯 又方
[illegible]丸 [illegible] 木通散 [illegible]湯
木香金鈴散 [illegible]散 [illegible]丸 芎仲散

神芎丸 八金花丸 四生丸 [illegible]湯 黃連解毒湯
八正散 海仙丸 黃芩[illegible]牛黃散 黃連湯
治[illegible] 黃芩[illegible]湯
治骨蒸積熱 [illegible] 治[illegible]熱口乾小便少
治大人及小兒發熱 [illegible] [illegible]湯
枳實湯 門冬丸 千金地黃丸 [illegible]木通丸 五石湯
木香[illegible] 甘露飲 [illegible]湯 [illegible]丸 龍[illegible]膏
犀[illegible]湯 [illegible]散子 五味湯 [illegible]散 火[illegible]散
三黃丸 丁香丸 [illegible] 地[illegible] 黃芩湯
解毒散子 解毒雄黃丸 犀角黃連散 金真丸
治[illegible]氣湯 [illegible]膏 [illegible]膏 [illegible]黃連丸
治熱氣[illegible]咽[illegible] 治傷熱 治熱攻心煩躁恍惚
治壅熱[illegible]中[illegible] 解熱 治大熱心[illegible]
治中大熱狂亂心躁悶 治熱勝痛 去熱氣
[illegible]熱[illegible]上[illegible]痛 [illegible]熱心煩

治大熱[illegible]熱[illegible]
治一切熱毒[illegible]用之 治肝毒熱

痼冷 論一道 方六十七方

[illegible]散 艾硃丸 附子理中丸 [illegible]丸
[illegible]丸 [illegible]丸 附子[illegible]散 走馬茴香丸 [illegible]香丸
金[illegible]正元丹 [illegible]丸 益神丸 烏金丸
[illegible]膏 保元丹 痼冷丸 [illegible]烏頭丸 [illegible]丹
[illegible]湯 [illegible]丸 白术散 走馬寸金丸 二氣丹
[illegible] [illegible]丸 參[illegible]湯 [illegible]丸 大巴寒丸
玉[illegible]白丹 [illegible]散 大建中湯 [illegible]丹 玉[illegible]丸
[illegible]丸 [illegible]湯 [illegible]湯 溫胃散
[illegible]湯 生[illegible]湯 [illegible]丸 [illegible]冷病方
[illegible]丸 [illegible]丹 [illegible]丹 [illegible]丸
又方 [illegible]湯 又方 大[illegible] 接真湯

風黃丸　鎮安五智湯　生犀丹　草登荷丸
二建丹　牧狗丸　青城山蒲真人救乳丹　三陽丹
金璧煎　玉海嚮巴戟丸　金粟黃芽丹　小鍾乳丸
養正金丹　補益丸　茸附丸　丹入句小便多者
灼灸

普濟方卷之四十三目錄　畢

普濟方卷之四十三

積熱痼冷門

總論

一陰一陽之謂道，偏[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
則致病[illegible]
其寒甚至於內[illegible]不能[illegible]
化大腑[illegible]發熱此皆[illegible]之證也[illegible]
二便已[illegible]石以[illegible]其[illegible]不能制[illegible]
乾燥[illegible]目[illegible]小便[illegible]此皆陽偏勝而
為積熱之證也施治之法令[illegible]熱之[illegible]之痼者解之積者散之使
陰陽各得其平則二者無偏勝之患矣○常[illegible]大[illegible]熱以[illegible]
行之治寒以熱涼而行之治[illegible]以[illegible]而行之[illegible]熱而行之○
大治熱以寒溫而行之者有二皆因大熱在[illegible]上[illegible]
二味者皆甘溫[illegible]
句辨其此[illegible]大熱之至理一也[illegible]
甚者便大[illegible]
必然於內[illegible]能退[illegible]以[illegible]者在人[illegible]胃之主氣[illegible]三
也若然以[illegible]而行之者[illegible]大寒[illegible]
其足[illegible]
水浴之[illegible]時見[illegible]
[illegible]
人[illegible]之理一也[illegible]
[illegible]
[illegible]
中元[illegible]一也

黃帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁
也因而大飲食[illegible]不能飲食[illegible]不能自
化聖意說熱病使五臟[illegible]之傷於寒則
為病熱表[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
腹滿泄瀉[illegible]熱者[illegible]舌上[illegible]熱爭則喘
咳痛走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒胃熱者腹脹[illegible]

欬嗽身熱熱爭則項痛而強術寒足下熱不欲言經曰汗出躁
擾一死不能食[illegible]其病一死狂言失志者三死皆是汗熱[illegible]
危殆以致危殆[illegible]諸熱皆病暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭
譫妄[illegible]手足[illegible]之氣也夫腎[illegible]
狂湯積熱[illegible]以致風熱[illegible]
[illegible]口舌生瘡[illegible]不利[illegible]
偏身生瘡[illegible]
便澀[illegible]中外一切[illegible]
[illegible]
[illegible]
飢不欲食[illegible]中有[illegible]多[illegible]數小便[illegible]
熱毒過度[illegible]中則[illegible]
人患人[illegible]不得[illegible]皆[illegible]大熱
不可[illegible]人[illegible]若
[illegible]不能[illegible]

中有貴富人所市取謂之金石者非也此方在甲一有寒水石石膏可
也即不當金有金者貴富人所加也○有表而熱者謂之表熱無表而
熱者謂之裏熱有暴熱者病在心肺有積熱者病在腎肝暴熱者宜
方雄黃解毒丸積熱者局方妙香丸暴熱心肺上焦者謂之高喘木香
金鈴散主之上焦熱而煩者牛黃散主之腎肝下焦[illegible]牛黃散主之有上
焦熱而無他證者桔梗湯主之有[illegible]謂之五淋[illegible]
此熱傳脾[illegible]
熱能自[illegible]
脫[illegible]
在今熱[illegible]中而已[illegible]
易九方一[illegible]
湯[illegible]
之酒[illegible]
蒲[illegible]
搐咽喉大熱炎上宜以京[illegible]

方

紫雪 治[illegible]內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走[illegible]
瘴疫[illegible]五尸五疰心腹諸疾[illegible]解諸熱[illegible]
[illegible]

黃金一百兩 石膏 寒水石 磁石 滑石
[illegible] 犀角屑 羚羊角屑 青木香 沉香
元參 升麻 甘草 丁香
已上八味入前藥汁中再煎取[illegible]斗五升去滓入下項
朴消 消石
已上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有七升投
在木盆中半日欲凝入下項
硃砂 麝香
已上二味入前藥中攪調令勻寒之二日
右藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大人小兒臨時以
意加減食後服

瀉[illegible]丸 治[illegible]積壅熱毒甚者[illegible]面目黃心膈煩躁吐不能飲食
發熱驚[illegible]以運動關竅不利肢體[illegible]喘熱去臥不寧心火有餘而
妄行上焦[illegible]血衄血下爲大小便血[illegible]
瀉傳化失常小兒疳積熱
黃連 乾葛 青黛 [illegible] 黃芩
大黃 青黛 梔子 薄荷 [illegible]
厚朴 茴香 木香 沈桂
右爲細末清水丸如小豆大每服十丸新水下凉水亦得小兒丸如麻
子大[illegible]本是熱內[illegible]牽牛忌[illegible]熱燒物
龍腦丸 [illegible]中解熱[illegible]口[illegible]口甘[illegible]吐血衄
人血崩並皆治之
真蒲黃一兩 麥門冬二兩 阿膠 甘草 人參
川當歸 [illegible]蒲黃 生乾地黃 茯苓
龍腦薄荷
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後用熟水吞

下[illegible]或更有病下[illegible]小兒[illegible]
犀角丸 治[illegible]熱[illegible]膈有停滯
犀角 黃連 黃芩 [illegible]
大黃 [illegible] 木香 [illegible]
川芎 牽牛頭末
右爲細末滴水爲丸如梧子大每[illegible]
[illegible]
[illegible] 天竺黃 甘草
[illegible] 當[illegible] [illegible]
[illegible]
右研細[illegible]
一方[illegible]
[illegible]

珠砂[illegible] 甘草 川大黃
右[illegible]分爲末拌勻[illegible]以竹葉湯[illegible]調下不拘時候
防風散 治積熱上衝頭熱如火痛入項中
防風 [illegible] 薄荷 當歸
大黃 梔子 川芎 [illegible]
治[illegible]散每服四錢水一盞[illegible]燈心二十莖苦竹葉十片煎[illegible]食後服
方[illegible]甘草
碧雪 治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁[illegible]物[illegible]或喉
閉壅塞水漿不下入行[illegible]或[illegible]
芒硝 青黛 石膏 寒水石
[illegible]石 甘草 馬牙硝
右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令消
溶得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲細末每用
少許含化嚥津不拘時候如喉閉壅塞不能咽物者即用小竹筒吹
藥入喉中即愈頻用神效
[illegible]
天門冬散 治上焦壅熱咽喉腫痛[illegible]
天門冬 [illegible] 甘草 [illegible]
牛蒡子 [illegible]
腦子 [illegible]
右爲細末和勻每服[illegible]
下食後臨臥
[illegible]散 治大人小兒[illegible]熱[illegible]
[illegible]喉[illegible]
[illegible]
[illegible]
川大黃 [illegible] 薄荷葉
[illegible]
右[illegible]末每[illegible]三錢水一盞[illegible]七分去滓食後
温服小兒可[illegible]

生姜煎○鼻衄唾血者加蒲黄山茵陈生地黄各半两一料内加麻[illegible]
者加滑石四两茯苓一两頭昏悶不進藥下救也慶攙痛悶不可忍
者乃腸胃乾涸膻中氣不下故經所謂三焦者州都之官津液藏焉
氣化則能出矣故膻中者臣使之官名三焦相火下合右腎為氣之
○三焦曰膀胱者液之府氣化則出之以膀胱也為藏胞居膀得氣
海之氣旋化則為便注下氣海之氣不足則隔塞不通故不得便利
也先用木香沉香各三錢煎湯下於正散甚則為上焦之分氣通
達小便自通上所謂病在下上取之○下焦曰熱攻於上不利於下
氣盡於上則益平散之若以利之

七寶丸心散　治熱重不調鼻衄重渴口乾多易五心煩熱小便赤
澁大便秘澁及風熱壯熱口舌痛瘡背胸急悶頰熱氣上衝口舌
瘡生喉痛咽痛疾逆重蘊而煩悶為心神煩燥喉咽腫痛一名瀉心散
大黃煨　赤芍藥　甘草炙　當歸
荊芥穗各　白术半两
石細末每二錢水一盞姜二片薄荷三葉同煎七分溫服小兒量度
薔參散　茯苓先任語多渴更驚風可服一錢並臨卧服大人五臟
重實欲要瀉加至四五錢熱服

天乞丹　治療積熱煩燥多渴口舌生瘡咽喉腫痛
山梔子去殼　甘草　茯苓　黃芩
鬱金　天竺黃
右為末每服一錢食後臨卧新汲水調服一寸

朴硝　芒硝八两　寒水石四两　石膏　金
右先內二硝於八升湯中攪令消以絹濾去滓一宿
中別取寒水石石膏碾如末粒大以竹瓷器之內汁中以微火煎
其上有硬起以筋攪中看稍欲凝白急下瀉著盆中待凝取出
刻日撰乾研為細末一匕為一錢和冷水五合攪和
以三焦熱之日二夜一

心膈熱方
枳實　芍藥　大黃　芒硝各三两

右為末蜜丸如梧桐子大空心溫服一十丸加至四十丸日一服
治熱壅煩渴不能食
以術荷生薑汁三四合多則令人吐
治熱氣有食
以搖罷顆見為之美食之
瀉毒丸仁丸一　治諸積風熱上衝又積熱毒疾走注實滯不利頭
旋目運頭閉滿口乾舌燥咽喉痛中引飲大便秘結心神不清
円緊脈熱赤風痰壯熱驚悸咽乾心煩赤眼宜服
口乾舌燥咽喉痛中引飲大便秘澁及小便赤澀
下疰瘡瘤瘰癧並宜服之
杏仁去皮　大黃　梔子仁
右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸至五十丸夜臥溫湯吞下利不赤毒
服讀為効服時驗其所服之藥甚不損臟腑亦能搜風順氣解
毒治小兒驚熱以薄荷湯化下三五丸極効

青解毒散　治大人小兒五臟積熱毒氣上攻胸膈煩悶咽喉腫痛
赤眼痛腫頭面熱毒口乾燥煩渴生瘡精神恍惚心忪悶亂坐卧不
安及傷暑毒面赤多汗心燥煩渴飲食不下
寒水石　石膏　青黛
右細研如粉入青黛和勻米飲丸如雞頭大每服一丸
食後新汲水化下或細嚼生薑水下亦得如中諸毒並宜服之
小兒驚風潮熱痰涎壅塞心胸煩燥頰赤多渴睡臥不穩每服半丸
可服半粒更量歲數加減與之

抱龍散　治諸熱涎潮精神昏冒及驚悸
天南星　麝香　膽子
右同研勻每服三錢膽人參湯調下如人行一里地更飲人參湯
一盞投之須臾下惡物為度累用有効
清心丸一　治經絡中熱手膈心忪恍惚煩熱善忘夜不安
常服經絡而得之也
黃連一两　龍腦二錢
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一十丸臨卧麥門冬湯送下

玄明粉 治六腑熱疾、三焦壅熱、五臟秘結

用朴硝不拘多少，以水煎至百沸，於星月下露一夜，用紙結成青白塊子，用甘草、蘿蔔子，以長流水入內，放冷至曉取出，或汁煎，再放下。

再加青色，夏後取出，每兩各加，用瓷盒盛了，以去其毒，然後研為細末，每二兩入甘草生熟二錢，又不一處搗羅為細末，再用之。或一錢或二錢，以桃花煎湯，飯後調下。此藥本性寒，收過性溫。

忌諸般魚及毒物等。

又方 治壅熱上攻口瘡

用竹茹一兩，甘草一兩，以水二碗，煎至一小碗，入龍腦末二錢，再煎，候冷，漱口，空心食之，日三服。

方用四味黃連中，方用放冷服。

當歸龍薈丸 治腎水陰虛，風熱蘊積，時發驚悸，筋惕搐搦，神志不寧，榮衛壅滯，肌肉瞤動，胸膈痞塞，咽嗌不利，腸胃燥澀，小便淋閟，筋脈拘奇，肢體痿弱，暗風癇病，小兒急慢驚風，常服宣通氣血，調和陰陽，病無再作。

當歸焙 草龍膽 大梔子 黃連 黃蘗

黃芩各一兩 大黃 蘆薈 青黛各半兩 木香一分

麝香半錢別研

右為末，煉蜜和丸如小豆大，小兒如麻子大，生薑湯下，每服二十丸。

兼服防風通聖散。一方加牛半二兩。

觀音神散 治腎水衰，心火上炎下

桔梗 黃芩 川芎 當歸 茯苓 瓜蔞

皂角 山梔子 薄荷 甘草 知母各等分

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎七分，去滓，入竹瀝調服。

麥門冬散 治丈夫婦人蘊積邪熱，心胸煩悶，咽喉乾，口燥渴，飲水不止，或大小腸不利，口舌生瘡，並皆治之。

小草 黃連 升麻 犀角屑 甘草 大黃

梔子仁 黃芩 大青 麥門冬

右為細末，每服三錢，水一盞，煎至七分，食後溫服。

導赤丸 治心腎氣熱，膀胱有熱，小便不通，風熱相搏，淋澀不宜，或

腑積熱，通利水道，三焦氣滯，腹熱痛，陰間或心胸煩悶，赤心腸口乾，舌瘡，骨節痛，並常服，比觀內消，毒頸生瘡，經絡熱壅，肉蘊熱，五毒發瘡，宜治之。

赤茯苓 赤芍藥各等分 生乾地黃 木通

大黃 山梔子仁各一兩

右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，食後白湯下。

烏梅丸 生津止渴，消宿酒

梅肉 百藥煎一兩 乾葛 甘草 人參

香白芷 薄荷 乾豆各等分

右為細末，甘草膏丸如雞頭大，每一丸噙化。

龍腦飲子 治大人小兒蘊積邪熱，咽喉腫痛，口舌生瘡，心胸煩悶，咽乾多渴，睡臥不寧，及除痰熱，咳嗽中暑，煩躁，一切風壅，並宜服之。

縮砂仁 藿香葉 石膏 甘草

大梔子仁

右為末，每服一錢至二錢，用新水如蜜調下。

汗用藥二錢，水一盞，入竹葉七片，煎至七分，並食後服。

石膏

牛黃 犀角 硃砂 硼砂 甘草

牡丹皮

右為細末，煉蜜丸如雞頭子大，每服燈心湯化下。

加減大聖易方 治心經蘊熱，咽喉腫，小便赤澀

木通 黃連 黃芩 赤茯苓

生乾地黃

右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸至四十丸，食後溫水下。

治毒熱，大人小兒內蘊邪熱，咽膈不利，痰涎壅盛，眼赤臉腫，咽喉有核，舌生瘡，胸膈煩熱，痰嗽不已，出入不能快。

邊並皆治之，小兒驚熱亦治，及口舌生瘡，未滿月小兒亦可服，二丸服。

導滯毒方

防風(各五錢)　荊芥穗　甘草(炙)　山梔子(一錢二分)
右為末每服一錢水一盞煎至七分食後服如大便實加
大黃
牛黃瀉心散(一名火府丹)　治心經實熱狂語精神不爽
腦子　牛黃　朱砂(各一錢)
右同研極細每服二錢生蜜水調下
龍腦丸　治大人小兒一切積熱不散及陰虛痘疹
龍腦　硃砂　麝香　牛黃
右末甘草膏為丸梧桐子大每服一丸至七丸人參湯下無時候
四順清涼飲　治血脈壅實臟腑生熱頸項結核多兼煩悶
不寧四肢搐搦及因飲食不時寒溫失度血氣不理腸胃不調或當
連兩頰成伏熱不散欲作驚瘡又治瘡疹餘毒
疹餘毒一切壅滯並宜服
大黃　赤芍藥　當歸　甘草
右銼散每服二錢水一盞半煎食後臨卧溫服小兒量大小虛實加

[illegible]

減微溏利為度加荊芥穗尤妙
導赤散　治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳流下經小
便赤澀淋痛臍下滿痛
生乾地黃　木通　甘草(各等分)
右㕮咀每服一錢水一盞竹葉少許同煎至六分去滓溫服無時候
八解丸　治心肝二經蘊有邪熱口燥咽乾入夜煩躁
目赤精疼唇焦鼻衄小便赤澀瘡疥不通
生乾地黃　黃芩　木通　犀角屑　甘草
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸以熟水下食後去黃
芩犀角名導赤散治痛心煩
導滯丸　去肝經熱毒清利頭目消血痛壅
黑參　龍腦　甘草
右為細末煉蜜為丸每服一丸入參湯下
清神散　治消風壅化痰涎止頭痛目眩心悸面熱腦痛耳鳴鼻塞
聲重口眼瞤動精神昏憒咽嗌不利

石膏　薄荷葉　荊芥穗　甘草(炙)　羌活
防風　人參　藿香　細辛
右為末每服二錢沸湯點服或茶清調下亦得
石膏散　治血熱煩燥咳嗽喘急
七寶
粉草　朱砂　梔子
右為末每服二錢食後新汲水調下
團參太乙丹　治煩熱神昏驚悸不安虛煩不得眠小便
赤澀口舌生瘡頭目昏眩
人參　酸棗仁　山梔子仁(炒)
人參　甘草(炙)
腦子　辰砂　金箔
右為細末煉蜜為丸每兩作一十五丸金箔為衣每服一丸荊芥茶
嚼下食後臨卧

[illegible]

雞蘇丸　治虛熱上壅頭目不清面赤咽乾痰嗽煩渴
雞蘇葉　荊芥穗　防風　黃芪　生乾地黃
桔梗　甘草(炙)　川芎　甘菊花
腦子
右為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸麥門冬去心煎湯
嚼下一方小便赤澀加車前子一分食後服
補髓丸　治四肢熱疼
生乾地黃　乾漆
右為末煉蜜丸如麻子大每服二十丸空心溫酒米飲下
加減芎辛散　治風熱上壅頭目昏眩頭旋偏頭痛
以茶調散加辛夷本香各　兩為末茶清調下
紅綿通中散　治煩熱解兩毒
清熱除毒
又為
人參　竹葉

甘草二兩 木香八錢 絳礬 升麻 黃芩各三
巴豆二錢 菖蒲 桑白皮 木通 大青各半兩
甜葶藶 川朴消 硃砂 硇砂一錢 麝香細研
右除硇砂麝香外並細剉以水二升五合煎至九合去滓更以燒
過再以漉入前合攪和勻候下研入硇木通等候冷
硇砂麝香等合勻每服一錢
二錢許及水泥下更量大小虛實加減服之
承上件須云溫下空心服亦得每服一錢
去風丸空心服
牛黃丸 治小兒風熱痰實頭目昏眩驚悸心神不安
發熱壅及中暑頭痛
牛黃研 白石英 麝香 硃砂各一分
藿香葉 天南星 牛黃 阿膠炒
金箔
右為細末入研藥令勻煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸用
及水化破入少許食後一方有紫石英與竹葉以熱水化下

治小兒驚風壅熱痰實心悸神思恍惚不安口乾多渴
牛黃涼膈丸
生犀
牛黃 甘草 紫石英
龍腦 牙硝 寒水石 石膏
右為末煉蜜為丸每兩作三十丸每服一丸
治小兒膈熱並治涼薄荷水化下
甘露丸 治大人小兒風壅痰熱心膈煩躁夜臥不安
赤鼻咽口喉咽乾熱中暑昏悶
牙硝 寒水石 甘草
右為細末用生姜自然汁和丸每服半丸
水化下小兒一丸
三聖散 治心肺上壅熱煩躁口乾生瘡小便赤澀並宜服之

寒水石
右等分研極細如粉入硃砂水飛過每服一錢
令後服
甘豆湯 治諸熱煩渴大小便澀
黑豆 甘草
右入生姜七片井水煎服
治卒煩熱
用白鴨屎和水作汁飲之
解煩熱止又大腸壅熱
用東來溫水冷服亦得和水服之
治中下熱氣方
以泉水多飲之又服
治胸中煩熱或渴心煩
用青粉四兩先以水炙熏蒸于經布袋盛
治膈上煩熱多渴通利丸
用滑石二兩搗碎以水三大盞煎取二盞去滓下粳米合煮粥食之
治骨熱四肢不和
用雞子白勻之
治煩熱止渴
用栗米飯食之
大黃除熱湯 治骨熱
大黃 黃芩 梔子 芒硝 甘草
右為散每服五錢水一盞半入生姜一錢煎至一盞
茯苓 煩熱四肢不和候風寒如癥瘕食湯不調者當服
其四肢瘦虛不能食
人參 黃芪
右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食後

桔梗湯 治四肢熱痺
桔梗二兩 人參 麥門冬 甘草各五 小麥一兩
右㕮咀水二升煎至一升去滓分三服不拘時候服
如聖散 治大腸實熱心神煩燥口內生瘡
粉草 青黛 黃芩 山梔子仁 紫蘇葉
黑參 木通 杏仁 赤芍藥
朴硝 甘草 大黃
右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓入生地黃汁一合再煎三沸
一兩沸溫服不拘時候
利膈湯 治上焦壅熱以致乾麻咽喉心煩身倦口咽生瘡疹
痛但是一切上壅之證皆可服之
防風 薄荷葉 桔梗 牛蒡子 荊芥穗各一
川芎 人參 甘草各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候
黃膏青子散丸 治陰虛經勞熱肺熱咳唾心熱驚悸脾胃熱口甘
吐血肝膽熱血出口苦胃熱神志不足上而有毒腎熱肩背疼而血滯
五淋血痢等疾
人參 芍藥 黃芩各一 白芷
知母各半 甘草炒一兩 鱉甲
右為細末黃膏青子丸桐子大每服二五十丸至百丸食後食前茶清下
黃膏半斤及二斗熬一斗去渣再熬令不住攪勻至半斤入白
蜜一兩熬一兩再熬令極勻熬待膏十兩收令丸藥
梔芎丸 治痰熱氣腫氣不舒而成痛
大黃二兩 黃芩二兩 滑石四兩 黑牽牛四兩 薄荷半兩
川芎半兩
右為末蜜丸每服十丸食後多服令氣血和者
通導丸 治上焦虛熱咽喉腫痛等疾如神方上
黃連 茯苓 人參各二 硃砂一分 真龍子仁
右細末和勻煉蜜丸如梧子大每服下二五丸日二三服
黃連毒散 治壅熱內攻喉嗌腫痛口多涎痰咽喉不利

與當歸順氣散子為表裏
大黃 芒硝 黃連各半 黃藥 黑牽牛頭末各 再子
右為細末水丸如桐子大每服百丸食前溫熱水下
先是腹生瘡腫當遍身久而不已用事水下二十丸
治膈熱方
苦參 玄參 麥門冬 皂莢子二兩
右為末煉蜜丸如桐子大一服十五丸日三服
大黃散 治上焦虛煩熱不寧
梔子仁 大黃 鬱金各 甘草
右為末每服二四分水煎食後服利乳已
滋腎丸 治下焦小便閉而熱在血分也
黃柏 知母 肉桂
右上二味為末煉以開胃氣故經曰無陽則陰無以化
故曰寒因熱用所謂病在下焦皆不渴也熱水為丸百丸下
青金丹 清心解熱降痰治語言生白胎疼痛
特行熱極生風大人小兒均可服并特行熱疫痧熱如火連日不愈者
天門冬 麥門冬各一 天麻二分 牙硝二分
天竺黃二分 朱砂一分 牛黃一分 白附子二分 紫粉
片腦子半分 生麝香半分 金銀箔各十 水粉一兩
右另研腦麝辰砂水粉金銀箔研和藥末入白麪二兩水丸以薄荷
為衣如菉豆大每丸用蜜冬生地黃汁心薄荷湯磨化服食時
加甘草人參尤妙
地黃煎 治熱
地黃汁四合 茯神 知母 萎蕤各四 栝蔞根五兩
竹瀝 生姜汁 生地骨皮 麥門冬各一
白蜜 石膏八兩
右㕮咀以水一斗二升先煮諸藥取汁二升去滓下竹瀝地黃麥門
冬汁微火煎四五沸下蜜姜汁微火煎取六升初服四合日三夜一
加至五六七合四月五月作散服之
半夏湯 治胸中客熱心中煩滿氣上大小便難

半夏一片 生姜一兩 前胡四兩 茯苓 白朮各五
甘草一兩 黃芩 人參各二 杏仁 枳實各二
右㕮咀以水九升煮取三升分三服胸中大熱者冷服之大小便
澀加大黃二兩一方用梔子二兩爲十一味
防風當歸散子 如傷寒熱盛煩躁病生心腹地黃丸食後服
柴胡 人參 黃芩 滑石三兩
大黃 當歸 芍藥各一 甘草
右爲粗末生姜同煎溫服如痰實者加半夏一方無防風
解表新秦升麻湯 右爲身壯熱者倍加麻黃
升麻一分 柴胡二分 當歸二分 羌活 蒼朮各一分
防風一分 甘草七分 藁本五分 橘皮三分 加麻黃
右㕮咀作一服水煎去滓服取汗後以葱白湯發之
和中丸 治口燥舌乾咽嗌不利胸膈痞滿心腹痛小便赤大
便結滯風氣攻身頭目昏眩腳膝拘急肢體疼倦一切風壅
美食消痰止逆
牽牛 滑石各二 官桂 木香各一 大黃
紅花 黃芩 茴香各半
右末滴水丸如小豆大每服二十丸用生姜湯下臨卧服
大黃散 治大人小兒五臟積熱煩躁多渴唇裂喉閉目赤鼻衄頷頰
結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譫語大小便秘一切風熱並皆治之
川大黃一兩 山梔子仁 厚朴 甘草各二兩 連翹一兩 薄荷一兩
甘草一兩 乾葛二兩 赤芍藥一兩
右爲剉散每服二錢水一盞入竹葉七片煎三七沸至七分去滓
食後服唯陽明證傷寒空心下
又方
白朮 荊芥 赤芍藥各一 大黃 車前子炒
芒硝 木通 甘草 川芎 當歸
右爲細末大便秘結者用溫水調一錢空心服上焦有熱咽喉生瘡毒風痰壅
熱用水二盞二大錢煎更看如滴淨洗煎湯調
下五心煩熱五巷一二錢服

京藥子丸 治五臟伏熱痰壅煩躁口舌生瘡大便秘小便赤澀
連翹 牙硝 甘草生 大黃一兩 石膏半兩
薄荷葉 梔子
右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一二丸水化下食後日進二服
瀉心臟五臟熱毒暴
淡竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分二服
木通散 治諸熱利小便
生乾地黃 木通 荊芥 地骨皮 桑白皮炒
甘草炙 赤茯苓各分
右剉每服三錢姜三片同煎服
竹茹湯 治心虛煩悶頭熱不解
竹葉 麥門冬去心 人參 茯苓 小麥炒
半夏泡洗
右㕮咀每服四錢用水一盞半姜五片煎至七分去滓不以時候溫服
木香金鈴散 治暴熱心肺上喘不已
大黃半兩 金鈴子三分 木香三分 輕粉入許 朴硝二分
右爲末桑白皮湯調下食後服三分或四分以利爲度喘止則已
牛角散 治五臟積熱
黃連 大黃 芍藥
右爲粗末每服五分水一盞煎至七分去滓溫服無時
細丸 治客熱積聚不散利方
人黃 草薢 杏仁 巴豆
右五味爲末蜜丸如梧子大每日服一丸以利爲度
香仲散 解一切諸熱毒及中食毒酒毒藥毒並皆解之
黃連 管仲 甘草炙 駱駝蓬五分
右爲細末每服三分冷水調下
神芎散 治一切熱壅
風熱壅滯頭目昏眩或痛
[illegible]
[illegible]

治[illegible]毒[illegible]由外一切有伤狂乱心志不宁口苦烦乱
饮食无度或生冷所伤诸气虚痹昏倦头疼痰发霍乱心胃服之
或脾胃阴虚风热痰壅人之[illegible]多痰[illegible]烦渴[illegible]
食毒腹满胃中毒气不受吐[illegible]多饮[illegible]
大黄　黄芩　[illegible]　黄连　[illegible]
右[illegible]为末[illegible]丸[illegible]水下十丸至十五丸每服加二丸
[illegible]
一切[illegible]
[illegible]为度如常服此药[illegible]
虚损骨蒸病人[illegible]便[illegible]以
肾虚其三焦[illegible]去[illegible]二十丸[illegible]但有益
且为损其妇人血下恶物[illegible]两旁复青常服病重者亦服
利阴而结聚腑胃通血物自下也此方[illegible]骨者或重者服是
若寡妇人经病后复血不止者[illegible]则不宜服此外一切风热积
病[illegible]不和或[illegible]人保养常服自显其功若以[illegible]其药

味则非明本草造化之理者不可得而知其[illegible]也昔孔子谓易道明显
难化万人之善而不见其大善之用功故曰显诸仁藏诸用只名[illegible]消
凡一法加黄连川芎[illegible]等各半两白[illegible]粘者愈
火金花丸　治中外诸热寝汗咬牙睡语惊悸溺血淋闭[illegible]衄血
瘦弱头痛并骨蒸肺痿喘嗽大便黄米数[illegible]去大黄加[illegible]多热
子金花丸又名既济解毒丸
黄连　栀子　黄芩　大黄[illegible]
右为末水丸如小豆大每服三二十丸新汲水下自利去大黄加[illegible]
半两小儿丸如麻子大三五丸
四生丸　[illegible]
大黄　[illegible]　[illegible]
右为末[illegible]丸[illegible]服二十丸以汤下自十九服至三十
丸食後服之
[illegible]　[illegible]
大黄八[illegible]　甘草[illegible]

右以咀每服一两水一大碗入生姜五片枣十枚煎半碗热服此汤
有余阴不足大黄芒硝去胃中实热当归补血益阴甘草缓中加生姜
枣引入此剂至胃中也经所谓微者逆之甚者从之此之谓也[illegible]
大剂为变换从顺[illegible]等[illegible]吐其之余後泄去上心胸
守胜[illegible]以意[illegible]治之
黄连解毒汤　[illegible]
热在中身热狂而[illegible]不安[illegible]
黄连　黄柏　黄芩　大[illegible]
右剉为麻豆大每服五钱水二盏煎至八分去滓[illegible]服如腹满呕吐
作利者加半夏茯苓厚朴各三钱生姜[illegible]片如白脓下利微重者加
大黄三钱毒盛加防风连翘荆芥金花也各风热加柴胡白小儿惊热
与四物相合为各半汤名妇人病热
八正散　治大人小儿心经邪热一切蕴毒咽干口燥大渴引饮心
忪面热烦燥不宁目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生疮咽喉肿痛又治小便
赤涩癃闭不通及热淋血淋

车前子　瞿麦　萹蓄　白滑石　甘草
山栀子仁　木通　大黄[illegible]
右剉散每服三钱水一盏半用灯心十茎煎食後临卧温服小儿量
力少与之或加麦门冬去心尤妙[illegible]
灵仙丸　治诸风热头目不清神志昏愦[illegible]大暴以[illegible]水之精专
於船板木中钟气风日久则日久变为青色以取太阳之气水见太阳
之气而变阳中有阴阳之气结而不散聚而成青黛之分专阳去和气
凋残腹坠八风皆以度物之气味所用且如果树上土取之以种水
调化取清水服之治腑脏不调肠胃受损土脾受湿为取以太阳其
火其土儿入於脾脏太阳真火之气以济其真气而吐泻得止又以鱼
骨入喉中内刺不去[illegible]细咽所以[illegible]服其白骨即受下又可[illegible]
疮不愈者令人烧成炭[illegible]烧灰乾傅疮上立已此圣人因其物增损
以故也且红积青黛上用意
[illegible]极膏　[illegible]
右[illegible]细末[illegible]丸每服[illegible]十丸[illegible]

黃耆當歸湯 治熱上攻頭目，小身疼痛，舉動則汗出，紅為引飲
晝夜不息，其脉洪大而虛，重按全無
實又云二症發熱，證象白虎，惟脉不長實為辨也，誤服白虎湯必死
此病得之於飢困勞役
當歸身二錢 黃耆一兩
右作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，溫服，食前
牛黃散 治一切丹毒及熱毒，心悶口乾，煩渴壯熱，[illegible]
牡丹皮不拘
川大黃 [illegible]
右為細末，每服二錢，[illegible]子湯調下，以利為度，服之
黃連湯 治一切熱毒及血熱，[illegible]
用黃連去鬚，剉碎，以井水浸良久，再碗蓋之，置鐵銚內，待湯沸取出
汁服甚妙
治五臟或氣厥發者，治脾胃熱，或大為熱，如瘧疾甚者
用雞蛋以煮令熱，和醬醋食之

[illegible]

治骨節熱積漸黃瘦
用大黃四分，以童子小便五大合，煎取四合，去滓，空腹分作兩服，如
人行四五里服
治熱結滯，經年數發
用胡黃連半兩，五月五日採，陰乾，水七升，煮取一升半，去滓，分服，太差
更服春夏葉，秋冬根莖，並用亦可，預備之
治發熱口乾小便少
用萎蕤五兩，煮汁飲之
治大人及小兒發熱
可取雞卵三顆，白蜜一合，相和服之，立差
除熱[illegible]
用絲瓜焙作末，研和以蜜服，亦治熱毒病及血痢
解熱
以桑葉研汁作粥食之
竹葉湯 治五心熱，手足煩疼，口乾唇燥，胸中熱 茯苓
竹葉 小麥 知母 石膏 栝蔞根
黃芩 麥門冬 人參 生姜
甘草 [illegible]

右以水一斗三升，煮竹葉、小麥取八升，去滓，內藥，煮取三升，分三服，老小分五服
枳實湯 治熱氣，手足心煩熱如火 白芍藥 [illegible]
竹葉 枳實 青箱子 生姜
黃芩 栝蔞根 麥門冬 [illegible]
半夏
右以水一斗，入竹葉，煮取二升，分三服
門冬丸 治心經有熱
麥門冬 川黃連
右為末，煉蜜丸如梧子大，食後熟水下二三十丸
千金地黃丸 治心熱
川黃連 生地黃
右細末，煉蜜丸如梧子大，每服三十丸，食後[illegible]
黃連木通丸 治心經蘊熱，夏至則甚
黃連二兩 木通一兩
右為末，生姜汁糊丸，每服三十丸，食後燈心湯下，日三服

[illegible]

五石湯 治胃熱，熱病後不除，煩悶口中乾渴
寒水石 消石 赤石脂 龍骨 栝蔞根
牡蠣 甘草 黃芩 知母 桂心
石膏 大黃
右以水七升，煮取三升，分四服，日三夜一
承氣湯 治熱氣，能瀉胃中熱在胃，不欲飲食
前胡 枳實 桂心 大黃 寒水石
知母 甘草 消石 栝蔞根 石膏
右以水一斗，煮取三升，分三服
甘露飲 治丈夫婦人小兒胃中客熱，牙宣口氣，齒齦腫爛，時出膿
血，目瞼垂重，常欲合閉，或即飢煩，不欲飲食，及目赤腫痛，不任涼藥，口
舌生瘡，咽喉腫痛，瘡疹已發未發，並可服之。又療脾胃受濕，瘀熱在裏，
或醉飽房勞，濕熱相搏，致生疸病，身面皆黃，肢體微腫，胸滿氣短，大便
不調，小便黃澀，或時身熱，並皆治之
枇杷葉 乾熟地黃 天門冬 枳殼 山茵陳

生乾地黃　麥門冬　石膏　甘草　黃芩
右等分為末每服　分水一盞煎至七分去滓温服食後臨卧　小兒
一錢分兩服仍量虛實加減　[illegible]　一方有犀角
麥門冬
竹葉湯　治胃熱而嘔吐效知胃熱手足心皆熱者是
半夏　[illegible]　甘草
右剉散每三錢青竹葉一握生姜　[illegible]
雞蘇丸　除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱欬嗽[illegible]
吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸上膈邪熱
又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦常服聰耳明目開心益
智
雞蘇　[illegible]　麥門冬　[illegible]
黃耆　[illegible]　阿膠　[illegible]　人參　[illegible]　木通　[illegible]
生乾地黃　[illegible]　蒲黃　[illegible]　甘草　[illegible]
右除別研藥外並為細末蜜　[illegible]　三斤先煉一二沸然後下
生乾地黃末不住手攪時時入蜜下　[illegible]　柴胡汁浸[illegible]
合其熱候將其餘藥末同和為丸如豌豆大每服二十丸嚼破熟水
下不嚼亦得虛勞煩熱者[illegible]人參湯下欬血[illegible]吐血
以麥門冬湯去心煎湯下並食後臨卧服之唾血崩下血諸淋疾
皆空心食前服治[illegible]用車前子湯下一方虛勞煩熱者[illegible]下肺熱
黃芩湯下[illegible]生甘草[illegible]肝熱防風湯下腎熱黃柏湯
下瘀熱生姜湯下[illegible]中暑[illegible]滑石末一分調下[illegible]湯下宜[illegible]
虛勞煩熱[illegible]一方有黃連
藕汁膏　治[illegible]五心煩熱
[illegible]　生地黃汁　[illegible]　生姜汁　[illegible]
右[illegible]
犀角湯　治[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

右為細末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服
涼膈散子　瀉心經客熱小便不通[illegible]
甘草　炙　[illegible]　麥門冬　[illegible]　赤茯苓　去皮　[illegible]
灯心　木通　人參　[illegible]
右㕮咀每服五錢水一盞半入[illegible]煎至一盞去滓温服[illegible]
是細嚼之食後
五味湯　治[illegible]熱發
柴胡　[illegible]　黃芩　[illegible]　茯苓　[illegible]　半夏　[illegible]
右每服五錢水二盞生姜[illegible]煎至[illegible]盞去滓温服
金[illegible]散　治心[illegible]
[illegible]　甘草　[illegible]　朴硝　[illegible]　甜硝　[illegible]
白[illegible]　生[illegible]
右為末[illegible]每服半分薄荷水下　小兒
驚熱宜服之
水解散　右一切熱疾頭痛心煩
肉桂　[illegible]　麻黃　[illegible]　芍藥　[illegible]　黃芩　[illegible]　甘草　[illegible]
大黃　[illegible]
右為散每服二分以井花水調下[illegible]出汗[illegible]再服[illegible]
過三[illegible]
三黃丸　治三焦積熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱上衝口苦
唇焦咽燥[illegible]大便秘[illegible]下鮮血
大黃　[illegible]　黃連　[illegible]　黃芩　[illegible]
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸不拘時熟水下[illegible]
如丸數以利為度一名三黃湯[illegible]
一[illegible]丸　[illegible]
丁香　[illegible]　巴豆　[illegible]　[illegible]
烏梅　[illegible]
右除巴外並為細末仍入巴豆研勻[illegible]
[illegible]大小[illegible]
丹參[illegible]　治大小心經熱涼熱方

丹參　當歸　芒硝　戎鹽　大黃各一

右㕮咀以苦酒半升浸四種一宿以成煉豬肪一斤煎三上三下去

滓乃內芒硝攪令成以摩之冬夏可用一方但用丹參當歸亦佳

地黃丸　治心熱大便不順夜臥不寧退熱安神養血熱者宜

服此藥

生地黃　人參　白茯苓　當歸　甘草各一分

右為細末煉蜜和丸如彈子大臨臥薄荷湯下一丸常服

養榮散用人參湯下

貫眾湯　治大熱有瘡宜服此

川芎　地黃　桂心　黃芩　荊芥　赤芍　防風各等

羌活　甘草各一

右為細末每服二分蔥白湯調下荊芥湯亦可

除熱飲子　治心驚客熱小便不通口燥煩渴

甘草　陳小麥　麥門冬　赤茯苓　赤芍藥

燈草　人參等分

右挫為散飲子每服五分水一盞半苦竹葉數片煎至八分去滓溫服

如前為細細呷之食後

解毒雄黃丸　取功下熱

雄黃研細　川鬱金　巴豆去皮細

右為末醋煮麵糊圓如麻子大每服五丸加至七丸熱茶清一盞下

如喉閉以熱茶清調下

犀角貫眾散　治血和經下利男子婦人上壅餘熱下部虛寒或

遍身生瘡久不愈者

犀角一分　當歸半兩　大黃一兩　芒硝二兩　甘草二兩

右為細末每服七錢毒水煎溫服

金真丸　治五臟積熱走注腸胃滯風毒攻注手足浮腫或

頑痺不仁疾遲不利大小便閉膈疼痛腹脹飲食或以因遺

丸如湯並宜服之

[illegible]　大黃 [illegible]

右以羌活二兩輕炒去皮子大黃入麝香一字切作片

子同炒一處炒至黃焦存性並為末上件藥末乾湯得

所先丸每服一二十丸至五十丸溫飲下不拘時候食前定

閒宜服名行血也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

致先師之意[illegible]

之三陽從手表[illegible]

行須散於肌表[illegible]

從下熱傷元氣[illegible]

以火盛則乘[illegible]

散之然非不可[illegible]

大病之後熱傷經絡而為此病明矣內經云熱淫所勝治以苦寒佐以

苦甘瀉之以酸收之當以黃蘗知母之苦寒為君以瀉大熱

腎欲堅急食苦以堅之黃芪生甘草之甘寒瀉熱實表五味子酸止汗

補肺氣之不足以為臣炙甘草當歸之甘辛和血潤燥升麻柴胡之苦

平行少陽陽明二經自地升天以苦寒之者也以為佐以咽司罪者

少陰之更[illegible]以瀉少陽之本[illegible]十二經[illegible]不[illegible]

遂名其方

清神補氣湯

蒼朮四分　黃芩三分　升麻六分　柴胡六分　五味子十分

黃蘗二分　知母二分　陳皮一分　黃芪三分　生甘草二分

當歸一分

右剉如麻豆大每服五錢水五盞煎至一盞去滓空心熱服大小便

飢時服之待少時以美膳壓之

春雪膏　治涼心經[illegible]

寒水石　石膏　滑石　代赭石　牙硝各五

甘草三錢

右為末每服二錢井水調下

朱砂膏　治膈熱悶亂不省人事

朱砂　硼砂　辰砂各半　金銀箔各二十五片

腦子一　粉草一分　石膏二分

右為末每服二分麥門冬二十粒煎湯下

四味黃連丸　治膈熱并酒毒厚腸胃

黃連

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十丸食前溫水吞下

治暑氣寒熱嘔吐　以黃芩煮汁飲之

治傷熱　以麻黃把去節以美酒五升煮取半升去滓頓服表汗出

則愈冬月用酒春月以水煮之良

治熱攻心煩悶恍惚　以牛黃研細一合分為三服良

治虛熱盜汗如中暑煩悶　以白蓮米炊飯食之

解熱　以乾荷葉作飲代茶

治大熱心悶者　用龍子皮末酒服方寸匕

治中大熱狂走心躁悶　以搗實作湯吞之

治熱腹痛　用栗末和水煮服之

去熱氣　以天麻子作飲服之

療熱壅涼膈上風痰積滯

蜀升麻青皮末每一大匙用蜜冬用十二兩春夏秋用十一兩先將藥

於晴處末復以白蜜和令勻便入新竹筒內小大看一筒蜜多少

半筒已上即止不得令滿却入沐甑中令有蒸氣安頓內其筒

上不得動蒸...取出... 入一兕蜂中以竹葉蓋勿

停手令至凝即暴瓶...入合中如熱月即於冷水中浸錄...勿

食後或飲臥時含一匙中嚥漸漸明之如要通轉亦得

治大熱發頭熱目合咽喉腫閉

取黑鼠三五百隻碎傳之

治一切熱毒痰

用大木耳炙黃者為末研細以一錢米湯調

治寒熱上心咽　用鼻食之忌冷不可多食

調服一錢匕服食無忌

治一切熱毒暑月用之

用龍枝和甘草煎汁如甜湯可食堪者嘗之甘美既置井中令冷徹

如冰白熟者及深暑中堪飲冷者之

治肝毒熱

用天明子作羹食之

○　痛令

論

夫方以胃春無物不為若夫胃春無所不容人之以世飲食為上過甚

之性其口腹下充胃以緣所以關中停寒不為之沉疳之於子

精汎冬手滯胃氣冷氣乏血虛旺吐逆心入迎暴下皆其諸耳廉

治之者雖胃乎是補不胃滋以性於安五臟虛中作以益胃為念

抑古人所謂補不足者補之以本脾之為言宜壽夫無剛剛燥宜

欲陽氣調同吾思胃氣為用心丈獨於藏胃未得其性

方

凡香草參茄丸　治右下經不足內伏積冷痞脹滿急痛引腰背面色

痿黃手足厥冷臍腹虛滿精神困倦飲食不能自利小便頻數大能補益四

十已上者宜服之

附子炮去皮臍　沉香

茴香炒　補骨脂炒　巴戟去心　木香

川芎　蓽澄茄　肉桂去粗皮　川楝子

右同為細末每服二錢水一大盞入鹽少許煎八分去滓稍熱服

之如胃腸一切虛冷痛服之有功空心食前服

艾姜丸　治...除去寒氣正作眞元氣虛冷...胸膈痞脹腰痛及傷冷

腹痛霍亂泄利自汗氣上下不足及小便頻數婦人衝任不足月水

經閉頭暈兩腹脹痛下全不思飲食或傷冷證手足厥冷脈微

右件

熟艾

附子炮

上為細末...二十九...大...空心食前

附子理中丸 治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷微
汗手足厥冷心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進及一切沉寒
痼冷並皆治之
附子炮去皮臍 人參去蘆 乾姜炮 甘草炙 白朮各二兩
右為細末煉蜜和丸每兩作一十丸每服一丸以水一盞化破煎
至七分稍熱服之空心食前服 小兒分作三二服大小以意加
減
紫沉煎丸 出聖惠方 治胃虛嘔吐積冷氣心腹疼痛脅肋疼痛
巴豆霜 硇砂 使之 硃砂 青皮 胡椒
硇砂 當歸 人參
丁香 阿魏 良薑 檳榔
官桂 乾姜 良姜 木香
硃砂研細 沉香
右為末用硇砂二味研勻入好醋於鍋內熬二千下如糊搓
丸如大麻子大每服二十丸溫生薑湯下如茶末心痛醋湯下立見功效
此丹丸 元氣弱又積冷食心腹脹痛刺痛 青香 肌
膚羸弱 不思飲食 多嘔吐泄瀉 心腹中痛 大便不利
胸膈痞悶 食後下 嘔吐 四肢 腳氣 疝氣
此食久痛久刺並皆治之
硇砂仁 胡椒 肉桂 木香 附子
川芎 當歸 陳皮 白朮 甘草
青鹽 白朮 乾薑 巴豆
阿魏
右為末用銀石器內入好醋五升白沙蜜一十兩先下硇砂阿魏
煎三五沸再下銀石器一升同煎攪勻便下藥末中打勻更入白麵
糊為丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯下
生硇砂
含臍及水臍氣上衝攻心腹冷痛不可忍氣 結者及陰陽
氣上下不升降飲食不進面黃羸瘦頭眩手腫五種水氣腳氣上攻又
手腳腫痛宜常服 若欲養者黃白脾虛一痛令手不止或卒暴中風
失翻上膈言語蹇澀神昏亂氣中痰壅狀似癱瘓曾用風藥吊吐不
出者宜用此藥百粒煎薑棗湯化之服下風涎即時自出消風逐自利或
觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷唇口青黑及男子腎虛傷冷腳膝酸軟
行步之力 難 虛瀉大便久滑及婦人血海久冷白帶自下歲久無子
血氣攻心頭面四肢並宜服之 面黃瘦損肌膚 少食嘔吐諸藥不愈
常服 化飲食養精神生暢元陽 溫臟 破癖 不動真氣使五
臟安和 調暢百病不侵 敬曰陰陽 衰 可傳 庶 衛 亦難
氣血 重 生 試服 陽起 又 日夫妻 會 肉 子 沉香
一兩 木 菟 陽起 破 桂
重事可
沉香 附子 葫蘆巴 陽起石 肉桂
茴香 破故紙 肉豆蔻 金鈴子 木香
黑錫 硫黃 沉香
右同黑錫或新鍋內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令
極細餘藥並杵羅為末都一處和勻入研自朝至暮以黑光色為度
酒糊丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服三四十粒空心
薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下
附子茴香散 出醫方大全 治氣虛積冷心腹絞痛
肉豆蔻 茴香炒 木香 白朮炒 人參
白茯苓 乾薑炮 附子 丁香
草薢蠍
古咀 每服三錢水一盞半煎七分空心服
茱萸茴香丸 治丈夫積年腸胃虛冷臍腹疼痛
黑附子 桂 葫蘆巴 川楝子 青橘皮
胡蘆 茴香 續子 乾薑 巴戟 破故紙
一 右為末 為丸如梧桐子大每服空心鹽湯下二十丸
安息香丸 治 得元陽
安息香 天麻 硫黃 陽起石 附子

鍾乳粉 白[illegible] 木香 蛇床子 白礬 青[illegible]

右為末更合研三日用黃[illegible]外腎去筋膜細研以[illegible]和劑

丸如梧子大每服二十丸溫酒下

金鎖正元丹 治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節酸疼骨

[illegible]痛目暗耳鳴面色萎黃[illegible]手足多冷

心腹疼痛[illegible]臍腹[illegible]不能久立脚膝[illegible]痛步履艱難背

拘急不得俛仰[illegible]水穀不消大便[illegible]心

食減少[illegible]多心[illegible]小便滑數遺精白濁

一切元臟虛冷之病並皆治之

五味子[illegible] 茯苓[illegible] 巴戟[illegible] 補骨脂[illegible]

肉蓯蓉[illegible] 葫蘆巴[illegible] 龍骨[illegible] 朱砂[illegible]

右為細末入研藥令勻酒糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十

丸空心食前溫酒下或鹽湯吞下

[illegible]丸 治久冷[illegible]元氣

硫黃[illegible] 附子[illegible] 山茱萸[illegible] 肉豆蔻[illegible]

肉豆蔻[illegible] 木香[illegible] 牛膝[illegible] 艾葉[illegible]

右為末糯米糊和為丸如梧子大每服十丸至十五丸空心鹽

湯下如腰脚疼痛用木瓜湯下

[illegible]神丸 補元氣治久冷

硫黃[illegible] 木香 肉豆蔻[illegible]

桂[illegible] 附子[illegible] 青橘皮[illegible] 乾薑[illegible]

右為末和勻糯米糊為丸如梧子大每服十丸至十五丸空心用下

烏金丸 [illegible]治元氣久冷上氣下虛胸中痰飲或上攻頭目

痛目常昏眩及胃脘氣實[illegible]腹脹痛不可忍[illegible]

[illegible]氣上下不能升降飲食不進面黃[illegible]

[illegible]心忡心[illegible]一切虛寒[illegible]

黑錫[illegible] 硫黃[illegible] 木香[illegible] 附子[illegible]

川楝肉[illegible] 破故紙[illegible] 肉豆蔻[illegible] 沉香[illegible]

右先將黑錫於鐵[illegible]石器內[illegible]灯下[illegible]硫黃細

末入在鍋內[illegible]一宿 硫黃

另研令極細黑錫既碎[illegible]以[illegible]

大[illegible]以[illegible]

於[illegible]研黃[illegible]右為細末[illegible]如梧子大每服三十丸或四

十粒空心食前鹽湯下[illegible]

[illegible]

震靈丹 [illegible]

之[illegible]

目[illegible]心神[illegible]

[illegible]小腸[illegible]

冷[illegible]

[illegible]不定[illegible]

[illegible]丹 治[illegible]冷小便滑數大便[illegible]

[illegible]食[illegible]

附子[illegible] 肉豆蔻 白朮 山藥 乾薑[illegible]

赤石脂[illegible] 肉桂[illegible]

右為細末水糊為丸如梧子大每服三二十丸空心[illegible]下

[illegible]丸 治[illegible]心腹[illegible]冷

白朮[illegible] 神麴[illegible] 川姜[illegible] 桂心[illegible] 川椒[illegible]

吳茱萸[illegible]

右為細末水糊為丸如梧子大食前米飲下五十丸或百丸一方

為散米飲調方寸匕

[illegible]氏烏頭丸 [illegible]風冷邪氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘於心

令人卒然心痛或引背膂甚[illegible]不差宜服之

附子[illegible] 川烏[illegible] 赤石脂[illegible] 蜀椒[illegible]

肉桂[illegible] 乾姜[illegible]

右為細末蜜和丸如梧桐子大每服三丸溫酒下冷至痛去痛止

若不止加至五六丸以知為度若早朝服無所覺至午時再服三丸

夜又服三丸若九心痛[illegible]服三丸[illegible]加至十丸[illegible]終身不

[illegible]心[illegible]生[illegible]

來復丹（出和劑方）此藥配類二氣，均調陰陽，奪天地沖和之氣，乃水火既濟之方，可冷可熱，可緩可急，善治榮衛不交養，心腎不升降，上實下虛，氣閉痰厥，心腹冷痛，臟腑虛滑，不問男女老幼，危急之證，但有胃氣無不獲安，補損扶虛，救陰助陽（方見諸厥門）

溫脾丸（出本事方）治宿冷在腸胃間，連年腹痛泄瀉，休作無時，服諸熱藥不效，宜先取去，然後調治易差，不可畏虛以養病也。

厚朴　乾薑　甘草　桂心　附子（生各二兩）

大黃（四錢，生碾細，湯一盞浸半日，攄去滓，煎湯時和滓下）

右細剉，水二升半，煎八合，後下大黃汁，再煎六合，去滓，澄去腳，不要晚，十分三服，溫服，自夜至曉令盡，不快，食前更以乾薑丸佐之。

乾薑丸（出本事方）

乾薑　巴豆（去心炒黃研）　大黃　人參（各一分）

右除巴豆餘為末，同研，煉蜜丸如梧子大，服前湯時，用湯吞下一丸，米飲亦得。有人因憂愁中傷，食結積在腸胃，故發吐利，自後至暑月稍傷則發，暴下數日不已，玉函云：下利至隔年月日期而發者，此為有積，宜下之，止用溫脾湯尤佳，如難取，可佐以乾薑丸，後服白朮散。

白朮散（出和劑方）

白朮　木香　附子　人參（各等分）

右細末，每服二錢，水一盞，生薑三片，棗一枚，煎六分，去滓服。

烏金丸（出衛生家寶方）治男子下元虛冷，真氣怯弱，腎臟虛寒，小腸氣痛，牽引肋腸，連臍疼痛，不可忍者，手足厥冷，多出冷汗，不能屈伸，面色青黑，時發時止，立有神效。

玄胡索　川當歸（各一兩）　舶上茴香　川練子（一兩去核）　木香（半兩）

乾全蠍（一錢，全者炒，去上足）

右並為細末，米醋糊丸如梧子大，每服二三十丸，空心鹽湯下，久服一月可去根。

二氣丹（出和劑方）助陽消陰，正氣溫中，治內虛裏寒，冷氣攻擊，心脇臍腹滿刺痛，泄利無度，嘔吐不止，自汗時出，小便不禁，陽氣漸微，手足厥冷，及傷寒陰證，霍亂轉筋，久下冷利，少氣羸困，一切虛寒痛冷，並宜服之。

硫黃（研）　肉桂（去皮各一分）　乾薑（炒）　朱砂（研為衣各二錢）

附子（二兩炮去皮臍為末各一兩）

右並勻研細，用麵糊為丸如梧桐子大，每服三十丸，煎艾鹽湯放冷下，空心食前服。

合體湯（出澹寮方）治下元虛冷，腰腹冷痛，臍下一切冷疾。

艾葉　川烏　細辛　乾薑　桂（去皮各等）

右為麁末，水煎，食前服，下部為妙。

溫胃丸　治寒痼冷癖，嘔吐逆，心腹堅痞，飲食（出王氏集驗方）

京三稜（炮）　附子（去皮）　乾薑（炮）　青皮　桂（各半兩）

右為細末，醋糊為丸如豆大，每服二三十丸，米飲下。

金鎖正陽丹（出經驗方）

硫黃（一兩研）　巴豆（去皮出油）　烏頭（去皮尖）　木鱉子（去殼）　雄黃（各半兩）

右件為末，用雞子清好者，各一兩半，黃丹一兩，硃砂一兩半，細研，客熱入前項藥末，乘熱丸如綠豆大，每服一丸，常服空心鹽湯下，水腸氣痛，炒茴香酒冷下，本臟前為下淋，腸脫肛，乾薑艾同煎，溫酒下，心氣痛燒鐵淬酒下二丸，氣塊嚼乾柿子下一丸，婦人血氣不行及產後敗血，當歸酒下，服多冷淡鹽湯，救煎湯下。

匈奴露宿丸（出千金方）治寒冷積聚。

礜石　桂心　附子　乾薑（各二兩）

右為末，蜜丸如梧桐子大，每服十丸，日三服，稍加之。

大已寒丸（出和劑方）治久寒積冷，臟腑虛弱，心腹疞痛，脇肋脹滿，泄瀉腸鳴，自利自汗，米穀不化，陽氣暴衰，陰氣獨勝，手足厥冷，傷寒陰盛，神昏脈短，四肢怠惰，並宜服。

蓽撥　肉桂（各四兩）　乾薑　高良薑（各六兩）

右為末，水煮麵糊丸如梧子大，每服二十粒，飲湯下，食前。此藥燥甚，治臟腑虛寒，滑而下痢，及泄瀉腸鳴，水穀不化，自非有積者，切忌壯熱，寒泄瀉，不可輕服，多有泄瀉吞酸之患，用溫熱藥不止者，宜用緊澀之劑，可於泄下湯方中求之。

玉華白丹（出和劑方）清上實下，助養根元，扶衰救危，補益臟腑，白五勞七傷，夜多盜汗，肺萎虛損，久嗽上喘，霍亂轉筋，六脈沉伏，唇口青黑，腸腑刺痛，大腸不固，小便滑數，婦中虛泄，肌肉瘦悴，目暗耳鳴，胃虛食減，久瘧

久病積冷痼冷諸藥不愈者方見[illegible]
王抱肚[illegible]治寒痼冷心腹刺痛常冷於臍腹間甚妙 方用針
砂如法炒記止入硇砂半兩並不用餘藥
針砂[illegible] 白礬一兩 硇砂一錢
粉霜一錢
右白礬等三味同研為細末與針砂拌和只作一服以水拌匀用
起拌摻令勻厚皮紙為貼闊二寸以上長四五寸貼之外以帛子包
繫臍膝或常貧臍下[illegible]即以衣襯之若藥力過再添水如前
拌用其紙如初可用四五次藥力退即將針砂再炒過別入新藥仍
一可用一方用雌黃半錢無粉霜
大通中湯[illegible]治冷心腹中大寒大痛嘔不能飲食飲食下咽自知偏從
一面下流有聲決決然若腹中寒氣上衝皮起出見有頭足上下而痛
其頭不可觸近
蜀椒二合 乾薑四兩 人參二兩 飴糖一斤
右吹咀以水四升煮取二升去滓內飴糖微火煮令得一升半分三服
[illegible]
服湯如炊三斗米久可飲粥二升許更服當一日食糜溫服之
養正丹[illegible]和補正助陽接真治元氣虛[illegible]陰邪交爭[illegible]常上
盛下虛氣不升降呼吸不足[illegible]短[illegible]多[illegible]驚悸[illegible]逆汗
腿寒[illegible]或虛煩狂言口乾上喘[illegible]胃吐食霍亂轉筋[illegible]不定又消
中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗[illegible]唇青脈沉
最宜服之及婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛[illegible]能[illegible]亦服
濟心火強腎水進飲食方見[illegible]補[illegible]元門
玉壺丸[illegible]治久冷[illegible]真[illegible]飲食壯筋骨[illegible]顏
烏頭[illegible] 硇砂[illegible] 陽起石[illegible]
硫黃[illegible]
右五味[illegible]為細末[illegible]丸如梧子大每服十五丸空心鹽湯下婦人[illegible]下
鍼婦丸[illegible]治逆冷氣心下結聚嘔逆不食不消[illegible]主傷寒[illegible]後[illegible]寒
令逆氣
附子[illegible] 桂心 礬石[illegible]
右為末蜜之如豆大以酒服三丸日[illegible]至十丸[illegible]食[illegible]自

近久宜冷食飲
治痼冷風眩寒中手足冷胃口寒臍下冷百病五勞七傷第一令人能
食二強盛三益氣四有子神驗方[illegible]
大豆一升 烏頭[illegible] 生地黃[illegible]五
右以除日吹咀烏頭以酒一斗半和地黃汁浸三兩頭[illegible]破日[illegible]去滓
內豆藥汁中至除日出曝之盡汁更浸曝之至汁盡藥成初服從二
豆起可至二十豆酒服之有病空腹服無病食後服四時合[illegible]得二
月二月為上時藥令人能食益氣強盛有子髮白更黑齒落更生[illegible]先
病熱人不可服
茱萸消石湯[illegible]治久寒不欲飲數十年[illegible]飲
茱萸八合 消石一升 生薑一斤
右以酒[illegible]斗水解令二升煮藥取四升服二升病即下去勿更服
也初下如泔後如污泥若如沫[illegible]者更可服之養如乳婦法
溫胃散[illegible]治痼冷腸胃止痛[illegible]和氣
橘皮二兩 桂一兩 乾薑[illegible]半兩
[illegible]
右為細末每一錢薑湯調下空心服
半夏湯[illegible]四[illegible]氣心腹中冷
半夏[illegible]升 桂心四兩 生薑八兩
右吹咀以水七升煮取二升一服七合日三服
生薑湯[illegible]溫中下氣
生薑一斤 甘草二兩 桂心四兩
右吹咀以水六升煮取一升半一服五合日三服
三聖丸[illegible]補男子丁元虛弱冷氣詩曰[illegible]二木三茴香丈服令
人壽命長知此方精神長養神利氣助容光丹田補暖[illegible]
[illegible]明[illegible]日常服丸數空心溫酒[illegible]
[illegible]令病[illegible]
蜀椒[illegible]
右[illegible]
[illegible]
及羊[illegible]

半夏(湯洗七次) 硫黃(研細)

右等分以生薑自然汁同杵入乾蒸餅末搜和臼內杵數百下

丸如梧桐子大每服三五十丸生薑湯下十五丸至二十丸婦人

醋湯下或用葱白一條生薑二片煎入阿膠二片溶開食前空心送

下

治諸冷積醫所不治(至寶方)

同為細末九升淨器去土之服中服一合日三服及四下之服記員

更以食壓之取瘥乃止

金液丹(出和劑方) 固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損

治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸蟲失精遺溺形羸力劣

脚膝疼弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔瘻

濕𧏾生瘡下血不止婦人血結寒熱陰蝕疽痔

洞陽丹(出和劑方) 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細微疾傷寒陰證治

之

附子(炮去皮臍) 鍾乳粉(各一兩) 天雄(二枚炮去皮) 川烏(一兩炮去皮臍)

辰砂(研)一兩(別研)

右為細末面糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒鹽

湯任下

赤丸(金匱方) 治寒氣厥冷

茯苓 桂心(各四兩) 細辛(一兩) 烏頭 附子(各二兩炮)

射罔(如棗大一枚)

右為末內真朱為色蜜丸如麻子大空腹酒服一丸日再夜一服不知稍增

至二丸以知為度 一方用半夏四兩不用桂

又方(金匱方) 治胸滿氣噎下部冷腹疼痛

半夏(湯洗) 生薑(各四兩) 桂(一兩) 吳茱萸(五合炒)

右㕮咀用水十升煮取四升分五服又再溫空心食前服

人參湯(千金方) 治丈夫婦人下元虛冷面黑肌瘦冷痰牽引小腹以至

胃翻食噎吐口苦舌乾手足倦懶手不能舉年月久遠一切脾胃冷病悉能

除愈

人參(一兩) 茯苓(一兩) 北(?) 粉草(一兩) 黃耆(一兩蜜炙)

附子(炮去皮臍)

右為細末每服三大錢煎湯點服忌生冷油麵粘膩等物昔一婦人

年四十餘患十年翻胃而日益黑瘦三十餘人治不效此脾胃諸冷

病久久遇此方疾愈甚服此藥不五七日間頓然無事堅意服至一月

遂去其根自是服之不三五服能進脾瘡五便瘥平能食胃氣壯服

內進飲食便業術家服大有補益厚誠屢驗幸毋忽焉

又方(千金方)

浮椒(一兩) 茴香(一兩) 粉草(一兩)

右為末每服二錢熱湯點服忌如前

大已寒丸(出和劑方) 治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和退陰助

陽除臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便

利無度又傷寒陰濕形氣沉困自汗

附子(炮去皮臍) 川乾薑(炮) 高良薑(炒) 吳茱萸(炒) 桂(去皮)

川烏頭

右為細末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服五七十丸熱米湯下空心食前

日進二服忌

接真湯 治陰盛病手足厥冷脾腹疼痛真氣不足更須取絕

沉香 丁香(各二錢) 麝香(一錢) 附子

右為麤末水二盞生薑七片棗二枚煎至一盞去滓空心溫服一服

硫黃丸 治胃人之久虛冷月且飲食不能克者

硫黃 礬石 乾薑 茱萸 桂

烏頭 附子 椒人 人參 細辛

皂角 當歸

右等分細末多少搗蜜丸如梧子大一服十丸至二十丸日三服若

冷痢者加赤石脂龍骨即便愈也

橘皮益智湯 治痛冷症攻及攻心痛如刺

青橘皮 益智(去殼) 烏頭 蓬莪 威靈仙(各)

右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑一片鹽少許煎六分去滓食前

溫服日三

[illegible]

硃砂 [illegible]

[illegible]

[illegible]

肉桂 赤石脂 木香 附子 華撥

丁香 白朮 乳香 沉香 胡椒

右為末 [illegible] 一升 [illegible] 梧子大每服 [illegible]

梧子大每服一十丸 [illegible]

靈砂丹 [illegible] 治丈夫元陽虛冷氣上衝心腹為心腹痛 [illegible]

以制靈砂 [illegible]

沉香 丁香 木香 舶上茴香 [illegible]

烏藥 白芷 胡蘆巴 華澄茄 [illegible]

右件八味同為末煉蜜為丸梧子大每服一丸生薑 [illegible] 下

三建湯 [illegible] 除痼冷扶元氣 [illegible] 治 [illegible] 手足 [illegible] 大小

便治 [illegible] 及中風涎潮不省人事傷寒陰毒並治

天雄 [illegible] 附子 大川烏 [illegible] 各等分

右㕮咀 每二錢 水一盞薑十五片煎八分溫服無時 一法加陶桂小雞

椒附丸 [illegible] 方 [illegible] 補 [illegible] 冷 [illegible] 小便頻數

心腹脹滿

附子 [illegible] 檳榔 牽牛 [illegible] 五味子 [illegible] 川楝 [illegible]

淨陳皮 乾薑 [illegible] 石菖蒲 [illegible]

右剉碎 [illegible] 為末 [illegible] 丸梧子大每服三十丸鹽

湯鹽空心下婦人血海冷當歸酒下 [illegible]

甘草湯下

青娥山 [illegible] 治男子腎虛久冷下部一切痼冷之疾

[illegible] 世不 [illegible] 小便 [illegible] 外 [illegible] 及腳 [illegible] 不 [illegible] 飲食 [illegible] 味 [illegible] 為

[illegible] 而多 [illegible] 內 [illegible] 及婦人子 [illegible] 久冷 [illegible] 不 [illegible] 帶下並

宜服之

秋石 四兩 [illegible] 一分 [illegible] 母 [illegible]

[illegible] 寒水石 [illegible]

[illegible]

右六味同研極細用圓正半夏十兩為末水熟麥成稀糊為丸每服

一二粒空心溫湯下婦人醋湯下丸如彈子大陰極乾臨 ○ 一法旋全

水滴為丸只要研極細陰乾復以甘鍋盛子丸斤子蓋頭大火一煅

功力尤大半夏糊丸者平穩功力差少久服見效

三陽丹 [illegible] 方 治男子氣弱丹田冷 [illegible] 泄瀉婦人血海冷一切

冷病並治之

五月五日 [illegible] 一隻 [illegible] 大艾葉一兩 [illegible] 不令 [illegible] 用好酒三升

淋下 [illegible] 內以 [illegible] 紙 [illegible] 了次又用泥封 [illegible] 日待去日中 [illegible] 至

九月重陽日取開焙乾 [illegible] 細末用 [illegible] 打麵糊 [illegible] 丸如梧桐子大每

服三十丸至四十丸空心用鹽湯下婦人醋湯下大有功效 [illegible]

霍亂 [illegible] 治男子氣弱丹田冷痛 [illegible] 泄瀉婦人血海冷疾一切

病並治之

[illegible] 以銀鋪刀 [illegible] 不拘多少新羅中 [illegible] 去 [illegible]

以竹刀或銅刀破開剖去 [illegible] 中用水 [illegible] 五

十 [illegible] 如水 [illegible] 肉為細末 [illegible] 一

[illegible] 空心食前 [illegible] 下功效未易具述 [illegible] 以金 [illegible]

服酒下亦得

至寶丹 [illegible] 方治 [illegible]

附子 [illegible] 良薑 [illegible] 桂 [illegible] 茴香 [illegible]

茯苓 [illegible]

右件為細末糊打麵糊為丸如梧子大每服三五十丸溫酒送下食前

金液丹 [illegible] 此丹養火不計歲年 [illegible] 之功

論 [illegible] 之 [illegible] 張柏子所 [illegible] 皆此丹也 [illegible]

善天 [illegible] 五 [illegible] 傷八風五痺 [illegible] 金水 [illegible] 又病久 [illegible]

一切男女老幼 [illegible] 不動 [illegible] 皆王之初服 [illegible] 中 [illegible]

或 [illegible] 是 [illegible] 則不動 [illegible] 服則不 [illegible] 服丹之人能

絕 [illegible] 五腥不食 [illegible] 大 [illegible] 仙 [illegible] 服 [illegible]

一兩退毒二兩入藥以[illegible]飲[illegible]以下曰
取一粒[illegible]今夜[illegible]丸而米[illegible]
念咒曰退[illegible]花水[illegible]人參
煑[illegible]
八月五[illegible]
日承[illegible]一斤
養[illegible]
痛[illegible]大[illegible]
飲[illegible]丸[illegible]
東大依[illegible]名曰
重次[illegible]入[illegible]方[illegible]

小蟾蜍丸 [illegible]令
蟾蜍[illegible]
右為細末[illegible]和丸如梧桐子大每服七八丸至十九空心米飲
送下

養生金丹 治中下焦虛冷進飲食暖脾胃[illegible]方
硫黃[illegible] 大[illegible]子 乾薑
厚朴 半夏 肉豆蔻 丁香 桂
右為細末[illegible]丸如梧桐子大[illegible]服二三十丸加至
七八十丸空心米飲下老人尤宜
蓽澄茄丸 治諸冷積腹脹氣痛
蓽澄茄 沉香 草豆蔻 白术 青皮
右[illegible]為末研[illegible]丸如[illegible]米飲下
溫內丸 治[illegible]冷在[illegible]積氣[illegible]
脾胃[illegible]飲食不入[illegible]常服溫益脾胃[illegible]
養[illegible]
厚朴 [illegible] 甘草 [illegible]
五味子 [illegible] [illegible] 草豆蔻
右為[illegible]為丸如梧桐子大每服五十丸不拘時候米飲下
治入[illegible]小[illegible]令者

母吉導者汁服之
治令
一月二日[illegible]

普濟方卷之四十三畢

對讀官[illegible]
對方醫[illegible]
[illegible]

普濟方卷之一百二十四目錄

○妊娠諸疾門 論十二道 類十二類 方四百乃去十二法

類
△胤嗣 妊娠 養胎胎教
轉女為男 惡阻 子煩
子淋 心腹痛 中惡心腹痛
心腹脹滿 身體腫滿 腰痛

○胤嗣 論一道 方七十四方

秦椒丸 柏子仁丸 白薇丸 又方 廣嗣丹
白薇丸 紫石門冬丸 七子散
女服紫石英丸 養百丸 紫石八丸 養真丸
白薇丸 白薇丸 續嗣降生丹 秦桂丸 朴硝蕩胞湯
白薇丸 助陽丹 凡人家國有妻妾婦閨衰蕭不孕
治婦人久無子息 名鍾斯丸 杜蘅丸 杜衡丸 吉祥丸
秦桂丸 扶血丸 禹餘糧湯 陽起石丸
紫石英丸 調經散 洗洗丸 坐導藥方 鍾乳丸
慶雲散 治婦人久無子息 治婦人子臟風冷 數令無子
熟乾地黃散 地黃湯 八真丹 白堊服宮丸
大黃丸 治婦人無病緣業久不生子 柏子仁丸
又方 治婦人不生者 承澤丸 陽起石丸
抑氣散 專治婦人下元虛冷定子嗣 當歸湯
治婦人無子 壽無子臟令子宮內炙 又方
秦婦人子臟偏僻令結無子 茱萸丸 驗胎法
治婦人無子及冷帶 辛萸丸 八珍散
千金保生丸 煖宮丸
婦艾丸 參香勝金散 治勝損虛後無子
令人有子 蒼朮丸 延年藥方也 附子當歸丸 此湯令人有子
令人有子 令婦人有子 令生男兒 療婦人無子

○妊娠 論一道 方七方 去七法

白朮湯 白朮散 木香丸 胎孕九箇月將息胎法
犀角散 治妊娠臟腑常多驚悸 治妊娠筆身碎痛
法 便產須知 推王相日法 推貴宿日法 胎前避忌
男女受胎時日法 食忌起居 胎前樂忌
妊娠食忌法

○養胎胎教 論一道 方五十九方

烏雌雞湯 補胎湯 艾葉湯 黃連湯 雄雞湯
茯神湯 菊花湯一名菊花湯 一名人參... 調中湯 阿膠湯一名...
安中湯 麥門冬湯 柴胡湯 葱白湯
杏仁湯 芍藥湯 葵子湯 半夏湯 豬腎湯
丹參膏 甘草散 麥門冬散 黃芪散 芎根飲子
竹茹散 柴胡散 赤茯苓散 人參散 乾地黃散
桑寄生散 敗醬散 桑寄生飲子 柴胡散 茯神散
紫菀飲子 葱白雌雞湯 半夏飲子 當歸散
赤石脂散 甘草散 地黃芎藭丸 人參丸 熟乾地黃湯
蒸大黃丸 黃耆湯 白朮湯 乾地黃湯 白朮散
白朮當歸湯 橘皮湯 熟乾地黃湯 艾葉湯
桑寄生湯 當歸湯 白朮散 當歸飲 阿膠湯
枳殼散 地黃丸 治婦人懷胎不長

○轉女為男 論一道 方二方 去五法

丹參丸 又方 轉女為男者 九變於三月變物變化
紫宮玉女秘法 又法 妊娠經篇三月要男者

○惡阻 論一道 方五十五方

半夏茯苓湯 茯苓丸 陳橘皮丸
治妊娠惡阻嘔吐不止 麥門冬散 安胎飲 枳殼丸

茯苓湯 茯苓半夏湯 桔梗湯 半夏飲
茯苓丸 人參散 白朮散 草子丸 陳橘皮丸
人參橘皮湯一名人參白朮湯 竹茹散 竹茹飲
人參飲 辛奇生飲 保生湯 犀角散 參朮飲
人參飲 白朮丸 茯苓飲 橘皮散 麥門冬丸
治妊娠惡阻胃寒 人參散 治妊娠惡心中煩憒嘔吐
半夏茯苓湯 療婦人妊娠惡阻嘔吐 加味二陳湯
小紫蘇飲 紫蘇湯 人參湯 前胡飲 麥門冬飲
橘皮湯 茯苓丸 白朮散 醒脾飲子 四七湯
人參丁香散 人參半夏丸 地黃丸
治妊娠惡心丁香十知糖 治阻病 參橘散 赤茯苓散
人參調中散 李氏家傳快氣湯 溫中十八方
膠艾湯

〇子煩 論一道 方十八方

升麻湯 鍼囊人湯 赤茯苓散 退熱湯 柴胡飲
知母湯 茯苓湯 竹瀝湯 知母飲 犀角散
竹瀝湯一名竹葉湯 麥門冬湯 竹葉湯 治妊娠煩悶
治孕婦七八箇月傷暑傷熱 治妊娠常苦煩悶此是子煩
治妊娠子煩口乾不得卧 一母丸 治妊娠心中煩悶見食即吐

〇子淋 論一道 方二十四方

地膚大黃湯 療妊娠數月小便淋瀝疼痛 安榮散
木通湯 冬葵子散 冬葵子湯 海蛤湯 當歸湯
人參散 葵子散 又方 白芷散 石斛散
石韋湯 鯉魚湯 治妊娠淋小便數少澀痛 檳榔散
滑石湯 治妊娠小便淋澀臍腹妨悶 車前子湯
葵子散 甘遂散 猪苓散 地膚湯

心腹痛 論一道 方八十四方

保生湯 畢撥丸 沉香湯 七寶湯 真白湯
妙黃丸 厚朴散 木香散 半夏散 地黃飲
木香和脾飲 枳實湯 如聖散 草豆蔻散
阿膠湯 大腹湯一名通氣散 厚朴湯 人參飲
丁香散 當歸散 芎歸湯 人參湯 沉香湯
人參湯 白朮湯 療妊娠三四月腹痛時時下血
療妊娠胎動搖指向下不安 艾葉散 參耆湯
當歸湯 大腹皮丸 金粟方 蓯蓉湯 當歸芎藭散
沉香散 安胎飲 人參湯 白朮散 桔梗丸
芎淨散 胜散 治妊娠心下急氣滿切痛 枸皮湯
芎歸湯 烏角散 治妊娠胎動腰痛心煩 治妊娠卒心痛
薑艾湯 加減四物湯 芎藭散 地黃方
草菓散 香朮散 當歸湯 白朮湯 治妊娠卒心痛
黑神散 枳殼丸 芎藭湯 撮子丸
當歸飲 治妊娠三五月忽然心腹絞痛 生雞子

又方 治妊娠卒心痛欲死 玄胡索散 竹茹湯
牛屎方 地黃汁 治妊娠胎動腹痛 車脂方
又方 知母丸 治妊娠忽口苦心腹痛
治妊娠傷胎結血心腹痛 治妊娠四五月忽心腹絞痛
治妊娠胎動腹痛連腰方 治妊娠腹中痛
當歸散 治妊娠心痛 火龍散
治妊娠渾身厥冷暴痛衝心 治妊娠忽然心痛悶絕
治妊娠心痛煩悶

〇中惡心腹痛 論一道 方十方

當歸散 犀角散 治妊娠中惡心腹疞痛 又方
又方 良薑湯 檳榔散 又方 治妊娠中惡心腹痛
又方 治妊娠中惡心腹痛

〇心腹脹滿 論一道 方十七方

丁香散　阿魏丸　厚朴煎散　白荳蔻散　倉公下氣湯
訶梨勒飲　檳榔散　人參湯　白术湯　丁香散
肉荳蔻丸　木香丸　草荳蔻散　藿香丸　白术散
枳殼湯　治妊娠脹滿有熱証者

○身體腫脹　論一道方二十八方

木通湯　當歸散　八正散　紫金散　桑白皮湯
鯉魚湯　防己湯　赤茯苓湯　茯苓丸　天仙藤散
療妊娠身腫有水氣　葶藶散　又方　澤瀉湯
腎著湯　五皮散　治妊娠腫　寄生飲　桑白皮散
豬苓散　葵子散　商陸赤小豆湯　治妊娠從脚上至腹腫
燒肝散方　治妊娠毒腫方　又方
治妊娠兩脚浮腫　治婦人身腫九月而產

○腰痛　論一道方二十一方

五加皮散　續斷丸一名五加皮丸　牛膝散一名牛膝散
杜仲散　防風湯　當歸散　天地煎丸　大腹散
治妊娠腰痛　治妊娠腰痛不止方　治妊娠腰痛
牛膝方　地黄酒　紫菀　通氣散
療妊娠腰背痛　治妊娠卒腰背痛如折　產前軟膝
杜仲丸　阿膠丸　治妊娠腰痛不可勝忍

普濟方卷之一百三十四目錄　終

普濟方卷之一百二十四

姙娠諸疾門

○胤嗣　附論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不孝有三無後爲大者言嗣續之至重也凡欲求子當先察夫婦有無勞傷痼害之屬依方調治使內外和平則婦人樂有子矣○素問云天地者萬物之父母也陰陽者血氣之男女也有夫婦則有父子婚姻之後則有生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血先至陽精後衝血開裹精陰外陽內陰含陽胎而男形成矣陽精先至陰血後衝精開裹血陽外陰內陽含陰胎而女形成矣若夫受形之易者男女必當其年男子二八精氣溢寫必三十而娶女子二七天癸至必二十而嫁皆欲其二氣完實然後交合交而孕孕而育育而壽後世嫁娶不拘其年早婚未完而傷是以交而不孕孕而不育育而不壽者多矣以此觀之男女婚姻貴乎及時夫婦貴乎强壯則易於受形也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理也或男子真精氣不濃婦人血衰而氣旺是謂夫病婦疾皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒男子益精生精以節嗜欲依方調治血陽和平則婦人樂有子矣○又曰無子者其事有三也一者墳墓不嗣二者夫婦年命相剋三者夫病婦疾皆令無子若是墳墓不嗣年命相剋此二者非藥能益若夫病婦疾須將藥餌故得有效也然婦人挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉止或崩漏帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故無子也○診其右手關後尺脈多浮則爲陽陽脈絕無子也尺脈微濇中年得此爲絕產也少陰脈如浮緊則絕產惡寒脉尺寸俱微弱者身絕產也又有因將攝失宜飲食不節乘風取冷或勞傷過度致令風冷之氣乘其經血結於子臟子臟得冷故令無子也○凡婦人年二三十無病而無子經血如常或經血不調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所阻礙不能爲用故也可用攝聖散局說見卷三二卅後用導水丸禹功散世三五行

或十餘行罩用無憂散泄十餘行虛寒乘虛實用之又服蔥白粥三五日胃氣宜通腸中得實可服玉燭散更服白朮散茯苓之類降火益水既乘之道當不數月而有孕內經曰婦人有癃痔遺溺嗌乾諸證難服妙藥針灸亦終不能孕蓋衝脈督脈任脈有此病不能孕故也○婦人所以無子者衝任不足腎氣虛寒也內經謂女子二七天癸至任脈通太衝脈盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本於夫病婦疾者當審其所因而調之○治要之男服七子散女服紫石門冬丸及坐藥蕩胞湯無不有子也

方

秦椒丸（出千金方）治婦人絕產生來未產盪滌腑臟使玉門受子精及子臟風虛冷氣致陰陽二氣不能和合致令久無子

秦椒　天雄（各十八銖）　玄參　人參　白斂
鼠婦　白芷　黃耆　桔梗　露蜂房
白僵蠶　桃人　蠐螬　白薇　細辛
蕪荑（各一兩）　牡蒙　沙參　防風　甘草
牡丹皮　牛膝　卷柏　五味子　芍藥
桂心　大黃　石斛　白朮（各二十銖）　柏子人
茯苓　當歸　乾薑（各一兩半）　澤瀉　乾地黃
芎藭（各一兩六銖）　乾漆　白石英　紫石英　附子（各一兩）
鍾乳（二兩）　水蛭（七十枚）　麻布叩複頭（七尺燒）　蟲蟲（百枚）

右為末蜜丸如梧桐子大酒服十丸日再稍加至二十丸若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異即停一方無鼠婦

柏子人丸（出千金方）治婦人子臟虛冷久無子乏勞七傷羸瘦面無顏色不能飲食產後斷緒無子多時

柏子人　澤蘭　芎藭　防風　紫石英
白石英　杜仲　厚朴　乾薑　熟乾地黃
當歸　川椒　甘草　桂心　牛膝
益荑（蕪荑）　人參　石斛　白芷　白朮　赤石脂
肉蓯蓉　白芍藥　桔梗　五味子
秦艽（去苗）　龍骨　防葵　白茯苓　藁本
知母　獨活（各一兩半）　黃耆（二兩）　鍾乳粉（二兩）

右為末入研藥了都研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前溫酒下

白薇丸（出千金方）治婦人子臟風虛積冷經絡不調面無血色肌肉消瘦不能飲食及帶下久無子

白薇　細辛　防風　人參　秦艽
秦椒　白斂　桂心　牛膝　蕪荑
沙參　芍藥　五味子　白僵蠶　牡丹
蠐螬（各一兩）　乾漆　柏子人　乾薑　卷柏
附子　芎藭　桃人　紫石英　鍾乳
乾地黃　白石英　鼠婦　水蛭　蟲蟲（各五十枚）
吳茱萸　麻布叩複頭（一尺）

右為末蜜丸如梧子大酒服十五丸日再稍加至三十丸當有所去小覺有異即停服

又方（出千金方）治月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子金城太守白薇丸久無子或斷緒上熱下冷百病皆治之

白薇　乾地黃　乾薑　車前子　蜀椒（各十八銖）
紫石英　藁本　石膏　菴蕳子　卷柏
澤蘭　赤石脂　白龍骨　遠志　麥門冬
茯苓　太乙餘糧（各二兩）　當歸　芎藭
蛇床子（各一兩）　白芷　覆盆子　桃人　人參
桂心　蒲黃（各二兩半）　細辛（三兩）　橘皮（半兩）

右為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再漸增以知為度亦可至五十丸慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝及心至四月五月不可

庚(?)鳳丹　治久無子息

黃耆　人參　川續斷　[illegible]　熟地黃
牡丹皮　延胡索　白芍藥　川芎　白薇
[illegible]　白茯苓　當歸
肉蓯蓉　防風　藁本　陳皮

華細辛 蓬莪茂 京三稜
乾薑 木香 山茱萸 肉桂
黑附子 萆薢 覆盆子
右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服一粒空心食前細嚼溫酒下日
進三服有孕住服昔有人常服此藥而生七男以此常合與人服而
皆驗效
白薇丸 療婦人百病斷絕緒產
白薇 細辛 厚朴 桔梗
鱉甲 防風 大黃 附子 石硫黃
杜衡 人參 桑上寄生 半夏
白殭蠶 續斷 秦艽 紫菀 杜蘅
牛膝 蠡魚 水蛭 紫石英 朴硝
桂心 鍾乳 當歸
右搗篩蜜丸空腹酒服如梧桐子十五丸日二漸加至三十丸不
吐不利忌生冷油膩餳生血物人莧生葱生菜豬肉冷水粘食陳臭
紫石門冬丸 出聖惠方 治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脈虛損
胞內宿夾疾病經水不時暴下不止月內再行或月前月後及子臟積
冷虛羸百病崩漏帶下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛少腹急重小便
白濁已上疾證皆令孕育不成以至絕嗣不孕此藥並能主療常服除
疾血溫子臟令人有孕臨產易生子及生子充實無病
紫石英 天門冬 當歸 芎藭 紫葳
卷柏 桂心 烏頭 乾地黃 牡蒙
禹餘糧 石斛 辛夷 人參 桑寄生
續斷 細辛 厚朴 乾薑 吳茱萸
牡丹 牛膝 柏子人 薯蕷 烏賊骨
甘草
右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十丸日三漸增至三十丸以腹中
熱為度不禁房室夫夫出外不可服藥或溫米飲下空心食前已服
七子散 出大全 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足兼治婦人無
子皆因五勞七傷虛羸百病所致

五味子 鍾乳粉 牡荊子 菟絲子 車前子
菥蓂子 石斛 乾地黃 薯蕷 杜仲
鹿茸 遠志 附子 蛇床子 芎藭
山茱萸 天雄 人參 茯苓 黃耆
牛膝 桂心 蓯蓉 巴戟天
右為末酒服方寸匕日二不知增至二匕以知為度禁如藥法不
能酒者蜜和丸服亦得一方加覆盆子八銖
女服紫石英丸
紫石英 禹餘糧 熟地黃
辛夷人 卷柏 石斛 川續斷
柏子人 川烏 海螵蛸 牡丹皮
川當歸 川芎 華陰細辛
粉草 桑寄生
山藥 吳茱萸 乾薑 人參 天門冬
厚朴
右為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服七十丸至百丸空心米飲吞下
以腹中熱為度不禁房事夫出不可服盡劑當有娠
卷柏丸 治婦人子臟冷久無子由風寒邪氣客於經血
卷柏 牡蒙 藁本 當歸 熟乾地黃
柏子人 乾薑 禹餘糧 白朮
芎藭 人參 五味子 石斛 桂心
附子 防風 吳茱萸 甘草
牛膝 桑寄生 川椒
右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下二十丸
治婦人久無子由子臟久積風冷陰陽不能施化
紫石英丸
紫石英 細辛 桔梗 白薇
厚朴 防風 川大黃
川椒 附子 硫黃 人參
當歸 桂心 鱉甲
桑寄生 半夏 白殭蠶
續斷 紫菀 杜衡 牛膝

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前温酒下

養真丸 治婦人血虚氣憊陰陽不升降久不成妊娠者

鹿茸　當歸　肉蓯蓉　禹餘粮　菟絲子

覆盆子　熟地黄　紫石英　桑螵蛸　五味子

真琥珀　白芍藥　川芎　桑寄生　卷柏

艾葉　川薑　白茯苓　人參　牡蠣

酸棗人 兩各一　鍾乳粉 四兩

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大食前温酒吞下五十丸日三服食後用粥飯壓之

白薇丸 治補調衝任温煖子宫治胞絡傷損宿受風寒久無子或胎不牢多致損墮又服去下藏風冷令人有子

白薇 [illegible]　牡蒙　藁本 兩各五　薑黄　當歸 [illegible]

熟地黄 [illegible]　川芎　人參 [illegible]　柏子人 [illegible]　石斛 去根

桂心 [illegible]　附子 [illegible]　五味子 [illegible]　防風 [illegible]　甘草

川牛膝 [illegible]　吳茱萸 [illegible]　桑寄生 [illegible]　秦椒 [illegible]　禹餘粮 [illegible]

右為末鍊蜜丸如梧桐子大空心酒下三十丸日二服忌生菜葱蒜麪醬麥猪肉魚鷄肉等一方有[illegible]茯苓[illegible]飲亦得覺有娠即住服已有孕者尤不宜服之

白薇丸 治婦人無子或斷緒上熱下冷飲食減少服之尤妙心腹一切疾痛皆主之

白薇　熟乾地黄　川椒 [illegible]　白龍骨 [illegible]

車前子　當歸 [illegible]　芎藭　蛇床子 [illegible]

乾薑 [illegible]　藁本　桂心　卷柏　細辛

覆盆子　菖蒲　人參 [illegible]　桃人 [illegible]　白芷

白茯苓　遠志 [illegible]　麥門冬 [illegible]

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前温酒下

續嗣降生丹 治婦人禀受氣弱胞臟虚損子宫冷憊血寒痼冷難成子息

當歸　桂心　龍齒　烏藥 [illegible]　益智

杜仲　石菖蒲　吳茱萸 [illegible]　茯神 [illegible]　川牛膝

秦艽　細辛　苦桔梗　半夏　防風

白芍藥 [illegible]　乾薑 [illegible]　川椒 [illegible]　牡蠣 [illegible]　附子 [illegible]

[illegible]

右為細末取附子內殊砂別研為細末糯米糊為丸如梧桐子大每服三十丸至百丸空心淡醋湯温酒鹽湯亦可下一日二服○此藥又治男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄及治婦人血虚帶下肌瘦寒熱但是男女諸虚百損客熱盗汗氣短乏力面無顔色飲食少味並皆治之更有奇效難以具述愛持居予宜預行善及方都服此藥無[illegible]

秦桂丸 [illegible] 治婦人無子不感應

秦艽　桂　杜仲 [illegible]　防風　牡丹皮

厚朴 [illegible]　附子　陽起石 [illegible]　白茯苓 [illegible]　白薇

當歸　乾薑　牛膝　沙參　半夏子 [illegible]

人參　卷柏　鹿茸 [illegible]　細辛 [illegible]　[illegible]

右各為末以蜜丸如梧桐子大每服三四十丸温酒下食前

朴硝盪胞湯 [illegible] 治婦人立身已來全不産及斷緒久不産三十年者

朴硝　牡丹皮　當歸　大黄　桃人 [illegible]

細辛　厚朴 [illegible]　桔梗　人參　赤芍藥

茯苓　桂心　甘草 [illegible]　牛膝　橘皮 [illegible]

附子 [illegible]　虻蟲 [illegible]　水蛭 [illegible]

右㕮咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠之必下積冷赤膿如赤小豆汁盡為婦人子宫內有此惡物使然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著坐導藥一方不用桔梗甘草一方無水蛭

白薇丸 出千金方 治月水不利閉塞絶産十八年服此藥二十八日有子金城太守方

白薇　細辛各一銖　人參　杜蘅一方用杜蒙
厚朴　半夏　白殭蠶　當歸　紫菀各一銖
牛膝　沙參　乾薑　秦艽各半兩　蜀椒
附子　防風各一
右爲末，蜜和丸，如梧子大，先食服三丸，不知稍增至四五丸。此藥不
可常服，覺有娠即止。用之大驗。一方有桔梗、丹參十八銖，一方有紫參
助陽丹　治婦人無子，月經不調，血閉臍腹疼痛，血塊血瘕，以不能先
服當歸六合散，空心煎十餘服，丸去敗瘀，臍肚不疼，可服助陽丹十五
服，必然成胎。有一婦人三十七歲無子，服此藥半月有子
細辛　防風　茱萸　川椒　白薇
白朮　乾薑　茯苓各一　牛膝　秦艽
附子　陳皮　石菖蒲　厚朴　沙參
人參　桂心
右爲細末，錬蜜爲丸，如杜豆大，每服十丸，溫酒下，日進三服，每日見
效。男子服能補益，婦人服之有孕，覺有孕不可服，無夫婦人者不可

八

服，用壬子日修合，忌雞犬，專服，每月經後三五日，淨一擧便成，亦可
延年益壽
凡人家圃園有凌霄花，婦聞其氣不孕，男服七子丸
五味子　菟絲子　韭子炒一兩
覆盆子　蛇床子　附子
白茯苓　巴戟　蓯蓉　鹿茸
益志子　木香　黃芪　遠志　陽起石
熟地黃
右爲細末，酒煮糯米糊爲丸，如梧桐子大，每服六七十丸，空心鹽酒
或鹽湯下。弱甚者加天雄半兩，炮去皮；腳膝疼痛者加杜仲一兩
去皮，薑汁炒去絲；石斛一兩去根
治婦人久無子，自大有神效
茯苓　桂　川芎　人參　當歸
細辛　沉香　五味子　川牛膝　沙參
白薇　琥珀　川芎　川椒　蜜

右爲細末，錬蜜丸如梧子大，每服五十丸，溫酒下，詳易亦得，日進二
服
杜蘅丸　治婦人服臟久積風冷，血氣凝滯，不能宣通，故令無子
杜蘅　附子　細辛　防風　白茯苓
白薇　牛膝　半夏　沙參
秦艽　桂心　川椒　菖蒲
藁本　蛇床子
右爲細末，錬蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心及晚食前溫酒
下。有子即住服
杜蘅丸　治婦人久無子斷緒
杜蘅　半夏　白薇
桔梗　附子　牛膝　石菖蒲
細辛　蜀椒　厚朴　沙參
防風　乾薑　桂
右爲末，錬蜜和丸，如梧桐子大，每服溫酒下二十丸，漸加三十丸，平

九

晨日午各一服
吉祥丸　治婦人積年不孕
天麻　柳絮　牡丹　茯苓　乾地黃
桂心　五味子　桃花　白朮　芎藭
覆盆子　桃人　菟絲子　楮實子
右爲末，蜜和丸，如豆大，每服空心飲下五丸，日中一服，晚一服
秦桂丸　治婦人無子，經進有效，危氏方
秦艽　桂心　杜仲　防風　厚朴
附子　白茯苓　白薇　乾薑　沙參
牛膝　半夏　人參一兩　細辛
右爲細末，錬蜜爲丸，如赤豆大，每服三十丸，空心食前醋湯米飲任
下。未效加丸數，已覺有孕便不可服，用鹽酒下亦得。昔金城太守范
羅謙上臣驗此術，若服藥四十日無子，請戮臣一家，以令天下。醫人
服子丸同張伯高學士傳云無子藥，諸士大夫服後但有癒騐，就藥結
上書刊二句云：修合者用為心以誠，服餌者存心以仁，不患乎無子也。

服如覺無益稍加丸數為度如服七日後陰陽覺有娠此藥與前太
子中舍尹丈妻李氏年四十無子服此藥十三日有娠此藥〔益斷丸〕
屢用屢驗此方不可不廣傳與人夫不在家不可服

扶血丸〔出直指〕治婦人無子

紫石英　桑螵蛸〔半兩〕　熟艾〔一兩醋炒〕　卷柏〔一兩〕　覆盆子〔一兩〕
阿膠〔炒〕　包金土〔各一兩〕　柏子仁〔二兩〕　陽起石〔半兩〕　熟地黃〔一兩半〕
牡蠣〔煅二兩〕　磁石〔二兩火煅〕

右為細末以糯米糊丸如梧桐子大每服三四十丸酒吞下食前

禹餘粮湯〔治婦人胞胎寒冷絕產無子〕

禹餘粮〔煅〕　白殭蠶〔炒〕　烏賊魚骨〔去甲〕　龍骨〔研〕
桂〔去皮〕　當歸〔去蘆〕　石葦〔去毛〕　乾薑〔炮〕
滑石〔研〕　赤芍藥　半夏〔湯洗七次〕
伏龍肝〔研〕

右㕮咀每服三錢水一盞入生薑三片煎至六分去滓食前溫服
日再

陽起石丸〔出大全〕治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子

陽起石〔煅〕　鹿茸〔酥炙〕　菟絲子〔酒浸〕
天雄〔炮去皮〕　韭子〔炒〕　肉蓯蓉〔酒浸〕　覆盆子〔酒浸〕
石斛〔去根〕　桑寄生　沉香〔別研〕　原蠶蛾〔酒炙〕　五味子〔各半兩〕

右為末酒煮糯米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯或酒下

紫石英丸〔出大全良方〕

紫石英　阿膠　當歸　川芎　赤芍藥
川續斷〔各〕　鹿茸　白朮　桂心〔各半〕　柏子仁〔一兩〕
熟地黃〔兩〕

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下二十丸治虛中有熱頭目旋暈足如履空嘔吐不食月水不調或多或少皆虛候也久服能生髮令有子更合虛悸常若憂思皆心血不足血室虛所謂也

調經散〔出大全良方〕治寒癖月候不調或在月前或在月後或多或少或逾月不至或一月兩來此是病主不孕

吳茱萸　半夏　當歸〔一兩去蘆〕　人參

麥門冬〔去心〕　白芍藥　川芎　牡丹皮〔去骨〕
厚朴　阿膠〔炒〕　甘草〔炙〕

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食前稍熱服

月候既調月月如期而來按時而止則當有娠○欲娠月候調勻顏色肌膚如常但苦沉重煩悶不欲飲食又不知患之所在脈又平和是欲娠也如此經兩月後經忽不通則結胎矣○既娠之候多病惡阻婦人稟弱有風氣痰飲則病甚狀沉重昏眩惡聞食氣喜啖鹹酸甚則寒熱心煩嘔痰恍惚不能支持輕者不服藥亦不妨重者須服藥

□□丸　治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墮

澤蘭葉　白朮〔各一兩〕　肉桂〔去麁皮〕　乾薑〔炮〕　熟地黃〔酒浸〕
當歸〔去蘆〕　川芎　石斛　白芍藥　牡丹皮〔去心〕
延胡索〔各一兩〕

右為細末醋糊丸如梧子大每服五十丸溫酒空心下一方無乾薑肉桂白朮有白薇人參

坐導藥方　夫求子者服藥須有次第不得不知其次第謂男服七子散女服蕩胞湯及坐導藥并服紫石門冬丸則無不得效矣

皂莢〔一兩去皮子〕　大黃　戎鹽　礬石〔燒〕　當歸〔各二兩〕
五味子　乾薑〔各二兩〕　細辛〔三兩〕　蜀椒〔一兩出汗〕　葶藶子
苦瓠〔各三分〕

右擣篩內輕絹袋子如中指許大長三寸盛之令滿內子門中坐臥意勿行走急小便時即出之仍易新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未見病出亦可至十日安之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用苦益菜煎湯洗一方無葶藶一方有礬霜二分著藥後日乃服紫石門冬丸

鍾乳丸　治婦人斷緒無子

鍾乳粉　白礬　生乾地黃〔焙〕　阿膠〔炙〕　紫石英〔研細〕
蜀椒〔去目炒出汗〕　五味子〔炒〕　蛇床子〔炒〕
禹餘粮〔火煅〕　石亭脂　牡蠣

右除石藥別研外餘並為末和勻鍊蜜和擣丸如梧桐子大每日空
心煖酒下二十丸漸加至三十丸

慶雲散 治丈夫陽氣不足不能施化施化無成

覆盆子 五味子各一升 菟絲子一升 天雄一兩 石斛
白朮各三兩 桑寄生四兩 天門冬九兩 紫石英二兩

右件擣篩爲散服方寸匕先食服日三素不耐冷者去寄生加細辛四
兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十五枚

治婦人久無子息

吳茱萸 白薇 白斂 白茯苓
細辛 牛膝 附子 人參 桂心一兩

右爲細末鍊蜜爲丸如桐子大每服十丸用溫酒送下食前

治婦人子臟風冷數令無子

皂莢 川大黃 白礬
當歸 五味子 川椒
乾薑 細辛

右爲末用綿裹如棗大內產門中有惡物下即出未効再用

熟乾地黃散 治婦人久無子斷緒者是子臟積冷血氣不調

熟乾地黃 牛膝 當歸 白薇
芎藭 卷柏 防風 柏子人 桂心

右爲散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓空心溫服

地黃湯 療久無子斷緒小腹冷疼氣不調

熟地黃 牛膝 當歸 卷柏 川芎
防風 牽牛子末 桂心

右以水八升煮取二升三合去滓分三服服別和一分牽牛
子末如人行四五里更進一服以快利止忌生冷葱熱麵蕎麥蒜
豬肉炙煿葵菜蕪荑菘菜海藻粘食臭物等

八真丹 治婦人無子

當歸 芍藥 地黃 川芎 鹿茸
阿膠 艾葉 續斷

右八味等分細末醋打麵糊爲丸如梧桐子大每服二十丸空心好酒
送下

白芷暖宮丸 治子宮虛弱風寒客滯因而斷
緒不成孕育及數落墮胎或帶下赤白漏下五色頭目虛暈吸吸少氣
胸腹苦滿心下煩悸脇腹刺痛連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不
食面色青黃肌膚瘦瘁寢常自汗

禹餘糧 白薑 芍藥 白芷 川椒
阿膠 艾葉 川芎

右爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十丸米飲下或溫酒醋湯亦得
常服溫補胞室和養血氣光澤顏色消散風冷退除百病自成孕
育性平不熱

大黃丸 治帶下百病無子服藥十日下血二十日下長蟲及青黃
汁三十日病除五十日肥白

大黃 柴胡 朴硝 乾薑
芎藭五兩 蜀椒二兩 茯苓

右爲末蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米飲下加至十丸以知爲
度五日微下

治婦人無病緣禁久不生子

右常候月水絕後一日接爲男二日爲女三日爲男四日爲女五
日爲男六日爲女過此女門閉不成勿復交接更待後月逮燕無
益須辛苦也宜用後方

柏子人丸 治婦人無病緣禁久不生子

用柏子人一升茯苓末二升擣合乳和服十丸即佳

又方

大黃七分 熟參五分 皂莢 杏人 吳茱萸
半夏 前胡

右擣篩鍊蜜爲丸每服二十丸不過半年有子依前法即定男
女也

治婦人不生者

胡椒 艾 熟薑 花椒 砂仁
官桂 茴香

右為末漢入猪肚内縫合煮熟每日清早辰剋二兩好酒三五盞服
之肚腹熟子懷爲孕

承澤丸 治婦人下焦三十六疾不孕絕產

梅核人 辛夷 葛上亭長七枚 溲疏二兩
藁本一兩 澤蘭子五合

右為末蜜和丸如大豆先食服二丸日三不知稍增若腹中無堅癖
積聚者去亭長加通草一兩惡甘者和藥先以苦酒搜散乃内少蜜
和為丸或軟飯為丸温酒送下亦可

陽起石丸 治婦人子臟虛冷勞傷過度風寒結搏又不受胎
絕子不產此藥能張之大益子宮消冷積冷

陽起石 吳茱萸 熟地黃
牛膝 乾薑 白朮

右為細末蜜和擣三百杵丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸
温酒或温米飲下空心食前日二服若覺有孕即止

抑氣散 出危氏方 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿體痛怔忡

皆可服之香附子乃婦人仙藥也不可謂其耗氣而勿服

香附子 炒去毛 茯神 去木 橘紅 二兩 甘草 炙一[illegible]

右為細末每服二錢入鹽少許食前湯調服仍兼進紫石英丸後
可服煎劑 先用湯蕩丸將金丹等諸藥大妙

專治婦人下元虛冷定子湯

血竭一錢 大黃半兩 紅花半兩 臙脂 大研

右為細末一處同煎熬成膏子如大豆大每服一丸服至七日再加
一丸至七日服三丸一月見效

大黃湯 出聖濟方 治婦人月水不利結積無子

大黃 剉炒 桃人 湯浸去皮尖雙仁炒 蝱蟲 去翅足微炒
水蛭 糯米同炒米黃去米

右剉如麻豆每服一錢匕水一盞煎至七分去滓空腹温服如無結積
不可服 一方無水蛭

治婦人無子

以二三月選丁亥日採取桃花陰乾為末入麝香硃砂人參甫并夜
水下取戊子日下同為細末當信用行温酒下二服並驗妙

療無子臟冷宮内炙丸 出聖惠方

麝香二分 吳茱萸十分 [illegible] 蜀椒六分 [illegible]

右搗篩蜜丸酸棗人大以綿裹內產宮中留少綿線出覺憎寒不
不淨下多即抽綿線出却丸藥一日一度換之無問晝夜皆內無所
忌也

又方 出聖惠方

蛇床子 石鹽 細辛 乾薑 土瓜根 各四兩

右搗散取如棗核大以綿裹內子宮中以指進之依準前法中間
病未可必不得近丈夫餘無所忌並效

療婦人子臟偏僻令結無子坐藥方 出聖惠方

蛇床子三兩 芫花五兩

右搗篩取棗大紗袋盛內產門中令没指袋少長作頂去任意卧

著臍風冷

茱萸丸 出聖惠方 治婦人陰寒十年無子

吳茱萸一升 蜀椒一升 去目

右為末如彈子綿裹導子腸中日再易無所下但開子臟令溫即
有子也

驗胎法 出婦人方 婦人經脈不行已經三月者欲驗有胎
用川芎生不見火為細末空心濃煎艾湯調下方寸匕覺腹內微動
則有胎也如胎不轉動腰重如石可用西調下

治婦人無子及令事

雞子設 綿子

右酒糊丸每服二十丸空心酒下此藥盡見効

暖宮丸 治衝任虛損下焦久冷臍腹㽲痛月事不調或來多不斷或過
期不至或崩中漏血赤白帶下或月再行淋瀝不止帶下五色經脈將
至臍腹冱痛連腰腿心便白蜀面色萎黃臍腹惙怯口苦飲食不進漸
至氣弱及治子宮久寒不成胎孕

附子 炮 杜仲 地榆 續斷
沙參 厚朴 黃耆 白歛

川牛膝（去苗） 川白芷 北細辛（去葉） 乾薑 蜀椒（各二分）
右為末，鍊蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，溫酒下，服之一月，自然有
孕。多服四打易產，丸不效，或囊易產下。
辛夷丸（出[illegible]方）治婦人子宮留受風冷，多致胎氣不固，常有損墮，宜
子宮風當服之。
嫩鹿茸（去毛酥炙） 北細辛 黃芪（蜜炙） 當歸（各二兩）
藁本頭 京芎藭 川白芷 牡丹皮 川芎
乾薑（炮） 肉桂（去皮） 小黑豆（炒） 芍藥（各一兩） 防風
川椒（去目，炒出汗）
右為末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服四五十丸，用溫酒或艾醋湯送
下，空心食前。
八珍散（出[illegible]方）治婦人靈深間內閉，常以無子為憂，思慮過多，傷損
脾氣，脾虛則不能制水，漏五色之證，或只常下赤白水，宜服此藥。
人參 白朮 粟米（微炒） 白茯苓 厚朴（薑製，各
益智（一兩） 黃芪（二兩） 甘草（半兩）

廣嗣紀要 卷十六 十六

右為散，每服三錢，薑三片，棗子四個，煎至八分，空心服。
千金保生丸（出[illegible]方）若服調氣和血，覺得氣調血足，但未受娠，則須去地
藥再服此藥，以資子宮，須經候通三日，復再擇自然成娠，無殘而不娠
者，由宜多服此藥，自然娠孕。
防風 石膏 糯米 川椒（去目，炒） 北藁本
秦艽（去土） 厚朴（去皮） 貝母 北細辛 石斛（去根）
大豆黃卷 白薑 火麻仁（去殼，一兩）
甘草（炙，一兩） 熟地黃 當歸 沒藥
右末，煉蜜丸如彈子大，每服空心，用北棗四枚，煎湯嚼下，日二服，
不可用酒下，恐變動了真氣，不能護血。
乘香勝金散（[illegible]）治婦人血不和，須先調其榮衛，使之有度，則服千
金保生丸，乃服有娠。
當歸（二兩） 白薇（一兩） 沒藥（一分） 玄胡索（去皮） 藁本頭
綿黃芪（炙，一兩） 京芎藭 甘草 肉桂
紫石英（煅） 白朮 白石脂（煅） 川芎 白茯苓

人參 川白芷 白牡丹皮 沉香（[illegible]）
右為末，每服二錢，溫酒調下，空心服。又水一大盞，薑三片，北棗二枚，
同煎，若盛煩作熱，每服之時，入生地黃汁一合，同煎一服。
治勞損產後無子，陰中冷溢出，子門閉，積年不瘥，身體寒冷方（千金方）
防風（一兩半） 桔梗（各三十銖） 人參（一兩） 菖蒲 半夏
丹參 厚朴 乾薑 紫菀 杜蘅（各十八銖）
秦艽 白歛 牛膝 沙參（各半兩）
右十四味為末，白蜜和丸如小豆，食後十五丸，日三服，不知增至二
十丸。有娠止，夫不在勿服之，服藥後七日方合陰陽。
歸艾丸（出[illegible]方）治婦人平生無子，服之屢驗。
生地黃（一斤） 生薑 白芍藥
當歸 熟艾
白茯苓 延胡索
右除艾葉外，各焙乾為末，入前件地黃、生薑汁，作一處，煉蜜丸如梧桐
子大，每服五十丸，空心酒下，一日三服。

廣嗣紀要 卷十七 十七

麝香圓（出[illegible]方）治婦人陰中冷，或成白帶，淋瀝不斷，又無子，令
零陵香 藿香 蛇床子（半兩） 吳茱萸 枯白礬
木香（各三錢） 麝香（二分） 丁香 龍腦（各一錢） 不灰木
白芷（各[illegible]） 龍骨（半兩）
右為細末，煉蜜和丸，每兩作四十丸，每用一丸，綿裹內陰中。
麋茸萬病丸（出[illegible]方）補養氣血，又服令人有子方
熟乾地黃 當歸 麋茸（酥炙）
右件各等分，為細末，煉蜜丸如梧桐子大，空心食前米飲或溫酒下
五十丸。
附子當歸丸（[illegible]）治血臟虛冷方
當歸（三兩） 芍藥（二兩） 附子 白朮（各一兩）
右為細末，醋煮麵糊和丸，如梧桐子大，米飲下三十丸，未效加至五
十丸，空心服。
壯陽令人有子（[illegible]） 以鹿頂骨髓塞者服之
令人有子（[illegible]）
以正月十五日，[illegible]婦[illegible]於富家會所盜之，勿令人知之[illegible]

床下當月有娠
令人有子 [illegible]
以正月雨水夫妻各飮一盃還房當孕有子神效也
令婦人有子 [illegible] 以狗骨煎汁常常飮食之效 [illegible]
令生男兒 [illegible] 以虎鼻懸戶上
療婦人無子
二月丁亥日收桃杏花陰乾爲末戊子日和井花水服方寸匕日三服

姙娠 附論

夫何以知婦人姙娠脉平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉動甚者姙子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按之不絶法姙娠也三部脉沈浮正等按之無絶者有娠也姙娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也姙娠四月欲知男女者左疾爲男右疾爲女左右俱疾爲產二子又法左手沈實爲男右手浮大爲女左右手俱沈實猪生二男俱浮大猪生二女尺脉若左偏大爲男右偏大爲女左右俱大産二子大者如實狀又法左手尺中浮大者男右手尺中沈細者女若來而斷絶者月水不利又法左右尺俱浮爲產二男不然女作男生俱沈爲產二女不爾男作女生又法得太陰脉爲男得太陽脉爲女太陰脉沈太陽脉浮又遣姙娠人面南行還復呼之左迴首者是男右迴首者是女又看上圊時夫從後急呼之左迴首是男右迴首是女又婦人姙娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女姙娠欲知將產者懷姙離經其脉浮設腹痛引腰脊爲今出也但離經者不病也又云欲生其脉離經夜半覺痛日則生也○夫原立本章有太初有太始有命一月旣見氣矣故曰太初旣立形矣故曰太始氣和形始天地相因生生化化品物彰矣故曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生有生之初躬陽爲之主育而充之以陰爲之主因形移易日改月化無非神道之代終也謂之姙陽旣交始陰壬之也謂之胞已爲正陽陰包之也謂之胚未成爲器猶之坯也謂之胎也既食於母爲口呂也若娠則以時動也

若懷則以身依之也天之德地之氣陰陽之至和相與流薄於一體唯能順時數謹人事勿動而別生育之道得矣觀四序之運生長收藏皆出萬物有儀則咸備而天地之氣未始殽亂者蓋陰陽相養以相濟也昧者曾不知此乃欲拂自然之理謬爲求息之術以且相生死於五行斷歸養於藥石以偽勝眞以人勝天雖或有子孕而育者而不壽者矣夫書人論年老有子者男不過盡八八女不過盡七七則知氣血在人固自有量夫豈能逃陰陽之至數哉○大全良方云男爲血方脉爲氣血爲營而衛陰陽配偶不參差兩臟通和皆類例血衰氣旺定無孕血旺氣衰應有體 [illegible] 尺微關滑尺帶數流利往來并雀啄小兒之脉已見數月懷胞猶未覺 [illegible] 左疾爲男右爲女流利相通速來去兩手關脉大相應已形亦在前通語 [illegible] 左手帶縱兩箇兒 [illegible] 右手帶横一雙女 [illegible] 左手脉逆生三男 [illegible] 右手脉順還三女 [illegible] 寸關尺部皆相應一男一女分形證 [illegible] 有時子死母身存或即母亡存子命 [illegible] 最利骨數相參皆督脉陰陽虛脉得明遍滿胃皇皆逆氣來三部通 [illegible] 左手太陽手太男 [illegible] 右手太陰兄女 [illegible] 諸陽爲男諸陰女指下分明長記取 [illegible] 三部兒正等無絶尺內不止眞胎婦 [illegible] 夫乘妻兮縱氣霧 [illegible] 妻乘夫兮横氣助 [illegible] 母乘子兮順氣護 [illegible] 小兒日足胎成聚身熱脉亂無所苦 [illegible] 汗出不食吐逆時精神結備其中住 [illegible]

[illegible]

三月[illegible]但疾不散[illegible]

五月母脉[illegible]若沉細而微[illegible]

[illegible]

○又云孕育論經云少陰脉動甚者有子厥旨何也曰

手少陰之經屬心足少陰之經屬腎心之所主者血腎之所主者精

血合氣而成之也然而胞門子戶又所以為精血之會其於尺部二脉

尤有可驗者焉且婦人尺部之脉滑且疾血實必主月事不行若其

斷絶或中絶而不至者此皆無孕惟滑而不絶甚無間斷於其間此則

真胎孕之脉也婦人懷胎臟氣擁閉不可多睡不可憂慮勞役不可嗔

食粘滞辛辣煎煿之物又不可妄施針灸所貴時行數步調暢血脉使

氣得其平若酒麵炙煿熱毒并若感觸風邪得疾[illegible]

破血動胎若七情內傷飲食縱恣則易致漏胎若腹痛胎未足月而早

若覺則驚動胎轉未得若抱持不正令兒下腹後之若近產多要寬解犯禁忌

則易產難既產之後或過用心力或兼看視風或血虛氣逆或產後[illegible]

實則血運脉閉之證生矣然而安胎之法有二因母病以致動胎者但

療母其胎自安或胎氣不堅因觸動以致母病者則安胎而母自產以

探丈為孕歸湯各半縮砂佐之為[illegible]產之劑前所謂四物湯加吳茱

萸入醋突前黑神散用乳香前湯調下皆其要藥產後血暈以苏合

器燒煙從向其鼻次則五靈脂末半生半炒入蘇合香丸百沸湯調與

之或黑神散入醋少許調以紫蘇湯又佐奪命散用童子小便且調

劑可也預孕驗法婦人面色青手足冷指甲黑而且過臍不[illegible]腹痛

害且或面青唇青以至舌間黯黑口角未出則不容以人力勝之人要

停產腹痛為勿驚動且須凭物而行直至腰疼子逼胃門方可用力為

腎繫於腰而胎繫於腎故也倘於產下用理中丸然寒其而滯不若用

理中湯倍於小兒初誕多用黃連然甚苦傷胃不若但用甘草炙前綿

蘸入口良又速用惡物自出倍於胎孕已成多服保胎枳殼散然枳殼

破寒頁以縮砂烏藥為佐產後飲食未飲勿用產後鹽洗沸湯是當戒

血以四物湯為以黑神人所共知也若夫順氣等劑胎前產後尤當兼

施而並用之血運昏迷切勿用降真香宜之以塞其氣

方

白朮湯[illegible]治妊娠血液虛衰羸弱難以運通動氣滯痞麻腎備不能

宣通常服養液潤燥開通結滯令血易歐

白朮 兩　寒水石　當歸　黃芩　芍藥

人參　石膏　乾葛　防風　縮砂

藿香　甘草　茯苓各一　木香一錢

右為細末每服三錢水一盞生薑一片同煎至六分去滓温服日三

文又貪服人參半夏加一般為妙崔宣武方用白朮一兩

白朮散[illegible]治妊娠氣不調和飲食易傷

白朮炒　乾紫蘇[illegible]　人參　白芷炒三　川芎

訶子皮　青皮各半　甘草一分

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至七分温服○經云飲食自倍

腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷於五味若妊子飲

食不節生冷毒物恣性食啖致傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯

此木香丸白朮散二方最為穩捷

木香丸[illegible]治婦人有孕傷食

木香二錢　三稜　人參　白茯苓各三

右為細末麵糊丸如菉豆大熟水吞下四十丸

胎孕丸 [illegible]月[illegible]息胎法[illegible]

用猪肚一個具依法用葱五味煮熟食食如不盡更食以盡為度

不得與別人食無効

犀角散[illegible]治妊娠婦人產前[illegible]因[illegible]時發昏眩

犀角　山梔子　黃連　青黛

捸參

川芎　川羌活　吳白芷　甘草炙　茯苓去皮已上

右為麄末每服五錢水一盞半生薑三片竹葉五七葉同煎至一盞

去滓溫服食前

治妊娠痰腳常多[illegible]身上取[illegible]令心中寬[illegible]

白朮　續斷　吳茱萸　防風　當歸

人參　芎　五味子　甘草炙　細辛

右為細䂓為末每服三錢水一盞二分生薑三片棗二枚同煎取一

盡空心喫

治姙娠渾身碎痛并腹內疼痛不可勝忍悶亂欲死方 出[illegible]

白朮　當歸　芍藥　川芎　黃芩各一分

右細剉羅為末每服三錢水一盞二分煎取一盞一分空心去滓喫

法 徒產宜知

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖瘂聾聵頑愚癲狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓屍柩之傍皆悉不可犬又會如法則有福德大智善人降托胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法 出便產須知

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男仍遇月宿在貴宿日又以夜半後生氣時寫精者有子皆男必壽而賢明高爵也若以經絕後二日四日六日寫精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

推王相日法 出[illegible]

春甲乙　夏丙丁　秋庚辛　冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日

二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十二日二十七日

三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日

四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十二日二十八日

五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五日十六日二十日二十五日二十八日二十九日三十日

六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日二十七日二十八日二十九日

七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日二十六日二十七日二十九日

八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十三日二十四日二十五日二十六日

九月三日六日十一日十六日二十日二十一日二十二日二十四日

十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十日二十二日二十九日

十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日十九日二十六日二十九日

十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十七日二十四日二十七日

若春合甲寅乙卯夏合丙午丁巳秋合庚申辛酉冬合壬子癸亥與上件貴宿日合者尤佳

胎前避忌 出產寶諸方

初受胎後凡妨胎藥物並不宜服或房勞不戒能令胎孕不安或[illegible]六七箇月後醉飽過度房事不節主母多有疾病橫產之災甚則傷胎不宜登高擧重或至跌撲挫閃損胎害人入月則[illegible]此時運險[illegible]驚動生子顛癇[illegible]初出俗謂截生產子患胎癎

姙娠食忌 出便產須知

食雞子乾鯉魚令子多瘡〇食[illegible]令[illegible]〇食兔肉令子缺唇〇食犬肉令子無聲〇食酒多食進肉令子無恥〇食椹子及鴨子令子倒出〇食驢馬肉令延月〇食魚鱉子傷兒〇食山羊肉令子多病〇食騾肉令產難〇食雞肉及糯米令子腹中多蟲〇食水漿令絕胎〇食雀肉豉醬令子淫亂無恥〇食螺螄令子[illegible]產姙娠六七月多食五辛炙煿酒麵令子胎熱〇多食水瓜菱茶等生冷菜菓令子患胎寒〇大小便向非常之地令半產殺兒此大忌之

食忌起居

羊肝多食生子多厄難○雞蛋同食○食蟹生子橫生○子薑多食子生多指○乾薑蒜雞毒○兔肉化傷胎○鱉魚不可食○雀肉多飲酒產難○有大毒有食之多延子

風雨天○勿亂服湯藥○酒勿過量以產九忌○勿亂針灸○勿向非當地便旋半產殺人○勿舉重登高涉險○必有大驚子必癲疾宜自勞○勿多睡臥時行步○體虛氣不足子必睡眠破不今宜服藥脾胃不和榮衛虛怯子必羸瘦○自取鄉象與悅其胎兒氣損命○勿犯損傷○最忌打擊者色青者損胎墮

右此等及胎前切宜避之

胎前藥忌

蝟皮虻蟲硫黃　代赭硇砂巴豆霜　水銀輕粉生金屑

消石三品牙朴芒　兔肉雞卵犀角羽　牽牛牛膝川白薑

天雄附子川草烏　南星半夏及蜈蚣　紅花芫花并大戟

白殭蠶牡丹皮　槐子皂角烏蛇皮

桃仁三稜乾漆共　茼草通草瞿麥俱　茅根葵根蟹甲木

牛黃蛇皮生犀角　蚖青斑猫并地膽　衣魚水蛭及蠐螬

蝗蚤金石雄雌甲　野葛松蘿芫青　鯪鯉兔肉細馬子

芙中莫食大小蒜　麝香及鼈蛇蛻　消遣以前切忌諸

養胎胎教 附論

夫至精纔化一氣方凝始受胞胎漸成形質子在腹中隨母聽聞自妊娠之後則須行坐端嚴性情和悅常處靜室多聽美言令人講讀詩書陳禮說樂耳不聞非言目不視惡事如此則生男女福壽敦厚忠孝賢明不然則男女既生則多鄙賤不壽而愚此所謂因外象而內感也昔太任娠文王目不視惡色耳不聽惡聲口不出惡言世傳胎教之道是謂此也○丹溪論子嗣之失然則婦人之所以無子者何也按巢氏病源云婦人無子者蓋有三焉一者墳墓不祀二者夫婦年命相剋三者夫有五病婦病皆令無子二者又不然有可以服藥而後能有子餘皆不可致也○觀是說亦未見當有人以婦人無子問西京常器之者乃曰女人自少多病服燥藥無節使天癸耗動且早故然矣無子又有問襄陽宋大夫者亦然然則婦人妊娠有兩胎者何也按古今方書並無論及此者惟巢氏論云陽施陰化精氣有餘故生二胎且謂尤一胎之理其精有變耶今觀婦人有兩胎者其精神氣血盛無少異至於教有偏治或問成兩胎者有俱男俱女者有一男一女者道藏經云有求子法云婦人月信初止後一日三日五日值男女旺相日陽日陽時交合者子多男若男女其受皆壯則多子一有怯弱則少子以此推之理可驗見焉又婦人妊娠男女之別何也按聖濟經云陽盛陰負當孕男女六腑諸經皆與其陽陰盛發陰當孕女又六臟諸經皆與其陰巢氏病源云三陽所會則生男三陰所會則生女蓋其後方云男從父氣女從母氣聖濟經云天之德地之氣陰陽之至和相為流薄於一體因氣而左動則屬陽陽資之則成男因氣而右動則屬陰陰資之則成女易稱乾道成男坤道成女此男女之別也凡妊娠胃氣以為瘍傷胎破血者亡忌何也內經云婦人重身毒之何如岐伯答曰有故無殞亦無殞也衰其太半而已也

蓋此婦人亦不可不預護其以寒審覆其毒藥性高下

衰以中病不必多藥恐其疾勢已衰藥尚宜更則病去母安子亦無損復何還以攻治哉○凡婦人妊娠十月其說見於古書有不同者多矣按巢氏病源論婦人妊娠一月名胎胚足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎當此之時血不流行形象始化未有定儀見物而變欲子端正莊嚴常令見貴人不可見狀貌醜惡人也欲生男宜操弓矢乘牡馬欲生女宜著珥璫施環珮欲子美好玩白璧觀孔雀欲子賢能宜看詩書務和雅手心脈養之四月始受水精以成血脈手少陽脈養之五月始受火精以成其氣足太陰脈養之六月始受金精以成其筋足陽明脈養之七月始受木精以成其骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月五臟六腑關節人神皆備此其大略也又五臟論有耆婆要者論一月如珠露二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足又有然者亦然又顱顖經云一月為胎胞

精血凝也二月為胎形成胚也三月陽神為三魂四月陰靈為七魄五
月五行分五臟也六月六律定六腑也七月精開竅通光明也八月元
神具降真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足萬象成也今
推究其說之理如五臟論者皆是意過不經性生妄託其名至於三藏
佛書且語涉怪誕漫不可考今按顱顖經三卷云中古巫方所撰隱人
巢氏亦嘗序之今巢氏論婦人妊娠乃不見言之聖濟經亦化篇亦
獨取顱顖經更不言巢氏論者何哉豈不見錢氏集云小兒方論起自巫
方氏云吾不能察幼小惟有巫方能知小兒之壽夭耳及觀巢氏
論小兒候亦云中古有巫方立小兒顱顖經以占壽夭世所相傳者有
少小方焉是則巢氏論小兒則取於顱顖經則是未盡其理故不言之若
聖濟經者但取其文句不若巢氏之論其間有胎教之法為可取所以
巢氏論妊娠至三月始胎之形欲令見貴人並兼君子操弓矢施環佩觀
孔雀讀詩書之類豈非胎教之理乎若詳推巢氏所論妊娠脉養之理
若足厥陰肝脉也足少陽膽脉也為一臟腑之經餘皆如此且四時之
令必始於春木故十二經之養始於肝也所以一月二月手心主心胞

絡脉也手少陽三焦脉也屬火而夏旺所以胎養在三月四月也屬手
少陰心手太陽小腸者以君主之官無為而尸之也足太陰脾脉也足陽
明胃脉也屬土而旺長夏所以胎養在五月六月手太陰肺脉也手陽
明大腸脉也屬金而旺秋所以養胎在七月八月足少陰腎脉也屬水
而旺冬所以養胎在九月又況母之腎臟繫於胎是母之真氣子之所
賴也至十月兒於母腹之中受足諸臟氣脉所養然後待時而生此論
奧微而有至理餘書所論皆不能及也觀此則知巢氏之論世更有明
之者亦未有過於巢氏之論矣余因述其說○又曰王氏脉經云至貴
人倫莫不重今世希究論者且謂夫婦配合陰陽奇耦乾道成男坤
道成女天元一氣既已姙孕自可格護胎息無犯禁忌生子必賢明壽
考今人嗜慾為樂殺戮性命及又房勞如鳥數御之亦有恃益房勞絡
脉衝而經脉運動之間胎氣亦隨經絡所損數產傷胎墮子皆從此
得然間有一陰生悖惡專夭則患胎驚變生諸病難救療豈不痛哉○
又曰姙娠臟腑筋脉虛滯關節壅塞切忌貪寢不可等閑服藥針灸
思慮悲哀驚恐胎孕須要數數行步竟經日行三千步用溫水濯足浮

浴不可盡防水氣侵胎可保無危八九箇月食葵菜臨產直數弱飲或
嬾者難產才產得飽食則氣順下必易分娩自然無病飢渴氣
之大全熱物損○又云孫真人大寶姙娠唯在抑陰助陽素問陰搏
陽別謂之有子蓋謂前為陽關後為陰尺中之脉按之搏手而不絕也姙
子也婦人平居陽氣微盛無害及其姙子則方閉經隧養胎若陽盛
搏之則經血妄行胎乃不固素問陰虛陽搏謂之崩其抑陽助陰之方
甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交雜別生他病惟是內補佐之使
陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎嗣此前人未嘗論及以二味熟
乾地黃四兩酒浸當歸二兩酒浸焙乾息以全人命更得明醫喻於人室
莫大焉○氣質生成章具天地之性集萬物之靈陰陽平均氣質完備
成其自然而奇偶異數有術有耗則剛柔異用或強或羸血榮氣衛不
能逃於消息盈虛之理則寡貧之切詎可一槩論是以附贅垂疣駢拇
枝指侏儒跛蹩形氣所賦有如此者瘖瘂聾盲瘖啞痞瘵
氣形之病有知此者則胎化之始精移氣變之後保衛輔翼固
有道矣天有五氣各有所涉地有五味各有所入養有節適所入有

度量凡所畏忌悉知戒慎資物為養者理固然也寢興以時出處以節
可以高明可以周密使霧露風邪不得間而入因時為養者理宜然
也以至調喜怒寡嗜慾作勞不妄而氣血從之皆所以保攝姙娠使諸
邪不得干焉苟不然方授受之時一失調養則內不足以為中之守外
不足以為身之強氣形弗充而疾疾因之若食兔脣缺食犬無聲食雜
魚而瘡癬之屬皆以食物不戒之過也心氣大驚而癲疾腎氣不足而
解顱脾胃不和而羸瘦心氣虛乏而神不足之屬皆以氣血不調之過
也誠能食飲知所戒推而達之五味無所偏傷誠能於氣血知所調推而
達之邪氣無所乘疾乃生育相待而成者故曰天下人不足○姙娠之
人有宿挾痼疾而後有娠或有娠時節適當理致生疾病並令臟腑衰
損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其疾病益其氣血以扶養胎者也
○姙娠將理無方脾胃不足飲食減少不能行榮衛化精微養衝任致
令胎臟內弱子氣不足生化稍弱是元方論母病療母則胎安是也若
使脾胃和而能飲食水穀化而運氣血則何慮胎氣不長也○又云人
由受氣至於有生十二經脉迭相滋養於之物世得寒暑之正土地之宜

無物不長凡懷胎中或有萎燥者蓋由妊婦所稟怯弱不足自周陰陽
血氣偏係亦令胎失所滋養所以萎而不長也日月雖足亦
不能生育亦有後時致失者惟宜資母血氣使陰陽調勻本末相應則
胎從而有養矣又云妊娠一月謂之胎二月謂之始膏三月謂之
始胎當是之時血脈不流形象始化男女於此儀則未分隨感而應所
以孕婦欲令見端正之人不欲見偏僂侏儒之輩及猿猴犬馬怪
異之獸乃在臥宜息心靜慎物亂思恐形異夢而感不祥也妊婦所以
擇食者蓋假五氣五味生成五藏氣味各隨所喜而歸之陰陽應象論
曰酸生肝苦生心甘生脾辛生肺鹹生腎此五藏假五味以生也六節
藏象論曰臊氣入肝焦氣入心香氣入脾腥氣入肺腐氣入腎此五藏
假五氣以成也若形藏未備則隨其不足而受損心欲其氣味食之益
陽為氣陰為味氣化則精生味化則形長故以人之生也稟本於天形
本於地內經曰天食人以五氣地食人以五味正此之謂若夫天命既
分形質不完者皆孕婦擇食之時不得其氣味故視斜覷短偏傍傴僂
手足跛攣偏背傴僂此肝形之不備也言遲語吃或聾或瞶神氣昏塞
此心形之不備也胸背凸凹唇缺此脾形之不備也毫毛疏薄髮
黃禿落或虛毛通白皮膚偏赤此肺形之不備也毛髮焦黃形體羸小
五輭數歲不能行此腎形之不備也由是孕婦擇食偶其氣味生
成五藏一有不備病隨之譬由陶冶成器一或苦窳是水火之劑不
調豈四工之良哉

方

烏雌雞湯 治妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥毋
食腥辛是謂才正○妊娠一月足厥陰脈養不可針灸其經足厥陰內
屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事寢必安靜無令恐
畏○妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿
胞急卒有所下當預安之宜服

烏雌雞一隻治如食法　茯苓二兩　阿膠二兩
生薑一兩　吳茱萸一升　麥門冬五合　人參　芍藥
白朮各三兩　甘草
右㕮咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升內酒三升
并膠烊盡取三升放溫每服一升日三

補胎湯 大全良方 若曾傷一月胎者當預服此方

細辛一兩　防風二兩　乾地黃　白朮各三兩　生薑四兩
吳茱萸　大麥各五合　烏梅一升
右㕮咀以水七升煮取二升半分三服先食服寒多者倍細辛茱萸
熱多渴者去細辛茱萸加栝蔞根二兩若有所思去大麥加柏子人三合一
方有人參一兩　忌生菜蕪荑桃李雀肉等物

艾葉湯 千金 治妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿
勞百節皆痛是為胎始結○妊娠二月足少陽脈養不可針灸其經足
少陽內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也妊娠二
月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍
下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾葉湯

艾葉　丹參　當歸　麻黃各二兩　人參
阿膠各三兩　甘草一兩　生薑六兩　大棗十二枚
右㕮咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服一方
用烏雌雞一隻宿肥者治如食法割頭取血內三升酒中相和雞以
水一斗二升先煮取汁去雞內藥煎取三升內血酒并膠煎取三升
分溫三服忌海藻菘菜

黃連湯 千金 治妊娠二月曾傷二月胎者當預服此

黃連　人參各一兩　吳茱萸五合　生地黃五兩
右㕮咀以酢漿七升生薑三兩煮取三升分四服日三夜一十日一
修合若頗覺不安加烏梅一升者不用漿直用水一斗　用當歸半兩
忌豬肉冷水蕪荑

雄雞湯 千金 治妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男
者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛
是謂外象而內感者也○妊娠三月手心主脈養不可針灸其經手心主
內屬於心無悲哀思慮驚動○妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便
難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脈腹滿繞臍苦痛或
腰背痛卒有所下

雄雞一隻治如食法　黃芩　白朮　生薑各一兩　麥門冬五

芍藥四兩 大棗十二枚擘 甘草 人參 茯苓

阿膠各二兩

右㕮咀以水一斗五升煮雞減半出雞內藥煮取半內清

酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡當溫臥一方用當

歸芎藭各二兩不用黃芩生薑忌海藻菘菜酢物桃

李雀肉等

茯神湯出千金方若曾傷三月胎者當預服此

茯神 丹參 龍骨各一兩 阿膠 當歸

甘草 人參各二兩 大棗二十一枚 赤小豆二十一粒

右㕮咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日後服一劑腰

痛者加桑寄生二兩一方有薤白二兩麻子一升忌同前

一方用水煎服

菊花湯出千金方治妊娠四月始受水精以成血脈食宜稻粳羹宜魚

雁是謂盛血氣通耳目而行經絡妊娠四月手少陽脈養不可

針灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和

心志節飲食妊娠四月有寒心下慍慍欲嘔胸膈滿不欲食有熱

小便難數數如淋狀臍下苦急卒中風寒頸項強痛寒熱或驚動

身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下

菊花如雞子大一枚 麥門冬一升 大棗十二枚 人參一兩半 甘草

當歸各二兩 麻黃 阿膠各三兩 半夏四兩 生薑五兩

右㕮咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫

臥當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞一隻煮水煎藥忌

羊肉海藻菘菜餳等

調中湯出千金方若曾傷四月胎者當預服此

白芍藥 生薑各四兩 厚朴 生李根白皮 枳實

白朮 柴胡各三兩 續斷 芎藭 甘草各一兩

當歸一兩半 烏梅一升

右㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日之後復服一劑

一方有半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉

阿膠湯出千金方治妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深

其居處必厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸

調以五味是謂養氣以定五臟○妊娠五月足太陰脈養不可針灸其

經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大飢無甚飽無食乾燥

無自炙熱無大勞倦○妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有

寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓

欲仆卒有所下

旋覆花一合 人參一兩 生薑六兩 當歸 芍藥

甘草 黃芩各二兩 吳茱萸七合 阿膠四兩 麥門冬一升

右㕮咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分

四服日三夜一先食服便愈不差再服一方用烏雌雞一隻割取咽

血內酒中以水煮雞以煎藥減半內酒并膠煎取三升半分四服忌

海藻菘菜

安中湯出千金方若曾傷五月胎者當預服此

黃芩一兩 當歸 芎藭 乾地黃 人參各二兩

甘草 芍藥各三兩 生薑六兩 麥門冬一升 五味子

大麻仁五合 大棗三十五枚

右㕮咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日復

服一劑忌如前

麥門冬湯出千金方治妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞

無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變

腠理紉筋以養其力以堅背膂○妊娠六月足陽明脈養不可針灸其

經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美

無太飽○妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖

忽有所下腹痛如欲產手足煩疼

麥門冬一升 人參 甘草 黃芩各二兩 乾地黃三兩

阿膠四兩 生薑六兩 大棗十五枚

右以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服每如人行

三四里中間進糜粥一方用烏雌雞一隻煮水以煎藥忌海藻菘菜

蕪荑

柴胡湯出千金方若曾傷六月胎者當預服此

柴胡四兩 茯苓一兩 白朮 芍藥一兩半 甘草
麥門冬 芎藭各二兩 生薑六兩 乾地黃五兩 大棗三十枚
右㕮咀以水一斗煑取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生
冷及堅硬之物七日更服一劑大全方用黃芩二兩忌海藻菘菜蕪
荑桃李雀肉等
葱白湯出千金方治姙娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動
作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒當食稻粳以密腠理是爲養
骨而堅齒○姙娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰內屬於肺
主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲
○姙娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱腹
滿短氣常苦頸項及腰背強宜服
葱白十四莖 半夏一升 麥門冬一升 旋覆花一合
黃芩一兩 人參一兩半 甘草 當歸 黃耆各三兩
阿膠四兩 生薑八兩
右㕮咀以水八升煑減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日三

夜一溫卧當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強
責汗一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥大全
方忌羊肉餳海藻菘菜等
杏仁湯出千金方若曾傷七月胎者當預服此
杏仁 甘草各二兩 紫菀一兩 鍾乳 乾薑各二兩
麥門冬去心 吳茱萸一升 粳米五合 五味子三合
右㕮咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七日服
一劑一方用白雞一隻煮汁煎藥亦可用酒二升煎藥大全方忌
海藻菘菜
芍藥湯出大全方治姙娠八月胎受土精以成膚革和心靜息無使氣極
是謂密腠理而光澤顏色○姙娠八月手陽明脉養不可針灸其經手
陽明內屬於大腸主九竅八月手陽明九竅皆成無食燥物無輒失食
無忍大起○姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不
安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰
背苦冷而痛目䀮䀮

芍藥 生薑各四兩 厚朴二兩 甘草 當歸
白朮 人參各三兩 薤白切一升
右㕮咀以水五升清酒四升合煮取二升分三服日再夜一方用
烏雌雞煮汁煎藥大全方忌海藻菘菜桃李雀肉等
葵子湯出千金方若曾傷八月胎者當預服此
葵子二升 甘草 厚朴各二兩 白朮 柴胡各三兩
芍藥四兩 生薑六兩 大棗二十枚
右㕮咀以水九升煮取三升分三服日三凡十日一劑一方用烏雌
雞一隻煮水以煎藥大全方忌海藻菘菜桃李雀肉等物
半夏湯出千金方治姙娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備
飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力姙娠九月足少陰脉
養不可針灸其經足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆
成無處濕冷無著炙衣○姙娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝
心腰背痛不可轉側短氣
半夏 麥門冬 吳茱萸 當歸 阿膠各三兩

乾薑一兩 大棗十二枚
右㕮咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫分四服痢
即止一方用雌雞一隻煮汁煎藥大全方忌生血餳物等
猪腎湯出千金方若曾傷九月胎者當預服此
猪腎一具 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黃
芎藭各三兩 白朮 附子中者一枚 大豆三合 麥門冬一升
右㕮咀以水一斗煮腎令熟去腎內藥煎取三升半分四服日三夜
一凡十日更一劑大全方忌猪肉燕麥桃李雀酢等物一方有人
參無附子大豆
丹參膏出千金方一名滑胎丹參膏 治養胎臨月服令滑而易產○姙娠十月五臟
具備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生姙
娠一月始胚二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立
七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜
服滑胎藥入月即服此藥
丹參半斤 芎藭 當歸各三兩 蜀椒五合有熱者以大麻仁五合代

右㕮咀以清酒漬停一宿以成煎豬膏四升微火煎膏色赤如血
膏成新布絞去滓每日取如棗許納酒中服之不可近服至臨月乃
可服舊有常驗

甘草散（出聖濟總錄）令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步動
作如故兒生墮地皆不自覺

甘草一兩 黃芩一兩 白朮 乾薑 大豆黃卷
麻子人 桂心 大麥蘗（各三兩炒） 吳茱萸

右治下篩酒服方寸匕日三暖水服亦得

麥門冬散（出聖惠方）治妊娠一兩箇月惡食手足煩悶

麥門冬（去心） 大腹皮（剉兩分） 知母 人參（去蘆頭） 黃芩
枳殼（麩炒微黃各三分）

右為散每服四錢以水一大盞入葱一兩莖煎至六分去滓食前溫服

黃芩散（出聖惠方）治若胎傷三月胎當預服

黃芩 人參（去蘆頭） 阿膠（搗碎炒令黃燥） 當歸（剉微炒）
吳茱萸（湯浸七遍焙乾微炒）

右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫
服 如覺大段不安加烏梅一兩

苧根飲子（出聖惠方）治妊娠二三月胎動

生苧根二兩 甘草（半兩炙微赤剉） 黃芩 白芍藥 當歸（剉微炒各一兩）
阿膠（一兩搗碎炒令黃燥） 黃芩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入棗三枚煎至五分去滓食前
溫服

竹茹散（出聖惠方）治妊娠三四月胎動不安手足煩熱面色萎黃

竹茹 麥門冬（去心） 白茯苓 麻子人 黃芩（各一兩）
甘草（炙微赤剉） 石膏（二兩）

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫服

柴胡散治妊娠三四月氣壅惡食四肢節煩疼或腳膝虛腫

柴胡（去苗） 人參（去蘆頭） 甘草（炙） 紫蘇莖葉 大腹皮
陳橘皮（湯浸去白焙） 赤茯苓（各一兩） 木通（三分剉）

右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓食前溫服

赤茯苓散（出聖惠方）治妊娠四五月頭重耳鳴時時腹痛

赤茯苓 桑寄生 葶藶子（各一） 人參（去蘆頭） 防風（去蘆頭）
澤蘭（各三分）

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫服

人參散（出聖惠方）治妊娠四五月胎不安或有所下

人參（去蘆頭） 當歸（剉微炒） 芎藭 黃芩 艾葉（微炒）
桑寄生 熟乾地黃（各三分） 阿膠（二兩搗碎炒令黃燥）
甘草（炙微赤剉半兩） 吳茱萸（湯浸七遍焙乾微炒半兩）

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫服

乾地黃散（出聖惠方）治曾傷五月胎預服

熟乾地黃 甘草（炙微赤） 麥門冬（去心） 五味子 黃芩
桑寄生（各一兩）

右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每
於食前溫服

桑寄生散（出聖惠方）治妊娠五箇月胎不安腹內疞刺痛日夜不止不欲

言語四肢無力宜服安胎

桑寄生 木通（剉） 赤茯苓 當歸（剉微炒） 知母（各一兩）
甘草（炙微赤剉） 白芷 遠志（去心） 陳橘皮（湯浸去白瓤焙各半兩）
熟乾地黃（二兩）

右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓不拘時溫服

艾葉散（出聖惠方）治妊娠五六月忽患腹內疞刺痛無有惡血下日夜不止

艾葉 白朮 訶梨勒皮 枳殼（麩炒微黃去瓤） 當歸（剉微炒）
厚朴（去粗皮塗生薑汁炙令香熟各一兩） 阿膠（二兩搗碎炒令黃燥） 白芷
赤芍藥 艾葉（微炒各半兩）

右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時
候溫服

桑寄生飲子（出聖惠方）治妊娠五六月患心腹脹滿口乾腹中疞刺疼痛
不止

桑寄生 木通 生乾地黃 訶梨勒皮 白朮
赤茯苓 當歸（剉微炒） 芎藭（各一分）

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入葱白七寸豉五十粒煎至五
分去滓不拘時候溫服
柴胡散治妊傷六月胎預服
柴胡去苗 紫葳 白朮 麥門冬去心 熟乾地黃
芎藭 肉蓯蓉酒浸去皮切焙各半兩 甘草炙剉
右為散每服四錢以水一大盞入棗三枚煎至五分去滓每於食前服
茯神散治妊娠六七月忽驚四肢煩疼心悶口乾頭痛
茯神 黃芩 麥門冬去心 石膏各一兩 梔子人
甘草炙剉 秦艽去土各
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入竹瀝半合更煎二
兩沸不拘時候溫服盡服之
紫菀飲子出聖惠方治妊娠六七月傷寒欬嗽氣急心
紫菀洗去苗土分 桑根白皮各半兩 乾棗七枚 燈心二十莖
生薑 陳皮一兩去白焙
右細剉和勻以水三大盞煎至一盞半去滓食後分為四服日三夜

一服
葱白雞湯出聖惠方治妊娠七月忽驚恐動搖腹痛卒有所下足厥冷若
傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強悉主之
葱白十四莖 半夏湯洗七遍 黃耆 黃芩
生薑 阿膠炒令燥各二兩 甘草炙剉 人參去蘆頭 旋覆花各一兩
右細剉先取黃雌雞一隻理如食法先以水一斗煮雞取十五升去
雞下藥煎至三升入酒一升更煎至四升去滓每於食前溫服一
小盞
半夏飲子出聖惠方治妊娠七八月或因驚恐或是傷寒煩熱腹脹喘服
氣促腰重
半夏湯洗七遍去滑 黃耆 人參去蘆頭 麥門冬去心各一兩
黃芩 甘草炙剉各半兩
右細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分葱白七寸煎至五
分去滓不拘時候溫服
當歸散出聖惠方治妊娠八九月因誤損胎或胎不安腹內疼痛下血不止
胎死否未知但妊娠腹內疼痛或滿脹
當歸切焙 芎藭 桑寄生 艾葉炒各一兩
阿膠炒令燥各一兩
右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓入酒一合更煎三兩沸
不拘時候放溫服之
赤石脂散出聖惠方治妊娠八九月胎動時有所下腹內疼痛頭面
壯熱口乾手足逆冷氣上奔悶
赤石脂 白朮 當歸切焙 乾薑炮 蘆根
桑寄生 地龍炒 艾葉炒三分 鍾乳粉 芎藭
鹿茸酥炙去毛 熟乾地黃 厚朴去粗皮生薑汁炙各半兩
右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候
溫服
甘草散出聖惠方治妊娠十月滿足入月預服
甘草炙 黑豆炒熟 糯米 大麻子各一兩 乾薑炮裂
白茯苓 吳茱萸湯浸焙炒各半兩

右為散每服食前以糯米粥調下二錢若未入月不得輒服
地黃丸出聖惠方治妊娠氣血虛弱令胎不長和氣養胎
熟乾地黃 厚朴去粗皮生薑汁炙各一兩 芎藭 當歸切焙
龍骨 阿膠炒燥 白石脂 白茯苓去黑皮 柴胡去苗
刺薊 桑寄生 當歸 甘草炙剉 人參各三分
右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時候粥飲下
日三
人參丸出聖惠方治妊娠胎不長宜服養胎
人參 白茯苓去黑皮 當歸切焙 柴胡去苗 枳殼各分
厚朴 刺薊 桑寄生各一 甘草炙一兩
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前溫水吞下
方加阿膠一兩
熟乾地黃湯治妊娠胎萎燥瘦不長
熟乾地黃焙 甘草炙 白朮 白茯苓去黑皮各三分
阿膠炙 大棗 細辛去苗葉 人參 防風去叉
一

白芷各等分

右㕮咀每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

蒸大黃丸 治妊娠養胎令易產

大黃 枳實 芎藭 白术 杏人

芍藥 乾薑 厚朴 吳茱萸一兩

右為末蜜丸如梧桐子大空腹酒下二丸日三不知稍加之

當歸芍藥湯 治妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

當歸 白术 人參 麥門冬

芎藭 甘草 陳橘皮 前胡

白茯苓

右㕮咀每服三錢匕以水一盞入生薑三片棗三枚煎至六分去滓

食前溫服

白术湯 治妊娠胎萎燥覺腹脹面色黃黑腹脹虛冷

白术 芎藭 厚朴

當歸 人參 甘草 訶梨勒

右㕮咀每服三錢匕以水一盞入生薑一分煎至七分去滓溫服

日三

乾地黃湯 治妊娠氣血不足胎瘦不長

熟乾地黃 阿膠 芎藭 當歸 赤芍藥

甘草 人參

右㕮咀每服三錢匕水一盞入糯米少許同煎至七分去滓溫服

日三

白术散 治妊娠胎不長養

白术 芎藭 人參 阿膠

甘草

右為末每服三錢匕以葱糯飲調下日三一方如苦痛加芍藥心下

毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半大棗二十枚煎服

之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋漿水服

白术當歸湯 治妊娠胎萎燥胎損腹痛不可忍

當歸 芎藭 人參 阿膠

白术

艾葉

右㕮咀每服五錢匕以水一盞半入棗三枚拍碎同煎至一盞

去滓分溫二服空心一服午食前一服

橘皮湯 治妊娠虛冷胎萎瘁不長

陳橘皮 厚朴 當歸

人參 阿膠 白术

右㕮咀每服三錢匕以水一盞入生薑一分切棗三枚擘破同煎

至七分去滓溫服日三

熟乾地黃湯 治妊娠胎萎燥過時未產滋氣血益胞藏

熟乾地黃 當歸 熟艾 芎藭 阿膠

甘草

右㕮咀每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三

艾葉湯 治妊娠胞中虛冷致胎萎燥不長

艾葉 芎藭 當歸 乾薑 白术

右㕮咀每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三一方有甘

草炙乾薑

桑寄生湯 治妊娠胎萎燥不能轉動心中急痛

桑寄生 白茯苓 人參 萎蕤 白术

右㕮咀每服三錢匕以水一盞入粳米半合生薑一分切同煎至七

分去滓溫服日三

當歸湯 治妊娠胞中虛胎不榮長致令萎瘁

當歸 甘草 乾薑 芎藭 白术

右㕮咀每服二錢匕以水一盞入大棗三枚擘破同煎至七分去滓

空心溫服

白术散 調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎瘦不長或失於

將理動傷胎氣多致損墮懷孕常服壯氣益血保護胎藏

白术 川芎 川椒 牡蠣

右為細末酒調一錢日三夜一但苦痛加芍藥心下毒痛倍加川芎

吐唾不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服之復有發水服之

若嘔亦以醋漿水服之復不能者小麥汁服之已後其人若渴者大

麥麴服之病雖愈盡服之勿置已產而挾孕

當歸飲 治姙娠胎萎燥

當歸切焙一兩 芎藭 阿膠炙燥各二兩 白朮一兩

右為粗末每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三

阿膠湯 治姙娠胎萎燥全不轉動

阿膠炙燥四兩 當歸切焙一兩 甘草炙一兩 白朮二兩

右麁擣篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三

和氣散 常服養胎益氣安和子臟治胎中一切惡疾觀滑

地黃丸 治婦人血氣不足經候愆期至子宮不榮姙娠多病胎不長

成用熟地黃不拘多少切焙為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心煎當歸酒嚼下晝再亦得

治婦人懷胎不長

用鯉魚長一尺者去腸肚鱗以水煮沒內鹽及棗煑令熟取汁稍稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輙一作此令胎長大甚平安

轉女為男 附論

夫疑形殊稟章天地形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相資而立未始偏廢男女構精萬物化生天地陰陽之形氣寓焉語七八之數七少陽也八少陰也相感而流通故女子二七天癸至男子二八天癸至則以陰陽交合而兆始故也語九十之數九老陽也十老陰也相包而賦形故陰窮於十男能圍之陽窮於九女能方之則以陰陽相生而成終故也元氣孕毓皆始於子自子推之男左旋積歲三十而至巳女右旋積歲二十而至巳巳為正陽陰實從之自巳懷姙男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣其稟賦也體有剛柔脉有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易也以至分野異域則所產有多寡之宜吉事有祥則所夢各應其類故剛陽暴壞多女頹巽孚壞多男熊羆為男子之祥虺蛇為女子之祥是皆理之可推也胎化之法有所謂轉女為男者亦皆理之自然如食牡雞取陽精之全於天產者帶雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類潛通造化密移必於三月兆形之先蓋方儀則未具陽可以勝陰變女為男理固然也○又云張華博物志曰姙娠必謹所感感於善者生子必善感於惡者生子必惡故姙娠勿令見惡物異禽毒獸切忌騎馬犬兔龜鱉鴨鳥無鱗魚粘膩難消化物養氣調子宜節飲食積胎難產性務簡靜動止有節三箇月之後聽誦經典詩書諷詠靜處誠心目不視惡色耳不聽惡聲如此生子必賢明端正忠孝壽考也

方

丹參丸出千金方 治婦人始覺有娠養胎并轉女為男

丹參 續斷 芍藥 白膠

柏子人 甘草各二兩 人參 芎藭 白朮

吳茱萸 橘皮 當歸十八銖 白芷 乾薑各三兩

乾地黃一兩半 蕪荑十八銖 犬卵一具乾 東門上雄雞頭一枚 冠纓一枚燒灰各

右為末蜜和丸如梧子大酒服十丸日再稍加至二十丸

又方出千金方

用原蠶屎一枚以井花水服之日三服

轉女為男者蓋陽施陰化所以有娠遇三陰所會多生女子但懷娠二月名曰始膏精成為胞至於三月名曰始胎血脉不流象形而變是時男女未定故令於未滿三月間服藥方術轉令生男也出錦件

以斧置姙娠床下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置窠下一窠盡出雄雞神効此雖未試亦不可不知者法見三月尿雄雞谷處

凡受胎三月逐物變化故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義聰明無疾蓋須十月之內常見好景象毋近邪僻真良教也如有斛許傷胎治者有法又曰初覺有娠出千金方

取弓弩弦縛婦人腰下滿百日去之一法絳囊盛帶左臂

紫宮玉女秘法 姙娠三月已前

取雄雞尾尖上長毛三莖潛安婦人卧席下勿令知之驗

又法 取夫髮又手足甲潛安卧席下勿令知之

姙娠逆滿三月要男者 出千金

以姙娠半兩未中帶之要文者以姙娠帶之一方姙娠盛帶之

惡阻 附論

夫姙娠阻病者，謂之子病。巢氏病源謂之惡阻。若婦人禀受怯弱，或有風氣，或有痰飲，既姙娠便有是病。其狀顏色如故，脈息和順，但覺肢體沉重，頭目昏眩，擇食，惡聞食氣，好食鹹酸，甚者或作寒熱，心中憒悶，嘔吐痰水，胸膈煩滿，恍惚不能支持。不拘初娠，但疾苦有輕重耳。輕者不服藥亦不妨，重者須以藥療之。千金方有半夏茯苓湯、茯苓丸二方，專治阻病。然此二藥比來少有服者，以半夏有動胎之性。蓋胎初結，慮其易散，此不可不謹也。張仲景傷寒論云：婦人傷風，續得寒熱，發作有時，此爲熱入血室。有用黃龍湯者，小柴胡湯去半夏是也，蓋爲姙婦而設焉。且以白术散或人參丁香散、人參橘皮湯、醒脾飲等試之，亦效，皆不用半夏動胎等藥。服者知之。○水飲停積，結聚爲痰，人皆有之，少者不能爲害，多則成病，妨害飲食，乃至嘔逆。姙娠之病，若嘔逆甚者，傷胎墮胎，疾之由，皆胃氣不調，或風冷乘之，令胃氣逆，故斯病也，亦惡阻之一則。○

又曰：婦人所食穀味，化爲血氣，下爲月水。凡姙娠之初，月水乍聚，一月爲胚，二月爲胎，三月爲胎，胎成則男女分，方食於母而口有所嗜。此時血氣未用，五味不化，中氣壅實，所以臟腑不思穀味，聞見於物，故惡心有所阻也。其病心中憒悶，頭重目眩，四肢沉重，憎聞食氣，好食鹹酸。姙娠之初，經脉內閉，以氣食血當其之時，腸胃虛如散入臟腑者，素有痰飲，則飲與血搏，食飲輒吐，頭目旋暈，憎聞食氣，喜啖鹹酸，四肢倦怠，不自勝持，多卧少起，痰熱困倦，名曰惡阻。已產之後，胞外餘血收聚，是利，名曰惡露。蓋惡者不善不爭之義，阻者阻礙之阻，血搏痰飲，伏於胞絡，難除也，當漸消之。露者，露水之露，蓋於胞臟，隨胎而至，不可遽當急遂之。由是之胎前曰惡阻，後曰惡露，古人命名深有意也。惡阻病者，心中憒悶，頭重眼眩，四肢沉重，懈惰不欲執作，惡聞食氣，欲啖鹹酸，多睡少起，世云惡食是也。乃至滿三月、四月日已上，大劇者不能自勝舉也。此由婦人本虛羸，血氣不足，腎氣又弱，兼當風取冷太過，心下有痰水挾之，而有姙也。血脈已閉，水漬於藏，藏氣不宣，故心煩憒亂，氣逆則嘔吐血。脈不通，經絡否澀，則四肢沉重，挾風則頭目眩。故有胎而病惡阻，所謂欲

有胎者，其人月水尚來，而顏色肌肉如常，但沉重憒悶，不欲食飲，不知患所在，脈理順時平和，即是欲有胎也。如此，已經一月日也。

方

半夏茯苓湯（出千金方）治姙娠阻病，心中憒悶，空煩吐逆，惡聞食氣，頭眩體重，四肢百節疼煩沉重，多臥少起，惡寒汗出，疲極黃瘦。

半夏　生薑（各三十銖）　乾地黃　茯苓（各十八銖）　橘皮
旋覆花　細辛　人參　芍藥　芎藭
桔梗

右㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。若病阻積月日不得治，及服藥冷熱失候，病變客熱煩渴，口生瘡者，去橘皮、細辛，加前胡、知母各十二銖。若變冷下痢者，去乾地黃，入桂心十二銖。若食少胃中虛生熱，大便閉塞，小便赤少者，加大黃十八銖，去地黃，加黃芩六銖。餘依方服一劑，得下後，消息看氣力冷熱增損，方更服一劑湯，便急服茯苓丸，令能食便強健也。忌生冷醋滑油膩菘菜海藻。一方加黃芩二
校名半夏瀉心湯，一方無旋覆花，有前胡桔梗。

茯苓丸（出千金）治姙娠阻病，患心中煩悶，頭眩重，憎聞飲食氣，便嘔逆吐悶顛倒，四肢垂弱，不自勝持。服之即效。要先服半夏茯苓湯兩劑，後可服此。常服此藥，消痰水，令能食，強力養胎。

茯苓　人參（去蘆）　桂心（熬）　乾薑（炮）　半夏（泡洗七次，炒黃）
橘皮（各一兩）　白术　葛根　甘草（炙）　枳實（麩炒，各二兩）

右爲末，蜜和爲丸如梧桐子大，米飲服二十丸，漸加至三十丸，日三。肘後不用乾薑、半夏、橘皮、白术、葛根，只五味。又云：姙娠忌桂，故熬。

麥門冬、忌海藻、菘菜、羊肉、餳糖、桃李、雀肉、酢。

陳橘皮丸　治姙娠阻病，心中煩悶，頭眩，惡聞食氣，便嘔吐悶亂顛倒，四肢患弱不自勝持。宜先服半夏茯苓湯兩劑，後可服此。

陳橘皮（湯浸去白）　白茯苓（各一兩）　白术
甘草（炙）　乾薑（炮）　半夏（湯洗七次，切）　枳殼（去瓤麩炒，各半兩）

右爲末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服三十丸，薑湯下，食前服。

治姙娠惡阻，嘔吐不止，頭痛，全不入食，服諸藥無效者，用此藥理血歸

原則愈 出大全
人參　甘草　川芎　當歸　白芍藥
丁香各五分　白茯苓　白朮　陳皮各一錢　苦梗炒
枳殼各三分　半夏湯洗七次各二兩
右㕮咀每服三錢薑五片棗一枚煎
麥門冬散 出大全方 治妊娠心煩憒悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重
百節疼痛多臥少起
麥門冬　子芩　赤茯苓各一錢　柴胡　赤芍藥
陳皮　人參　苦梗　桑寄生　甘草
旋覆花各五分　生地黃一錢
右為粗末每服四錢水一盞薑半分煎至六分去滓不拘時溫服
安胎飲 出大全方 治懷胎三月四月至九月惡阻病者心中憒悶頭重目
眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲噉鹹酸多臥少起惡心嘔逆不食
或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及妊娠一切病產並皆治之
甘草炙　茯苓去皮　當歸去蘆　熟地黃酒蒸　芎藭
白朮　黃芩去朽　白芍藥　半夏湯泡七次　阿膠炒
地榆各等分

醫方類聚卷之二百二十四

右㕮咀每服三錢水一盞生薑四片煎至八分去滓溫服無時候
如或惡食但以所思之物任意與之必愈輕在妊娠禁忌勿食雞子鯉
魚膾兔犬驢騾山羊肉魚鱉雖產兼產難及妊娠論云令母常居靜室
多聽美言聽人講論詩書陳說禮樂耳不聽非言目不視惡事心不起
邪念能令生子既壽福而忠孝仁義聰明無疾斯乃聖人所留數論
故隨方伏以書○　方無半夏地榆有人參桑寄生一方無白朮黃
芩半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓
枳殼丸 治妊娠惡阻病心中煩憒頭眩聞食氣即嘔逆四肢無力不自勝舉
枳殼麩炒　人參去蘆　肉桂去粗皮　半夏湯泡七次　白朮
葛根　白茯苓去皮　麥門冬去心　乾薑炮
甘草炙各半兩　陳橘皮去白各一兩
右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候以生薑
粥飲下三十丸

茯苓丸 治妊娠惡阻嘔逆惡心四肢痛疼惡聞食氣怔忪煩悶多
損墮宜安胎調勻血脈
白茯苓去皮　旋覆花各二錢　陳橘皮一兩　生薑　熟地黃各二兩
芎藭　人參　桔梗炒　甘草炒各
芍藥各一兩　細辛去苗
右粗搗篩每服三錢匕水一盞同煎至六分去滓溫服不拘時候
旋覆半夏湯 治妊娠阻病心下憒悶吐逆不食惡聞食氣頭暈四
肢百節煩痛多臥少起
旋覆花去梗　芎藭　細辛去苗　人參　甘草炙各半兩
半夏湯洗七次　赤茯苓去皮　當歸去蘆　乾生薑　陳皮去白各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候
桔梗湯 治妊娠阻病心中憒悶虛煩吐逆惡聞食氣頭眩體重四肢
疼痛煩熱多臥少起惡寒汗出疲倦
桔梗　半夏湯洗七次　白茯苓去皮　細辛去苗　芎藭
人參　甘草炙各一兩　芍藥一兩　熟乾地黃

醫方類聚卷之二百二十四

右㕮咀每服五錢匕水一盞半生薑五片同煎至六分去滓溫服食
後日二服
半夏飲 治妊娠惡阻心中憒悶聞食氣即吐逆惡寒多
半夏湯洗七次　白茯苓去皮三錢　細辛去苗
旋覆花　桔梗　赤芍藥　陳橘皮去白　甘草炙各
熟乾地黃一兩
右㕮咀每服三錢水一盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服空心食前
茯苓湯 治妊娠并氣攻血海停留胃脘嘔悶血腥嘔吐食飲及妊
娠中脘宿冷冷血侵脾惡聞食氣病名惡阻
半夏湯洗七次　茯苓　熟地黃各二　橘皮　細辛
人參　芍藥　川芎各二兩
右剉散每服四大錢水二盞薑七片煎七分去滓空腹服有客熱
煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母　腹冷下痢者去地黃入桂心炒
胃中虛熱大便秘小便澀去地黃加大黃一兩八錢黃芩六錢
人參散 治妊娠一兩月惡聞食氣足煩悶

人參（五分） 知母 枳殼（麩炒各） 陳橘皮（去白 一兩）
甘草（炙） 麥門冬（去心） 黃芩 大腹皮（各半兩）
右爲散每服三錢以水一中盞入薑半分煎至六分去滓不拘時
溫服

白朮散 治妊娠阻病心中憒憒悶頭目眩四肢沉重惡聞食氣好吃酸鹹果實多臥少起三月四月多嘔逆百節疼痛不問白晝
白朮 厚朴（去粗皮塗生薑汁炙令香熟） 葛根 麥門冬（去心）
人參（各半兩） 陳橘皮（湯浸去白焙一兩） 白茯苓（一兩） 甘草（炙微赤剉半兩）
右爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時
候溫服

厚朴丸 治妊娠阻病頭疼身體煩悶往往寒熱不思飲食
白朮 陳橘皮
厚朴（去粗皮塗生薑汁炙令香熟） 赤茯苓 麥門冬（去心） 人參（去蘆） 半夏（湯洗七遍去滑各三
前胡（去蘆頭各一兩）
分）
右爲末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候以生薑
粥飲下二十丸

陳橘皮丸 治妊娠阻病心胸氣滿復擁疼痛嘔重
陳橘皮（湯浸去白焙） 當歸（剉微炒） 赤芍藥 乾薑（炮）
艾葉（炒微黃） 芎藭（三分） 甘草（炙微赤剉） 吳茱萸（湯浸七遍焙乾微炒）
右爲末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不拘時以粥飲下
二十丸

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水妊娠三月以來惡阻吐逆或
初妊擇食頭痛寒熱間作四肢不和心虛煩悶者服之名
竹茹湯
人參（去蘆） 陳橘紅 白朮 麥門冬（去心各）
甘草（一分） 厚朴 白茯苓（各半兩）
右爲粗末每服四錢水一盞半淡竹茹一塊如彈子大生薑三片
煎至七分去滓澄清溫服空心食前一方無茯苓麥門冬
甘草名橘皮湯

柴胡散 治妊娠心悶頭目昏重心胸煩悶不思飲食或嘔吐
柴胡（一兩半） 赤茯苓 麥門冬（各一兩） 枇杷葉（去毛） 人參
橘紅 甘草（各半兩）
右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

柴胡飲（良方） 治妊娠阻病頭疼四肢煩羸弱不思飲食唯思眠睡
柴胡（去苗） 赤芍藥 麥門冬（去心） 人參 黃芩（微炒）
甘草（各半兩） 生地黃（研取汁）
右爲粗末每服三錢以水一盞入地黃汁一分同煎至六分去滓溫
服日再一方無生地黃用生薑煎服

人參飲（良方 出大全） 治妊娠阻病心中煩悶嘔吐逆惡聞食氣頭
重四肢百節疼痛嗜臥汗出痰極甚瘦
人參 麥門冬（去心） 白茯苓 生薑（各） 陳橘皮
甘草（炙） 大棗（十枚）
右剉如麻豆大分爲三劑每劑以水五盞煎取二盞去滓食前分
三服如人行三五里再服一方丸妊娠惡食者以所思食任意食
之必愈 忌菘菜醋等物

桑寄生散 治妊娠惡阻頭旋目運腰腹疼痛胎動不安
桑寄生 阿膠（炒） 茯神（去木） 麥門冬（去心） 人參
芎藭（各一兩） 郁李仁（去皮）
右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候一方治妊
娠阻病未成腹背兩脇肋腰痛下痛胎動不安兼治頭面生瘡

保生湯（良方 出大全） 治婦人經候不行身無病而似病脈滑大而六部俱勻
乃是孕婦之脈也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐
清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁
香生薑煎服
人參 甘草（各一分） 白朮 香附子 烏藥
橘紅（各半兩）
右㕮咀每服三大錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服無時
或爲末調服亦可

犀角散 治妊娠心煩憒悶虛煩吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重
百節疼痛多臥少起

麥門冬 苧根各二兩 黄芩 茯神各一兩 甘草炙一分
羚羊角屑半兩
右㕮咀每服四錢水一盞生地黄一分淡竹葉二七片煎至六分去
滓温服
參朮飲出醫方大全專治阻病
橘紅四兩 藿香葉三兩 白朮一兩 粉草炙半兩 人參半兩
丁香二錢半
右為末每服二錢水一小盞生薑五片煎至七分去滓温服惡心加
乾薑胃脹悶加枳實又云千金半夏茯苓湯內有半夏娠婦不可服
宜服此藥甚妙
人參散 治姙娠阻病心中憒悶頭目眩四肢沉重懈怠惡聞食氣
好喫酸鹹果實多臥少起三月四月皆多嘔逆百節不能自舉者
人參三兩 白茯苓去皮 厚朴 白朮各一兩
陳橘皮湯浸去白 葛根
右㕮咀每服三錢以水一盞入生薑五片同煎至六分去滓温服
白朮丸 治姙娠阻病頭疼背煩悶氣悶不思飲食
白朮 厚朴去粗皮薑汁炙 當歸微炒 陳橘皮湯浸去白各一兩
白茯苓去皮 熟乾地黃
右為末鍊蜜搜和杵熟為劑搗令勻熟丸如梧桐子大每日空心
米飲下二十丸早晨日晚各一服
茯苓散 治姙娠阻病心中煩悶頭眩重憎聞食氣聞便嘔逆
四肢重不持子
陳橘皮散出聖惠方 治姙娠二三月惡阻病吐逆不能食
陳橘皮湯浸去白焙 白茯苓 半夏湯洗七遍去滑 麥門冬去心各一兩
甘草半兩炙微赤剉 人參三分去蘆頭
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分淡竹茹一分煎至六分
去滓不拘時候温服
麥門冬丸出聖惠方 治姙娠阻病頭重不思飲食四肢羸弱多臥少起
麥門冬一兩去心焙 柴胡去苗 枳殼麩炒微黄去瓤 桑寄生

荊芥各一兩 甘草炙微赤剉半兩
右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候煎淡
竹茹湯下二十丸
治姙娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛出大全良方
人參 丁香 柿蒂各一兩 甘草 良薑各半兩
右為細末每服二錢熱湯點下無時
人參散[illegible]治姙娠惡食嘔逆
人參四兩 厚朴 生薑 枳殼 甘草各二兩
右切以水六升煮取三升分三服不拘時
療姙娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐出大全良方
青竹茹 麥門冬各三兩 前胡二兩 橘皮一兩 蘆根一握
右為切以水一大升煮取半升分為二服去滓食前一服一方無麥
門冬用小麥三合體熱四肢煩熱者加地骨皮
半夏茯苓湯出大全良方 治姙娠惡阻嘔吐不食
半夏泡洗七次 陳皮各二 白茯苓二兩 縮砂仁一兩 甘草四兩
右㕮咀每服四錢水二盞薑十片棗一枚烏梅半箇煎至七分食
前温服如惡阻者加青竹茹一彈子大同煎空心進
療婦人姙娠惡阻嘔吐不下食出大全良方
青竹茹 橘皮各三 生薑 茯苓各四 半夏五兩
右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不瘥頻服忌羊肉
鮓餳等物
加味二陳湯出危氏方 治受胎一月或兩月嘔吐擇食緣中脘宿有痰
飲經水止後氣滯所作名曰惡阻
陳皮 白茯苓各一兩半 半夏一兩 白朮半兩 粉草二錢
右剉散每服四錢生薑三片烏梅一箇煎食前服未効加生薑汁
小紫蘇飲出危氏方
紫蘇 厚朴 白茯苓各一兩半 半夏一 甘草各三錢
右剉散每服三錢水一盞生薑五片棗二枚煎温服害熱煩渴口
生瘡者加知母前胡腹冷下痢加桂心炒胃中虛熱大小便秘加
黄芩頭疼加細辛川芎

麥門冬湯 治妊娠惡阻病心中憒悶見食嘔吐惡聞食氣肢節煩疼身體沉重多臥黃瘦

麥門冬去心 人參各三分 白茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白各半兩

甘草炙一分

右粗搗篩每服三錢以水一盞入生薑一分拍破棗二枚煎至六分去滓溫服食前

人參湯 治妊娠一兩月惡食手足煩悶

人參 知母焙 枳殼麩炒去瓤 黃芩去黑心各一兩

大腹一枚并皮剉

右㕮咀每服三錢以水一盞生薑半分切煎至七分去滓溫服食後日二

前胡湯 治初妊娠惡阻食即吐逆頭痛顛倒寒熱

前胡去蘆頭 細辛去苗葉 白茯苓去黑皮 甘草炙

厚朴去粗皮生薑汁炙各半兩

右為粗末每服二錢水一盞生薑一分切同煎至六分去滓溫服不拘時日二服一方加人參名前胡湯

麥門冬飲出聖濟總錄 治妊娠阻病胎不安寒熱嘔逆不思飲食

麥門冬去心 人參 白茯苓去粗皮 阿膠炒各一分

甘草炙一兩

右為粗末每服三錢匕以水一盞入生薑一分拍碎棗二枚同煎至六分去滓食後溫服日二一方加陳橘皮

生薑橘皮湯 治妊娠惡阻嘔吐涎痰不能食

生薑四兩 陳橘皮湯浸去白 青竹茹各半兩 前胡去蘆各一分 檳榔剉二枚

右剉如麻豆每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

茯苓丸出經驗方 療妊娠惡阻嘔吐顛倒重死不自勝持服之即效

茯苓 人參各一兩 肉桂去皮 甘草炙 枳殼麩炒

右搗篩蜜和丸每服二十丸加至三十丸日二服 古今療胎病方有萬十首不問虛實冷熱胎死者活此方緣妊娠忌桂故熬

白朮散出十便良方 治惡阻吐清水甚者十餘日粥漿不入者

白朮一兩 人參半兩 丁香一錢半 甘草一分

右為末每服二錢水一盞薑五片煎至七分溫服

醒脾飲子出朱氏集驗方 治妊婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中無味或作寒熱

草豆蔻以濕紙裹灰火中煨令紙乾取出去皮用 厚朴製各一兩 乾薑三分

甘草一兩一分

右為細末每服二大錢水一大盞棗二枚生薑三片煎至八分去滓呷服病輕者只一二便能食 舊有婦人二兩日寒熱瘡閉不食後人去橘皮以乾生薑代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇效一方用乾薑生橘皮亦名醒脾飲子治阻病極為神驗

四七湯出和劑 治妊娠三月惡阻為病氣鬱生痰

半夏湯洗各五 白茯苓四兩 厚朴三兩薑製 紫蘇二兩

右㕮咀每服四錢用水一盞半薑五片棗一枚煎至七分去滓不拘時候

人參丁香散出袖珍 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參半兩 丁香 藿香葉各一分

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服無時

人參半夏丸出聖濟總錄 治妊娠惡阻病醋心胸中冷腹痛吐逆不喜飲食

半夏湯洗七遍 人參 乾生薑各半兩

右為細末以生地黃汁及麵餅為丸如梧桐子大每服四十丸米飲送下不拘時候

小地黃丸出保產方 治妊娠嘔心吐清水腹痛不能食

人參 乾薑炮各等分

右為末用生地黃汁丸如梧子大每服五十丸米湯下食前服之

生方加製半夏等分

治妊娠忽下黃汁如膠或如豆汁出大全方

苧根切二升 銀一斤

右以水九升煎取四升每服入酒二升或一升煎藥取升分作二服

治阻病出永類鈐方 用香附子末熟湯調服

參橘散出胎產方 治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓 橘皮去白各一兩 麥門冬去心 白朮 厚朴薑製

甘草炙各

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片竹茹少許煎七分去滓溫服

赤茯苓散 出產寶方 治妊娠惡阻心胸煩悶頭暈惡心四肢昏倦嘔吐痰水惡聞食氣

赤茯苓去皮 半夏湯洗 陳橘皮去白 桔梗去蘆 乾地黃炒

各一 白朮 川芎 人參去蘆 香附子炒

旋覆花 甘草炙各半兩

右件㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片煎至一盞去滓熱服不拘時候

人參調中散 出產寶方 調脾肺氣治胃膈滿悶四肢煩熱及妊娠阻痞心胃注悶嘔逆不思飲食

人參去蘆 甘草炙 枳殼去瓤麩炒 厚朴薑製 白朮

白茯苓去皮各一兩 桔梗去蘆 細辛去葉土 藿香葉去土

陳橘皮去白各三分

右件為㕮咀每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服食前

婦人良方卷之十五 八 五二

李氏家傳快氣湯 妙產 自初妊娠惡阻便可服此旁中快氣抑陽助陰入月滑胎易產

枳殼五兩 縮砂 香附 甘草

右各等分為細末湯調服

溫真人方妙產

枳殼五兩 川當歸 木香各一兩 甘草一兩

右為末湯調服

膠艾湯 出產寶方 治妊娠胎阻

阿膠 川芎 甘草各一兩 艾葉 當歸各三兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服覺全痛加乾薑一兩

○子煩 附論

夫妊娠苦煩悶者四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若每心驚膽更多有煩悶名曰子煩也產寶云夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又虛熱相搏氣鬱不舒或煩躁或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子煩也

方

升麻湯散 治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆此證與子煩大同小異通用知母丸亦可

川升麻 黃芩 人參 麥門冬 梔子人

柴胡 茯神 瓜蔞根 犀角屑各一兩 知母

甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

酸棗人湯 治妊娠煩躁虛悶四肢疼痛不睡

酸棗人炒 赤芍藥 防風去叉 柴胡去苗 赤茯苓去皮

羚羊角 黃芩 甘草炙 人參 檳榔

右為粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服

赤茯苓散 出產寶方 治妊娠心煩頭項疼痛不思飲食手足多熱

婦人良方卷之十五 八 五十五

赤茯苓 桑寄生 知母 百合 麥門冬去心

川升麻 人參去蘆 柴胡去苗各一兩 甘草炙微赤

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入淡竹茹一分生薑半分煎至七分去滓不拘時候溫服

逍熱湯 治妊娠虛煩懊熱夫妊娠虛煩懊熱者以陽氣偏勝熱氣作心下懊悶頭痛面赤小便黃赤甚則淋痛是也病原又謂之子煩

人參 甘草炙 黃芩去黑心 當歸切焙 芍藥

梔子人 防風去叉 柴胡去苗各

右搗篩每服三錢水一盞煎取七分去滓溫服食後

柴胡飲 治妊娠虛煩懊熱胎氣不寧手足煩熱

柴胡去苗 桑寄生 知母切焙 百合 麥門冬焙去心

升麻各一 淡竹茹

右搗篩每服五錢水一盞生薑三片同煎至一盞去滓食後溫服

知母湯 治妊娠虛煩懊熱

知母切焙 防風去叉 黃芩去黑心 甘草炙 麥門冬焙去心

赤茯苓去皮 升麻各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分入竹瀝少許攪勻

去滓溫服不拘時

茯苓湯 治妊娠虛煩悶熱中悶乾嘔逆重悶連四肢倦怠

赤茯苓去皮 白茯苓 防風去蘆 人參 白朮剉炒

枳殼麩炒 甘草炙各等分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時候

竹瀝湯 治妊娠心下煩熱悶燥

防風去叉 麥門冬去心 黃芩去黑心 升麻 石膏研

梔子人各一

右㕮咀每服三錢水一盞五竹瀝半合煎至七分去滓食後溫服日再

知母飲 良方 治妊娠心脾壅熱口乾渴苦煩悶

赤茯苓 黃芩 黃耆各三兩 知母 麥門冬去心

甘草各二兩

右粗末桑白皮煎湯成入竹瀝一合服不拘時候胎臟受熱最宜服

五十四

之一方去黃芩知母加地骨皮犀角屑羚羊角各三分㕮咀煎如前法

犀角散 出聖惠方 治妊娠心煩熱悶

犀角屑 地骨皮 黃芩 麥門冬去心 赤茯苓去皮各一兩

甘草炙半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不拘時溫服

竹瀝湯 一名竹葉湯出千金方 治妊娠常苦煩悶此是子煩以四月受少陰君火氣

以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多好煩悶

竹瀝一升 麥門冬 防風 黃芩各三兩 茯苓四兩

右以水四升合竹瀝煮取一升八分三服不瘥再作 一方用知母無黃

芩一方加人參半兩

麥門冬湯 出經驗方 治妊娠四月六月多苦煩悶心驚膽怯名曰子煩

白茯苓去皮 人參 麥門冬去心 防風各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片入淡竹葉十片煎至八分去滓

溫服不拘時候

治妊娠恆苦煩悶此名子煩

茯苓三兩 竹瀝一升

右以水四升合竹瀝煎取二升分三服不瘥重作亦可時時服竹瀝服

之

治孕婦七八箇月傷寒傷熱以致子煩胎氣逆上攻於咽喉至凝心腹

脹滿下墜似前病每至子時坐一次人忽為氣不得大便一通也好

專用前藥不知病在胎熱子煩

用小烏豬散下黃連阿膠丸或用炒阿膠兩半黃連各一分枳殼炒黃

黃芩之分作兩劑為[illegible]煎服 後其大便潤導都以川芎茯苓

縮砂甘草湯之君主藥嚴密應丸者連服車非其治也

治妊娠常苦煩悶此是子煩 出大全良方

用竹瀝隨多少時時服止取瘥

治妊娠子煩口乾不得臥 出大全良方

黃連去鬚為細末每服一錢粥飲調下 一方以蜜丸黃連丸亦妙

一母丸 出大全良方 治妊娠因服藥致胎不安有似虛煩不得臥者

用知母一兩洗焙為細末以棗肉為丸如彈子大每服一丸細嚼煎

人參湯送下○次見醫者不識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣

有識者亦見有藥也產科鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中也用之

良驗一方用蒸餅糯米湯化下名萬安丸

治妊娠心中煩悶見食即吐非時吐心飲食不進非時悶絕脉息共潘

大小腸實熱 出[illegible]論方

麥門冬去心 防風 茯苓 前胡去苗

升麻 黃芩 石膏各等分 山梔

右細剉為末每服三錢水一盞半蔥白三枝煎至七沸食後臨臥頓服

○子淋 附論

夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則小便

行澀而數不宣妊娠之人胞繫於腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶

亂故謂之子淋也轉胞證候孕婦多有之患在忍縮小便或喜食而過

或脫後為熱所迫逼使小腸之氣逆而不通大腸之氣與[illegible]俱否外水

不能入脬胱內水不能出膀胱淋瀝急每欲尿時痛不可言大便亦裏
急 以劑非辨必以手從胸次按至臍下庶可立出小便否則送上
出爲不禁甚者因此腹脹浮腫治法用凉藥疏利小腸中熱仍與通
泄大腸迨其腹中攪痛大便大下則脬胞通卸時至又安小便頓流宜服
葵子散
方
地膚大黃湯（出聖惠方）治妊娠患子淋由腎虛膀胱熱則小便行澁而數不
宣心中煩悶疼痛
川大黃（一兩） 地膚草（一兩） 知母 黃芩 豬苓
赤芍藥 通草 川升麻 枳實 甘草（各一兩）
右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候
葵根汁治每藥莫許物
療妊娠散治小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食（出千金方）
瞿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子（各一兩）
黃芩 芍藥 枳殼 車前子（各半兩）

普濟方卷三百四十一 五十六

右爲麤末每服四錢水一盞煎至六分溫服
安榮散（出婦人良方）治妊娠小便淋澁者何皆曰本因調攝失宜
子臟氣虛蓋緣酒色過度傷其血氣致水臟閉澁遂成淋瀝名曰子淋
宜服安榮散通利小便
麥門冬（去心） 通草 滑石（各一兩） 當歸（去蘆酒浸） 燈心
甘草（半兩炙） 人參 細辛（一兩）
右搗羅爲細末每服三錢煎麥門冬湯調服不拘時候服之尤妙
一方止用檳榔赤芍藥各等分水煎空心服更效或蔥白煎湯亦可
木通湯治妊娠子淋澁痛
木通（去節） 石韋（去毛各一兩） 赤茯苓（去皮） 芍藥 桑根白皮（剉）
陳橘皮（去白炒） 人參（各三分）
右搗篩每服三錢水一盞半入生薑一棗大煎至八分去滓溫服
冬葵子散（出聖惠方）治妊娠臍不安小便淋澁小腹疼痛
冬葵子（炒） 柴胡（去苗） 桑根白皮（剉） 赤茯苓（各一兩）
赤芍藥（一兩） 當歸（一兩剉微炒）

右搗爲散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去
滓不計時候溫服
冬葵子湯（出聖濟總錄）治妊娠患淋小便澁不利小腸水道熱痛
冬葵子（一升） 芍藥（二兩） 黃芩 赤茯苓 車前子（各三兩）
右㕮咀以水七升煎至二升溫分二服
海蛤湯治妊娠子淋
海蛤 木通（各一兩） 豬苓（去黑皮） 冬葵子（一合） 滑石（一兩）
右搗篩每服三錢水一盞入燈心十莖同煎至六分去滓食前溫服
當歸湯治妊娠子淋小便澁痛
當歸（切焙） 芍藥（一兩） 甘草 梔子仁
右搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服
人參散治妊娠子淋
人參 木通 黃連 海金沙
淡竹根
右將人參木通淡竹根搗羅爲細散同海金沙研令勻每服一錢匕燈心湯調下每

普濟方卷三百四十一 五十七

服二錢空心酒或米飲調下
葵子散（出千金方）治妊娠小便澁痛謂之子淋
葵子 滑石 木通 榆皮
右爲末每服三錢以水一盞半煎至七分去滓食前溫服
榆皮
又方（出肘後方）
葵子 滑石 杏仁 水
右爲末或煎或調服神效
白芷散治妊娠子淋小便頻數澁痛
白芷（三分） 海金沙 阿膠（炒） 滑石（各一兩）
右搗羅爲散每服一錢煎蔥白湯調下
石燕散治妊娠子淋因卻致澁痛大婦人懷子而淋者謂之子淋因
腎虛膀胱經客熱令溲少而數水道澁痛閉於臍者是其候也
石燕（一枚） 乳香（一分） 滑石
右研細末爲散每服一錢煎燈心湯調下

石韋湯治妊娠小便頻數澁少痛

石韋去毛　榆白皮[illegible]四　滑石一兩

右擣篩每服三錢水一盞入葱白二寸生薑二片煎至六分去滓

食前溫服

鯉魚粥治妊娠小便淋澁胎不安

鯉魚一頭[illegible]　葵菜一斤　葱白四兩

右以水五升煮魚少許鹽和魚菜并汁同食之効

治妊娠淋小便數而少並痛手足煩痛

地膚草　茅根剉　大麻子各四兩

右擣篩為散每服四錢以水一中盞入葱白七寸煎至六分去滓不

計時候溫服

痛鄉散　治胎前諸般淋澁小便不通臍腹作脹用他藥不愈此

方屢神効

[illegible]

右為粗末每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服空心食前

當歸散　婦人妊娠及產後小便淋澁水道疼痛用之甚効一方治妊

娠中惡心腹疼痛溫酒調下一錢

滑石湯治妊娠子淋

滑石[illegible]　[illegible]

右擣篩每服五錢水煎至八分食前去滓溫服

治妊娠小便淋澁臍腹妨悶　出聖惠方

猪苓[illegible]　葵子一兩

右擣細羅為散每服二錢不計時候[illegible]調下

車前子湯治妊娠患淋水道澁不通

車前子五兩　葵根切一升

右以水五升煎取一升半分二服

葵子散大全治妊娠患子淋

以葵子一升水五升煮取二升分再服　一方無葵子用葵根亦可

治小便不通

甘遂散大全治妊娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差者

宜服此藥下之

用太山赤皮甘遂二兩為末以白蜜二合和合如大豆粒多覺心下

煩得微下者日一服之後還将猪苓散不得下日三服漸加至半錢

以微利為度

猪苓散　治妊娠小便澁痛兼治胎水亦治子淋

用猪苓五兩去皮為末白湯調方寸匕加至二匕日三夜二不瘥宜

轉下之服前藥

地膚湯大全療妊娠患子淋小便數出少或熱疼痛酸疼手足疼煩及

手頸

用地膚草三兩細切水四升煮取二升半去滓分三服日三　一方作

地膚子十二兩

○心腹痛 附論

妊娠心腹痛者或由宿有冷疾或新觸風寒皆由臟虛而致發動也

邪正相擊而并於氣隨氣上下衝於心則心痛下攻於腹則腹痛

故令心腹痛也妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時差者

其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云妊娠心腹疼痛

多是風寒濕冷痰飲與臟氣相擊故令腹痛攻傷不已則致胎

動也○妊娠心痛者多是風邪痰飲乘於心之經絡邪氣搏於正

氣交結而痛也若傷心正經而痛者為真心痛心為帝主之宮統領

諸臟不可受邪邪若傷之朝發夕死夕發朝死若傷心支別絡

而痛者則乍安乍甚休作有時也妊娠之人或有痛而痛不已

者氣乘胞絡傷損子臟也則令胎動凡胎轉移則多不安

不安而動於血者則血下也[illegible]○妊娠臟腑虛弱

胃寒虛之氣邪氣與正氣相擊故令腹痛病不已則傷胞絡

令胎不安治法宜祛散寒濕安和胎氣則痛自愈

方

保生湯　治妊娠心腹痛祛散寒濕安和胎氣

紫菀去土　柴胡去苗　龍骨　赤石脂各半兩　艾葉炒

白术各三　黃連去鬚　厚朴去粗皮　阿膠炒各

枳殼 地榆一兩 肉荳蔻 益智去皮
乾薑炮 旋覆花 黃芩
右為麁末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服
澤蘭丸治妊娠羸瘦腹冷腹痛不欲食安胎
澤蘭 當歸切焙 桂去粗皮 乾薑炮 芎藭
訶梨勒 蕪荑 藁本 石膏 白芍
柏子仁 人參 白朮 細辛 甘草炙
右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下日再服
沉香湯治妊娠心痛疼逆不思飲食
沉香一兩 白荳蔻去皮 草荳蔻 白朮
人參 白茯苓 厚朴
半夏 陳橘皮 木香
乾薑 甘草
右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分去滓稍熱
食前服
七寶湯治妊娠心痛胸脘不利嘔吐吐痰
半夏 大腹皮 甘草炙 草荳蔻
訶梨勒 白朮 郁李仁 木香 乾蝎
人參 白茯苓 芎藭
右麁搗篩每服一錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分去滓溫
服
真白湯治妊娠腹痛不思飲食
木香 沉香 丁香 蓬莪茂 芎藭
當歸 芍藥 桂 藿香子 甘草
益智去皮 陳橘皮
右麁搗篩每服二錢水一盞棗一枚煎六分去滓食前溫服
如薑丸治妊娠兩脇脹悶腹中疼痛不思食
乾薑 桂 木香 沉香 當歸
甘草 白荳蔻 白茯苓 青橘皮
芍藥 乾木瓜 蓽澄茄

右搗羅為末湯浸蒸餅為丸如小彈子大每服一丸細嚼溫酒下食
前服
厚朴散治妊娠冷氣攻心腹疼痛或不納飲食
厚朴 陳橘皮 吳茱萸
訶梨勒 訶梨勒
草荳蔻 白朮 人參
甘草
右為麁散每服三錢以水一中盞半入生薑三片大棗三枚同煎至
一盞去滓不計時候稍熱服之日三服一方加當歸無生薑煎服
木香散治妊娠心腹疼痛
木香 枳殼 白芷 蓬莪茂 白朮
益智 甘草 桂 青橘皮
人參 京三稜
右為散每服二錢不拘時候沸湯調服
半夏飲治妊娠傷冷心腹痛或疼逆不納飲食
半夏 人參 草荳蔻 白朮 高良薑
芎藭 甘草
艾葉 阿膠 陳橘皮 厚朴
右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分
去滓不計時候稍熱服
地黃飲治妊娠心腹痛面赤手足心悶喘無力
生乾地黃 人參 當歸 桑寄生 芍藥
赤茯苓 桔梗 桂 釣藤 甘草
右搗篩每服三錢水一盞生薑二片棗一枚煎至七分去滓溫服
日三
木香和解飲治妊娠心腹冷痛霍亂吐瀉
木香 丁香 白朮 甘草 芎藭
人參 草荳蔻 沉香 大腹皮 訶梨勒
右搗篩每服一錢水一盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服空心
食前

知母湯 治妊娠心痛胸滿不思飲食
枳實 人參 赤茯苓 柴胡 木香
桂 草豆蔻 白朮 檳榔
右麤搗篩每服二錢水一盞煎取七分去滓溫服不拘時一方用生
薑一節服
如聖散 治妊娠心痛胸膈不利不思飲食
人參 白朮 乾薑 丁香
檀香 桔梗 胡椒 甘草 縮砂仁
右搗羅為散每服二錢鹽湯點服
草豆蔻散 出聖惠方 治妊娠心腹脹痛吐食減少四肢不和全不入食
草豆蔻 陳橘皮 乾地黃 白朮 川芎
當歸 桂心 乾薑 木香
右為細末每服四錢水一盞棗一枚煎至六分熱服無時
阿膠湯 出聖惠 治妊娠心腹痛胎動不安四肢皆不和
阿膠 芎藭 桑寄生 陳橘皮

二十二

艾葉 枳實 當歸 高良薑 甘草
右搗篩每服三錢以水一盞入棗三枚煎至七分去滓不拘時稍熱
服
大腹湯 治妊娠心痛脹滿胎不安穩
大腹皮 芎藭 赤茯苓 陳橘皮
人參 當歸 芍藥 紫蘇莖葉
右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓稍熱溫服一方加生薑
厚朴湯 治妊娠心脾痛惡不下食
厚朴 白朮 白芷 乾薑
甘草 枳殼 陳橘皮 縮沙
右麤搗篩每服一錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時候
人參散 治妊娠心痛腹脹滿不思飲食嘔逆不止
人參 桑寄生 陳橘皮 白茯苓
白朮 甘草 厚朴
右麤搗篩每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時

丁香散 治妊娠腹中冷痛
丁香 當歸 蓬莪茂 益智 甘草
芎藭 木香 青橘皮
右為細末每服二錢湯調下食前服
當歸散 治妊娠胎動不安腹內疼痛
當歸 阿膠 熟乾地黃 艾葉 甘草
乾薑 白芍藥
右搗篩為散每服三錢水一中盞入棗二枚煎至六分去滓不計時
候稍熱服
芎歸湯 治妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺
川芎 人參 茯苓 吳茱萸 桔梗
當歸 厚朴 芍藥
右㕮咀以水九升煎取三升分三服氣下即安一方有甘草二兩炙
○上證枳殼散可
人參湯 治妊娠心腹俱痛引脇肋妨悶不思食
人參 厚朴 訶梨勒 阿膠
赤茯苓 白朮 陳橘皮
甘草
右搗篩每服三錢水一盞入生薑五片棗二枚煎取七分去滓溫服
不拘時候
沉香湯 治妊娠心痛不可禁
沉香 厚朴 附子 陳橘皮
甘草 白朮 芎藭
右剉如麻豆每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至六分去滓
溫服
人參湯 治妊娠腹內疞痛如刀所刺
人參 大腹 檳榔 枳殼 芍藥
柴胡 附子
右剉如麻豆每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓空心食
前溫服

白朮湯 治妊娠腹痛㽲刺安胎

白朮 桂 陳橘皮 甘草

厚朴 芍藥 芎藭

右麤擣篩每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分去滓食前熱服

療妊娠三四月腹痛時時下血

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸 川芎 人參

大棗 茯苓 阿膠 艾葉

右細切以水四升煮取二升適分三服

艾葉散 治妊娠胎動不安腹內㽲痛

艾葉 芎藭 乾薑 桑寄生 阿膠

當歸 甘草

右擣篩為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

參朮湯 治妊娠心腹痛脇肋脹滿煩

人參 白朮 枳殼 赤茯苓

檳榔 肉荳蔻 柴胡

右擣篩每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓食前溫服

當歸湯 治妊娠心腹氣攻疼痛

當歸 麥門冬 芎藭 赤茯苓 甘草

大腹皮 柴胡

右為麤末每服三錢水一盞入生薑五片棗三枚煎至八分去滓不計時候熱服

大腹皮飲 治妊娠心腹疼痛及兩脇肋內妨悶嘔逆惡心不上飲食不下體倦四肢少力或時發氣脹喘息急大胎不安稍宜服

大腹皮 人參 赤茯苓 當歸

枳殼 柴胡 白朮

右擣篩每服一錢水一盞生薑棗一枚煎至七分去滓溫服日三

金粟湯 治妊娠心痛益中調氣

粟米 半夏 甘草 人參

白朮 桂 檳榔

右擣篩每服二錢水一盞生薑三片煎六分去滓溫服

荳蔻湯 治妊娠心痛時多痰逆不飲無味腹脇脹滿

肉荳蔻仁 附子 縮砂 木香一分

白朮 芎藭

右剉如麻豆每服二錢水一盞生薑三片煎七分去滓溫服不拘時

當歸芍藥散 治妊娠腹中㽲痛心下急痛及療產後血暈崩虛之腹中血病帶服通暢血脈不生癰痛消痰養胃明目益津宜服 ○安期先生賜李少君久餌之藥後仲景增減為婦人懷妊腹痛方

白芍藥 當歸 茯苓 白朮 澤瀉

川芎

右為末每服二錢食前溫酒調服又補勞養真陽退邪熱安和神志潤澤容色散寒邪時氣一方用芍藥四兩澤瀉茯苓川芎各一兩當歸白朮各二兩亦可以蜜丸服

沉香散 治妊娠內積冷氣腹中㽲痛

沉香 附子 甘草 烏藥

當歸 芎藭

右為末每服一錢溫酒調下熱湯亦得不拘時

安胎飲 治胎寒腹痛胎動多驚舉重腰痛腹滿胞急或頓仆悶亂忽有所下飲食毒物或感時疾性寒寒熱觸傷胎臟

當歸 枳殼 粉草 糯米

熟地黃 川芎

右剉每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚金銀少許同煎至七分去滓食前服虛弱者加藿香下血者加阿膠炒下血未止者加熟艾頭痛者加白芷白芍藥不食者加人參白朮

人參湯 治妊娠疼痛

人參 茯苓 赤芍藥 桔梗 厚朴一兩

甘草

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分熱服之
白术散 治妊娠胎動腹痛又腹疼不止
白术 白茯苓各三兩 熟乾地黃 阿膠炒 當歸各一兩
甘草炙半兩
右為麁散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分
去滓不計時候稍熱服
桔梗丸 治妊娠心氣痛不思飲食大便難心腹疼痛日漸羸瘦於將
心脾之經手少陰是也脾之經足陽明
息外受風冷
胸上膈注心中是也二經為風冷所乘所攻邪正交爭故令
心腹俱痛久不差則妨害飲食耗損氣血傷動胞絡
桔梗一兩 訶梨勒炮去核 木香 檳榔 各半兩
白术略 細辛去苗各半兩
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下食前服
芎藭散 治妊娠心腹痛
芎藭一兩 白术一兩 黃芩去黑心 吳茱萸湯洗焙乾各一兩
木香三分 丁香半兩
右為細散每服一錢空心以生薑湯調下
紫蘇飲 治妊娠心腹氣脹疼痛煩悶不安
紫蘇 人參 白茯苓 大腹皮 芎藭各半兩
苧麻根 兩
右剉如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服之
治妊娠心下急痛 當歸 赤茯苓三分 桑白皮五分 前胡四分 郁李仁 檳榔各三
右為粗末以水一升煮取一半去滓溫服
橘皮湯 治妊娠心腹痛不思飲食
陳橘皮湯浸去白焙五錢 草荳蔻二兩 甘草炙 厚朴去粗皮薑汁炙
白术二兩
右將蔥一握細切拌藥令勻炒令黃色搗為粗末每服二錢水一
盞煎至七分去滓溫服
芎藭湯 治妊娠心痛煩悶不思飲食

芎藭 甘草炙 芍藥 厚朴 生薑 檳榔
右搗篩為散每服三錢水一盞棗一枚生薑二片煎至七分去滓溫服不
拘時
鹿角膠散 治妊娠胎動腹痛悶亂
鹿角膠炙 人參 甘草炙 芎藭一兩 當歸
右搗篩為散每服四錢以水一中盞入蔥白七寸煎至六分去滓不
計時候溫服
治妊娠胎動腹痛 心煩
芎藭 當歸 阿膠炒 艾葉
大豆卷 右為細剉以水一大盞煎至一盞去滓食前分溫三服
治妊娠卒下血
當歸 黃芩 厚朴
當歸大腹皮二兩分為三服食前
阿膠 治妊娠腹痛
黃芪 艾葉 甘草炙
右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不拘時
加減四物湯 治妊娠將產前腹痛或胎動不安或胎下血或漏胎或後胎
氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下
當歸 川芎 白芍藥 熟乾地黃各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分取六分清汁熱服日四服以
知為度若平不血即入艾六七葉阿膠末一錢同煎疾勢甚大數半
不可以四味各半兩細剉以水四盞煎至二盞去滓分四服食前
熱服一日之中令盡以知為度平常產乳服至三腊止如虛損血崩
不調至一月止因產致熱熱血血崩口舌乾渴欲飲水者加栝蔞根
一兩麥門冬三分腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各一分血
崩加地黃蒲黃各一兩因熱生氣加川芎一分柴胡半兩身熱
脈躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩大便秘結加大黃半兩桃仁
一分炒大便自利加桂心熟附子各一分發寒熱加乾薑一枚

皮、芍藥各一分。嘔者加白朮、人參、香附各半兩。腹脹加厚朴、枳殼各一分。產煩不得眠加竹葉、人參各一分。煩渴大渴加知母、石膏各半兩。水停心下微吐逆加豬苓、茯苓、防己各一分。虛寒壯熱傷寒加人參、柴胡、防風各三分。此法大治產前產後眾疾如神。加防風、熟地黃各一兩。治男子婦人諸般風氣毒瘡加地骨皮二兩、白茯苓一兩。治男子婦人骨蒸氣。此方乃養營守元氣得之者先生大有神效。高道書云：惠氣疾及渾身燥痒以四物湯青汁調消風散甚妙。產前漏胎加艾、阿膠、糯米、生粟加利。產前服即愈。治婦人欲產不產心腸逆米刮痛每服一兩加搗紅香附延胡索各半兩煎。治經脈不通腹中疼痛或挾氣痛加琥珀煎見效，並錯一合煎立效。治婦人血脈腳痛加丸加芫花服。治婦人血熱生瘡加地骨皮、香附子煎服。治婦人經候不通口乾頭暈更加熟加菊花煎服立效。治婦人百病與興用端仁加芸吳茱萸煮湯歲少使陰藏多使有驗。治婦人腎夜之如毒疾是血証加紅花煎服妙

芎藭散 治妊娠腹痛脹悶

芎藭　當歸(切焙)　乾薑(炮各一兩)　陳橘皮(湯浸去白焙一兩)

右為散每服二錢用糯米飲調下不拘時

地黃湯(出聖惠方) 治妊娠心痛煩悶不食

生乾地黃(焙)　淡竹茹(一兩)　桂(去粗皮半兩)

右擣篩為散每服三錢水一盞煎取一盞去滓溫服不拘時服

草果散(出大全良方) 治妊娠臟氣本虛宿挾風冷脾胃久弱臟腑虛滑臍腹疞痛日夜無度

厚朴(去皮薑汁製炙)　肉豆蔻(一枚面裹煨)　草豆蔻(一枚煨)

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓熱服

香朮散(出大全良方) 治妊娠五月已後常胸腹間氣刺滿痛或腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食失節之所致

廣中莪茂(煨一兩)　丁香(半兩)　粉草(一分)

右為細末空心鹽湯點服一大錢覺胸中如物按下之狀。蔡元度寵人有子夫人怒欲逆之病醫官王師復處此方三服而愈屢用果驗

當歸湯 治妊娠心腹疞痛

當歸(一兩銼)　甘草(一分炙)　乾薑(炮半兩)

右㕮咀篩每服二錢水一盞入棗二枚煎七分去滓溫服

白朮湯(出十便良方) 治妊娠心腹疼痛不能食及遍身痛或一邊痛欲死緣胎有水致痛

白朮　黃芩(各半兩)　芍藥(一兩)

右㕮咀篩以水八盞煎至五盞去滓分五服服之易生方飲一

忌桃李雀肉

治妊娠卒心痛欲死不可忍者

橘皮(三兩)　豆豉(二兩)

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每以水下二七丸無時候

黑神散 治妊娠內挾寒冷腹中疞痛安和胎氣

桂(去粗皮)　乾薑(炮各一兩)

右擣羅為散每酒調下一大錢不拘時

枳殼丸 治妊娠腹痛一切氣疾

枳殼(去瓤麩炒一兩)　木香(半兩)

右將木香擣羅為末入枳殼相和丸梧桐子大每服二十丸溫酒下不拘時

芎藭湯 治妊娠腹痛不可忍安胎止痛(方見安胎類)

梔子丸(方見胎漏門) 治妊娠月數未足而似欲產腹痛者宜服(方見產難門)

當歸散(方見安胎類) 治妊娠腹痛或是冷痛或是胎動(方見安胎類)

治妊娠三五月忽心腹絞痛

大棗(十四枚燒令焦)　鹽(一兩燒令赤)

右為末取一撮許以酒調服之即愈

生雞子酒(出本草) 治妊娠心痛或八九月懷妊或中惡心痛得心痛者

用破生雞子一枚酒和服之

又方 鹽汁用蜜一合和井底泥泥心下

治妊娠卒心痛欲死不可忍者(出經驗方)

用人鼠屎二升以水八升煮取五升分為五服

柴胡茶散(出本草) 治雙身心腹痛可可忍者及腰腿痛

用玄胡索二兩照者為末每服三錢以溫酒調下食前又加地黄末
一兩名玄胡五錢劑雷公炮炙論云心痛欲死自覓延胡
竹茹湯出千金方治妊娠心痛因驚怖厥地驚有所傷宜服
用青竹茹刮碎二兩羌活去頭各兩每服三錢水一大盞煎七分去滓溫服
不拘時一方云入丸當歸赤芍藥生地黄牛馬驚痛傷胎心痛者以青竹皮不
拘多少酒煮三兩升服之不瘥再服
牛屎方 治妊娠心痛 一方出肘後方
地黄酒出千金方治妊娠腹中滿痛 一方出千金方云二升
治妊娠胎動腹痛連腰出千金
用好豉一合以水一大盞煎至六分去滓食前分溫二服
車脂方出千金方治妊娠腹痛咳嗽并産難三日不出
又方出千金方取鹽一升頓服良
知母丸治妊娠月未足欲産腹中痛 方見妊娠小產
右治妊娠忽口苦心腹痛不可忍出千金方
用燒鹽令赤熱二指撮以酒服之 方用鹽一斤

治妊娠傷胎結血心腹痛出千金方
取小兒尿二升頓服之立瘥
治妊娠四五月忽心腹絞痛及冷氣攻注心脾出大全良方
用大紅棗十四枚燒存性為末以童子小便調下 一方上用溫酒調
服
治妊娠胎動腹痛連腰方出聖惠方
右取大麥麪一兩以水一大盞煎五七沸食前分溫三服
治妊娠腹中痛出本事
燒車釭脂末以酒中服 一作車轄中脂
當歸散出聖惠方治妊娠胎動不安腹痛不止
當歸一兩 續斷 芎藭 陳橘皮湯浸去白焙各半兩
右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分
去滓不計時候稍熱服
治妊娠心痛或八九月隨藏成牛馬驚傷得心痛及煩悶出聖惠方
白蜜一匙 生地黄 青竹茹一升

右合煎食頃服如棗核大三枚日三 一方水煎服
火龍散出聖惠方 治妊娠心氣痛
艾葉末鹽炒 茴香 川楝子各半兩
右為末水煎服之
治妊娠卒心痛氣欲絕不可忍方出聖濟總錄
吳茱萸 白术 當歸 乾薑
續斷 艾葉 芍藥 芎藭
右細銼羅為末每服三錢水一盞煎一分去滓取一盞空心服連進兩三
盞以效為度
治妊娠忽然心痛悶絕欲死不可勝忍出婦人大全良方
桑寄生 當歸 茯苓 阿膠 芎藭
吳茱萸各一兩
右細銼羅為末每服二錢以水一盞煎取九分空心熱
治妊娠心痛煩悶
用麻子一合研細水一盞煎取六分去滓非時溫服 麻子即火麻子也

中惡心腹痛 附論

夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡言邪惡之氣中於人也所以然者血氣自養而為精神之主若氣血不和精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也

方

當歸散出聖惠方治妊娠中惡心腹疼痛
當歸炒 丁香一作雞舌香 川芎各三兩 青橘皮二兩 吳茱萸湯浸焙乾炒
半兩
右為細末無時溫酒調一錢
舉卿散出聖惠方 治妊娠中惡腹痛心悶
犀角屑一兩 川升麻 木香各一兩
右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服
治妊娠中惡心腹疼痛出聖惠方
生乾地黄一兩 枳殼麩炒微黃 木香各一兩

右為細末每服一錢粥調下不計時候

又方

苦梗一兩炒 生薑半兩

右㕮咀以水煎服無時

又方良薑湯

高良薑 蓬莪茂各

右為細末不計時候以温酒調下一錢

續易簡 治姙娠中惡心腹疼痛

又方

吳茱萸 當歸

右為末不計時候以醋湯調下一錢

治姙娠中惡心腹痛 出千金方

用新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦治姙娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止

又方 出千金方

用水三升煮大豉取汁温服

治姙娠中蠱心腹痛 出千金方

用燒敗鼓皮為服方寸匕須臾自呼蠱主姓名

○心腹脹滿 附論

夫姙娠心腹脹滿者由腹內宿有寒氣致令停飲姙娠重因觸冷飲發動與氣相干故令心腹脹滿也○姙娠腑氣不和停飲留滯則中焦生實寒則胃受水穀不能消化令人胃脹胃脹者腹滿也

方

丁香散 治姙娠腹滿脹急心可進飲食利心胸止乾嘔

丁香一分 白术 蒼术各一分 前胡去蘆 胡椒

高良薑 乾薑炮 芍根 厚朴去皮生薑汁炙

藿香 訶梨勒皮 延胡索 甘草炙

右擣羅為散每二錢以沸湯點服不計時候

阿魏丸 治姙娠腹滿喘急脹悶

阿魏麵和作餅炙 丁香 木香 蘹香子炒 白芷

陳橘皮去白焙 檳榔 附子炮去皮臍 甘草炙剉

生薑各半兩切炙

右擣羅為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸爛嚼煎蘇葉湯下或酒或鹽湯生薑湯下不得以藥下氣攻心腹虛脹

厚朴煮散 治姙娠腹脹不欲飲食

厚朴去皮生薑汁炙 白术 芎藭 乾薑炮

當歸 訶梨勒 陳橘皮 人參

芍藥 甘草炙

右擣篩每服三錢水一盞入大棗一枚煎取七分去滓不計時候稍熱服

白茯苓散 治姙娠心腹脹滿氣攻胸膈咽喉不利飲食減少

白茯苓 甘草炙 枳殼麩炒 人參

白术 大腹皮 前胡 赤茯苓 訶梨勒皮

陳橘皮

右擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

倉公下氣湯 出大全 治姙娠心腹脹滿兩脅妨悶不下飲食四肢無力

羌活 赤芍藥 甘草 檳榔 青皮

大腹皮 陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮

桂心 紫蘇莖二兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服無時候一方加燈心煎

訶梨勒飲 出聖惠方 治姙娠腹滿氣衝胸膈煩悶四肢少力不思飲食

訶梨勒皮 赤茯苓 前胡 大腹皮 陳橘皮

桑根白皮 枳殼 白术 芎藭

右麤擣篩每服三錢以水一盞入生薑半分切棗三枚同煎取七分去滓溫服不計時候

檳榔散 出聖惠方 治姙娠心腹脹滿兩脅妨悶不下飲食四肢少力

檳榔 前胡 赤茯苓 人參 白术

苦梗 炒 各半 陳橘皮 去白 焙 枳殼 麩炒 各一兩
甘草 炙
右擣篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去
滓每於食前溫服
人參湯治妊娠腹滿脹悶不思飲食
白朮湯治妊娠腹滿少食多脹
白朮 二兩 陳橘皮 去白 焙 木香 各半兩 丁香 半兩
甘草 炙 厚朴 去皮 薑汁炙 半夏 湯洗 薑汁製
乾薑 炮
右為末每服三錢水一盞入生薑五片同煎至一盞去滓溫服不拘時
沉香散治妊娠腹滿可食氣刺痛
沉香 陳橘皮 去白 焙 白朮 二兩 人參 木香
茯苓 去黑皮 甘草 炙
右為細散每服二錢入鹽少許以沸湯點食前服
白豆蔻丸治妊娠腹滿飲食遲化胃中氣壅健脾和胃

白豆蔻 去皮 枳殼 去瓤麩炒 各一兩 木香 二兩 當歸 切焙
訶梨勒 煨去核 陳橘皮 去白 焙
右為末將棗肉以水煮去皮核爛研和藥丸如梧桐子大每服二十
丸至三十丸切生薑入鹽少許煎湯下不拘時
木香丸治妊娠腹滿可思飲食嘔逆不止
木香 沉香 枳殼 去瓤麩炒 青橘皮 去白 焙
甘松 甘草 炙
右為末水浸炊餅和丸如梧子大每服一丸嚼破煨生薑一塊如皂
子大與藥同嚼溫湯下食前服
草豆蔻散 出聖惠 治妊娠心腹脹滿脾胃氣虛不下食飲
草豆蔻 去皮 人參 去蘆 白朮 各 柴胡 去苗 陳橘皮 去白 焙 各
訶梨勒 甘草 炙微
右擣羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六
分去滓不計時候稍熱服
藿香丸治妊娠腹滿溫胃氣化冷痰利膈思飲食

藿香 木香 各一 白豆蔻 去皮 丁香 各半 半夏 一兩 生薑汁浸
右為末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服二十丸食前生薑湯
下
白朮散 出 治妊娠心腹脹滿不欲飲食
白朮 黃芩 陳橘皮 去白 二兩
右擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分
去滓不計時候溫服
枳殼湯 治婦人懷胎腹脹
枳殼 二兩 黃芩 一三
右為麤末每服半兩水一盞半煎一盞去滓溫服 若腹脹滿身體
沉重枳殼湯中加白朮一兩
治妊娠腹滿有熱證者 [illegible]

○身體腫脹 附論

夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不剋水血散入四肢遂致腹脹
手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜
腳腫俗呼為皺腳亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水○凡妊娠之人
無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒邪氣及有所觸犯則隨
邪而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相
搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫
滿也然其由有自或因泄瀉下痢臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾
煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭目或手足浮腫也然水漬於胞兒
未成形則胎多損壞及其胎產日腳微腫乃胞臟水少血多水出於外
故現微腫則易生也或有寒冷承因寒冷所觸故令腫滿也○妊娠
自三月成胎之後兩足自腳面漸腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食
不美似水氣狀至於腳指間有黃水出者謂之子氣直至分娩方消此
由婦人素有風氣或衝任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段甚者
慮將產之際費力有不測之憂故不可不治於未產之前也○脾合土
候肌肉土氣和平則能制水水自傳化若有停積若妊娠脾胃氣虛

血壅閉見水飲下化且氣道並外攻形體內害胞胎姙之始腫滿或又瀉膀氣如臨月而脚微腫者利其小便自病可愈

方

木通湯 治姙娠身體浮腫心腹脹滿小便不通

木通 香薷 桑根白皮 木香

訶梨勒皮 黃芩 枳殼 檳榔 紫蘇莖葉

右麤擣篩每服四錢水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓溫服食前日再

當歸散 治胎前諸疾或因憂中恚氣衝子藏或充脬脈腹急肚脹腰腹時疼可思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難小便忽澀玉門忽腫

當歸一兩 赤茯苓 枳殼 白芍藥 川芎各二兩

川白薑 木香 粉草各半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞半薑三片煎至八分去滓無時溫服如稟受氣弱及南人枳殼減半如氣實及北人於內加分二服服之或連日大便秘澀加蜜同煎

八正散 治姙娠心氣壅胎氣八箇月散壅手足浮腫急痛不安難產

瞿麥 木通 滑石 大黃 車前子

萹蓄 山梔人 甘草

右剉散每服三錢水一盞燈心同煎熱服

勝金散 治小腹連脹者何益因食硬物傷胎胎既受病傳於脾胃致虛令遍小腹狀若奔豚或腰重大便秘澀兩腸虛鳴宜服勝金散溫中下氣寬脹即安寬

吳茱萸 陳皮 乾生薑

川芎 厚朴 縮砂仁 甘草 乾薑

右為細末每服二錢鹽湯調服不拘時候一方有木香無縮砂仁

桑白皮湯 治姙娠四肢腫滿小便不利喘促

桑根白皮 枳殼 商陸 澤瀉三分

大英根 赤茯苓 木通

右麤擣篩每服四錢匕水一盞半入生薑半分拍碎煎至八分去滓食前溫服以利為度

鯉魚湯 治姙娠腹大胎間有水氣腹腫通身腫滿胎僻不分

鯉魚一頭 生薑 白朮五兩 芍藥 當歸各三兩

茯苓四兩

右㕮咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升內藥煎取二升分五服已此李崔兩師初寺一方用陳皮少許昔有姙娠腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫脾胃寬氣去脹等劑服之反以藥物不能納轉加脹滿湊心驗之胎死腹中大服諸下胎藥不能通解舉家憂惶因得鯉魚湯論曰脚腫俗呼為脚腫亦有通身腫滿心胸急脹名曰胎水遂去姙娠人前衣服看之胎壯不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方得分娩死胎可謂更生之人矣此證蓋懷身腹大娠婦不自知覺人人皆以謂身娠如此終不以為胎水病醫人何以得知故書此論病家自當覺察

防己湯 治姙娠通身浮腫喘息促小便澀

防己 大腹皮 桑根白皮 紫蘇莖葉 赤茯苓

木香一分

右麤擣篩每服四錢水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓食前溫服一方無大腹皮

赤茯苓湯 治姙娠身體浮腫心腹急滿小便赤澀及水腫

赤茯苓一兩 白朮 旋復花 木通

杏人 黃芩

右麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑一分拍碎煎至六分去滓食前溫服一方無木通用防己二兩不用黃芩

茯苓丸 治姙娠身體腫有水氣心腹脹滿小便澀喘息促

赤茯苓 郁李人 檳榔

葶藶子 枳殼 白朮

右擣羅四味為末入末味同研令細煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸煎桑白皮湯下一方加桑白皮名檳榔丸粥飲下

天仙藤散 治姙婦足腫如水氣狀

天仙藤 香附子 陳皮 甘草 烏藥

右等分為細末每服三錢水一盞薑三片木瓜三片紫蘇三葉同煎至七分放溫澄清空心食前服日三服小便利氣脈通體輕腫漸消更不須多服

治姙娠身體有水氣心腹脹滿小便少

茯苓四兩 杏人 檳榔 旋覆花 郁李仁各一兩

右為粗末以水六升煮取三升去滓分溫三服小便通即止

葶藶散 治姙娠遍身洪腫

葶藶子十分 白朮廿分 茯苓二兩 桑白皮 郁李仁八分

右為粗末以水六升煮取二升分溫三服小便利即瘥

又方 治姙娠煩渴引飲致腹脹身腫不能食

澤瀉 葶藶各三 茯苓 枳殼 白朮各

右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即瘥

澤瀉湯 治姙娠氣壅滯身體浮腫喘促大便難小便澁

澤瀉 桑根白皮 木通 枳殼 赤茯苓各

檳榔

右為粗末每服四錢水一盞半入生薑半分拍碎煎至八分去滓食前溫服以利為度日再服

防己湯 治姙娠腰脚腫痛

茯苓 白朮各四 乾薑 甘草 杏人三兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分食前服

五皮散 治胎水亦治孕婦脾虛腫滿

大腹皮 桑白皮 生薑皮 茯苓皮 橘皮各等

右㕮咀每服半兩水二盞煎磨木香一呷同煎至八分去滓空心溫服亦治男子脾虛腫滿 一方去桑白皮有白朮倍之名白朮散

治姙娠腫體有水氣心腹急滿

茯苓 白朮 黃芩 杏人各三

旋覆花

右㕮咀以水一升煮取二升半分三服忌桃李雀肉酢物

養生飲 治姙娠遍身虛腫

桑寄生一兩 桑根白皮 木香 大腹皮

紫蘇莖葉一兩

右細剉如麻豆大拌勻每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

李子白皮飲 治姙娠四肢腫皮肉拘急小便不利

李根白皮

右以粗細剉如麻豆大拌勻用水五盞入生薑七片同煎去滓

當歸郁李仁并食鹽便利差一方無生薑名當歸湯

豬苓散 治姙娠身腫手足腫脹小便不利

豬苓 紫蘇莖葉 木通

右搗細羅為散每於食前以溫水調下二錢

葵子散 治姙娠身腫浮腫小便不利洒淅惡寒

葵子 赤茯苓 漢防己

右搗細羅為散每於食前以粥飲調下一錢

商陸赤小豆湯 治姙娠手足腫滿攣急

赤小豆 商陸各等

右㕮咀每服一兩用水一碗煎至七分空心服一方有澤瀉一方無澤瀉有桑白皮

治姙娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲

取豬苓五兩為末以熟水服方寸匕日三服

燒鯉魚方 治姙娠胎水腫滿及姙娠卒下血 方見前

治姙娠毒腫方

用芭蕉根先去皮搗研如泥令布大三

薄腫以帛急之日再易

汁含咽之

又方

用燒鯉魚如常法方可服方寸匕日三

治姙婦兩脚腫名曰脆脚脾不能制水以化為水所致

用生料平胃散每服二錢薑服為末蘇湯調服亦可

治婦人身腫不能言者

前王壻散二兩水半盞煎至七分去滓入酒放温時時呷之

○腰痛 附論

夫腎主腰足因勞傷動其經虛則風冷乘之則腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其不止多動胎氣婦人腎以繫胞姙娠而腰痛甚者則胎墮也

五加皮散 療姙娠腰痛不可忍或連胯痛先服此散

杜仲 五加皮 阿膠 防風 金毛狗脊

川芎 白芍藥 萆薢 杏仁去皮尖炒

右㕮咀以水九升煑取二升去滓下膠作一服一方無芎藭生薑

煎服

續斷丸 療姙娠三二月腰痛不可忍者次服此丸

續斷 杜仲 芎藭 獨活 狗脊

五加皮 萆薢 芍藥 薯蕷 訶子肉

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下四十丸日三服

平胃散 治產前暴崇刺兩脇疼痛

杜仲散 療胎動不安以致腰痛背及臍腹疼痛

杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎

萆薢 人參

右細剉以水七升煑取二升半分温三服無時

防風湯 治姙娠身痛

防風 藁本 獨活 細辛 甘草

阿膠

右㕮咀每服三錢水一盞煎熟服之

當歸散 療姙娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛二三月姙娠

當歸三兩 阿膠 甘草 葱白一斤

右細剉以水七升煑取三升去滓分温五服

大地黃丸 治產前後腰腹疼一切血疼及治氣血虛四肢不舉骨髓熱疼

熟地黃二兩 烏梅肉 當歸各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸白湯嚼下空心

大腹散 治姙娠氣壅攻腰疼痛不可忍

大腹皮 郁李仁 枳殼

右擣篩為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治姙娠腰痛

豉一兩 榆白皮一兩

右熟擣蜜丸如梧桐子大服二七丸亦治心痛温酒下亦可

治姙娠腰痛不止方

鹿角屑一兩 生乾地黃一兩

右擣細羅為散每於食前以温酒調下二錢

治姙娠腰痛

用麻子三升以水五升煑取十三升分五服亦心痛

牛屎方 治姙娠腰痛亦治心痛煩悶

燒牛屎焦末水服方寸匕日三服

地黃酒 治姙娠腰痛方見諸血門

紫酒 治姙娠腰痛如折亦治常人腰痛一名聖酒方

用大黑豆二合炒令香熟以酒一大盞煑取七分去豆空心頓服

通氣散 治姙娠腰痛狀不可忍此藥神妙

用破故紙不以多少瓦上炒令香熟為末嚼核桃肉半箇空心温酒調下二錢

療姙娠腰背痛反覆不得

用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒淬以角碎為度取酒飲之

為末服亦可

治姙娠卒腰背痛如折

以銀一兩水三升煎取二升飲之

產前散勝

甘草 生薑 烏梅

右用水一大盞同煎至八分去滓服更令骨軟產前氣痛不攻作

杜仲丸 治妊娠宜血海虛弱寒邪氣奔搏胞絡妊娠腰痛小

腹牽連行步力弱艱於俛仰小便白濁晝夜頻併

五加皮 萆薢 山茱萸一兩 杜仲四兩炒

續斷 金毛狗脊 川芎

細辛 鹿角膏 生乾地黃

右件爲細末蜜糊和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下或煎艾

湯下空心食前服

阿膠丸 治妊娠胎臟之氣腰腹疼痛或因損動至胎肭下腹痛作

香附子 天山 當歸 五味子

吳茱萸 阿膠 川芎 乾薑

蒼术 甘草

右件爲細末醋煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三十丸煎艾湯下或

木香湯下空心食前

治妊娠腰痛不可轉側兩足浮重行步無力腰腹痛不可勝忍

杜仲 續斷 茯苓 川芎 防風

芍藥 萆薢 當歸 甘草 細辛

右細切爲末每服三錢水一盞之分同煎取一盞空心去滓溫

蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下二十丸亦得

普濟方卷之一百三十四 畢

普濟方卷之一百三十二目録

嬰孩門 論一道 類三十六類

總論

類

辯形色 小兒面部氣色 面上諸候察形歌

小兒面部氣色總現 虎口三關指掌圖

三關紋色形狀 三關指紋要訣 虎口手紋脈訣

指脈紋色様 脈指訣歌

驗五臟氣絕證 辯表裏諸證及治法

錢氏治法 五臟標本 五臟伏敵吉傷

五位分部定位 辯小兒脈法

形候證病訣 湯氏雜病形證歌

病證疑難 治中表病訣證 辨候變症

審小兒得病之源 病原歌

湯氏惡候形證歌 不治候歌

雜色不治 不治證 聽聲音驗病

辯疑 撮要 論髮際穴

灌藥服藥法 論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

小兒四時用藥 新生小兒戒灸

普濟方卷之一百三十二目録 畢

普濟方卷之一百三十二

嬰孩門

總論

夫醫之道誠爲難矣而治小兒尤爲難理寧醫十丈夫莫醫一婦人何也丈夫者榮衛氣壯婦人血脈相衝兼產難治千金云婦人之病比男子十倍難療寧醫十婦人莫醫一老兒何也婦人者氣血尚盛老兒元陽枯竭氣血皆衰以老兒爲難治寧醫十老兒莫醫一不語小兒何也老兒雖元陽枯竭氣血皆衰疾病即能言小兒不能言精神猶未備骨肉猶未堅形質猶未正脈息猶未全所以難治者語不能問其得病之由脈不能診其必無之理故黃帝云吾不能察其幼小也寶鑑云冠壯易明幼童難治○活幼論危氏得効方云譬諸木有根荄水則有泉根荄盛則枝葉暢茂原深則其派必長小兒稟父母元氣而生成元氣盛則肌膚充實驚疳積熱無由而生風寒暑濕無由而感元氣虛則肺實怯弱諸證易生所患輕則藥餌調治所患重則可治者鮮故試詳之後或不能言或不能行或手拳不展髮不生斯猶可治甚則初生之時臍風撮口吊腸等證鎖肚重舌無聲舌焦鳥飯者黑如此病狀非惡疾則百無一治若其餘諸病不一治之之道當觀形察色聽聲切脈觀形則先觀其眼若兩眼無精光黑睛無運轉目睫無鋒芒如魚眼猫眼者不治或神氣於內而外若昏困神氣不亂則是無再活之理察色者若面目俱青眼睛竄視此爲驚邪入肝面紅頰赤惕惕夜啼則驚邪入心面青惡呼喘嚥咬牙乃驚邪入腎面色淡白喘息氣乏則驚邪入肺面黃嘔吐不食虛汗多睡乃驚邪入脾皆隨其狀而治之聽聲則聽中驚啼聲浮者易治聲沉不響者難痊或聲如鴉中彈者不治至於切脈浮則細而遲實則洪而數次當看紋候男左女右手掌之從虎口內至第一節是風關第二節是氣關第三節是命關第一節赤紋乃飛禽內外人驚紫紋微乃火驚黑則水驚青打撲驚青色乃天雷四足驚內隱青紋微細則是急風候紋青乃停食候第二節氣關紫色紋急驚痢青多紋乃疳傳肝經白則疳傳肺經若黃色乃疳傳脾經黑色難治第三節命關青黑紋現三關通度斜歸指甲則不治至於驚疳積熱四證驚者虛陽怯松氣怯神散痰涎來去其聲必青積新生風其證有冷熱虛實冷則溫之虛則溫之實則利之熱則涼之是爲活法急驚之候通關截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已後又急須和胃鎮心不可過用寒涼等劑其或口中出血兩足擺跳腹肚搐動摸體尋衣神昏氣促噴藥不下通關不定心中痛絕忽大叫者難愈慢驚之候宜於生胃氣藥和以截風定搐不可太燥其或四肢厥冷吐瀉加嗽面黯唇慘胃痛鴉聲口生白瘡髮直搖頭高急涎鳴口眼手足一邊牽引者難愈慢脾十救一二祇當生胃回陽如太衝脈在則取百會穴灸之若身冷粘汗直臥如尸病喘頭軟大小便不禁虛痰上攻呼吸氣粗脈來浮數是謂陰盛強陽錯認陽氣已復直與峻藥下痰痰通氣下人以醫爲能皆之如則復撥燈燃之證雖不藥亦無生意矣又有急中痰涎聲如拽鋸一兩日間閉目不開此爲虛痰鬱積其氣漫遂下痰亦未可保蘇合香白丸子姑與之痓病發痛天吊亦風之類搐身僵仆有汗不惡寒手足冷口噤爲柔痓無汗惡寒身反張咳嗽爲剛痓得之表易施治諸癇八證馬癇張口搖頭馬鳴反折羊癇揚吐舌犬癇手屈兩足拳攣雞癇搖頭反折並馬陽癇口吐涎沫振目視人牛癇目視直腹脹烏癇唇口撮緊手足俱搐兒癇身軟頭舉吐舌視人並屬陰治法須臍其冷熱䐃氣平血和痰除風息或目睛不轉口噤無聲唇面青黑肚脹不乳身熱下血厥逆吐利汗出壯熱不止髓軟不癒眼生白瘡不治之候天釣者壯熱翻眼手足搐掣如魚之上釣皆由乳母過食熱毒迺痰乳兒兼挾風邪所致但當解利風熱則瘥手而命治者總而論之項弱無力魚口氣麤啼喘咬人一寫下如痢血手足搐搦不得目似開不開身軟口噤不食舌乾瀉反張昏張頻踏不動不作聲冷汗如油慢脾發不醒視物不轉睛眼上赤脉雖盡癇復生亦無如之何若痼候兒童二十歲已下爲痼二十歲以上爲癆癆與痼皆氣血虛損藏腑受傷故有肝心脾肺腎五疳外有蛔疳脊疳腦疳乾疳疳渴疳瀉疳痢腫脹疳勞無辜疳丁奚哺露治之各有方其病多因乳哺天常腸胃停稽或吐或瀉晝夜內熱而得之故其爲候頭皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口燥唇白兩眼昏爛揉鼻挦眉脊聳體黃鬭甲

咬牙焦渴自汗凝曰瀉臟肚脹腸鳴痢結溺熱或身多瘡疥酷嗜仏果鹹酸炭米泥土多飲水者皆其證也惟腎疳害人最速者蓋腎虛受邪熱疳氣奔上焦故以走馬為喻初作口氣次第齒黑盛則齦爛熱血迸出甚則齒脫宜急治之縱得全活齒不復生其餘諸疳如或飲水不以滑泄不休舌上黯黑目睛青筋眼角黑氣小便如乳牙黑骨枯脫肛軟逆氣促身上粟生斑黑唇白腹高人中平滿抱 手足垂彈無力覺着脚心全不知疼身軀變冷為五絕積者面目浮黃肚緊脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸祕澁小便如油或便利無禁糞白酸臭此皆其證也其或面黑瀉黑肚脹泄下不止疳蠱手必有瘡瘦弱柔軟亦莫能療矣疳之為病有實有虛實者兩臉深紅唇口紅紫煩渴焦煩大小便難啼呼無時時發壯熱虛者面色青白恍惚微溺口中清冷泄瀉虛汗或作冷作渴上壁下利水穀不分乃令熱不調外有十證熱者潮熱如瘧風熱不減乳食積熱多吐積熱脚手冷耳鼻脚冷手指尖冷乃麻疹之證唇汗口珠乃麥蒸候也多瀉多日瘡之為熱面青脈大驚熱的是脾病啼聲不息[illegible]目閉面如胎中全不受熱諸吐乳食不化面色

黑隨食隨吐通身冷則為不治諸瀉日久不宜緊澁之藥宜先須調氣和中若洞瀉不止乳食不進無有愈期汗多舌出唇紅眼閉搖頭氣麤兩脇動口生血瘡吐瀉得之名曰胃爛大亡精液至於八朔則有魚口噤口五色脫肛臟毒脾毒令積痢無非便下膿血裏急外重腸腹急痛日夜無度治之須究其因先以去積寬腸通氣之劑續為之斷下鮮有不愈其或所下如魚腸血水壯熱煩而不食白汗小便不利未知有瘡一瘡疹一證通表虛裏實其根於臟腑所患重麻疹表實裏虛其根於皮膚所患輕不治亦自愈至若豆疹多因時令不正氣候傳染加之外感風寒內積邪熱而得大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼耳鼻脚指手中指俱冷噴嚏呵欠喘嗽痰涎或作寒作熱驚似之間當視其耳後有紅脈赤縷及見心胃間細點如粟起為痘子尾不可汗不宜晶下之解毒和中安表大要如前人作熏炊撩撥得熱耳其或熱極生風或發驚搐但當清心散風切不可投冷藥之劑及灼艾蓋灸則以助熱燃投冷藥則毒氣內攻又為大害仍忌諸般臭穢煎炒油煙人毋行房梳頭剪髮犯未發觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸則瘡痛如割以至黑爛切宜禁戒仍燒蒼朮諸香及打醋炭噴胡荽酒於遍房以辟穢觸之氣却不可以母舍兒不忌無慈為常法病此者多不服藥豈知未發已發則合解散正發則合活氣血若依此非惟出疹亦易乾斂仍免後患若不依此則邪盛瘡密收靨費力餘毒為患致生癰疽疥瘍赤眼咽喉口瘡之疾至於善惡之證猶當細認如善證則乳食如常大便或一日一次或兩日一次通者只須用和平不冷不熱之藥自保十平全如惡證則着夏屬陽為順秋冬為逆冬月寒嘗水得時多歸於腎或先如蚤後發渴其瘡色如黑血此腎證也不治春屬瘡疱為金剋木夏黑靨為水剋火秋斑子為火剋金冬疹子為土剋水並逆鼻有黑氣或舌黑瘡已出而搭譫語煩渴小便赤澁泄瀉不入食瘡成餅搭黯塗不發其聲焦啞兩眼閉面黑睛暗咳面陷目閉頭溫齒頭面腫大瘡盡紫破或臭不可近或脚冷至膝瘡小黑而負風攻喉頭唇項腫硬胃高而突以上證狀內不可治外此至於風寒暑濕之感於大人無異治之法特劑量差少耳雜證則隨方備治

○辨形色 附論

全嬰方論云夫嬰兒未能言有病宜察知也唯察形色而已蓋形有五色應其五臟五色青黃赤白黑五臟之肝心脾肺腎心赤肝青脾黃肺白腎黑是五臟所主人稟其內必形於外故小兒有病先見於面部也如形病不相應者更切脈証○分五臟五色面部形證○左頰屬肝東方之應其位居左脈訣云色青形象木位列在東方右頰屬肺西方之應其位居右脈訣云兌為八卦地金屬五行處額上屬心南方之應火性炎上脈訣云象離隨夏王屬火向離主鼻上屬脾中央之應其位居中脈訣云王特隨四季向土為根下頦屬腎北方之應水性潤下脈訣云王冬身為水位北定無疑難經曰五臟有五色皆見於面素問云神之變也其華在面又云現其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛此所謂視而可見者也錢氏云左頰為肝右頰為肺額上為心鼻上為脾下頦為腎赤者熱隨證治之○定四季色各歸部位驗病○春色左頰微青者平深青者病白色者絕黑色額上微赤者平深赤者病黑色

者鮑秋色右頰微白者平深白者病赤色者絶冬色下頦微黑者平深黑者病黄色者絶季色鼻上微黄者平深黄者病青色者絶季色者四季月各十八日土旺時○分五藏面部病證○額上心證赤色者心經有風熱主心躁驚悸睡卧不安青黑色心中有邪主驚風腹痛寶鑑云心乃中邪多痰或病啼叫青黑甚則心腹疼微黄色皮乾燥主盗汗頭髮乾黄婦主驚疳骨熱微渴王氏云毛髮黄必時復發熱故也左臉肝證赤色身熱拘急肝風熱也青黑主驚或腹痛滔赤潮熱心躁有一等小兒夜間潮熱日中面紫不赤必唇紅乾燥也脉不真兼診脉緊數右臉肺證赤色身熱淡色潮熱或大便堅而氣粗壅嗽青白色主咳嗽惡心青色主風入肺時時嗽青黑主驚風欲發或腹疼盤腸内吊鼻上脾證赤色身熱不思飲食黄色小便不通鼻孔乾燥氣粗主衄血鼻孔乾燥不氣粗是肺熱夜間多哭鼻上淡白色主泄瀉食不化王氏云鼻青主吐妳鼻口乾燥主大小便不利下頦腎證赤色主膀胱與腎爲表裏有熱則水道不利令小便不通○分面部雜病證○面目證青色驚肝風熱赤色心肝熱主煩躁風熱黄色主脾積口臭可食目解主驚

目赤肝風熱主驚目飽浮腫主久嗽惡心如不救主痢食積黄狀大便不調春又主骨熱或時腹痛亦主疳起王氏云兩目飽腫浮脹面浮是脾受積目睛黄赤主早晚發熱兩目深沉色微黑眼睛微赤主耳聾壅耳是疳氣攻腎眼尾有細碎紅紋主驚風内吊已上四證出王氏眼衍瞼主肝熱多變者因其狀黑睛外如金線隊是也寶鑑云風熱眼衍瞼又云精黄藏腑有積寶鑑云青在兩眼是驚欲發在左上必多驚悸右上風入肺爲嗽脉要云目赤偏多惡熱直人云揩拭眉眼是欲生風甲堂證青黑色主腹疼夜啼如傷風主頭疼不傷食主久痢寶鑑云肅痍眉頭皺王氏云眉心中尖白色主泄瀉黄白食物不化人中證寶鑑云人中左右兩邊黄主傷食人中心青主乳不化便青唇口證唇白主吐逆唇淡亦主吐血便血唇紅赤乾燥而皺者主渴唇紅赤不皺主口臭又便不通又閉心躁不睡紅乾而燥主熱王氏云口臭唇黄脾受積後必發驚仍主便是黄白不化人云唇口紫吐瀉主熱痛飛仙論云唇口紫不吐是積氣千金云唇燥并主小熱口舌生瘡寶鑑訣云唇紅赤主胃口熱下不然唇口動主驚熱寶鑑云口唇青必吹生風吐又主口瘡

有一等小兒脾冷流涎下頦常濕名滯頤不在此條錢氏云口頻撮氣不和益散又云血虚陸爲冷亦乘則唇青孫真人云唇青主脾寒或時肚疼乳食減少舌上證舌乾舌白舌黑舌燥舌胎舌黄舌有□主大便不通設或遇利大便必臭黄舌裂舌上芒刺舌上出血皆脇熱陽毒也舌上生瘡心脾熱舌捲主驚有久瀉痢舌黑必死不可認爲熱是又痢上舌黑熱久瀉痢舌黑者多死不治氣喘錯氣喘不適必主驚候寶鑑云噫飲須知死數氣喘氣下氣頻呵欠主驚兩耳證王氏云耳前微赤主耳聾微黄主腎經驚中吹耳耳輪乾燥黑主疳腎蒸熱○分面色相亂病證○面青茭白主惡心可食驚瀉面青白主吐瀉寶鑑云主驚風欲發又云面青俱白主驚身哭胎受邪王氏云面青唇白主吐妳不化青冷難經云外證面白善嚏悲愁不樂只欲哭面青黑色吐沫者亦看不吐沫者食積痛亦主驚寶鑑云主天吊風面青遍身熱發躁多受痢疾面青有汗口内氣熱必發吊痛面黄夜卧盜汗面青黑或時吐沫者寶作面青唇赤主壯熱驚搐面青白黑往來不定主心腹痛煩渴寶鑑鑑云臉赤面黄白主心痛壯熱千金云面赤目黄主小便不禁渴者子

云面青筋急或多嗔悶目嗔不見人面紅赤色主傷寒發熱心躁不安若眼斜欲驚發狂寶鑑云主身熱傷風又云面紅變易主驚搐通真子云面赤心煩仍多哭面黄臉赤主傷寒潮熱驚搐睡卧不安如肉肉微微赤者主痢食潮熱錢氏云心痛面黄臉赤身壯熱安神丸主之面黄白色主疳積人便不調夜起食不消嘔逆寶鑑云面黄白主脾肺有積通真子云面色萎黄瀉痢無時錢氏云面㿠白氣弱腹肚疼痛不思乳食面目皆黄是脾熱曰黄疸寶鑑云黄疸皆因胃熱爲錢氏云此證多於大病之後不因病及身微黄者胃熱面黄肚大脾疳初生嬰兒身黄胎疸頭面青筋月者將欲發驚因熱必作搐因吐必肚疼若頭面大小青筋如線縷浮起者多治不痊見搐搦則難愈雖未非時青色面色不定謂之青面色非時變易不定者是胎風有驚亦主客忤面色或青或白或黑不定者腹中痛錢氏論云目赤多哭者欲發搐目直而肘自反折搖頭者生驚吹牙咬者發驚口中吐沫水者後必發痛昏睡善嚏悸者將欲發驚吐瀉昏睡露睛者胃虚熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱吐瀉不化胃氣虚也下之迷也及從人呵欠昏胃虚冷吐稠涎及

血皆滿熱，久則虛瀉，黃紅赤黑皆熱，瀉青白乾 胃冷身熱不飲水
者熱在外，身熱飲水者熱在內，先發膿疱後發疹子者逆，口噤不止則
失音，暈疼草穴同長大不行，行則脚抽，齒長不生，生則不固，髮久不生，生
則不黑，血虛怯為 令所乘則唇青，黑黃色久則尿血，小便不通，久眼
蒲當利小便，先浴 拭臍不乾風入作瘡，令兒撮口，甚者是脾虛吐瀉疾
熱者下之，吐後瀉 者益之，先發膿疱後發疹子者順，先發水疱後
發疹子者逆，先發膿疱後發水疱，多者順，少者逆，先水疱後斑子多者
逆，少者順，先疹子後斑子者順，凡瘡疹只出一般者善，胎實面紅目黑
睛多者善，哭胎怯面 黃目黑睛少白睛多者多哭，凡病先虛或下之
合下者先實其母，然後下之，假令肺虛而痰實，此可下，先當益脾，後方
瀉肺也，大喜後食乳食，多成驚癇，大哭後食乳食，多成吐瀉，心痛吐水
者蟲痛，心痛下吐水者冷心痛，吐水不心痛者胃冷病，蟲面有五色，不
當不澤者死，呵欠面青者驚風，呵欠面黃者脾虛驚，呵欠多 者內
熱，呵欠氣熱者傷風，熱證疎利或解化後無虛證，勿無補，熱必隨
生

〇小兒面部氣色

五臟五色本位 心主紅，脾主黃，肺主白，肝主青，腎主黑

五行相生 金生水，水生木，木生火，火生土，土生金

五行相剋 金剋木，木剋土，土剋水，水剋火，火剋金

五行今生相侵 心氣侵黃，脾氣侵白，肺氣侵黑，腎氣侵青，肝氣侵紅

五藏生本相臨 心氣臨青，脾氣臨紅，肺氣臨黃，腎氣臨白，肝氣臨黑

五臟勝伏相交 白色交心，黑色交脾，青色交肺，紅色交腎，黃色交肝

五臟受尅相入 黑色入心，青色入脾，紅色入肺，黃色入腎，白色入肝

五臟受變 肺本辛金畏丁火變巳土，腎本癸水畏巳土變辛金，肝本乙木畏辛金受癸水，心本丁火畏癸水變乙木，脾本巳土畏乙木變丁
火

五臟子母生成 肺 脾母腎子 腎 肺母肝子 肝 腎母心子 心 肝母脾子 脾 心母肺子

分定五位所屬局

心藏部位　脾藏部位　肺藏部位

顱面臉頰，心火所屬，氣池之下，法令之傍，食倉之上，高骨取之一寸分，皆屬心之部位

承漿之上，人中之下，法令之內，食倉之傍，其合即唇，其開即口，合則屬脾，開則屬心，四方二寸四分，撮動之所，皆脾之部位

準頭至山根，兩孔并中梁，皆頭直下年壽上，東外通息，皆屬肺之部位

腎藏部位　肝藏部位　命門部位

耳花及輪廓，文臺山林，顧髮際兼地角，四維如海岸，皆屬腎之部位

風池與正居，氣池眉皆，頭上下耗動處，太陽及太陰，連及山根，所皆屬肝之部位

天中與天廷，司空及印堂，額角方廣處，有病定存亡，青黑驚風惡，體和滑澤光，不可陷兼損，純黑病難當，青則憂甚，氣黃赤亦堪傷，此是命門地，醫人鮮[illegible]量

面部圖



額（紅熱青驚）印堂（青驚紅熱）顴（熱紅）年上（青吐）臉（赤傷）兩眉
風池 金匱 人中 承漿
正口 兩眼 聽 危證
太陽
已上大抵紅赤則熱，青則驚，黃積或吐痢，黑色非症則危證也。

面部圖

面青肝之病
面赤心之病
面黃脾之病
面白肺之病
面黑腎之病

今附五臟受病圖

肝藏受病

驚風髮際白
受積食者黃
面青為冷候
骨赤熱為瘀

心藏受病

心驚者
積候起太陽
熱多面頰赤
冷則白面光

脾藏受病

脾驚髮際白
有積口唇黃
冷即眉心白
熱則太陽高

肺臟受病 腎臟受病



髮際青赤為驚
髮際赤為癥
冷在人中見
熱須面頰青
驚入耳前黃
粮沈精所傷
顴頰上紫
熱斐食舍光

○面上諸候察形歌

痢候眉頭皺，驚風面臉紅，渴來唇帶赤，熱盛眼朦朧。
山根若見有青脈，此則名為兩度驚，赤黑因痰時吐瀉，紅汗多啼夜不停。
青脈生於左太陽，一度須驚易會重，赤是傷寒微熱際，黑青

色乳為傷。石邊青脈不拘多，有則頻驚難奈何，紅赤為風抽眼目，青黑三朝命不過。
小兒初誕月，腹痛兩眉頻，病既盤腸氣，時時哭又悝。
小兒初誕月，體殼頭髮毛稀少，元因鬼疰胎。

外八片錦

眼上赤脈定難量，數內之中一不祥，或有亂紋錦目下，更加赤脈鮮瞳光。顖門腫起定為風，此候應須也不中，忽陷成坑如盞足，七日之間命必終。鼻乾黑燥渴難分，面黑青時命不存，肚大青筋無死候，只恐遺心直大紋。目多直視白睛黃，聲細身疼不可當，更兼看物勝勝慢，不久應須命也亡。指甲青兼黑，又多惡瘦，唇青恐奈何，忽作鴉聲心氣急，此時應不免。元痾虐舌出口數無好，氣急唇青命即亡，叩齒醫人難定死，聲孤魚口氣喉防。蛔蟲出則有三般，口鼻之中出不懽，或若白蟲兼黑色，靈方任選命須拚。手坐瘡痛不常，下氣頻頻更滑腸，氣喘汗流身不熱，手拏胸臆命遭殃。

已上八候疾中犯得一般者皆危亡之候也

內八片錦

紅淨為安體貌寧如逢紅黑便肩驚更兼紅亂前人甚轉下除驚又添有靈赤殷輕微走外驚若來紅熱并輕紅散散多因啼哭乳搐搦將來豈得手忽逢相間有其青者着立便有風生紅青號麻風將起不見風屑氣陽登亂技湯藥紫兼青急急驚持命免傾若如淨紫體還熱須知五臟有風生黑輕可治死還生紅赤傷寒痰疾停赤青已受脾風了青黑脾風作慢驚紫細紅曾六畜驚紫赤相間則痢成紫若一同如米粒夾食傷寒事可稔紫散風傳脾臟間紫青多瀉即風癇隱隱紫深難治麻去風痰毒命有逢紅赤乎連赤若輕必然乳母不相應有時兩手俱無見定知滴汎應神明

已上歌訣無形但看五色浮沉長短可定死生

小兒面部氣色總現

五位總作痕波泛殺陽怒黙黙青色者驚積不散欲發風候其神彩觀覷不穩上上下下證變風生

五位總作閃紫激射乎燈映火紅色者痰積壅盛驚悸增進其神彩視物不定恍恍惚惚候變驚逆

五位總作晃熱泥潦表傳土牆黃色者食積痰傷欲作痢疾或痞癖有之其神昏頓散漫昏昏沉沉其候寒熱翻覆飲食不欲氣粗短滿困倦喜睡嘔吐瀉痢皆有之

五位總作黯黯乎虛野霧入谷白色者肺氣不利大腸骨泄水穀不分欲作吐利其特危候蓋夫其精神朦朦朧朧性情不有光彩全無五臟少實百脈多虛或吐利之後有失調攝

五位總作黑黑雲蒙重灰飛覆黑色者傳不順證變即逆候表裏俱虛臟腑欲絕其氣不榮其氣不衛營衛失守經絡流走凝滯於脈為疾危急其神昏冒沉沉默默者為人不必

虎口三關指掌圖

三關指掌之圖

虎口叉手處是也

三關第二指又三節

風關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位

夫三關者正謂男左手女右手第二食指三節也頭節為命關次節為氣關下節為風關後歌所謂寅赤者正謂下節屬寅位中節屬卯位上節屬辰位也又謂上青者即第一節青也下黑者即第三節黑也非謂寸關尺也

活幼口議詩

小兒初生一塊血也無形證也無脈有驚須知是胎驚有熱須知是胎熱小兒生下一月餘有病如何為分別男左女右虎口看若是紫紋胎驚熱青色受胎氣不全亦有驚積多搐掣赤色必因數日前有驚困跌蹼嗔顚孩兒一歲至三歲虎口脈內看兩邊若過一關長一米定是驚風傳經起半寸病因是驚傳先須用藥鎮心氣若過寅位三第二節並同驚積一般說似出不出隱隱紋此乃驚傳脾臟結若還紫色脈雖通痛青色其驚入肺脾此病呼作慢脾風好手醫人急須療或紅顏色便心虛用藥之時立見安脈過三關連指面孩兒死候立須見不拘顏色赤白紅十死一生休怨嘆

虎口亂紋多因知氣不和色青驚積聚下亂瀉相和青即慢驚如入掌內吊多三關若通遍此疾久沉疴脈紋若黑青情知何足驚看內水火拏紅色是人驚[illegible]由及風熱亂[illegible]紋青食上停但看叉手處方可識其形青色大小曲人驚并四足赤色大小曲水火飛禽蹼紫色大小曲傷火麵魚肉黑色大小曲[illegible]風微作搐

又歌詩

左有紅紋[illegible]右有紅紋如左樣[illegible]傳驚積一[illegible]赤[illegible]是傷寒[illegible]紅定[illegible]生[illegible]氣關[illegible]位[illegible]風關下寅位[illegible]寅赤因驚搐生[illegible]若[illegible]不解[illegible]時命必沉寅黑須知腎藏[illegible]病[illegible]驚[illegible]相夾雜[illegible]視有痰[illegible]上青肝藏

本傳謟目閉身疼四體厥冷一則令孤傈冒氣中青冒連歛時休下青
驚是再驚來用藥追風可免災上下若有唇又白四肢逆冷葬泉臺
上未由無黑脉況或赤或紫黃多青上下一同煩渴熱更兼尿赤解
方醒下黑赤脉共可隨氣粗下世病貞知瀉變便脾風證候心虛怖
熱單赤驚赤傳辰位亦相通大便秘結熱兼風上下若違煩熱燥小
便赤色熱來攻不黑須紅字是驚但宜驚積自安平上下若違因打
跌熱來眼閉受心情

○三關紋色形狀

魚刺形主初驚
在氣關主壯熱吐痢
在命關極難治
在風關主初驚

懸針形主瀉痢
在氣關主傷冷
在命關傳慢脾極候
在風關瀉傳主慢脾風

水字形主肝驚
在氣關主痰嗽虛積
在命關困不治
在風關發驚嗚硬

乙字形又名曲形主食驚
在氣關主食傷吐痢
在命關困不治
在風關傳變爲風肝形于脾

走蛇形主內虛外實
在氣關主病積
在命關不治
在風關主勞帶驚

來蛇形主外實內虛
在氣關主病積
在命關不治
在風關主勞帶驚

蛇中催形內外俱虛
在氣關主疳積
在命關不治
在風關主勞帶驚

弓形環形主疳積
在氣關熱喚主吐逆疳
在命關不治
在風關疳極蟲疫

亂紋主蟲痛
在氣關有蟲積食生物
在命關痛熱難治
在風關蟲咬心痛

○○○ 珠形死候此形不拘三關見者皆死候

○三關指紋要訣



末關命門
中關風候
初關氣候



流珠形主膈熱三焦不和氣不調膈飲食欲吐或瀉作熱腸鳴自利



煩躁啼哭

環珠形主氣不和胃虛積敗食傷滯心腹脹滿作熱或食虛煩悶

鎗形主邪熱痰盛生風神精恍惚睡不安發搐搐搦驚風傳授

魚骨形主驚風痰熱證候已定可以截風化痰利驚退熱不作諸惡候
若已傳過恐作它證

水字形主驚積食積膈熱煩躁心神迷悶夜啼三焦不順痰涎壅盛
潮口噤痰如搐搦

針形主心肺受熱熱極生風驚悸煩悶兀沉默默不食神困四肢垂解
又驚風發搐痰涎壅盛抽搦等候

透關射指面主驚風疾熱四證皆聚停在胸膈不能散其候所受雖重
證順亦可治

透關射甲主驚風惡候受驚傳入經絡風熱發生併入八候虛痰不下
危急惡証難可療治
黃色無形者即安樂脈也紅若無形者安寧脈有莅伴形者即病之脈
次第而變初作一點子氣關多紅脈至於風關其色方變紫色病已傳
過青色已變之極黑色其病危急純黑分明不可療治三歲已上病重
危急指甲口鼻多作黑色蓋兒脈絕神困證候惡逆
氣珠只一點子紅色環珠其形差大長珠其形圓長以上非謂圖子總
皆紅脈貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大一頭尖去蛇亦如此
乃分其上下故曰來去角弓反張其裏外向裏為順向外為逆鎗形直
上魚骨分開水字即三脈並行針形即過關一二粒米許射甲命脈外
射透指命脈曲裏一十三位悉有輕重元由一氣自微至著從漸至驗
輕重參詳有云五色者曰黃紅紫青黑其病盛色能加變又傳加遠
即越黃紅之色紅盛作紫又有紅紫之色紫盛作青紋又有紫青之色
青盛作黑又有青黑之色至於純黑之候不可治矣

○虎口手紋脈訣

夫脈者血氣之先也有血氣則有脈然小兒初生至於五歲血氣未定
呼吸至數太過必辨虎口色脈參合三部脈法方可察其病之的要也
男以左手女以右手觀之其色赤者主心驚煩容憔悴壯熱多啼躁中
頻驚眼視直少精神其色黑者主痰毒積冷在脾與肺咳嗽重者又加
氣喘其色青者肝家受風延熱痛合眼如醉久則變慢驚風也其脈上
出者主痼氣逆食乳知積吐逆其脈縮兒入內至虎口者主食乳不消
化亦白痢世為脈紅可療面唇黑冷逡巡死青色難治夜多啼叫及主
天吊風寒目帶上插形或冷或熱面白肺風咽喉破而無聲面赤生瘡
辨其脈紋彎者主冷乳在脾宿食積滯忽熱忽冷及脾寒變成瘧疾
如青彎過第二節者有難消痰水在脾腹肚虛脹小便難出大便積
冷與脾虛氣脹如不思乳過三關者飲食不化喫水之時更加嘔吐
肚大青筋翻急頻出急與安脾胃藥服之遲即死也其外曲紋者主
因驚而又成風乃或如吐瀉如痰之候紋過第三節又成慢驚必死也其

裏曲紋者主傷熱身體壯熱頭疼多啼哭不睡時時驚人只在其中勢
熱灌於心藏而眼赤潮涼風藥治之其病過第一節可治過第二節為
難治過第三節為黑甲名曰絕脈下候顏色俱死證也如紋紫色白日死
如青色黑色夜後死

○指脈紋色樣

深青色主驚搐淺青主便青肚痛青黑主驚搐內吊
紅赤色主驚熱淺紅主下痢腹痛如不刺主吐瀉不食
深紫色主驚哭淺紫主煩渴紋青主傷乳不吐即瀉
脈紋透起指面者必發熱驚臥不安不熱則定病日深不久之變風搐若
指紋生枝節者不治或有進退喘急多睡精神不爽指紋不見者久久
發驚候不治

○脉指訣歌

小兒食指辨五關男左女右一般看若知初氣中風候未是命關勢不

難審知虎口氣紋脈側指看形分五色青紅赤紫五臟和紅紫傳輸有
損血紫青傷食氣虛煩青黑之時證候逆忽然純黑在其間好手醫
人心膽寒若也直上到風關粒米短長分兩端如鎗衝直驚風至分作
支叉有數般弓反裏順外為逆順逆交連病已難叉頭長短猶有救
如此醫人仔細看男兒兩歲前為嬰三歲四歲幼為名五六次第年少
長七齠八齔辭情九歲為童十稚子有病關隔辨其因十一兩痰疏
痾風痫病還同昔病攻痞癖定為癖積候忽爾熱不相同初看掌心
中有熱便知身體熱相從肚熱腳冷傷食定腳熱額熱是感風額腳冷
熱驚所得瘡疹發來耳後紅小兒有積宜與積傷寒三種解為宜食風
之時須有積冷瀉須用與溫脾水瀉且與益脾脾先將常揚敷與之
孩兒無事忽大叫不是驚風是天吊大叫氣促長聲粗誤食熱毒悶
心亂忽須吐下卻知淋者將驚藥良煙更逆疾寫來居頭不努不散
腸有風冷熱不調分赤白脫紅肚毒熱相攻十二種痢何為惡噤口刮
腸大不可見但有瀉不可下下熟白子無白焉神困顖陷四肢冷乾嘔
氣直神法白吐蟲面白以無純有氣粗熱噎不化真寒咳嗽及虛痰脈

細腸為燥煩譫若將有積與躁逼下了之時心生疏孩兒實熱下無防面赤睛紅氣壯指脈大弦洪肚上熱脹頭腫痛尿如湯米硬腹脹脇肋扁四肢浮腫夜啼長無瘡生瘡肚腹痛下之必愈世為良法者小兒初生至半歲之間有病即看額前眉上髮際下以名中食三指輕手滿曲按之兒頭在左舉右手在右舉左手食指為上中指為中名指為下若三指俱熱感受寒邪鼻塞氣粗三指俱冷臟寒吐瀉若食中熱上熱下冷若名中指熱夾驚之候若食指熱胸膈不寬若名指熱乳食不和五指梢冷主驚中指傷寒中指獨冷主瘡分男左女右看之○半歲以上方可看虎口兩歲以上看虎口兼一指脈若五百七十四日變蒸滿足只與看一指脈以食指裏特分取三部凡言三部者非寸關尺也皆面氣色為一部虎口紋脈二部寸口一指脈三部五臟者上按額前下診太衝消息三部謂之五脈凡兒有患不服而候即不可與太衝之脈其脈定生死之要會也其驗危惡皆當診之

○驗五臟氣絕證

心絕　顋腫頭陷汗出不流汗出如珠如油舒舌出口舌腫發驚黑點血髮直如麻皮膚黑色並死壬癸日

肝絕　啼哭無淚不哭下淚爪甲青黑眼深如暗舌卷囊縮背搐目斜直瞪口動手如抱頭之狀或脚面直青悶云其筆在爪其充在筋並死庚辛

脾絕　人中滿或黑唇縮者張唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒舌腫尿血舌瘡或卷氣乳斷張面紫冷涎如油撮口如囊面如土色四肢冷逆如瀉石之狀哭乳不收瀉青赤黑並死甲乙日

肺絕　有病喘急水井漿食喉中鳴是胃管直水不能降肺出嚨嚨書深有五黑曾有驗此必不治目直青斜目直氣促氣喘不咽飲食多重軟摸眼上視往塞口喉中鳴唇鼻乾黑燥鼻塞不通肺脈胃腸頭汗肢冷並死丙丁日

腎絕

面黑神昏眼黑睛腫目無光彩耳輪青黑耳輪焦枯牙齒焦枯痛牙齒落髮踈黃燥骨足疼驚啞咬奶聲啞舌出屈伸驚胃色脣口並死戊己

五臟相尅雜證

心病目黑腎尅心壬癸日絕

肝病皮黑肺尅肝庚辛日絕

脾病唇青肝尅脾甲乙日絕

肺病頰赤目腫心尅肺丙丁日絕

腎病面腫唇黃脾尅腎戊己日絕

五軟惡候　手軟脚軟頸軟背軟腰軟

五硬惡候　手硬脚硬頸硬背硬心硬

五冷惡候　手冷脚冷氣冷唇冷面冷

五縮惡候　手縮脚縮舌縮囊縮陰縮

五反惡候　眼反唇反舌反頸反脚反

五禁惡候　口噤唇口禁眼禁手脚禁陰囊禁

五陷惡候　顖門陷太陽陷眼睛陷胸下陷肩井陷

五腫惡候　五心腫人中腫舌頭腫腰腫陰莖腫

五喘惡候　瘡疹喘驚風喘虛腫喘吐瀉喘下痢喘

五音惡候　瘡疹音驚風音久渴音久痢音久瀉音

○辨表裏諸證及治法

表證屬陽

陽病外證壯熱煩渴大小便秘結頭面有汗昏憒氣粗揚手擲足三陽乃足三陽自頭至足

太陽屬膀胱其證體有指頭項痛發熱惡寒乃陽證之表。

陽明屬胃其證目疼身熱鼻塞不惡寒反惡熱自汗不惡內實大便難乃陽證之裏

少陽屬膽其證脅痛或口苦咽乾目眩往來寒熱而嘔病在三陽三陰之間

表證發熱頭疼惡寒或惡風或身體疼痛小便清其脈浮或浮緊浮數

表虛抹手而汗其證自汗惡風小便自利胡理論曰汗出而惡風

為表虛當解肌楊氏參蘇飲為和散香蘇散加乾葛本方惺惺散解肌湯小柴胡湯

表實脉浮而緊其證無汗惡寒大熱小便赤澀明理論曰無汗而惡寒為表實當表汗楊氏解肌湯楊氏麻黃桂枝湯加黃芩本方青龍湯解肌湯惺惺散並加麻黃

○論汗下活人書曰表病裏和汗之則愈下之則死楊氏曰陽盛體輕解肌而浮於外在體為表表有邪則知陽虛而陰盛表之藥宜溫和陰勿陽也湯氏曰凡小兒發熱之初急須表汗次當擇散無復調理要在一晝夜熱退為佳今之醫者多不用麻黃但用惺惺散香活散之類乃常法致令失表三五日熱不除入於經絡搏於血氣表裏受邪內外蘊熱變證蜂起或作驚風或成痘證陽生之命皆失表之過

當汗而不汗仁齋曰則汗血化為蓄血則熱悶煩悶昏迷譫語心怯衄血發黃發狂小便多皆血證也

當汗而誤下明理論曰表未解而誤反下之胃中空虛陽氣內陷則為便膿楊氏曰誤下則內泄其真氣邪氣得以深入為瘡痛為結胸為便膿為痢血張氏曰承氣入胃陰盛乃亡乃陰盛出外而誤投承氣下之外得寒而助邪內受虛而損正安得不已述之為妄下之戒

裏證屬陰

陰病外證脉沉而微其證厥冷自利煩躁無身熱頭疼

太陰屬脾其證腹滿或痛手足溫自利不渴咽乾腹滿時痛有積

少陰屬腎其證口燥舌乾而渴惡寒欲寐不欲見光明咽乾口燥胃汁乾也

厥陰屬肝其證昏青煩滿筋痿或囊縮不欲食舌卷囊縮毒入胃也

裏證不惡寒反惡熱手足心腋下有汗口燥胃乾身熱腹滿小便如常大便堅硬其脉滑實按緊中間數或則裏證也

裏實脉沉而實心腹滿身熱口氣熱大便堅明理論曰腹脹滿而短氣者邪在裏為實法當下之楊氏四順清涼飲本方解肌湯惺惺散並加大黃虛者煨用

裏虛而傳寒證脉沉而微細其證自利厥冷身清四逆口氣冷煩燥而身無熱唇青舌黑或白吐或不欲搖頭頸冷手足溫面色黯然明理論曰腹滿而短氣者裏邪虛也宜溫之仁齋曰陰病裏虛當用溫熱藥救裏楊氏溫裏理中湯厥冷甘草乾薑湯本方實脾散四君子湯加乾薑煮加附子

論汗下活人書曰裏病表和下之則愈汗之則死仁齋曰裏病體重脉重實而不浮其病在裏屬陰謂之裏有邪則為陰虛而陽盛是以攻裏之藥性宜寒抑陽助陰也又曰陰病亦謂之裏陰經受邪則成臟病裏者胃腑之主而臟受病又衆於裏為又當助陽以救裏法當溫之是以溫陰之藥性宜熱助陽抑陰也

當下而失下楊氏曰致血氣不通是以熱燥而厥深厥甚手足冷也陽盛則厥其脉沉數指爪時溫

當下而誤汗楊氏曰外泄其正氣內耗其虛而出為壞證為亡陽動經下厥上竭至於陽厥似陰張氏曰桂枝下咽陽盛則斃正以陽盛而入誤以熱藥汗之內得熱以助邪外受虛而損正安得不斃述之示誤汗戒

小兒諸病惟熱證多先當辨其虛實隨證治之

虛熱其證面色青白身微熱足冷口氣冷手足心不熱大小便自利恍惚神怯氣微弱泄瀉多尿虛汗自出叔和曰虛熱不可大攻熱去則寒起惺惺散豬苓湯四君子湯錢氏白术散

實熱其證面赤氣粗口熱燥渴唇腫大便難掀揭衣被煩躁叫在表宜汗青龍湯解肌湯並加麻黃在裏宜下四順飲解肌湯加大黃錢氏曰得判證勿中補熱氣得補復作表裏俱熱煩躁而黃[illegible]煩口乾小便赤澀大便堅硬口中熱氣楊氏四順飲加川芎柴胡惺惺散加麻黃大黃本方青龍湯解肌湯加大黃黃芩[illegible]

冷熱不調其證[illegible]上盛下泄水穀不分楊氏敗毒散加木香本方解肌散加肉桂木香

汗下熱不除仁齋曰退表熱宜微汗退裏熱宜微利汗下而熱又

再來乃表裏俱虛氣不歸元陽浮於外不可再用涼藥及再
汗下當和胃氣使陽氣收斂歸內其熱自止宜參苓白朮散
本方實脾散擬叔舉云若已經汗下大熱未除恐防癥證不
可妄用涼藥

餘熱不除仁齋曰用凉藥不可十分盡去熱去則寒起古人戒之
或餘熱不除不足關心但用川芎茯苓甘草白朮少用白水
煎以和胃氣收斂浮陽若用取効又曰凡壯熱煩燥已用柴
胡黃芩大黃解利之其熱下輕下遽宜用黃連能瀉心川芎
活血赤茯苓利小便生地黃退熱入燈心一捻水煎服心血
一調其熱自退

冷證其脉沉而微遲其證面色青白身溫冷口氣冷大小便自利手足
冷乳食不化隨證用藥治之

寒熱往來明理論曰陽勝則熱陰勝則寒乃陰陽相勝也寒為陰熱為
陽裏為陰表為陽邪先於表與陽爭則為寒邪入於裏與陰
爭為熱邪在半表半裏外與陽爭為寒內與陰爭為熱
在半表半裏則寒熱亦半矣審其寒熱多少知其表裏邪氣
淺深小柴胡為主之內經曰熱淫於內以苦發之必先散熱
以苦寒為主柴胡為君黃芩為臣以成徹熱發表之劑人參
味甘平邪氣傳裏甘以緩之用人參甘草為佐以扶正氣半
夏味苦辛微溫邪初入裏辛以散之以三味佐柴胡和裏生
姜味辛溫大棗味甘温經曰辛能發散是以生姜大棗為使
和柴胡以和表七味相合兩解之劑則當矣仁齋曰此藥非
獨和解表裏大能解血熱消惡血蓋傷寒一二日調治失宜
必致傷血此藥內有黃芩柴胡最能行血但藥性差涼宜以
寒熱輕重用藥温凉加減得法本方解肌湯內此方藥味俱
用詳審用之毋為熱過冷誤乃良工也

寒熱虛實

五虛

身寒　脉細　不食　前後利　汗出

五實

身熱　脉大　能食　悶瞀　大小便不利

石壁胡大卿痘疹方論虛實
飲食進退則知人穀氣之虛實
大便滑澀則知人臟腑之冷熱
實者稟氣壯實夏暄暑而不畏熱冬嚴寒而不畏寒
虛者稟氣怯弱多寒多熱見天氣寒冷則感寒而腹痛遇天氣稍
炎則中暑發熱

朱氏集驗方論虛實小兒面如桃花色乃童顏也大便黃稠小便清
徹手足和暖乃表裏俱實其子易養無病不必服藥恐
傷胃氣證傳吐利

不可服熱藥者七
足脛熱　兩腮紅　大便秘　小便赤　渴不止
上氣急　脉緊數

不可服涼藥者七
足脛冷　腹虛脹　糞青色　吐乳食　眼珠青
面青白　脉沉微

楊仁齋論虛實證

五實
脉盛　大熱　腹脹　前後不通

五虛
脉細　皮寒　氣少　前後泄利　乳食不進

實勝當瀉之腹與補虛之腹不同當布之施與抑縮之雖各
異論曰諸病出者為虛入者為實陰出乘陽陽入乘陰言者為虛
不言者為實緩者為虛急者為實陰靜則緩陽躁則急濡者為虛
堅者為實癢者為虛痛者為實外痛內快者外實內虛外快內
痛者外虛內實其有心腹皮膚內外俱痛按之而止虛也按之而
痛實也經所謂皮虛則熱脉虛則驚肉虛則重筋虛則急骨虛則
痛髓虛則惰腸虛則泄三陽實三陰虛汗不出三陰實三陽虛汗不止

錢氏治法　出宋吉錢氏補遺

五臟五邪

在前為實邪

子能令母實，相見賊不敢傷於母，其子又引母所往者妻相助故

曰實邪也

在後為虛邪

母引子之夫賊至，由此母能使子虛也，內經曰子能令母實，母能

令子虛，此之謂也

妻來乘夫為微邪

夫來乘妻為賊邪

法當瀉見所勝本臟

本臟自病為正邪

法當虛則補之，實則瀉之，內經曰益其不足者，必固其根，伐下者必因其

上，逆其根則伐其本，伐其本則敗其真矣

心主熱，自病或大熱，瀉心湯主之，實則煩熱，黃連瀉心湯主之，虛則驚悸，生犀散主之，肺乘心微邪，喘而壯熱，瀉白散，肝乘心虛邪，風熱，煎大羌活湯下大青丸，脾乘心實邪，瀉黃散，腎乘心賊邪，恐怖惡寒，安神丸

肺主燥，自病喘嗽，燥則潤之，實則喘而氣盛，瀉白散主之，虛則喘而少氣，先益黃散而後阿膠散，心乘肺賊邪，熱而喘嗽，先地黃丸，中導赤散，後阿膠散，肝乘肺微邪，惡風眩冒昏憒嗽，羌活膏，脾乘肺實邪，增寒，數清利百解丸，腎乘肺虛邪，體重吐痰，瀉數人參白朮散

肝主風，自病則風搐拘急，肝苦急，急食甘以緩之，佐以酸苦，以辛散之，實則風搐力大，瀉青丸，虛則風搐力少，地黃丸，心乘肝實邪，壯熱而搐，利驚丸、涼驚丸主之，肺乘肝賊邪，氣盛則前後可久，微搐，法當瀉肺，先補本臟，補肝地黃丸主之，瀉肺瀉白散主之，脾乘肝微邪，多睡體重而搐，先當定驚，搐瀉青丸主之，搐止再見後證，則對主去治之，腎乘肝虛邪，增寒呵欠而搐，羌活膏

脾主濕，自病則泄瀉多睡，體重昏倦，脾苦濕，急食苦以燥之，實則泄赤黃，睡不露睛，瀉黃散，虛則瀉白色，睡露睛，白朮散，肝乘脾賊邪，風瀉而嘔，茯苓半夏湯主之，心乘脾虛邪，壯熱體重而瀉，羌活黃芩蒼朮甘草湯主之，肺乘脾實邪，能食不大便而嘔嗽，煎檳榔大黃湯下羊肝丸，腎乘脾微邪，惡寒，泄理中丸之類

腎主寒，自病則足脛寒而逆，人之五臟惟腎無實，小兒瘡疹變黑陷，則是腎實水勝火也，心乘腎微邪，內熱不惡寒，桂枝丸，肺乘腎虛邪，喘嗽皮澀，百部丸，肝乘腎實邪，拘急氣搐身寒，理中丸，肝乘腎賊邪，體重泄瀉，身寒，理中丸，本臟虛弱，是自己正令不行，乃見賊之所勝者，當補本臟之正氣，假令肺病喘嗽，時於初春見之，法當補腎，補見於夏，救肺，見於秋，瀉肝，見於冬，補心瀉本臟，乃名寒救。大抵五臟各至本位即氣盛，不可更補，到所勝位不可更瀉

外感風寒

小兒外傷於風，拘急呵欠，頓悶，皮毛澀，口中氣熱，當發散，秋冬用溫熱藥，春夏用涼藥，無大熱，能飲水，能食，不大便，用大黃丸，作散子服之，如身表無大熱，而小便不利，是為有濕熱，瀉膀胱，仍用膀胱溫藥白朮茯苓之類，利小便則其熱自退，如有便白，胡慎不可妄下，恐外熱乘於內而漸結，胸危證多矣

肝熱

肝主謀慮，熱則身來搐搦，瀉青丸

肺熱

肺主氣，燥熱則壯熱，飲水喘悶，鼻乾燥，手捫眉面，瀉白散

肺盛復有風冷

胸滿短氣，氣急喘嗽，上氣，皆是肺氣有餘，復感風邪之所傷，宜先散邪，先瀉肺，瀉白散，而復發散，大青膏

肺臟虛怯

唇乃肺所主，紅則肺虛熱，少服瀉白散，色白者肺虛怯也，可補之，阿膠散，若唇白無津者難治

心熱，是積在心經內

心自主熱，合面而睡，有就涼之意，口中氣溫，上竄搖頭，咬牙，皆心熱也，導赤散主之，心實則上下氣壅，喜仰面而臥，氣得上下通也，瀉心湯主之，溫中丸亦妙

腎氣不足

下竄者目內兩足熱不喜衣被縮以下皆腎之所主緣心氣下行於
腎部也此乃腎不足而心有餘宜地黃丸

肝勝肺

肝病白秋發搐又見肺虛而氣短病見於申酉戌時是肝真
強也內經曰受所制而不能制謂之真強法當補脾肺而後瀉肝寫青
赤散 瀉青丸

肺勝肝

肺病春發兒或見於寅卯辰時木之位又以見肝怯少力正當見弱
而肝不勝肺當補肝瀉肺若肺病甚又虛則不得瀉肺只宜用地黃丸
之類之不可服瀉白散何謂也經云虛則補之實則瀉之

肝風

目連劄目直視不能轉視或搐則身反張折目直視熱也瀉青丸等
木氣使黃木主之目為肝之竅為木木生風故如是也當補腎瀉心

木火相勝

男子木在左視木位右視金位相擊則有聲男反右視女反左視亦有

有搐

早晨發搐

急熱於寅卯辰木之位是肝旺也當補腎水以制心火瀉肝以止其
搐

日午發搐

已午未火之位而發潮搐者心熱也導赤散涼驚丸

日晚發搐

肺之位而肝強當補肝恐被木之賊犯之宜先瀉心肝以扶其母
夢瀉心導赤散瀉肝瀉青丸而後補肺益黃散

夜間發搐

皆因大病之後脾胃虛損多有此證法當補脾涼心益黃散

傷風發搐

因傷風得之口中氣熱呵欠頓悶手足搐者此乃邪氣入之大人
傷風風病之類當發汗無汗以陰陽二證用大青膏小續命之類
發則愈小續命湯方當用仙方中有是也於前方也

傷食發搐 此其不用他病忽然而搐

此因飲食過度致損脾胃故兒多睡或吐不思飲食脾胃既虛引肝
風則發搐當先定其搐加羌活防風煎下瀉青丸後用白餅子下其
食滯漸用調中丸異功散養其胃氣

急驚

陽證也俱腑受病小兒客忤熱於心神是以陽相火旺故云熱則
生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得大聲而動故搐大本不動搖風
而動當用利驚丸導赤散瀉青丸抱龍丸為主之搐止服安神丸

慢驚

陰證也俱臟受病亦是小兒吐瀉病久脾胃虛損若不早治則成
慢驚名曰瘈瘲似搐而不甚搐也因脾胃虛損故大便不聚當去脾
間風先以宣風散導之後用使君子丸益黃散其利自止既以失
治則脾胃俱虛致被肝木所乘是為慢驚也當用溫補

論發搐

素問云諸痛痒瘡皆屬心火大熱則君火相行君命三焦真陽之
流作也若傳變於肺則鼻塞痰入於肝則成木產自為病也
之君火入于肝作熱則肺主受克君火不受邪金此乃君之使也

辨傷風與痘疹

凡傷風則虛汗瀉痘疹則身熱中發驚悸呵欠是為是

識夫

麻痘輕重候

凡未出而發搐者是外感風寒之邪內發心熱之所作也
下解者是風用地黃為主之一證是亦如針頭
而京其內連熱此痘毒甚已使為重微喘飲水者有熱證用去風
藥微下之若出了大青便自利者其在表不在裏當發散用升麻
葛根湯若有熱謂溫涼不大熱大小便澀則是熱在內當微下
宣風散若身表大熱者表證未解已出見小熱小便
不利當此小便已發便有鮮
言不出者是

大黃亦可

土爲脾胃病

夏月心火用事，治吐瀉[illegible]可用五苓散，秋用[illegible]

五藏[illegible]

[illegible]白术[illegible]

便不通[illegible]

[illegible]

飲食[illegible]

厚朴入於[illegible]

黃散[illegible]

[illegible]

穀[illegible]下[illegible]

損[illegible]

脾虛[illegible]

凡久病吐瀉之後，虛則[illegible]，其脉微細[illegible]，主[illegible]

[illegible]

益黃散[illegible]

下口利下[illegible]

服白餅子、大黃丸[illegible]

便後利大便

實表裏攻發

有表證者[illegible]

主[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

無[illegible]

[illegible]

[illegible]

有是[illegible]

之有汗發熱[illegible]

風[illegible]

無汗[illegible]

熱不[illegible]

之有汗[illegible]

脉入承氣湯[illegible]

之[illegible]

散[illegible]

久[illegible]

小便不利，大渴引飲[illegible]散

土失津液而胃病

若病後大虛亡水者，是飲食不[illegible]

養胃氣，白术散或[illegible]

利小便藥

五疸

如有宿食發熱而[illegible]大黃[illegible]

熱[illegible]

[illegible]

渴，加蒼术，五色丸

黃病

[illegible]

[illegible]

[illegible]

五苓散[illegible]

[illegible]

黃病血氣不足

[illegible]

[illegible]

散

諸瘡證

瘡者小兒病癖多以吐瀉[illegible]之證小兒[illegible]之
胃虛而失津液內亡[illegible]一藏虛則諸臟皆弱其病曰肥
脾臟虛[illegible]宜服
散[illegible]依本臟補其母[illegible]內疳[illegible]散[illegible]心血疳
安神丸[illegible]肝疳[illegible]
氣不足[illegible]大人病[illegible]之故

乳食不消

物[illegible]乃胃氣
不和可以[illegible]乳食
不化是脾胃[illegible]散[illegible]

咳嗽 補肺

肺主生病而成咳嗽[illegible]乳之
證以[illegible]實則[illegible]不利
喘而面腫吐食皆當先補肝後瀉肝[illegible]若瀉血是
肺虛也用[illegible]之若虛則面白[illegible]
疾[illegible]當用阿膠散補之若[illegible]白术散

目內有五方

五色甚者瀉本臟色淺者但補之不[illegible]合發
散[illegible]
是腫痛[illegible]

五臟標本

肝在天之風在地之木在人為肝在時為春腎水為母心火為子克脾
土生筋主眼[illegible]其色
青不歡[illegible]
主[illegible]
邪克木也
[illegible]

肝實則赤多[illegible]兩脇小腹[illegible]
肝虛目[illegible]
肝絕[illegible]
平脈[illegible]七十二日春則[illegible]
賊脈[illegible]金克木也
危脈[illegible]

心在天之熱在地為火在人為心在時為夏肝木為母脾土為子[illegible]肺
金主血主脈神其[illegible]其味苦[illegible]其色赤
[illegible]
心病面赤[illegible]
心熱口乾[illegible]
心虛恍惚[illegible]
心[illegible]
平脈夏王七十二日夏則洪鉤[illegible]
賊脈沉濡而微水克火也
危脈[illegible]

脾在天之濕在地為土在人為脾在時為[illegible]心火為母肺金為子克[illegible]
[illegible]
其色黃[illegible]
乳食飢飽[illegible]
脾病面黃善思[illegible]四肢[illegible]
脾實[illegible]
脾虛[illegible]
脾絕[illegible]
平脈四季之月各王十八日土之[illegible]
賊脈[illegible]木克土也
危脈狀如雞雀啄止而復來

肺在天之燥在地為金在人為肺在時為秋[illegible]腎水為子克肝

木主氣主生泄其從災其夜弗成木平上應得其以歷定毛其色白
音如口王也潭不飲如毛肺王脈柔也侁肺之氣欲形更即本則
冰漦重主[illegible]邪氣勝則病白赤[illegible]邪乘金也
肺病面白悲愁喘咳[illegible]肺有動氣
肺虛呼吸少氣[illegible]喘之咳血
肺實喘咳[illegible]上氣[illegible]
肺絕汗出髮潤喘而不休毛焦氣出
肺脈秋王七十二日秋則脈浮濇王者脈之狀輕虛似浮
肺脈浮大而短也
一色積毛如風吹毛
腎在天之寒在地為水在人為腎在形為骨[illegible]子為心
火主骨主髓[illegible]其液唾其味鹹上屬耳下屬腰
色黑欲如重漆不欲如炭[illegible]
腎病主黑[illegible]而面黑[illegible]邪[illegible]水也
腎病面黑恐欠足寒[illegible]下
腎實[illegible]
腎虛心懸如飢[illegible]耳鳴
腎絕瞳目直視[illegible]
腎脈冬王七十二日冬則脈沉而[illegible]
腎脈緩而大[illegible]克水也
危脈石如奪[illegible]如彈石

○五臟伏敵喜傷（附論）

肺所伏者心所敵者肝所喜者[illegible]所傷者[illegible]七氣之臟和則[illegible]
[illegible]神[illegible]生[illegible]風[illegible]熱[illegible]之臟和[illegible]
腎所伏者[illegible]所敵者心所喜者[illegible]所傷者甘[illegible]之臟和[illegible]
[illegible]笑[illegible]黑[illegible]咳[illegible]耳[illegible]汁
肝所伏者肺所敵者[illegible]所喜者[illegible]所傷者辛[illegible]之臟和[illegible]魂
[illegible]生[illegible]目[illegible]
心所伏者腎所[illegible]所喜者[illegible]所傷者[illegible]之臟和則情

[illegible]所伏者[illegible]所敵者[illegible]所喜者甘所傷者[illegible]之臟和[illegible]
[illegible]食[illegible]乳食

○五位分部定位（附論）

肺部所主鼻[illegible]名[illegible]大小皆[illegible]名山根
若[illegible]如[illegible]即肺經[illegible]作[illegible]者即[illegible]
鼻中[illegible]或[illegible]清涕[illegible]
肺[illegible]得有[illegible]乳[illegible]熱亦如此[illegible]
下生[illegible]
腎部所主耳[illegible]之則名曰耳花耳[illegible]
[illegible]耳[illegible]耳門生[illegible]耳中[illegible]時[illegible]
[illegible]名[illegible]汁不止[illegible]其[illegible]熱心[illegible]
作[illegible]上攻[illegible]如[illegible]耳[illegible]水[illegible]相[illegible]
[illegible]熱傷[illegible]熱[illegible]攻青心[illegible]

腎[illegible]有[illegible]無益
肝部所主眼睛[illegible]其[illegible]外[illegible]五輪[illegible]熱即生[illegible]
心[illegible]如[illegible]家[illegible]中心[illegible]
人[illegible]兒[illegible]目[illegible]哭[illegible]治[illegible]
從[illegible]良[illegible]熱[illegible]有治法[illegible]
理[illegible]已至肝熱[illegible]
無[illegible]中[illegible]十無一生
脾部所主唇即口門[illegible]居其中飲食之宗[illegible]
[illegible]上下四方[illegible]口內[illegible]心[illegible]有熱[illegible]
紅如血[illegible]即[illegible]時[illegible]熱[illegible]
[illegible]心[illegible]不足令兒[illegible]何知[illegible]甲皆黑目無神[illegible]者知[illegible]
五[illegible]口[illegible]可[illegible]論方[illegible]
心部所主眼睛[illegible]之中名曰之[illegible]下名[illegible]心無

別黒則見因青腎爲[illegible]心[illegible]乃[illegible]屬[illegible]手[illegible]
相[illegible]剋則[illegible]相生則吉[illegible]病[illegible]相[illegible]之平常不動
[illegible]色反[illegible]色[illegible]不得心[illegible]何因大[illegible]
不[illegible]人一[illegible]事于心下[illegible]神[illegible]
[illegible]神[illegible]當[illegible]心爲[illegible]主[illegible]語[illegible]加
[illegible]心[illegible]當清[illegible]不[illegible]之五[illegible]
[illegible]首[illegible]中[illegible]中[illegible]神[illegible]神者[illegible]中[illegible]
[illegible]之[illegible]
黒是也[illegible]生[illegible]之[illegible]之[illegible]
重[illegible]入之[illegible]即[illegible]入即[illegible]其
白色者[illegible]如[illegible]黒[illegible]如[illegible]
紅色者紅[illegible]若[illegible]黄[illegible]色者[illegible]如[illegible]
[illegible]青色[illegible]青[illegible]入[illegible]之[illegible]
[illegible]傷[illegible]而[illegible]之[illegible]
[illegible]如其[illegible]三[illegible]如[illegible]

四數決[illegible]之[illegible]也五數[illegible]如[illegible]
[illegible]之[illegible]而[illegible]而有[illegible]
之[illegible]長[illegible]者[illegible]
[illegible]百[illegible]

辯小兒脉法

分三部法

分三部[illegible]前爲寸口關後爲尺[illegible]如小兒脉[illegible]

論小兒脉

以一指按其三部進退取之此法甚明不可[illegible]也

小兒脉三歲以上五歲以下然後可看[illegible]大人有異者爲呼吸至
是[illegible]至[illegible]十至[illegible]小兒[illegible]息數促如大人者爲不
[illegible]也小兒[illegible]前[illegible]息雖[illegible]已後方有[illegible]形[illegible]五百七
十六息乃成人[illegible]脉[illegible]可診候也

書林[illegible]

驚[illegible]脉 [illegible]
心腹痛 [illegible]
汗後脉 [illegible]
嘔[illegible]脉 [illegible]
吐[illegible]脉 [illegible]
諸[illegible]脉 [illegible]
諸[illegible]脉 [illegible]
瘧[illegible]脉 [illegible]
[illegible]脉 [illegible]
失血 [illegible]
[illegible]脉 [illegible]

夜啼脉 [illegible]
傷寒脉 [illegible]
溫[illegible]脉 [illegible]
霍亂脉 [illegible]
泄瀉脉 [illegible]
[illegible]脉 [illegible]
腹脹脉 [illegible]
[illegible]脉 [illegible]
熱[illegible] [illegible]
中惡腹脹 [illegible]
小[illegible]脉 [illegible]

已上[illegible]是小兒五臟之脉本君得其病則知其可治若得其[illegible]則知
其不可治也俱有生者十得一二

七表應病

浮 [illegible]
乳 [illegible]
實 [illegible]
緊 [illegible]
滑 [illegible]
弦 [illegible]
洪 [illegible]

三部一脉

三部俱數 [illegible]
三部俱弦 [illegible]
三部俱[illegible] [illegible]
三部俱實 [illegible]

三部俱緩 [illegible]
三部俱浮 [illegible]
三部俱洪 [illegible]
三部俱急 [illegible]

[illegible]應病

數 [illegible]
[illegible]數 [illegible]
弦數 [illegible]
沉緊 [illegible]
沉伏 [illegible]
微[illegible] [illegible]

遲 [illegible]
沉微 [illegible]
緊數 [illegible]
沉細 [illegible]
微緩 [illegible]
[illegible]急 [illegible]

故浮[illegible]

浮緊[illegible]

浮滑[illegible]

沉[illegible]

時甚急[illegible]

脾微細[illegible]

又微細氣長[illegible]

脉過寸口入魚際[illegible]

七表八裏脉乃是五臟六腑脉也。且小兒脉陽有餘多見七表，脉為陽脉故也。主病用陰八裏脉，所以不見者，為屬陰脉故也。並是小兒消八裏脉者，皆是寒病[illegible]氏云陽[illegible]風也[illegible]

脉沉[illegible]

[illegible]

浮滑[illegible]

脉緊[illegible]

浮數[illegible]

心急數[illegible]

浮[illegible]

脾[illegible]

之微遲[illegible]

小兒脉訣并歌

凡小兒脉當以大指按三部，一息六七至為平和，十至為發熱，五至為內寒。脉緊為風癇，沉緩為傷食，促急為虛驚，弦急為氣不和，沉細浮為風，大小不勻為惡候，為鬼祟，浮大數為風熱，伏結為物聚，單細為疳勞，腹痛多喘，弦而緊，洪為有熱，浮而遲者胃寒也，溫之則愈。[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

脉得五百七十有六，曰大小殘決敗色異，如[illegible]書脉理全訣候方能無所失，手左右不相干，自史一指定三關，浮洪熱甚須數遲

冷沉[illegible]脉浮[illegible]

當手數風熱[illegible]

脉中多手洪胃口如火[illegible]

腹痛多[illegible]足知氣動不安[illegible]

[illegible]

疫脉[illegible]

上是[illegible]

胃間[illegible]

乳食[illegible]

不[illegible]

○形候驗病訣

額上多青色[illegible]不安，赤時身壯熱[illegible]

素問云心熱病者額先赤，心氣合火，火之象炎上，故[illegible]

頭顱額也

毛髮[illegible]

尾之[illegible]

而乃為熱[illegible]

右臉[illegible]

目[illegible]

肝[illegible]

素問云金之[illegible]

一臉[illegible]

兩臉[illegible]

唇紫

有一等小兒[illegible]

熱者也[illegible]

謂[illegible]熱也

两睛胞青黑多啼切牙何驚疾走進退請搐不安和耳燥身粗促搖兒
唇血同黄肝尿不利赤色熱多渴躁燥多哭皆為脾熱為白青連口
鼻吐瀉食傷脾
目鮮目眦目青驚目直躁心肝熱已成二臓戦争風火風小注斑連看看
搐搦兩目睛
錢氏云目赤兼青欲發搐目直而青身反折直生風又云肝風熱目
連眨萬全方云若目眨有驚症獨下必發多吐泄來兩顴云目睛黄
脾主疳也
有積眼睛黄吞叉肓似赤是虫多爲癖腫數雖常目用一腫皆因
久數為積黄脾有積脹熱有疳疾
亦有目胞腫不散者因食積傷脾久必皆腫有目腫脹脹者必赤色
風常
眼深徵黑脂燥亦必主耳聾腎虚積眼角亦有紅筋内吊驚風是辨
辨此
印堂多青黑腹痛夜啼睛脾睛無[illegible]日[illegible]下[illegible]
嬰童百問卷上 四七
面黄浮吐瀉形瘠白唇乾為不休
腹實身熱攢眉者主頭疼
黄色人中呼兒因食物傷形青便數沫理胃不燥唇口兒頂[illegible]
大血形[illegible]唇乾[illegible]消黄熱不安字
久渴滿唇紅已虐睡不可用凉藥
有積唇黄色者有作痞形肝虚多夜熱重白臭酸粗唇青紫者必腸今
痛非常果食多傷乳嗜冷而色黄
青時木色居王脾土本表勉上知脾弱不能食錢氏云小兒臓氣天
和血氣爲令所乘則四肢唇青白亦有臓氣熱唇生瘡而風冷之氣入
瘡結痞後血氣不復故令唇青
口臭[illegible]作腫黑赤[illegible]中重不通[illegible]
延口唾苦涸蟲攻[illegible]致[illegible]
是兒疳[illegible]
知
舌白乾焦燥[illegible]小便難[illegible]心大[illegible]

如心便不通必焦黄舌腫厚弄舌欲乳不能哭者此因邪熱客入兒脈
流入心脾如舌厚唇燥不急治殺人先心散導赤散黑魚切片于貼
舌上百草霜塩等分和塗舌上下立消舌黄舌上出血舌腫舌裂舌
上芒刺舌焦舌黑舌赤並與地黄湯方見舌部
两耳前微赤者攻必耳聾微赤者驚入耳皆為臓腑中
滴下微黄赤主之或曰女子無此者[illegible]云物搭者發熱腎
晚白青形而心渇瀉[illegible]縮身啼哭常欲搐作喘面色作青表熱
熱下散色青腸胃冷腹痛但啼聲紅赤湯寒而心煩熱不安眼鮮紅[illegible]
作風驚受多痛
有一等小兒面黄不赤都發潮熱湯寒迫熱者必唇乾燥或氣微促
也
面白黄者見心煩渇不安困傷常夜起[illegible]食不能消面色[illegible]
發病因驚中多叫哭而熱[illegible]精神[illegible]身金色肝[illegible]
則黄疸[illegible]雖當頂面青[illegible]不宜服[illegible]
唇紅面赤驚搐[illegible]入陰成内吊虚風在胃[illegible]
嬰童百問卷上 四八
搐躽身叫哭非為驚[illegible]不久自卧驚搐伏陰陽邪正至
細千
弄色非時變態[illegible]紅青黄[illegible]今男
錢氏云病重面有五色不常不澤者死孫氏云弄色為夭也夭色者
兒
微微下顆赤[illegible]熱聚小腸中結滯膀胱内令兒溺不通
[illegible]閉云胃熱[illegible]
[illegible]
食[illegible]
小兒多要吐者傷胃中有宿食宜下之[illegible]
[illegible]
水正乳[illegible]

面黃目白少精光多啼咳嗽[illegible]傷食生疳[illegible]腹痛[illegible]

雜病卷[illegible]終

右證食積[illegible]積痛面黃已無精光多困臨[illegible]大便
臭[illegible]者[illegible]去其積[illegible]

時行瘡豆[illegible]

重唇[illegible]

疹瘡

○湯氏雜病形正歌

瘡疹多發傷時行病同增寒痛要分明[illegible]又須細目[illegible]
兩腮紅嗽涕[illegible]噴嚏[illegible]
自目[illegible]
氣[illegible]瘡[illegible]
愛[illegible]
身[illegible]瘡[illegible]身熱[illegible]分明

兒氣皮膚裏相傳[illegible]以風[illegible]痛
重之[illegible]小兒運有此[illegible]者
時氣皆令節令[illegible]頭疼壯熱汗微微良工仔細看時候但作傷寒病[illegible]
熱氣[illegible]胃居[illegible]令黃色在皮膚須知鼻氣息如何[illegible]
之[illegible]
[illegible]
毒氣[illegible]府[illegible]便成結毒在腸中[illegible]若煩多渴更重尿[illegible]
[illegible]
時氣[illegible]夏早早[illegible]成[illegible]氣[illegible]時[illegible]
[illegible]
陰陽[illegible]內相[illegible]陰陽各[illegible]作[illegible]名是重[illegible]須[illegible]
停[illegible]
雜氣之下[illegible]元[illegible]不[illegible]
除[illegible]
時氣雜[illegible]多[illegible]停[illegible]須不食[illegible]

熱氣血與血熱行[illegible]人可[illegible]皆因汗而不[illegible]
[illegible]
病來入而上下之[illegible]急結胃之[illegible]切
須知
傷寒熱毒胃中存又作斑瘡[illegible]若見舌唇黑只同[illegible]
達也
黃疸皆因胃熱為[illegible]加[illegible]便[illegible]汗[illegible]見此候時休[illegible]吉[illegible]定
[illegible]
耳口[illegible]兒[illegible]作[illegible]非干[illegible]只為[illegible]中[illegible]全人[illegible]作
[illegible]
瘧[illegible]何[illegible]
小兒[illegible]下[illegible]兒不得[illegible]良工[illegible]
[illegible]
風冷傷筋痺四肢全不仁為因風熱[illegible]寒[illegible]

[illegible]似[illegible]人[illegible]用[illegible]寒不[illegible]精神
小兒[illegible]腫[illegible]風[illegible]為[illegible]見皮膚[illegible]名[illegible]
因依[illegible]
脾為土[illegible]不[illegible]水便[illegible]毒[illegible]痛若[illegible]血[illegible]
成之若者[illegible]須[illegible]使[illegible]太陽[illegible]耳[illegible]
多[illegible]耳[illegible]是[illegible]
耳[illegible]痛[illegible]不[illegible]非[illegible]氣[illegible]入[illegible]
熱氣[illegible]肝眼[illegible]有[illegible]痰[illegible]生[illegible]色
如[illegible]頭[illegible]肝[illegible]子[illegible]眼[illegible]
良[illegible]是異人
小兒[illegible]肝[illegible]全[illegible]不明[illegible]青[illegible]
一[illegible]般
小兒眼[illegible]昏[illegible]無[illegible]為[illegible]眼[illegible]世人[illegible]
[illegible]風[illegible]熱[illegible]中[illegible]名為[illegible]食[illegible]生[illegible]
肯[illegible]

胃熱皆因血氣狂心煩且吐小便黃更兼熱擾頭煩躁甚渴思冷時時[illegible]
如湯○寒吐多因人挫衝更兼志氣亦相達吐下青黃并白沫水[illegible]
痰關張痛又攻面色青黃或變色須臾是難不干且一似驚癇無
上視早辨驚癇要從容

小兒氣弱合中寒嘔吐多因飲食傷其狀肆須啼哭泣衝人冷氣[illegible]
更兼寒冷食嘔空失時和劑三焦不通則[illegible]冷吐一如乳[illegible]
同瑞涼未絕方且將治官之自救療方更須忌[illegible]

痫疾因何得來風在腎經洞[illegible]并血聚如此成形冷氣挺在臟因
熱小腹疼痛本經熱補法[illegible]東[illegible]乳因風冷[illegible]吐瀉并[illegible]
將其頭[illegible]嘔乳母因傷寒[illegible]兒[illegible]風兒[illegible]腹[illegible]更頭[illegible]

小兒吐[illegible]早[illegible]只[illegible]虛胃[illegible]更有中[illegible]如[illegible]在
心臟○風冷傷於乳交乘[illegible]兒主[illegible]
實風[illegible]合[illegible]吐從[illegible]
經[illegible]

血為榮兮氣為衛二氣相隨無[illegible]血氣[illegible]所以[illegible]行不循位

血隨氣上升未吐出鮮紅争見[illegible]須服藥急[illegible]凉[illegible]依次
胃[illegible]
產母傷胎忌[illegible]令傷令便嘔[illegible]主[illegible]兒[illegible]乳[illegible]加[illegible]
乳[illegible]不[illegible]傷[illegible]乳相[illegible]不[illegible]
成吐[illegible]以長衣[illegible]小兒[illegible]
膚皮致令另[illegible]上汗出訊[illegible]衣

小兒血氣未調和[illegible]來[illegible]
燒[illegible]

啟乳并[illegible]水[illegible]結在[illegible]兒乳不了吐[illegible]似[illegible]
入步中早須[illegible]又[illegible]
三焦若不調胃中寒氣[illegible]乳[illegible]不能[illegible]
[illegible]之[illegible]明[illegible]
胃中熱[illegible]不[illegible]知經中[illegible]
時加紅熱不[illegible]明此是分[illegible]
[illegible]色

先看小兒疾病光觀形[illegible]神色而切脈次之面青眼青肝之病面
赤心之病面白肺之病面青脾之病面黑腎之病先別其五臟
各有所主次[illegible]虛實[illegible]之[illegible]其[illegible]
兼五臟六腑表裏各有相[illegible]若[illegible]明[illegible]則神聖工巧自然有之

察形證歌

[illegible]肝[illegible]生[illegible]明三焦[illegible]主青[illegible]其寒[illegible]面
實[illegible]小[illegible]
[illegible]汗[illegible]生[illegible]
長[illegible]氣生止[illegible]
[illegible]小便[illegible]
病因[illegible]母[illegible]之[illegible]
[illegible]上[illegible]

○病證疑難

逆證似順

[illegible]逆有別陰陽不均[illegible]相加色[illegible]
[illegible]之[illegible]其[illegible]也[illegible]
[illegible]者[illegible]是也[illegible]
乃[illegible]中之陽又[illegible]
是[illegible]有[illegible]
似[illegible]乃[illegible]中有陽[illegible]陽不主[illegible]中[illegible]
陽其[illegible]非[illegible]不可[illegible]理[illegible]而知之[illegible]其可[illegible]
從已

陰證反陽

小兒傷寒[illegible]表裏而理之不以陰陽證候[illegible]見者[illegible]
之[illegible]陽之[illegible]是[illegible]之[illegible]是也[illegible]兒吐[illegible]
作[illegible]其[illegible]良[illegible]已或[illegible]
[illegible]其[illegible]反[illegible]陽也其[illegible]
陰[illegible]為難治[illegible]工不知所以[illegible]見其[illegible]
文[illegible]不引[illegible]只合[illegible]其[illegible]如[illegible]有如此何[illegible]理之

陰盛格陽

陰盛之候謂之陰盛及其發越之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸粗大其脉浮數其證陽強陽之類工以消陽因以得其所宜與不宜兼用大辛熱藥而下兒命返藥而化衆言殺殺之非也謂不識證脉而用之雖下下藥亦死矣

虛極生熱

痼疾有作則證初作即補居氣久承宜更宜極是謂虛極之候陰陽二氣不勻上下氣不升降榮衛內虛臟腑不和宜可以補虛嘆柴胡以前之藥飲食以救之陰陽衰倦內虛氣缺方得升降陰陽二氣已得調和藏腑已得肌膚已和壯醫工已知府得虛候爲作虛極之熱與補氣藥服之稍多更生大熱所謂虛極初調熱盛便渴發作因勞而發曰下矣皆因熱勞虛極生熱而致之也

冷久必寒

疾積已作虛候所謂自是傷重飲食不化泉瀉中脘乃食傷肌積陽前積積之為病皆致其冷冷之既久脾胃虛怯虛怯既久積成陰陽

胸膈脹滿熱間并癖痞刺痛脉無定當工不理治將令其身作但作疾癖治之刺下大達疾不去根為患又重難施和利良由刺刺臟腑虛久入腹并作煩躁腹壯脹緊氣喘短促難以調治寺證狀先心無異保全是幸

熱多作痰

熱分內外身體皆陽氣受邪三焦受熱三焦者本實無狀隨熱得名所連五臟六腑相干邪熱受邑盛中由實燥熱閉塞靜則為名動則分三所上焦以實甚脘中焦至於中脘下焦至于丹田以文掛痼痰中指作一種目咽喉攻逐分作三焦則知上中下三焦所屬也過極則熱熱盛則未焦寄于其中夫人患此指上不可見小兒三焦感伏熱多作熱寒之熱所以不堪重兒從何所調理若不早療疾作無辜

理實戰虛

虛則作痰實當是論形體理虛速痛去痰內外其冷熱外者其證候三實內虛神不安居三焦內實入自得失虛之為病其候則是實

之為病其候則是實本致害重則作禍是矣并理心肺腎子母相生得皆心氣相克且如虛曰月經虛發熱不使又心氣不足驚悸有作所治子母滿重小便閉澀利之可乎所以知其內者母虛虎子實子盛補母虛又肺家有熱且調之香大約滑利氣溫之可醫工但安母虛則瀉理其子實者攻其子則母亦虛所謂母能令子實子能令母虛肝腎調心理實戰虛矣

利表傷裏

傷寒豆疹皆論表裏二義不通所以反反是傷寒所受從表入裏豆疹所謂自裏出表作熱形證與傷寒頗似稍寒不定輕重所受相尚其服升麻葛根湯或通利飲解其表裏已解其汗不止汗出稍多表虛作渴皆熱氣發泄從其自然也出所謂與其熱計其表通四肢多或者不識皆亦不是少小出其熱乃有根氣外不預消表不利助劫於中道府臟衝和氣陽明胃壽盡風之合自是助治大過矣真自然之理是死矣如其因也謂表裏傷寒一也

退熱作渴

小兒發熱一證與大人同熱在三焦古消胃不利重煩方消上盛下虛方消水大不相合方有後者熱方消津液燥渴方消思後本渴但有其熱熱在于裏或因其虛裏自燥熱生之以虛表熱傳裏更設其虛虛之裏俱重引飲入脾臟而手足走虛虛子作脾臟二下之病皆是病宜理之後表致衰熱發有命

冷熱發疾

有疾者必有熱隨之有驚者必有風從之刺其驚風宜首散其熱而疾不生此醫者所得其宜劉理驚滯邪風定搐以明其要者易見表實家才見驚重有熱不問元何使服驚風自愈散粒月餘積多發則驚搐不作恐無妨其兒而股更涼藥多脾胃虛弱不吐則瀉成慢驚更其虛疾加其疾調理醫工宜充之也

用疾隔文

風者肝主之肝臟不和則風所因從痰者脾受之脾若不壯則痰所由成之二流風痰之因皆由山為生勞則為行於經絡乃又它痰風痰相隨夕而不之息在肝脾所由皆食之熱於千不敢難則摩理處而

是作以至反戕且風痰火尚在牙頸之間甚至齒無盡生發有因感作胸膈或作痛息或咂牙或時驚或語於肺則咳於肝于心則忙惕驚惕驚止未能速下且痰火[illegible]搐狂者甚其風又致痰作痰須春夏並化或理方才治病致是可[illegible]或脈乘無功治療風痰可致殿久則難矣宜詳究之

驚氣與時

因驚而得熱其熱當料於事之所屬于血更加氣血荣衛失常啼驚氣所常作或生於驚氣發於是然未神因心虛熱而昏無口等中冷未鈍快懷忘飯見候更此寧辛氣血如何故與人以為活[illegible]星壹時之顛驚不明皆更身如錮可也

恐悸而息

驚悸恐[illegible]而息[illegible]耳目[illegible]四非心主之君心所受其疾不能[illegible]從是知肝氣之[illegible]肺[illegible]不安恐悸傷于肝肺肺[illegible]喘滿求[illegible][illegible]若張口大喘者肝肺[illegible]不[illegible]安神[illegible]未見[illegible][illegible]見功效

食噎噯逆

兒孩[illegible]食[illegible][illegible][illegible]其[illegible]中不[illegible]乃心不[illegible]幼[illegible]飲食宜[illegible]物[illegible]之[illegible][illegible]作[illegible][illegible]不升降其[illegible]分不伸[illegible]陽[illegible]取[illegible]後[illegible]黑[illegible]焦[illegible]則[illegible]之後[illegible]良由食[illegible]宜[illegible]宜升[illegible]若不早治[illegible]終身[illegible]矣

令子無辜

夫人所謂者陰陽而[illegible]首[illegible]血而[illegible]五臟以[illegible]和陰陽不均則有[illegible]其[illegible]主之於[illegible]母[illegible]乳[illegible]目[illegible]辛[illegible]正[illegible]之一也[illegible]見之[illegible]復作[illegible]且[illegible]也[illegible]非風痰之所攻[illegible]驚[illegible]之[illegible]其[illegible]其[illegible][illegible]之[illegible]

三才[illegible]成乃謂為人[illegible]功道合始知得志胞胎既備心定神全血脈未[illegible]骨[illegible]力[illegible]智[illegible]于心神為人[illegible]者斯可知者[illegible]者[illegible]由是[illegible]者乃[illegible][illegible]者心[illegible]此不及[illegible]之重者[illegible]五[illegible]之[illegible]身[illegible]五[illegible]由其所心[illegible]肝[illegible]氣血[illegible]其[illegible]有[illegible]於[illegible]不及[illegible]往往[illegible]未定[illegible]不足[illegible]如五[illegible]只[illegible]有[illegible][illegible]者[illegible]從[illegible]可[illegible]者[illegible]之一矣

[illegible]身[illegible]氣

幼幼未[illegible]形[illegible]胎[illegible]血[illegible]知[illegible]之後[illegible]以乳乳者化其氣血[illegible]百脈流和二[illegible]身[illegible]新壯三周[illegible]一主[illegible]其[illegible]母[illegible]血[illegible]氣[illegible]乳不成[illegible]召[illegible]子[illegible]之[illegible]食不[illegible]口[illegible]其乳[illegible]食多不[illegible]兒[illegible]其有不[illegible]之[illegible]字[illegible][illegible]傷其[illegible]其形[illegible]傷[illegible]其[illegible]寒但見[illegible]有時[illegible]人[illegible]神[illegible]生子[illegible]上[illegible]食[illegible]

[illegible]十中[illegible]十二[illegible]服[illegible][illegible]為[illegible]之[illegible]得為人死

中年活[illegible]

[illegible]受[illegible]

初生未[illegible]乳[illegible]用[illegible]一[illegible]三[illegible]根全者[illegible][illegible]胎[illegible]其[illegible]者[illegible]之根也為人之本也[illegible]之[illegible]也[illegible]之[illegible]月之前[illegible]之[illegible]其兒[illegible]不作[illegible]亦無[illegible]兒[illegible]有[illegible][illegible]之非也[illegible][illegible]人[illegible]不足[illegible][illegible]之[illegible]工[illegible]者子[illegible]果其宜[illegible]頭以[illegible]之云耳

胎中受病諸證

[illegible]胎

婦人[illegible]者[illegible]胎[illegible]以人[illegible]之[illegible]之[illegible]非[illegible]胎者乃父精[illegible]足也[illegible]之不及[illegible]存之[illegible]

子七八箇月已滿生又有過至十月而生稍生胎氣血虛弱臨誕難
設所言兒者即胎氣未得敬衛不充致于萎而諸猶如果子結實之
時有所不到者則為物偏小其形瘦果實有可見如此之類胎
氣虛羸常與先天數殊扶乳哺自調氣血充盛胃固壯即保其可善
蓋由受氣不足氣賦不全恐爾諸病非可治耶

胎病

小兒有患胎病者非五臟傷受亦非大腑所主也蓋兒生後方五周
將母復有孕血氣兩分之而瑞是故胎孕漸傷乳汁少成毒血邪相
攻兒則致疾故曰其氣漸傷其神悅令兒痿黃尪羸枯悴煩躁不明
昏昏識目夜不可得寐聊達與健其乳温平胃氣和血脈自然而
愈其有害病致瘦乃成無辜

胎氣

初生芽兒三朝之後滿月之前所受諸撮作痰痰皇不爾者蓋因胎
氣虛敏有壯有弱其母飲食過冷飢飽不止寒暑坐卧不擇令兒得
寒不寒即熱不虛即實熱乃作痰實乃作泄虛即作驚痞即作結蓋
則溫之熱則涼之虛則補之實則瀉之當用安神治胃散利諸藥用
之不必過劑

胎[illegible]

芽兒胎病謂胃敗將滿母失調護或勞動氣血相干或坐卧飢飽相
役或飲食冷熱相制或恐怖血脈相亂胎氣有傷兒形氣損或因物
土興工或由營造房室或移安居或更床帳雖不犯白仙已被於牢
娠子時兒身有因如此得疾者乃成終身之患重則損根壽輕則
養學致癎也胎病由氣致患乃可可療或傳成風為疾者也不可空
和生初幼有被牢罪則時和暖調理

胎病作熱

兒在胎中母多驚怖或因食熱毒之物生育之後兒多虛痰
滿視目胞浮神困呵欠不乳伸身呢呢作聲大小便不利或通利即
有如水或則手常拳臥常搐搦眼常斜視身常拘攣皆因胎中
受熱宜速與大連翹飲子消毒散諸熱次與消風散散無忌

胎氣搐熱

兒在胎中母多驚怯驚則之令不散又因胎氣壯盛兒主髓精母生
驚傳是致乳汁不和兒初成毒致能作熱令兒食則嘔吐眠不定
神不安積驚習則甚者不解積毒熱搦手足作再重成疾宜至先
直須氣次服四順若不安即用抱龍丸效

胎病風熱

兒在胎中母常嗜食動風之物熱毒流傳致兒受之隱在經絡則手
足發擧注入血脈則動脈搐鴒其兒眼常嗜睡血不寧心神不守令
怯人怕物視作定目若不早療恐先忽忽卧脾雖長情性不能為人
多見額記夕忘雖父受病不如與生蓋父母但知怕其嬌婆要嗇
用之兒知此者凡胎風服藥里用責細若以常方難言立功

胎病驚熱

兒在胎中母常驚怯其氣乘於胎兒寓受之生育之後其兒精神不安
顏色[illegible]則溫溫有聲[illegible]赤[illegible]動則恐[illegible]傳者不
叫乃驚夜啼[illegible]有胎驚將傳胎風之候是母諱驚忌食
一切熱毒之物若作發痛即兒雖經益是血脈未[illegible]虛假不
如[illegible]何可取若是使發書病懼若經之熱已自散即於項上生癰
其文如拳名曰驚癰須當破之而後合之勿傷毒素恐傷肌膚不能
傷風[illegible]為佳

胎病風痰

兒在胎中母喜食熱毒之物熱即生風肺壅不利達者風痰難不能
損肌傷肺其氣與風相擊痰多風不散熱留痰堰生風痰能作熱
更加睡被紅暖母食多熱毒動風之物脈時害生痰非不嘔乳汁
之者也如兒面赤風痰不必下截風化痰散但青心肺涼藥
健則自能安意不可太涼恐寒傷臟腑宜以清風散吞下白丸子
至良合可作丸

胎病結熱

兒在胎中母失調理恣縱飲食不加將護縮熱仍父又至生育熱氣
隨藏逆入於東遠作脈不由氣搏之大便不通[illegible]

撮口等方停藥恙以三番先或四日七實以爲應不必過刻切不
可不待凡乎弟不但服藥恐反為害

胎病胎寒

兒在胎中母因食生冷寒涼之物致兒受寒之氣及至生育
全兒關竅不通精神昏悶作熱咳嗽[illegible]啼叫腹[illegible]人未知之
者將謂驚風妄投藥餌[illegible]或[illegible]心[illegible]由此寒邪初只在表久則傳
裏[illegible]邪氣直[illegible]皮毛皆不得其[illegible]療理此時邪不得[illegible]表而有遺
氣血致傷頻頻[illegible]目[illegible]但與小柴胡湯投之頻服之以人參
羌活散然後中和之表[illegible]分散裏氣既生痛定當[illegible]知解散即

胎病發熱

兒在胎中母喜食辛熱之物古人有曰將產[illegible]之前[illegible]指[illegible]性星熱
又是受熱以為兒[illegible]受之經絡[illegible]目令兒為胎生胎熱延壽熱[illegible]丹
瘡之類經[illegible]作或於頭額生瘡[illegible]大[illegible]熱[illegible]生
死一生何得見初生切勿[illegible]加[illegible]用[illegible]救
風[illegible]其清心平肺[illegible]母[illegible]其口[illegible]理與[illegible]其[illegible]

胎病胎驚

兒在胎中母因驚恐[illegible]勞役神魂失傷[illegible]則[illegible]
中動其[illegible]以邪干亂心[illegible]胎驚兒乃受之既生之後
兒常昏悶[illegible]則[illegible]驚[illegible]哭[illegible]不[illegible]亦
生[illegible]少[illegible]正[illegible]

胎病臟寒

兒在胎中[illegible]其月母[illegible]食諸生冷物[illegible]
時時有作生育之後兒眼青[illegible]腹[illegible]入[illegible]呢呢作
聲日夜不息[illegible]則[illegible]長[illegible]是腹[illegible]陰陽之[illegible]不[illegible]調[illegible]不溫平
分氣[illegible]成[illegible]陰[illegible]合[illegible]母[illegible]乳溫令
子氣和

胎病胎熱

兒在胎中母[illegible]于痛或是[illegible]或是胃
風[illegible]寒[illegible]
不啼初生[illegible]不知作熱[illegible]

語其理即以受症愛之經路未產用之柱先但與調中均其陰陽若
是吐瀉宜以金[illegible]丸米湯少令熟吮[illegible]上漸安

諸候發端

急驚風候醫書云陽病也手足搐搦身熱大熱驚熱之下往往[illegible]以輕[illegible]
或水[illegible]已[illegible]皆有毒[illegible]已[illegible]精神倦[illegible]皆[illegible]欠伏乳食者或有
餘熱其候故得安痊于[illegible]只可用平和[illegible]胃氣不可便[illegible]
若與服之其候復作矣[illegible]

[illegible]

慢驚風候醫書云陰病也[illegible]由[illegible]用[illegible]太甚[illegible]作慢
驚[illegible]因吐瀉不止而成或[illegible]或因瀉後[illegible]不[illegible]作[illegible]因[illegible]
食一二劑不治而[illegible]

譬而來之病[illegible]不[illegible]當[illegible]不[illegible]
諸若與[illegible]重矣[illegible]

[illegible]

小兒[illegible]

小兒傷[illegible]正受哭[illegible]食[illegible]

[illegible]

小兒積[illegible]

[illegible]

小兒有患驚風疾[illegible]四證如何用藥[illegible]

[illegible]

小兒世[illegible]陰府[illegible]皆驗所屬[illegible]

[illegible]

小兒[illegible]疾[illegible]云五疳八痢[illegible]其理數多端輕重不一

[illegible]

小兒疳疾其證[illegible]其狀不同發作不常治療不一方[illegible]不專輕重[illegible]

[illegible]

[illegible]隨宜投方必有可理者[illegible]

[illegible]

小兒諸[illegible]方藥[illegible]法[illegible]莫能盡用[illegible]

[illegible]

審小兒得病之源

大喜後乳食多成驚癎

喜屬心大喜後乳食則傷心錢氏云心主驚驚是癎也素問云暴怒傷陰暴喜傷陽孫真人云傷陰則瀉傷陽則驚

大喜後飲水多成喘急

喜後飲水則停於上膈令胸喘急通真子云喜後飲水水傷於三焦令氣急喘急聖惠方云喜後飲水必成喘也蓋喜氣心汗並為之故也

大哭後乳食多成吐瀉

哭屬肺大哭後乳食則傷肺肺氣逆則作吐瀉故肺與大腸為表裏錢氏云大哭後乳兒多成吐瀉

大哭後飲水多成痰嗽

哭屬肺大哭後飲水則氣道不通成痰嗽氣喘聖惠方云飲水積結不散故成痰也又云肺水氣乘之則多嗽故也倉公曰哭人飲成氣噎塞吐哯嗽痰水

大饑後乳食多成腹痛

修真秘訣云飢食過多則結積聚又云乳食不用急急則不細不細則傷損脾胃為病云大飢之食久成瘕塊面黃

大飢後飲水多成泄瀉肚疼

飢後飲水則冷濕傷於脾脾氣受病則令腹痛素問云濕勝則濡聖惠方云飲冷過多結在心下故令心腹滿痛也

大飽後飲水多成氣逆

素問云飲多則肺布葉舉故氣逆而上奔故能生痰疾又書云飲食過多成痰癖氣急養生云飲水莫急多久成氣病

大飽後迎風多成暴厥

大飽則食氣上衝心肺之間夫脈虛而風冷所傷故暴厥不醒如中風之狀修真秘訣云飽食汗出過風發生頭疼多腫

大驚後乳食成吐心痛

大驚後乳食則手足閃動受驚多成心痞抱朴子云驚後便令食多成心痛心主驚故也大驚飲食氣痞不通或吐逆翻胃

大驚後飲水久成不語

心主驚驚後飲水則傷心心氣通於舌舌本無力故不語也亦能成水癖聖惠方云小兒水癖者因飲水而被驚則成也

當風乳兒成吐嗽腹脹

倉公曰小兒當風飲乳風令入肺則令嗽又經曰形寒飲冷則傷肺肺傷則咳嗽嘔王氣氣傷則涎脹

當風飲水成目青盲

素問曰風氣通於肝當風飲水則水停於肝肝氣通於目故成青盲雀目也聖濟經曰小兒飲水又傳肝經傳至全無物雖夜晝不明為雀

目青盲晝夕一般

夜露下乳兒多成嘔吐

夜露下乳兒陰氣入胃乳不散多生嘔逆修真秘訣云夜露食其上有邪氣

夜露下飲水多成泄瀉

素問云濕勝在內攻於肝胃脾胃受濕則水穀不分水穀相和故大腸滑遏而乃注瀉也

正食便乳成瘡黃口臭

王氏云正食便乳令兒口臭牙中血出通真子云乳食並食令兒面黃口臭又能生痰癖巢氏云飲乳食痛不能無痰癖

正汗便乳成心痞壯熱

葛洪云汗者心之液正汗便乳則傷其心心傷則液散液散則壯若壞成心痞壯熱錢氏云心痞面黃臉赤身體壯熱修真秘訣云

大汗脫衣得偏風半身不遂

食熱奶乳兒多成癰癤

聖惠方云小兒癰癤緣肺熱脹滿所生又乳母多食五辛熱毒令兒癰癤也孫兆云母食五辛令兒癰癤

食酸鹹炙煿乳兒成渴

聖惠方云乳母多食五辛多味酸鹹炙煿令心臟停滯使即乳兒致臟腑生熱熱則煩躁致令渴不止也又云兒食炙煿渴飲水

則成啞病

母醉臥當風乳兒失音

抱朴子云乳母飲酒過度醉而當風取涼仰臥乳兒風冷酒毒氣亂之乳入不喉嗌之間故令兒失音不語也

母飽便乳兒身熱喘急

孫氏云乳母大飽肌脈俱滿氣自未調便即乳兒遂令身熱喘急嘔全云醉飽傷滿便乳兒者多成癇病

飲水便乳搐疾成驚風

寶鑑云飲水弄傷乳為痰結在胸令兒乳不下吐逆脚冷顛悶則身多熱齒舌入腹中早須醫治緩之則變為驚風傍乎秘訣云渴飲過多則成痰癖

飽食合困乳兒成天吊

聖惠方云乳母食飽無常病因過度有毒氣凡入乳中即便乳兒心肺生熱熱毒既盛風邪所傷則令心神驚悸眼目反視壯熱不休

母被相驚觸成天吊

咳後飲乳成驚喘痰壅

咳者肺也咳後飲乳痰聚不散氣道不利關竅不通肺不布則成痰壅痰壅即驚喘

咳後飲水成鼻塞多涕

咳主肺肺氣通於鼻咳後飲水則傷於肺氣肺氣受寒則鼻多濁涕寶云清涕出肺受寒

悲怒未定便乳成涎嗽

葛氏云悲怒未定便乳兒者涎嗽引風葛氏云小兒悲怒未定便飲乳者則傷肝心風火交急則化成痰乳停於膈而成涎嗽

悲怒未定飲水成吐血

悲怒未定氣血不和飲水則逆其氣氣逆則肺血血隨氣行故令吐血萬全方云因而飲水多停心下故令嗽噦其口嘔血

兒啼未定便乳生癖氣

聖惠方云兒啼未定以乳乳之令氣不得消散故結聚成癖氣也孟氏云乳啼未定以乳便即乳母與氣相逆氣結停積多成癖痞

兒啼未定飲水成胸高

孟氏云兒啼未定飲水則痰結痰結則肺脹肺脹則胸高葉氏云痰者水飲停結胸膈之間故結成痰也又云若為風冷所加即氣聚於肺肺脹則胸高氣急

拭浴未乾乳兒生瘡疥

寶鑑云小兒癬是母於風中浴後拭之未乾和水飲乳及夏月汗出而不於生疥和星星是也皆真瘡秘訣云浴湯洗而無光彩作瘡疥瘡

拭浴未飲水成頭瘡

拭浴未乾便飲水者則內外俱傷故令身熱頭瘡全氏云浴體飲水則內外寒交攻遂致頭瘡身熱仙經曰吮湯先飲則多成瘡

喜乳進常生驚

錢氏云令兒上氣喘行亦令兒生瘡喘急或生驚

怒乳成疝腹脹

千金翼云怒乳令兒疝氣腹脹鍋云女子則腹脹

寒乳嫌食不化

董氏云寒乳氣寒傷冷故令便青而啼千金翼云令兒咳嗽

熱乳面黃不食

千金翼云令兒嘔吐張氏云熱乳則傷肺氣令兒鼻衄

氣乳吐瀉腹脹

寶鑑云令兒面黃白乳哺減少夜啼觀乳

病乳常生諸疾

令兒消瘦自汗面青食飲不化夜啼孫氏云病乳則致虛羸及生諸候

壅乳吐逆生痰

靈秘云壅乳成痰涎壅生驚寶鑑云壅乳成嫌吐又吐逆生痰

賤乳臆急驚冷

寶鑑云臆急而滿脫背皆熱夜啼肌瘦一如積癖

醉乳恍惚多驚

千金翼云令小兒熱腹急痛鍋云醉淫情亂乳兒恍惚多驚

淫乳心痠驚癇

實理云乳母淫泆情亂乳兒令吐瀉身熱啼叫如鴉不得已上急欲
乳兒能生諸病不可不忌也凡有怒氣亂未定乳兒則成吐瀉腹痛
疳黃不食寒熱瘦瘠不欲乳兒則成痰癖疳痃喉腫脹悶淫喘乳
多發驚癇聖惠方云所乳母飲食小兒甚有性命乳者夏不欲熱
熱則吐逆冬不欲寒寒則啼哭乳母未欲甚怒則令上氣顛狂母不飲
醉醉則令身熱腹滿母方吐下而乳則致虛羸母有積熱而乳則變
黃不能食母有病乳則致疾等受邪不能行大抵母須節飲食令便日生
疾病

○病源歌

胎風腹痛
胎病多胎熱胎寒不同寒眼痛熱搐如弓
內吊夜啼百日內外多有此證
盤腸內吊腹多冷氣爭夜時曲腸腹每夜多啼直至明胎中有毒腸
腸搐
盤腸內吊十歲上下多有此證
盤腸吊痛令兒夭氣內攻腹中疼痛遶臍上如蛇蟲見形於腹未轉

因積毒
只吐不瀉惡候
傷乳停胎脾生痰作吐嘔不宜承氣逆尤忌燥紅色
嗌乳生吐惡候
孩兒何嗌吐乳為膈脾俞腹因風冷胸前吐不宜表云食則
嘔者物盈滿而上溢嬰孩氏云小兒吐嘔者乳哺冷熱不調則令停
脾胃因食有病後胃與氣不宜瀉故令兒吐嘔也
吐乳嗽搐惡候
吐乳頻頻必發驚脾虛因弱失精神精血既失延瞓疵眠睛
不救因
嗯乳生涎
嗯乳非為吉生涎甚可疑頻頻防制手搐口必驚危
食停中脘亂大便

食停中脘內留延氣難通不盡時為痛生痰必引風
嗽煎生驚
嗽煎無休歇風生五臟中面青因嗽痛不久夜驚風
呵欠生驚
呵欠若頻頻時邪搐口唇雖然驚未發啼哭動心神
搖頭生驚
搖頭頻擦面揩額亦因風目眩青絲絡身熱若弓
悲哀啼乳
悲哀令兒乳痰夭氣不通停留胸膈上吐逆未生風嬰孩云小兒
飲乳因冷熱不調停積胸膈之間結聚成痰痰多則令飲不下吐
痰沫重痰結微微壯熱痰食壯熱不止則發驚搐
肺穴傷風
肺穴傷風冷痰涎喘嗽聲哮前因有熱搐自然驚
傷風咳嗽
傷寒傷風冷令兒鼻不通乳多因不利痰聚引驚風

咳嗽因風
咳嗽因風肺受寒痰涎喘急嗽睡安時時發熱心煩躁臉赤唇紅
口鼻氣鼻內並涕平林錢氏云嗽而吐痰風在肺以麻黃等發散
孫氏云嗽而不吐痰熱在上焦甘草桔梗等劑散邪重者涼更
邪壅
胃冷嗽逆治用香蘭散
咳逆寒生胃重傷藏損人衝上氣不順多有痛嘔嘔時以傳於腹
胃素間因逆孫氏云風冷傷於肺
鼻塞不通
邪冷皮毛肺中風致令鼻塞氣道留邪冷停聚入清涕自生成
鼻中
鼻流清涕
鼻內流清涕元因肺感寒寒停傳頭鼻氣不冒乾
喘息氣與嗅惡證
實邪傷肺搐啼哭至無聲氣結痰痰臨喘痰涎喘息驚

驚喘痰壅
驚喘膜胸喧風驚又合傷寒蓋因三經作發形體如焚
驚後壅滞
痰涎壅氣痹脉中驚即令兒氣不通嗽吐痰涎生喘急精神恍惚更驚風
驚後成癇
慢驚雖差後痰涎壅盛難收發必成癇疾精神不自由
驚後成軟
慢驚雖差後神忌一如痴不甚因痰痹乃筋軟四肢
驚風不語症候
驚風何為不能言只被風邪五臟沿涎痞於心間氣道致令聲啞
癇不相連
癇病瀉歡
癇病未作如口流涎口噤舌唇青眼目聳頭額手握痰聲嗳氣急退息復依然
痊病真症候
痊真反如驚搐中風涎痰唇口勃搐痰病同
顛狂真症
重陰相勝必為顛喜笑無時面目鮮陽盛兩爭強自作或歌或哭
辰驚啼
傷寒驚狂
傷寒身熱發狂顛臉赤唇紅目又鮮氣促生涎多渴燥宜時草[?]
不習眠
傷寒結脉症候
傷寒因下早腫痛結胸間痞悶時為喘皮膚作紫斑
時氣傷寒中署云寒毒藏於肌骨至春即發病
時氣因邪觸春秋及夏冬受邪肌肉內傷客衛客中頭痛溫熱
心煩兩頰紅鼻清涎嗽嗆傳度以傷風
夜熱日涼
夜熱身如火才明依舊淨非干邪氣作蓋為客風傷甘熱承多赤

汗漿畫滞黃汗來方始退肌體漸羸尩
頭熱身涼大合湯
頭熱卻身涼陰陽不順陽陰沉滞不降病作必為殃
頭熱面爽今前去
諸傷傷腸尸熱病只攻頭陰被陽相隔滞行衛不流
身熱發厥久瀉利多此厥熱
氣虛多發厥血虛因作熱氣血若俱虛身熱手足厥
久熱筋痛
久熱傷筋骨伸舒痛苦風亦能成動弱血氣不能通
久熱頭暈
久熱生頭暈心虛臥不平骨蒸微有汗憔悴減形容
風熱相搏騷風青宜風散
風熱互相搏風壅手不自由疼痛麻木咽痛引熱攻頭
痰涎驚疾壯風膏琥珀散
少驚而驚悸見心虛怕見人驚而肝腎怯心蓋而及舌唇
伏熱生驚
伏熱生涎爆多嗔見食遲句明增不樂入暗稍相宜或即鮮雙目
急時動四肢瀉頻身冷蟹毒作驚光
中暑似驚症候
暑伏傷心狀若驚頭疼熱渴躁煩驚睡中驚悸嗆喘氣無汗手足掣牽搐
傷寒鼻衄
眼閉睛
傷寒何鼻衄蓋為熱傳心合汗通無二陽邪從此文奈
吐血氣逆
血逆氣風不和因熱毒流心引肺風忽尔氣壅栄衛逆吐出鮮明
驚熱紅
痰中有血
咳嗽痰中忽有紅氣傷氣血不和同喉中喉血因頻嗽脉損聲粗
必引尿
大便下血

風冷濕熱閒又熱攻交秘孚作裏急紅府多膀胱合便血

血淋尿血

久熱膀胱内時中積聚或小便時下血痛少痛于心

熱淋結澁

三焦因有熱熱氣入膀胱結澁塗中痛淋者稍赤黃

石淋沙石

膀胱并腎熱小水將中結似石或如沙痛苦難泄

氣淋腸虚

氣氣膀胱傷冷雖澁又頻腎氣膀受冷水道不成精

實淋如膏

淋瀝脂膏水道虚冒熱甚泄濁精液起白如膏又難降

水泉不止

水泉頻不止膀内不收藏冷滑泄精甚七洋耗小腸

膀胱疾痛

膀胱尿時痛尿時冷以常非干淋痛氣聚結膀胱

遺溺

膀胱因受冷夜卧必尿床又名遺便溺淋痛小腸

疳蝕女陰

疳蝕女陰有瘡尿者自然生虫亦用藥法

疳蝕法中蟲蝕漸作瘡肉腫如帶下又耗即選黄芩塗丸加附子麗香合內外兼攻膀胱傳之

蟲攻下部

疳因攻下部侵蝕至肛門痒痛兼不唖疳蝕病在根

肛腸脱出

肛腸頻自下因利後難收秋後延時日令腸痛不休

腸濕生瘡

濕濕風瘡疼風冷氣攻腹攻臍作痛生風

尿難糞結

結熱在腸中尿難糞不通外如牙杜熟門必引驚風

大小便澁四順散八正散

氣壅生風熱大便不能泄小水痛難通頃刻成驚搐

吐瀉因暑

吐瀉因傷暑渴色黃

前急肚荒氣粗頬腮痛面色或精光

疳脾泄瀉

小兒泄瀉精神少多患脾虚食不閒發後眼睛生白膜青黃面臉見

紅痢有時嫌鼻癢揉眉頭或口唇焦齒齦瘍飲停留脾受寒致令

水穀不能分

疳瀉進退

疳瀉膨脝腹肌膚日漸瘦消化食臟滑又經時重難醫多臭頭

脂四肢唇紅因有熱進退極難醫

疳痢雜色

大腸痢血

轉少精光

糞中雜色

糞如元因積成是食傷脾青綠米疳白臭非常

五臟糞色

肝冷糞青黃脾熱土之形肺勝又積赤黑因心

腎熱成

驚疳相傳

驚為疳病相傳心與脾便黄赤

疳食傷

疳食尿白睛中眼不能高視有虚疾

作瀉不異瀉或吐或不吐作熱

大便物不化

乳食傷

乳食若稍傷為疾亦為積吐出臭酸或瀉多惡氣肚腹痛

曳疳

食物不化
食物難消化脾胃有積停痰飲流作為進退不安寧
堅積癖塊
堅積癖塊有多端元因乳食聚脾肝或積增隔連腹痛無時隱見
腸間安
痞塊積塊
痞塊本因肝連脾成積痞遶脇結塊膜消空難安
面黃地捲
傷暑傷積食心煩嘔吐腹脹疫渴躁吐與瀉相連
腹大非飽
嗜食不飢飽不生肌肉腹大大便稀泄腸胃不和故也
腹大非干飽多食口是飢痞深常骨熱眼瞬致冠常
因飢傷飽黃芩丸
因飢傷大飽氣脹膨脹肚腸渴飲黃熱喘息不寧行
虛實腹脹
腹脹皆因食氣傳虛而喘滿滿相連消實更急心煩為實虛脹宜

虛實可宜
寒熱因積
吐熱寒時又卻發皮膚燥血髮毛乾非干神鬼為邪祟取下脾胃積
燒要
冷物為瘧
實熱往來類傷寒病因連朝勞血氣間日積精神
頭面生瘡四順散
五臟不和同六腑氣難通瘡瘍生頭面流傳必至身
血熱生瘡
血熱生瘡疥膿窩凝若珠痒時搔不已痛過腫又膚
咽喉腫痛
咽喉中痛咽乾物難有痰風熱作其喘不寧安
風府大丹四順散
熱盛生風痰伏熱發遍身火丹并赤腫斑毒亦驚人
膿耳成聾

膿耳停風熱重蒸耳作膿腫疼因熱聚氣嵌亦成聾
言語遲
心府臉赤
心府臉赤少精光壯熱唇紅面多黃身外皮膚流盜汗睡中驚哭
恚悸慢
肝府白睛
肝府白睛眼中膜怕日羞明日不乾咬血搖頭肌瘦腹中堅癖塊
多氣
脾府腹脹
脾府腹脹腫黃食物難消又有瀉物結寒痛有多又吐如糞和黃
瀉非常
肺府咳嗽
肺府咳嗽痰喘氣促多氣喘促氣力衰疲痛皮膚生瘡痒類類要食
只多氣
腎府虛熱

腎府骨熱生偏墜齒黑唇焦瘡疳痹常病氣不熱手如冰每夜啼哭
不挂牌
時時吐瀉
時時嘔吐唯胃氣冷之因日漸亡津液並黃作瘦人如附子
偏墜腫硬
陰囊腫如吹兒啼氣為或因積作或被蟲吸傷迸睛脫肉
只陰外腎墜停留堅且大結聚一邊歌
疳熱肢冷
渾身熱似火手足冷如冰腹大時加渴皮膚盜汗蒸
骨熱膚燥
骨熱皮膚燥時時盜汗多又能津液竭血氣不安和
疳眼羞明
疳眼瞼羞明不開且又傾肝心俱積熱生翳眼遮睛
雀目青盲

疳目氣素肝黄多見物難睛納蓋翳睛肉生若雲朦

盜汗如珠

盜汗如珠皮多白晝無亡汗夜骨熱面色焠皮膚

瀉变成腫

瀉頻因久瀉脾胃久亡津水飲多彩舌咽焦又渴生瘡窩損多因傷[illegible]

堅小精神務弱經時日成虛腫遍身

脾冷流涎

脾冷涎唾經云是滞頤不宜頭下温並久損偏風[illegible]

疳腫明見

虛黄如熱多積水皮紫發聚氣蛕攻內塗虛腫若吹

風腫多痒

體腫時痒痒風邪客膚皮搔之成瘡膿痒熱互相存

氣腫因氣

久嗽成浮腫因勞肺氣為疾停膈腸病見喘不相宜

積腫宜消

中因食積傷脾肌膚状若吹腹脹多氣候虛脹積無疑

瀉痢傷脾

久瀉傷脾脾虛腫兩腿渴頭多及食脇凸兩脚危

豆毒中傳

豆毒停留熱有餘流傳脹悶結癰宜攻脾傷肉腸中滑衝肺嗽涎

微時虛後曾五疳瘡毒攻裏所棲淋瀝難除心悸如也邪干肚鼓

要精神不自居

豆毒生熱

豆毒多生熱攻衝氣血弄霖肝胃上膈入肺更難除[illegible]

傳脾腫有餘[illegible]能好

豆後結癰

豆後結癰疽肌膚熱未除瘡[illegible]再出腫脫趕如初[illegible]

臟腑不自如[illegible]元有餘毒[illegible]

豆毒攻目

豆毒攻肝膽盡明眼[illegible]生息因白肾[illegible]

瘡豆如珠

瘡豆如珠皎肥紅正得宜滿[illegible]焦須解利有熱速涼之

豆毒未盡

豆毒未能盡瘡壞再出瘡身凉更發熱瀉種恐為殃

豆毒發嘔逆痰氣實者可治

豆後發喘逆嗽前痛亦危吐痰真可畏咽氣不相宜

豆後牙疳

豆後亡津液生疳食齒斷傷膿速口鼻損可更傷助

瘡後肚疼

發熱腹中痛斑瘡隱內攻出多防不透出少更防癰

瘡豆逆候不治

吐瀉斑瘡並更難亦危[illegible]痰因惡氣致豆色之变

瘡豆變色不治

微物時時嘔喉中冷錯聲痰氣有汗腹脹氣虛鳴

瘡豆[illegible]

豆毒熱交攻發聲重不通數朝須鼻塞病者勝風

瘡豆青黑不治

瘡豆出先青黑手足皮膚帶紫色[illegible]又增喘因嘶且冥

欲不食心煩渴瀉腹脹體熱喘[illegible]吐[illegible]時頓秋毒

潰咽唯聲啞裏

湯氏惡候形證歌

孩兒形候細詳看[illegible]一搦[illegible]汗珠[illegible]命

[illegible]人[illegible]

[illegible]

不治候歌

臍撞或陷

初生小嬰孩[illegible]臍[illegible]胎風[illegible]亦多災

臍腫內弔

初生小兒孩[illegible]腫內弔疾難止驚風搐再來

青黑口噤

初生小嬰孩青黑口[illegible]病凶[illegible]血肌膚[illegible]

重舌無聲

嬰孩患重舌舌[illegible]無聲[illegible]更[illegible]命必傾

弄舌生驚

弄舌[illegible]手搖引腹胃[illegible]空[illegible]氣[illegible]口如吹

顖門低陷

顖陷形全變[illegible]傷兒[illegible]青黃[illegible]水[illegible]吐[illegible]

顖門開大

顖大頭成縫胎中母氣衰父精因不足肌體致虛羸

顖門腫起

顖腫青[illegible]嗽[illegible]吐涎并嘔乳風引動雙睛

顖腫頭大

顖腫頭皮急風攻[illegible]縫開[illegible]頭必大筋[illegible]頸難撐

咳嗽氣粗[illegible]

百日孩兒嗽涎鳴肺臟虛喘[illegible]心腹脹[illegible]困難醫

[illegible]

胃熱身黃

胃熱[illegible]身黃[illegible]傷[illegible]心腹脹[illegible]定知亡

客忤吐沫

客忤[illegible]生人或[illegible]鬼夾神吐黃青白沫[illegible]紅新眼內睛[illegible]下

唇青[illegible]

三虛卒中

[illegible]生[illegible]夫時[illegible]此[illegible]三虛被鬼[illegible]氣中心[illegible]陰[illegible]未絕

[illegible]死病

孩子驚風

孩子驚風時唇紅口[illegible]肌[illegible]睛[illegible]反視[illegible]四[illegible]腹[illegible]頻頻嗽[illegible]

神昏[illegible]吐涎[illegible]爪甲黑[illegible]

急驚握拳

急驚欲發先握拳[illegible]為胎中有毒從陰錯陽差為逆候男左女

右搐[illegible]白[illegible]紅[illegible]口喝舌[illegible]更驚[illegible]頭手[illegible]

昏[illegible]豈能痊

啼哭無淚

啼哭無淚或無聲下氣時時又發驚[illegible]齒粘痰魚口動[illegible]命[illegible]

[illegible]

發搐面白

發搐面白唇中黑身上皮膚無血色汗出如油粘體骨[illegible]中喉

中[illegible]

驚風指[illegible]

驚風指甲如[illegible]手足[illegible]以[illegible]多啼無淚下[illegible]時停息

又[illegible]

再發驚風

再發驚風[illegible]涎[illegible]目[illegible]青[illegible]口鼻[illegible]哭[illegible]如鴉

面冷腮紅

面冷腮紅眼[illegible]手青甲[illegible]指如丁[illegible]嘔吐時時[illegible]日日[illegible]

夜[illegible]風涎[illegible]唇[illegible]氣喘水[illegible]齒[illegible]偏咬[illegible]

逆[illegible]

吐魚口作鴉聲

面[illegible]紅[illegible]力[illegible]風[illegible]有汗[illegible]無怕[illegible]吐[illegible]防咽[illegible]

涎[illegible]依[illegible]胃[illegible]筋衰

咳[illegible]

粘痰作[illegible]喘[illegible]時時面臉[illegible]外被[illegible]傷肺穴內[illegible]冷[illegible]

入喉咽看看[illegible]直[illegible]兩手[illegible]口角流涎心腹脹[illegible]

[illegible]齒[illegible]難痊

感風氣喘
邪塞皮毛肺感風忽然喘急氣粗涌精[illegible]汗出多聲急[illegible]有痰延滯

腹中

虛陽生風
虛脫皮膚[illegible]虛陽火上攻下焦陰氣盛中脘食難進

上熱下冷
虛陽上熱口生瘡下冷泄頻頻為[illegible]渴飲無度四肢入四肢冷過肘

冰霜

天柱骨倒
天柱骨倒為六淫所襲元因吐瀉致肝受賊風難俯仰腎傷冷氣積
精神頹蔫頸軟身傾[illegible]項不伸面色無黃眼凝涎多
畏食命難延

慝驗不治
頭腦數日忽病不治或風攻顖門頭骨開解或時而赤如面色少時
即退[illegible]發驚不可[illegible]兒百日內外發搐愈而復作千愈後復發體不可

治病愈後復作面黑神昏雖不吐瀉大便如常身熱生痰喘氣兒
自指口內者腦中有痰久必發驚不治

久病不治
身軟頭青身赤血點手網熱頭痛增寒汗出發熱足冷[illegible]手入形
氣頭軟睛昏赤脈眼爪向眼口臭生瘡面腫作喘者頭節黑口唇
焦赤喉中鳴聲啼哭氣喘飢不能食渴欲思食利如血或如糜
腹脹脊項硬

○雜色不治
青色從耳入目者死青色連耳入耳者死青色如[illegible]口下者死青黑
色入口鼻者死黑色多達口鼻者死黑色從耳走耳者死鼻上青色
頭痛者死鼻上白[illegible]血出者死[illegible]白色[illegible]起黑或白色者死[illegible]不
出出不止者死[illegible]不去者死

○不治證
目赤眩黃搖頭咬牙鼻乾黑面口白[illegible]吐瀉不定渴不定[illegible]
大渴不定止之又渴吹鼻不噴病重口乾不睡時氣喘上青黑頰厚
赤如塗胭脂鼻間張喘急不定

○聽聲音驗病
肺屬金應商音 [illegible]
心屬火應徵音 [illegible]
驗五藏正聲
脾屬土應宮音 [illegible]
肝屬木應角音 [illegible]
腎屬水應羽音 [illegible]

忌聲音主病
聲雄而重大 [illegible]
聲悲而後燥 [illegible]
聲笑而不啼 [illegible]
聲促而焦急 [illegible]
聲重而不響 [illegible]
聲雄而實在 [illegible]
聲高而況重 [illegible]
聲啼而不笑 [illegible]
聲長而細小 [illegible]
聲重而輕顫 [illegible]

聲輕而微細 [illegible]
聲前促而後緩 [illegible]
聲短而速緩 [illegible]
聲咽而不定
有小兒聲嗄咳嗽眼閉嘔者是發出瘡豆又有聲啞痰盛或出後至
毒回喉聲啞者死候也又有初生男女兒患重舌舌聲不出者死

○辨疑
一兒患陰癇其脈浮數洪弦是足陰中之陽非真陽也
一兒患慢驚得脈浮數呼吸相大見其絕證非陽回也
一兒患一夏疳作熱非傷寒也但為日後亦[illegible]若是
一兒患身反張非傷風也或投風藥亦愈
一兒聞聲而掣縱者非驚也乃肺氣不足神有未安
一熱在筋脈奇發搐非真搐也如或過則則變假為真

○撮要
一凡兒在胎胎必母飲食有常起居有若使中全氣和胎氣安生子

必偉
一懷娠之後戒忌食熱毒等物庶免孩之生免有胎疾瘡癩等患
一乳母常須養和血氣樂以忘憂使乳汁和平縱兒疾作自安平易半
矣
一嬰兒平常無病不必服藥恐遇疾不即爲効
一初生小兒必忌外客所觸庶免致客忤熱古人所以忌客
一臟
一兒孩不宜食肉太早傷及脾胃免致蟲積疳積
一兒孩變蒸作熱非謂其病不藥自愈
一小兒有病在腑有自愈者故先賢惟理其臟未言其腑腑陽臟陰
如麻子一語乃是腑病
一小兒顱顖未合視爲尋常
一兒生穀道無穿多至不救藥無逆驗必假物透以通之
一驚風發搐手足不宜執捉恐風痰逆入經絡殘害肢體
一小兒無容入神廟中恐神像陰惡必生怖畏
一小兒笑極與和哭極與乳須忌飲漿免使咀嚼
一兒急吐瀉女吐男瀉病爲急證急宜療之
一小兒忌瘡疹發驚不可下驚藥有熱不可用凉熱藥若汗不可止
汗或吐不可理吐或下亦有可不可

論髮際穴

仁齋直指方論云小兒初誕故生者多於頂顖前髮際中間灸之蓋取其可以截風路也諸風篤證藥力不及昏迷兒絕嘿然無聲於此灼艾每有扶危之功然亦顧其善後之劑何如耳百會穴在頂心端正旋毛間亦療危困者以是哉

灌藥服藥法

小兒煎藥以銀盞約水半盞藥多又加多焉其或不能灌藥則以匙送下服藥未盡啖被與之藥性溫熱乳食前服藥性太凉乳食後少頃服和平之疾隨意無拘

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

仁齋直指方論云小兒之驚熱亦以其內外熱濕風痰氣系而無所泄故耳記腦麝銀粉巴硝之類[illegible]其[illegible]不得已而用之[illegible]兒不[illegible]擇重母見熱發搐輒用腦麝鎮墜[illegible]等審視之以爲常惟其不當用而輕用或當用而過用之[illegible]時日驚風之所[illegible]而作[illegible]以爲[illegible]以理驚之背[illegible]有度勢須以爲道[illegible]如[illegible]或[illegible]可[illegible]不可無之亦可量而用可[illegible]爲青丸瀉青散乃驚風之上劑然有毒惟風氣痰熱者可以當之[illegible]能截然自止但用之貴乎[illegible]宜而用或半字或一字或隔字半丸或捌子女丸任的量而作劑也設或過焉害以輕劑而度爲[illegible]解也豆毒以氣搖爲荷汁調下稀服或芭蕉根汁服凡初起驚搐搦風先神志不定恍惚懼人撫眼上視左顧右盼伸手握拳悶鬱努氣情態不若尋常如此者有驚即散驚有熱即退熱痰壅即去痰熱退則不生痰驚散則不爲風痰壅通則氣得其平病無由作是故當以小劑治之若失之任疾熱全未有風搐搦摘引之狀則只與退熱化痰如參蘇飲之類可也謹勿妄投局刺利驚等劑恐或透引熱流入經絡反成風疾此又小兒無病不可服藥之戒出俗玩習以爲小兒體氣或過澡浴即與父母易水之中風冷外傷水氣內蒸日剝閉遂成風搐或惡吗頻吐或昏迷失音或[illegible]不已勢如暴風疾雨難以支吾不可不戒

小兒四時用藥 簇碎

假令春分前風寒也宜用地黃丸爲君防風或地黃丸瀉青丸相間服是也春分後風熱也羌活防風黃芩或瀉青丸用[illegible]散下之立夏之後宜三黃丸以[illegible]散[illegible]至[illegible]熱也[illegible]散合而服

之或黃芩甘草白朮茯苓之類為勝且去熱也立秋後宜益黃散陳皮厚朴人參木香之類是也秋分之後瀉白散立冬之後地黃丸主之謂腎不受瀉也

新生兒戒灸

嘗有北人居於南方新生小兒多與灸顖其害非淺古書云河洛土地多寒兒生三日灸顖以防驚今者東南地土多温新生孩兒無病不宜逆灸聖濟經云前世之為親小兒氣盛之病者不知陽中有陰而專於吐利執河北閩中地寒之論者不知南北之異而專於灸顖以抵牾其地土尚温厚也

普濟方卷之一百三十二畢

寺院宮觀常住濟人

有求方者皆許抄錄

勿得借出恐防失落

[illegible]　訓導王世[illegible]
對方[illegible]
寫字人王[illegible]
[illegible]

普濟方卷之一百三十三目錄

嬰孩初生門

論二十道　方三百九十三方　首三道

[illegible]二十四道　類二十類

總論

初生論　新生方法　臍風撮口
胎寒　胎熱　胎驚
胎退　胎黃　變蒸
驚啼　夜啼　驗啼
盤腸氣痛啼　驚風內釣啼　胎寒胃冷啼
胎熱伏心啼　邪干心痛啼　心腹痛啼
乳食作痛啼　小兒不哭乳

初生方法

法三十四道　方四十二方

虎頭湯方　浴兒方小兒身熱李葉湯方　又方一方
浴體法　見存常浴兒　李根湯
治新生兒寒熱不住　治小兒寒壯吐　浴兒法
又法　初生浴兒良日　金虎湯　浴新生兒方
甘草法　黃連法　硃蜜法　牛黃法　豬乳法
乳兒法　擇母乳法　哺兒法　護反法　回氣法
聖惠方預治三證　封臍散　傅臍散　裹頭法　引董氏初灸額
塗顖法　哺兒良日法　小兒初生不飲乳及不小便
木瓜丸　木粉散　柏仁散　雄黃丸　茯苓丸
丁香散　初生小兒產下有聲啼　水銀膏　治小兒不能乳
通便法　保命散　治小兒出退　孩子要用藥物
藏衣法　崔氏藏兒衣法　又安產婦及藏衣天德月空法
小兒初生斷臍法　人兒三　小兒初生斷口法
小兒初生斷臍法　治兒初生小兒法　保護小兒法
拭兒口法　灸粉法　甘草法　硃蜜法　牛黃法

嬰兒初生至滿月　剃胞衣　小兒初生六日見臍有吐血氣方
小兒初生畏寒　小兒初生服藥　地黃湯
治小兒初生因五香湯　治小兒一歲至兩歲疏乳血氣　治小兒新生
治小兒初生七日助穀神以導其腸胃　令兒易長
令兒無病　治小兒未滿月　令小兒速語　小兒初生

臍風撮口 論五 方六十

封臍散　拭兒散　丹砂丸　天麻丸　益脾散二方
灰砂膏　蝎梢膏　撮風散　神授散　控痰散
天漿子散　噤風散　一字散　香蟾散　立聖散
鉤藤湯　當歸散　安臍散　蘇葉散　蜈蚣散
麝香散　蜘蛛方　朝粉散　麝香散　金黃散
三灰散　烙臍散　白龍散　牧鴻散　甘草散
括蔞散　另白龍膏散　烏蛇散　治臍風癖腫　治小兒撮口
杏膏膏　甘草湯　蜈蚣丸　牛黃竹瀝散　蜈蛸散
蝎牛散　烏魏散　白石脂散　又方　治臍瘡不燥
治臍赤腫　牛沫方　治小兒口噤乳不下　治小兒臍濕腫爛
治臍腫　殭蠶方　治小兒撮口　治小兒臍風　治小兒撮口病
治小兒臍風腫腫又不差　治小兒未滿月　治小兒臍風鎖口
治小兒撮口乳　又方六方　治小兒生來臍內有汁出　黃山真伏天麻丸
治小兒臍風撮口去　治臍中小兒臍風撮口去　治小兒撮口
又方　五聖散　蟬退散　牛黃飲子　竹瀝湯
五靈丸　又方　治小兒吐噤　治小兒臍風
治小兒臍中　治小兒患風臍　治小兒吐噤
治小兒口噤體熱者　治小兒牙關不開　治小兒撮口

胎寒 論一首 方十七方

鐵中丸　當歸散　小白丸散　全蝎丸　茱萸散
諸真當歸散　治小兒多患胎寒　芎藭丸　黃耆湯
芍藥丸　衣中白魚事方　梨中散　當歸散
五加皮散　治胎寒夜中啼喉口方　人參散　小柴胡湯

胎熱 論一首 方二十二

地黃湯　新約龍膽乳方　惡風散　蒼耳散
豬苓湯

胎驚 論一首 方六方

龍膽湯　太乙散　全蝎散　保命湯　豬乳膏
金蝎散　寫金散　牛黃鎮乳膏　牛黃散

胎風 論一首 方三十五方

葛根湯　犀角丸　朱銀丸　虎睛丸　龍腦散
塞蟬香丸　水銀丸　虎睛丸　天南星丸　虎睛丸
牛黃丸　牛黃丸　斷癇丸　六麝散　牛黃散
水銀丸　定命丸　天竺黃散　天竺黃散　乾蝎散
丹砂散　聖惠牛郎散　牛黃丸　犀角丸
信乾散　皮鞋粉散　松頭散　烏蛇散
水銀丸　朱砂散　牛黃散
天麻丸　驚藥　附子散

胎黃 論一首 方三方

生地黃湯　甘草湯　黃龍湯

變蒸 論一首 方二十七方

龍膽湯　惺惺散　調氣散　柴胡湯　清心湯
前胡湯　紫霜丹　當歸散　紫丸　四君子湯
黑散　小紅錦散　防風飲子　防風散　溫平驚藥
天麻四君子湯　前胡飲子　白朮散　青神散
溫藏鉤藤膏　蟬花散　小紅丸　先天散　通神散
牛蒡散　硼砂散　犀角散

驚啼 論一道 方三十九方

蛇黃散 安神散 治小兒驚熱 龍齒丸
牛黃散 安神丸 青金丸 抱龍丸 瀉金散
青神散 牛黃丸青 養驚湯 紅綿散 龍角丸
龍齒散 治小兒驚啼 鈎藤散 龍齒散
虎睛丸 青芍藥散 牛黃丸 雄黃丸 雷丸浴湯
真珠丸 辰砂丸 勻氣散 千金湯 黃芩散
殭子人散 治小兒驚啼 又方三方 代赭丸
治小兒驚啼 治小兒夜啼驚大人因驚失心 療小兒驚邪
治小兒夜後狂語 虎睛丸

夜啼 論一道 方五十一方 符三道

牛黃丸 辛蘇子散 人參散 鈎藤散 當歸散
五味子散 茯神散 黃芩丸 犀角散 羚羊角散
鈎藤散 芎藭散 鈎藤膏 乳頭散 龍齒散
甘心湯 鈎藤膏 代赭丸 伏龍肝丸 芎藭散
石膏散 燈花膏 芎藭散 蟬蛻湯 劉寄奴散
伏龍肝散 蟬砂丸 蒜乳丸 射干湯 立効散
琥珀丸 蟬花散 一物前胡丸 麝香散
治夜啼 獨犯禁忌夜啼 治小兒夜啼
治小兒夜啼 治小兒夜啼 治小兒夜啼
治小兒夜啼 治小兒夜啼 治小兒夜啼
蟬花散 治客忤夜啼法 治小兒夜啼豬屎浴方
又方 花火散 治小兒夜啼 又方
天麻四君子湯 當歸散 朱砂散 安神丸
治小兒腹痛夜啼 治小兒夜啼符法三道 治小兒驚啼
治小兒夜啼 治小兒夜啼不止 治小兒夜啼 治小兒夜啼 治小兒夜啼

軀啼 論一道 方十方

養脾丸 養臟湯 牡蠣散 蓖麻子丸 白朮丸
牛黃丸 馬齒礬石丸 治小兒驚啼
又方 治小兒躽啼

盤腸氣痛啼 論一道 方十六方

茴香散 備急方 四聖散 茴香散 蘿蔔子散
乳香膏 鈎藤膏 木香散 宣連丸 巴附子
延胡索散 檳榔丸 乾香散 桃枝散 安息香散
盤腸氣痛

驚風內痛啼 論一道 方十二方

沉香飲 茯神散 蘇邪丹 乳香丸 乳香丸
桃符丸 淮石子丸 止痛丸 治內痛腹痛 芎歸散 木香散

胎寒胃冷啼 論一道 方十方

蜀椒丸 當歸丸 揚火當歸散 當歸散
助胎酥乳法 乳附丸 芎藭湯 承痛丸 理中丸
當歸湯

胎熱伏心啼 論一道 方三方

導赤散 豬苓湯 芝燈湯

邪干心痛啼 論一道 方三方

治邪崇所侵小兒 一方 蘇利丸

心腹痛啼 論一道 方七方

蘇合香丸 六神散 參香丸 蓮仙丸 蒜乳丸
治小兒腹痛夜啼 半夏丸

乳食作痛啼 論一道 方二方

治臟寒腹痛　又方

小兒不乳　論一道　方九方

朱砂丸　龍腦散　摩頂膏　人參丸　乳黃散

朱砂散　牛黃散　青礞石丸　厚朴丸

普濟方卷之一百三十三目録

普濟方卷之一百三十三

嬰孩初生門

總論

論小兒初受氣

凡小兒受氣在胎一月胚二月胎三月血脈生四月形體成五月動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月百神備而生生後六十日瞳子成能咳笑識人百日任脈生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匍匐三百日臏骨成能獨倚三百六十日為一期膝骨成乃能行此是定法若有不依期者必不壽也

相兒壽法

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽啼聲散不成人啼聲深不成人臍中無血者好臍小者不壽通身軟弱如無骨者不壽鮮白長大者壽自開目者不成人目視不正數動者大非佳汗血者多厄不壽汗不流不成人小便凝如脂膏不成人頭四破不成人常搖手足者不成人早坐早行早齒早語皆惡性非佳人頭毛不周匝者不成人髮稀少者強不聽人額上有旋毛者早貴妨父母兒生枕骨不成者能言而死尻骨不成者能倨而死掌骨不成者能匍匐而死踵骨不成者能行而死臏骨不成者能立而死身不收者死魚口者死股間無生肉者死頤下破者死陰不起者死陰囊下白者死赤者死卵縫通達黑者壽兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其夭壽大略兒小時識悟通敏過人者多夭大則項託顏回之流是也小兒骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭即楊修孔融之徒是也由此觀之夭壽大略可知也亦猶梅花早發不論初生諸疾并治法　年事是知晚成者壽之兆也

論初生諸疾并治法

大抵今之孕婦懷胎保攝乖常飲食不節起居不時未娩之間勞役衆苦男子覩胎以為常忌其所欲任其所性恣縱所以胎之多脉致墮三月手頻開口不啼者初生之間作疾患生多

婦人方得而詳之今嬰兒二十有六證後學可言之當其可否此品之能[illegible]
審理而勿其常衛調順經絡得宜而已○可以張口而又合之欠者謂
由不足故名呵欠非是疾病初生才而多有此作不足性有錢氏有
謂呵欠邁悶食由胎氣怯弱榮衛不壯而繁少順乃不任心[illegible]
心則神不守神不守則可發悶悶無他也患也古方有朱砂膏法用為[illegible]
為調和飲之者不為定志也五七起去明終湯化陽痰服之疏也○伸者
突其胃重展其氣脈舒者引其頸稍直其手足者而作之是人[illegible]
生者亦多有如此亦非病也良由母懷胎[illegible]不得見展者[illegible]
壯其胎度或常臨產節將大事或限已近旋轉不轉便是胎健[illegible]胎
囊氣未舒鴿滯生之時自然而亦充知與擺未知調之者時有待[illegible]
未為[illegible]之功況用能事抱斯邑莫久之或抱兒鳥候其[illegible]仍與親音[illegible]
少少其服効○肺之氣私童臆理不亮以致其邪或己其氣發發閉[illegible]
嬰兒子中及至噴嚏方有少邪不能發散邪入肺之竅[illegible]寒熱[illegible]
即加之嗽輕則氣促或一重則[illegible]風搐搦痰濁之刊苦在初傳而云
不可宜與[illegible]風散[illegible]嗽宜與金杏散人參毛[illegible]桑白皮等藥[illegible]
治百二十

則無致有損之患甚則温胎疚化度利病○胎乃青形精乃根本胎氣因
則形體壯形堅實則根本命長定其年[illegible]形定[illegible]新[illegible]
新生之乳調和合故命實是也謂之相交形體之故爲所生之兒有熱
在室則脾傳肝到化作聲勞根莫氣抑入根本之中所以臍突腫
赤者大可是無論之夫將斷臍之乎利而使之其者非也臍斷不盈尺
一握之内須其根蒂自有實者湯之騎者戒之不得之理以其事[illegible]
明得之此乃良由胎中母多驚悸或因食熱毒之物有作[illegible]大建
趣飲[illegible]自散其臍臍事不必以藥傳之恐毒傳入而害○初生三五
日之間使有寒月卜乳將身反張此其非疾所作情實驗[illegible]工必
作驚風療之其候非也蓋所由兒在胎中受母飲食熱毒[illegible]
生誕下三日之前宜與黃連去熱臍粉散毒古人種種利害豈不[illegible]
失慎[illegible]心肺種毒既化而[illegible]無[illegible]若不如此所生簡[illegible]反只上
寒[illegible]作之者[illegible]不因食[illegible]之物何可任哉或[illegible]
亦愈但須明其所以用藥知者執之為一不由為風所傳[illegible]
患○[illegible]失之罪既長必[illegible]自兒[illegible]之乳[illegible]在胎[illegible]

和氣養之降生則是乳滿之其氣限則胎不壯其乳數則兒不[illegible]
不及乳乳乾即不食無乳者也雖食無乳稱定生爲是[illegible]
食不可不即乳火晴兒不而自衰令人失那和無疾自性乳者壯[illegible]
食者爲其腸胃所謂乳哺二周三歲見益其體令人未周食其乳月
患肥甘豈不致疾○[illegible]聲[illegible]膈要底長形處胞胎之中血氣充[illegible]
大[illegible]滑心背不動耳目而叙相通大小二腸相佐循次發聲清和[illegible]洪亮
者根固本壯事賦完實而自然之理也初生啼哭發聲不出咳嗽而作
[illegible]時而爲其或短數上下不相[illegible]果訣云此由胎[illegible]
何更投藥假使或人父母不悦根本不壯何頁藥餌如果本之[illegible]宜
也[illegible]速用[illegible]父母呼可及以[illegible]無根本肴子育兒
當知其理○人之受胎[illegible]以[illegible]其子皆以精神全氣[illegible]
壯根聽欣陽取與喜怒周怀之間於人事[illegible]以知其逆順
方可調而後性識之本也其或周歲已過不說名不便親常常[illegible]
思是啞嘿今[illegible]呼[illegible]若[illegible]若尸其行即[illegible]
立用[illegible]骨[illegible]脉柔性[illegible]食不[illegible]飽[illegible]不知飲[illegible]
治[illegible]

蓋如此胎氣不散子足者[illegible]十日○胎[illegible]已滿產時方全畫一氣而包
[illegible]兒[illegible]以[illegible]在十月之中[illegible]已具分爲所時之内[illegible]穿
所[illegible]兒在胎中乳[illegible]如何四體百骸能生長斷由[illegible]
所致肺[illegible]於肚口[illegible]不前生之後[illegible]而含苦
投定氣之[illegible]急閉不通若下温平之藥而又不通者即是兒氣不順
臟胃空達[illegible]閉合可是方不詳[illegible]無驗[illegible]等[illegible]
而[illegible]通而[illegible]之金[illegible]上王[illegible]次之[illegible]合[illegible]肉入孔中[illegible]一二
寸許[illegible]出為快也胃及肛門閉合小便通利大便之見無能通者思[illegible]
燒火筋刺之事出不得已[illegible]因合[illegible]無奇方[illegible]以金[illegible]刺之也[illegible]
火筋又自初生胎熱一二日不通者與服先心散以通為度四[illegible]飲[illegible]
將兩亦良○產婦血收者當下[illegible]化乳血下不[illegible]母[illegible]乳有
不識兒把其病乳兒吻其乳月不[illegible]於[illegible]氣[illegible]
以[illegible]開之然[illegible]宜也又[illegible]令兒神[illegible]力之[illegible]乳[illegible]
若[illegible]作[illegible]及[illegible]風定矣初生[illegible]周[illegible]兒胃[illegible]
[illegible]全[illegible]吻乳[illegible]自然臟[illegible]百脉順[illegible]

用性不順則氣血亂氣血亂則乳汁不和乳汁不和令兒逆吐其乳
與厚朴若作天吊常以致害生小兒或前又生汶九兼與服之乳
藿香壬半兩如熊求垂頁
論新生將護法
小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此為之玉衡
若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣兒生落地不作聲者取暖水一
器灌之身更當啼兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶
向身却捋之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以葱白徐徐鞭
之即啼兒已生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴乃先浴
之然後斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七
遍然後纏結所留臍帶令至兒足趺上短則中寒令兒腹中不調常
不可剩若先斷臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍斷訖連臍
帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成疾斷兒臍中當令長六寸長則
傷肌短則傷臟不以時斷若搭汁不盡從令暖氣漸微自生寒令兒臍風
生兒宜用其父故衣裹之生女宜以其母故衣皆勿用新帛為善不可令

衣過厚令兒傷皮膚害血脈發雜瘡而黃兒衣棉當以故絮著之熱傳
之凡小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日
若都不見風日則令肌膚脆軟便易中傷也皆當以故絮衣之勿用新綿也
凡天和暖無風之時令母將兒於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌
肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳之中重衣溫暖譬猶陰
地之草木不見風日軟脆不堪風寒也凡裹臍法椎治白練令柔軟方
四寸新綿厚半寸與帛等合之調其緩急急則令兒吐哯兒生二十日
乃解視臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者此或臍燥還刺其腹當
解之易衣更裹裹臍時閉戶下帳然火令帳中溫暖換衣亦然仍
以溫粉粉之此謂冬時寒也若臍不愈燒蝦蟆灰粉之若過一月臍有汁
不愈燒蝦蟆灰粉之日三四度若臍中水及中冷則令兒腹絞痛夭糺啼呼
面目青黑此是中水之過當炙粉絮以熨之不時治護臍至腫者當
隨輕重重者便灸之乃可至八十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼
呼者搗當歸末和胡粉傅之炙絮日熨之至百日愈以啼呼止為候
十壯便差[illegible]

米安置直向甘草湯以甘草如手中指一節許打碎以水二合煮取一合以
綿纏蘸取與兒吮之連吮汁計得一蜆殼入腹止兒當快吐去心胸中惡汁也如得
吐餘藥更不須與若不得吐可消息計如飢渴須臾更與之若前所服
及更與並不得吐者但稍稍與之令盡此一合止如得吐去惡汁令兒
心神智慧無病也飲一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿復與甘
草湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也兒新生三日中與朱蜜者不宜多
多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癇氣急變噤痙而死新生與朱蜜
法以飛鍊朱砂如大豆許赤蜜一蜆殼和之以綿纏箸頭沾取與兒吮之得
三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許也勿過此則傷兒也
與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神
止驚辟惡氣除小兒百病也新生三日後應開腸胃助穀神可研米
作厚飲如乳酪厚薄以豆大與兒咽之頻咽三豆許止日三與
之滿七日可與哺也兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日
如棗若乳汁少不得從此法當用意小增之若三十日而哺者令兒無
疾兒哺早者兒不勝穀氣令生病頭面身體喜生瘡愈而復

發令兒尪弱難養三十日後雖哺勿多若不嗜食勿強與之
強與之不消復生疾病哺乳不進者腹中皆有痰癖也當以四物紫丸微下
之節哺乳數日便自愈小兒微寒熱亦皆當爾利之即差也後乃哺
凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也以空乳乳之即消日四
若臍未愈乳兒太飽令風中臍也夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令
兒咳利母新房以乳兒令兒羸瘦交脛不能行母有熱以乳兒令變黃不能食
母怒以乳兒令喜驚發氣疝又令上氣癲狂母新吐下以乳兒令虛羸
母醉以乳兒令身熱腹滿凡新生小兒一月內常飲豬乳大佳凡乳母乳
兒當先極挼散其熱氣勿令汁奔出令兒噎輒奪其乳令得息息已
復乳之如是十返五返視兒飢飽節度知一日中幾乳而足以為常又常
捉去宿乳兒若臥乳母當以臂枕之令乳與兒頭平乃乳之令兒不噎
母欲寐則奪其乳恐填口鼻又不知飢飽也浴兒法凡浴小兒湯極須令
冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五臟疾也凡兒冬不可久浴浴
久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背冷則發癇若不浴又令兒
毛落新生浴兒者以豬膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥

以豬水合之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各二兩枝亦得㕮
咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒良去不祥令兒終身無瘡疥浴但
[illegible]以令兒易浴金一斤虎頭骨一枚以水三斗煮為湯浴但須
浴即煮用之凡小兒初出腹有鵝口者其舌上有白屑如米劇者鼻
外亦有之此由兒在胞胎中受穀氣盛故也或妊娠時嗜[illegible]米使之然
治之之法以髮纏箸頭沾井花水撩拭之三日如此便脫去也如不脫可
煮栗荴汁令濃以綿纏箸頭拭之若春夏無栗荴可煮栗木皮如
用井花水法小兒初出腹有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下後
喜令兒言語不發不轉也可以爪摘斷之微有血出無害若血出不止
可燒髮作灰末傅之血便止也小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則
口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆籜盛水狀者若懸癰有
有脹起者可以綿纏長針留刃處如粟米許大以刺決之令氣泄去
青黃赤血汁也刺之止有一日之後自消者[illegible]刺之不過三刺自消
盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著
頰裏及上腭如此者名重腭有著齒齦上者名重齦皆刺去血汁也小
兒生輒死治之法當候視兒口中懸癰前上腭有胞者以指擿取頭決
令潰去血勿令血入咽入咽殺兒急急慎之小兒初出腹骨肉未斂肌
肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻
口左右悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血
脈不斂也喜不育若有如此者皆宜與龍膽湯也

論凡乳兒者

擇乳母負精神爽健情性和悅肌肉充肥無諸疾病知寒溫之宜能
[illegible]乳食[illegible]十數日則可以飼兒不得與兒母大陵酸鹹飲食仍須
[illegible]衛寒溫[illegible]更便轉乳之[illegible]如此則必成痛病或[illegible]刺之疾
[illegible]見之[illegible]不得令兒抱則[illegible]一二夕令兒抱無左右附之可
[illegible]乳母之目[illegible]衣令其自[illegible]頭面一向仰掛恐成痼疾[illegible]
之[illegible]如[illegible]自[illegible]母抱身坐抱乳[illegible]之加陰陽之氣[illegible]
可餵兒咽此[illegible]之[illegible]乳生瘡或[illegible]三月肉中不可大溫[illegible]
母不可驚哭恐兒[illegible]疾或驚熱[illegible]之疾至於夏[illegible]重嚼乳
[illegible]熱[illegible]若乳飽知嚼[illegible]則則無疾病[illegible]不

須令兒常服藥此尤宜審之也

初生病證治

凡小兒飲食乳哺不能無痰病常宜節適若微有疾則當消之乃不能
進乳哺則宜下之不致變發他病也又小兒始生生氣尚盛無有虛勞微惡
即須下之所損不足言其益多矣若不時下則成疾難治矣月下之後
猶須將護然自病者亦不可不下直月下後腹中常小脹滿當節哺乳
護之兒之乳哺宜令多少有常兒稍大食哺自能稍增若成少者是
腹中已有小不調便當微以藥下之但乳之而已甚者十餘日輕
者五六日自當如常若都不食哺而但欲乳者此是有癖不可不下不下
則成寒熱或吐而發癇或致下痢若先其輕時下之則病速愈矣小兒有癖
痼者卒慎時往動骨血即令病瘵若待病成乃攻之多傷氣微胎養薄即
兒恢驚易傷致多為病兒復多有擾父母好與棄其兒而兒得抱
兒風地若壯真即宜發汗之微汗不止便當使壯為度也及育第三
[illegible]第九[illegible]為十[illegible]也已壯兒大者以意
增之可至三十壯唯風池特宜多七歲以上可至百壯小兒常切慎護
風也風池在頸項筋兩邊灸百病乃以艾炷之大小不可妄施灸之大亦不
可廢於灸下[illegible]傷經絡也下動脈藏故也但當以於熱湯浴之除
熱散其氣之[illegible]又以膽中[illegible]生之令兒汗出時以粉粉之
斷生兒來慎不可妄逆鍼灸逆鍼灸即忍痛動其五脈因成痼可畏焉土地
多寒兒喜病痙其俗生兒三日喜逆灸以防之又灸其頰以防噤之決
寒多以去血江東土地無此疾古方絕傳有逆鍼灸之法令人不
詳南北之殊便奉方用之為害最多惟田舍小兒任其自然皆無此
患也又云夫當下不可下以[illegible]則易虛易寒當下之則下陰陽應生
熱熟即增炎且非當下之病不可下也○嬰兒初生[illegible]之後但有[illegible]
兼重陰若乳母乘涼取冷浴而水入氣為痰於胸膈之間是為[illegible]傷疾或
解脫風冷所侵令兒臍腹多啼不能乳哺即成臍風宜用[illegible]臍法○
通大小便去兒初生腹脹欲作大小便不通者令婦人以溫水漱口
心手足心臍下共七處以紅赤色為度良久自通○小兒生下肌肉[illegible]
身上[illegible]月又使[illegible]肌[illegible]紅色[illegible]大便[illegible]時時
生是○[illegible]生之○又云胎怯生下面色無精光肌肉薄大便白[illegible]

身無血色時特更[illegible]多[illegible]目無精采當浴體法主之○新生兒初
益母草湯洗之則不生瘡又以[illegible]以[illegible]煎湯浴則一生少病小兒初生七
日內患臍風撮口百無一活坐視其兒良可憫哉曾有一法拯救世人宜
知其兒齒齦上有小泡子如粟米狀但以溫湯蘸熱帛裹手指輕輕擦
破即開口便安不用服藥或用真珠天麻丸治之○胎驚乃產後胎驚候
過中常飲酒嗜慾忿怒驚恐撲[illegible]母有所觸胎必感之或外挾風邪有
傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內溫壯發搐撩乍[illegible]吐
身腰強直眼閉啼吐指甲青驚悸腹痛聞聲即驚或顋赤或面青眼合
其有著噤撮[illegible]之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧
者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治紋反出外者不
治治法解散風邪利驚化痰調氣貼顖甚則以朱銀丸利之

○初生方法

虎頭湯方 出聖惠方

虎頭骨 五兩 苦參 四兩 白芷 三兩

右用水一斗煮十沸入豬膽汁少許適寒溫浴兒

治兒少小身熱李葉湯方 出聖惠方

右用李葉不拘多少以水煮去滓適寒溫浴兒

又方 出聖惠方

用白芷根苗煎湯浴兒良

又方 出聖惠方 用苦參煎湯浴兒良

浴體法 出幼幼新書錢乙方

天麻末 二錢 蝎尾 去毒 朱砂 各半錢 烏蛇肉 酒浸焙

白礬 三錢 麝香 一字 青黛 一錢

右同研勻每用三錢水三碗桃枝一握并葉五七枝同煎至十沸溫
熱浴之勿浴背○御藥院名浴體天麻散治小兒百日內發搐真
者不過三兩次必死假者發搐可為重直者內生發搐假者外
傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐欲知假者口中氣來
出熱也治之可發風邪用浴體金[illegible]法

凡尋常浴兒 出聖惠方

右以湯添水[illegible]用小鹽浴兒後以粉傳之若無事勿數浴恐傷風冷
兒發驚為痰痸

李葉湯 出聖惠方 浴兒辟溫惡氣解百病去皮膚沙粟

桃根 梅根 李根 各二兩 細辛 蛇床子 各三兩

右細剉以水三斗煎至二斗濾去滓溫浴兒佳一方加麝香
少許不用細辛蛇床子

治新生兒寒熱不住不能服藥用此方藥草湯浴之方 出聖惠方

莽草 丹參 蛇床子 桂 各三兩 菖蒲 半斤

雷丸 一斤

右剉碎以水五斗煮三五沸適寒溫浴兒避目及陰處

治小兒卒客忤吐下乳哺面青黃色變弦急浴之方 出聖惠方

用錢七十文以水三升煮令有味適寒溫浴兒

浴兒法 出聖惠方

凡浴兒不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風
臍瘡等證仍以清油調髮灰傅臍凡洗浴兒並不可用水打濕臍帶[illegible]
成之

又法 出[illegible]

右益母草五兩剉水一斗煎十沸溫浴兒不生瘡疥

初生浴兒良日 出[illegible]

寅卯酉日大吉 壬午丁巳癸巳大凶

右用虎頭骨煎湯浴之令兒不驚啼辟邪惡氣

金虎湯 出聖惠方 浴小兒驚啼辟惡氣浴

金 一片 虎頭骨 一兩

右以水一斗煮至七升使令暖得所時用浴兒心安甚良

浴新生兒方 出聖惠方

右用豬膽一枚煎湯在盆中取膽汁投於湯中適寒溫以浴兒終身
不患瘡疥不得湯中入著生水

甘草法 出[illegible]

嬰兒初生月滿擇甘草細切少許臨臥時以綿裹沸湯泡少時用綿蘸[illegible]
生之際急以軟帛裹手指蘸甘草汁拭其口次用黃連法

黃連法（出鴉咸 醫通）
產婦臨月內，當用黃連細切搗碎，綿裹，入百沸湯，同用甘草一處泡入前
法拭口，次用朱蜜法

朱蜜法（出醫說）
用甘草煎汁法拭口，吐其惡汁，將定，更與朱蜜，安神定魄，開驚鎮
大豆粗研，又如蛾殼許，和硃砂許，抹口中，非獨鎮心安神，能解惡
物之毒，生兒存養之意，一方並根汁蜜之，亦屬益血，令兒無病

牛黃法（出醫通）
以真好牛黃如豆許，同朱蜜服，牛黃法亦如朱蜜，多少也，牛黃益肝膽，除
熱定精神，止驚，開解惡氣，除小兒百病也

猪乳法（出醫鑑）
取猪乳頭，令猪兒飲，毋使犯著猪兒，後腳起，口自放乳，急用手
將之，可得乳矣，非此法不可取也。千金要方云：初生兒宜取猪乳，或未有，須子
產婦之乳未下，亦可用猪乳代之，此法甚良，先用猪乳，乃後母乳哺之，
可免驚癇瘡痘

乳兒法（出醫鑑）
湯氏云：嬰顱經論夏不欲熱，將乳母冷後，或兒啼，不可與乳，能使
兒成疳，冬不欲寒，兒啼哭時亦病吐白，乳兒合後可令兒見夏之熱，謹乳之或嘔逆
也。○千金論：凡乳兒不可過飽，滿而溢則成嘔吐，乳或來猛，取乳
按後再乳，凡初乳時須常捏去宿乳，然後與之，凡乳母睡著
枕之，令兒與頭平，令兒不嗆，母欲睡即奪其乳，恐睡著不知飽足，亦成
嘔吐，又母鼻之間乳兒，或於側衝驚哭起，不可乳兒，氣亂未定則殺
人也。○嬰兒云：兒神未定，未調乳哺，切戒次乳，欲其不得
傳倍積而成嘔吐，此養育之可不為之慮乎也

擇母乳法（出醫鑑）
乳母者，其血氣為乳汁也，五情善惡，悉是血氣所生，乳兒者，
宜善其喜怒，慈愛之氣，未解其病，乳必從其乳母所染，夫隨
甚多，不可求備，但無胡臭、癭瘻、疥疾、白禿、癧瘍、瀋唇、
耳聾、齆鼻、癲癇，無此等疾者，便可飼兒，諸...
殘患者，餘皆可用也。若...之人，氣性亦同，隨其強弱...之性，乳也不理也

詳（…）已上八候，病中見得一證者，皆危亡之候也
（內）八片錦
紅淨為吉，鶴頂為禍，紅黑便秘更黃，紅氣霧人甚轉下
喘多驚作，青黃赤肢粗，擦是外驚，若如未熟非輕，紅散多因
喜怒亂搐搦，手足...得手忽逢相搏，前其青者青亞便直
便生紅青相...痢病時起不見氣，病氣壓乳推湯藥要求青急
角弓反張命多凶，如淨寧雖逆熱，須知五臟有風生，果莖可治
死證生紅赤病寒，...是青已受脾風傷...
紫暗紅...
寒...風...
治...
時而手俱無見定，...
已上歌訣無形，但觀五色浮沉長短，可定死生

中小兒面部氣色總視

五位色作九宮法，產...諸家云：面色青者，驚積不散，欲發風候，其證
驚于起上，上下下，難定風生
五位色作...紅色者，痰積壅盛，驚悸不寧，其
神形視物不定，恍惚，但候而發驚也
五位色作...黃色者，食積...傷，欲作疳候，或痞
癖有之，其神昏倦，...
食不散...
五位色作白色者，肺氣不利，大腸...
...
五位色作黑色者，...
說：...

中小兒五臟圖

致不甘辛雜物未能克化令之飲食肝臟積壯痞滿肚大頸小好啼令嬰孩
得患皆由此也○嬰兒生下兩月日能笑識人切令生人抱
之及不可見非常之物因成客忤百日任脈生能反覆乳母當過
晝夜半歲尻骨成乳母當令學坐二百日掌骨成當教匍匐三
百日臏骨成當教獨立周歲膝骨成當令行步此皆定法令人
之家不按此法但令嬌子常抱不令出見風日亦有冒見兒弱無
人今筋骨微弱難任其數[illegible]此本藏方論非獨之法余觀田舍之兒
嘗受饑及晚出日星霜露恐之惡土而已無他疾者[illegible]草木生於深山
坐崩及大厦之中容易合[illegible]因[illegible]寺[illegible]果[illegible]加培壅多有害
而得實者此豈貴賤之理有異哉

回氣法 [illegible]

小兒初生不能啼者必因難產或冒寒[illegible]所致不可便斷臍帶急以
綿絮包抱懷中以臍帶置火中燒仍以大紙撚蘸清油燃於臍帶上往
來燎之使暖氣入腹須臾氣回方啼[illegible]即斷臍帶

聖惠方預治三證

凡兒初生旬外臍風撮口最為急證十難救一以熱物包指揩
兒口中牙根上如有青筋兩條便用竹刀輕輕刮斷以綿拭乳汁塗之○
又用黃連[illegible]煎[illegible] 白朮[illegible] 生甘草[illegible] 前胡[illegible]○
以牽牛小便[illegible]水三合兒初生未[illegible]前便以[illegible]中二七
[illegible]服兒口中時時出臍[illegible]至乙日[illegible]每日[illegible]
[illegible]承無此疾經[illegible]動也○又方[illegible]向臍上有青脈直上於青脈
頂上炙三[illegible]不是死

封臍風[illegible]

[illegible]來[illegible]入[illegible]乳[illegible]臍中一方[illegible]不令[illegible]
川當歸[illegible] 天泉子[illegible] 亂髮灰[illegible]

[illegible]之

[illegible]臍散[illegible]
瓜蒂 南星 白斂 赤小豆
右為末每三錢用[illegible]自此十[illegible]臍四[illegible]

剃頭法[illegible]

初剃頭但不擇日但於滿月日剃之[illegible]風俗所尚然此時未得出
房滿月與兒俱出以猜胎髮穢恐觸神明令小兒不安[illegible]用此
日當就溫暖避風處剃之即以生油[illegible]杏仁膩粉頭上擦之以避風邪
[illegible]後剃頭此日宜用此

外台[illegible]初剃頭良日[illegible]
丁日未日[illegible]不可剃令生瘡

[illegible]日丑日吉

生瘡法 [illegible]治偏[illegible]百日內發搐
[illegible]香[illegible] 蝎尾[illegible] 薄荷葉[illegible] 蜈蚣末
牛黃[illegible] 青黛[illegible]

右同研勻熟棗肉剃為膏[illegible]上余[illegible]貼頭上四方可出一指許
火上炙手頻熨百日[illegible]可用此[illegible]
[illegible]兒自[illegible]以不[illegible]日大吉其[illegible]不得[illegible]

又寅丑辰巳酉日良 [illegible]戊巳日不得[illegible]丙丁日不得

小兒初生不飲乳及不小便

右[illegible]一寸四[illegible]之以[illegible]汁二合[illegible]石[illegible]豆[illegible]灌之[illegible]

生兒[illegible]不飲乳及小便者[illegible]為急證[illegible]此方用

[illegible]之即[illegible]

木香丸[illegible]療兒初生下口中穢惡不盡咽入喉中即便吐[illegible]
[illegible]則[illegible]下用生地黃
木香 [illegible] 膩粉 木香 [illegible]
右[illegible]為丸如小黃米大每服一二丸甘草水下不拘時

[illegible]

[illegible]散[illegible]治小兒初生下遍身無皮但是紅肉
[illegible]以白[illegible]米研為細末[illegible]皮肉生[illegible]
[illegible]散[illegible]治小兒生下[illegible]如[illegible]破則成水流[illegible]

又生

用[illegible]研入[illegible]仍服[illegible]合香丸
[illegible]丸[illegible]治小兒[illegible]乳母[illegible]

[illegible]之氣
[illegible] [illegible]頭骨[illegible] [illegible]頭骨[illegible]

白龍腦 乳香各一分 降眞香末 篤香 白膠香

思白 ... 大蛇頭一枚

右細研勻用熟棗肉和丸如彈子大初生孩兒煎熱一丸次用綠豆
手帶一丸於身辟一切邪祟之氣

茯苓丸 出直指 治小兒初出胞胎其牽未救急以手拭掠其口令惡血
淨盡不得下咽則無他病若拭口不前惡血入腹則便腹滿短氣不能
飲乳或產婦取食過度胎中受寒則令兒腹痛不肯飲乳

赤茯苓 川黃連去鬚 枳殼炒各等分

右爲末煉蜜丸桐子大每一丸乳汁調灌下

丁香散 出直指方 治白穢入腹令兒嘔吐不止方

木香 乾薑生 茯苓 甘草炙各一分 蕤木瓜

丁香 各等分

右搗末一捻水煎以綿蘸之

初生小兒喉下有皮膜如榴中膜或舌或通舌根 出直指方
可以指甲刺破令血出燒礬末灰細研傅之若某至時若不摘去兒

[illegible]

必瘂

水銀膏 出直指方 治小兒噤其病在胃中如麻豆許令兒不能乳哺方
右取水銀如黍米大一服兒稍無早晚水銀下咽便愈心量之不退
小麻子許與則也

治小兒不飲乳 出直指方

右用雀屎四枚爲末着乳頭飲兒兒大十枚

通便法 出直指方

小兒初生大小便不通腹脹欲絶者急令婦人以溫水漱口了吸咂
兒前後心并臍下手足心共七處每處凡三五次漱口吸咂取紅赤
爲度須臾自通不爾無生意有此證遇此法可謂再生

保命散 出直指方 治初生七日間胎毒者其舌上有白屑如米連舌下有
膜如石榴子大令兒語不發如鵝口狀名曰鵝口病

白礬燒灰 馬牙硝研 硃砂水飛

右同再細研每服一字取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上頰頸內未用
兼將先以手指纏亂髮揩拭舌上垢然後使藥傅之

也

治小兒出腹六十日舌上喉裏斷腭上有物如蘆揮所求狀者 出直指方
右以鋒針刺鋒如米粒以缺之令去却刺且止若不消持
日各一刺不過再刺愈

孩子畫用藥物

硃砂 牛黃 麝香 蘆薈 青黛
蛇黃 犀角 蝎梢 虎頭骨 蝸牛殼
蜈蚣 蘆兒飯丸 天竺黃 白藥 竹瀝
吹鼻散 虎睛 鈎藤散子 虎骨 蘆薈丸
髮灰 五味虎睛丸 封顖散 蜂姼丸 髮灰
好醋酒 墨散子 明粉飲獨子 [illegible] 猪婦乳 [illegible]

右已上藥物入月皆直足一遍迎與產婦學相識

藏衣法

凡藏兒衣法

右兒衣先以清水洗之勿令沙土草污又以清酒洗之仍內錢一文在衣
中盛於新瓶內以青帛裹之其瓶口上仍密蓋頭且置便宜處

[illegible]

待滿三日然後依月吉地向陽高燥之處入地三尺埋之瓶上土厚一尺
七寸唯須牢築令兒長壽有智慧若藏衣不謹爲豬狗所食者
令兒癲狂蟲蟻食者令兒病惡瘡犬鳥食之令兒兵死近社廟傍者
令兒見鬼近深水洿池令兒溺死近故竈傍令兒驚惕近井傍者令
兒聾盲棄道路街巷者令兒絶嗣無子當門戶者令兒聲不出耳
聾著水流下者令兒青盲棄於火裏者令兒生爛瘡著林木頭
者令兒自絞死如此之忌皆須慎之

又安產婦及藏衣天德月空法

正月 天德在丁 月空在丙壬　二月 天德在坤 月空在甲庚
三月 天德在壬 月空在丙壬　四月 天德在辛 月空在甲庚
五月 [illegible]　八月 天德在艮 月空在甲庚
九月 天德在丙 月空在丙壬　十月 天德在乙 月空在甲庚
十一月 天德在巽 月空在丙壬　十二月 天德在庚 月空在甲庚

凡藏兒衣皆依此法天德月空處埋之若有過及走者宜諸

衣內新瓶

盛黃封塞口挂於宅外福德之上向陽高燥之處待過月然後
埋藏之大吉
又法
甲寅旬日十日不得藏埋兒衣以瓶盛黃封安置空處過十日即藏
埋之
又法
甲辰乙巳丙午丁未戊申此五日亦不藏兒衣以瓶中盛黃塞勿令
氣通挂著兒生處過此五日即埋之亦不得更過此日
又法
甲乙日生兒丙丁日藏大吉　丙丁日生兒戊己日藏大吉
戊己日生兒庚辛日藏大吉　庚午日生兒壬癸日藏大吉
小兒初生拭口法一 出保嬰方
出 嬰兒初生[illegible]母腹者老娘不用得嬰之法兒啼一聲則口中惡物嚥入
腹須令兒多病亦多瘡疹凡有孕婦臨月之家前一二日備下甘草
蓋更各半錢淨為末生汝[illegible]害[illegible]入[illegible]少火[illegible]將初出[illegible]之
娘奏用左手托住嬰兒肩背以右手[illegible]提兩足令兒倒啼一聲吐出
口中惡物隨手用綿包手指蘸甘草[illegible]水拭兒口中令淨然後以盆
水浴之能令兒不生驚哭後出瘡疹必輕長大疾病亦少此乃保安
之第一法也
小兒初生斷臍法二 出保嬰方
初生斷臍者忌用金鐵刃器 蓋嬰兒柔弱易引寒氣入腹令臍
常濕多致生病宜用火燒剪刀熨熱斷之更於斷臍處上有以艾
火炙三十壯物發氣入腹則臟腑堅固元氣充實令子病少壽長大
有益焉
令兒初生小兒法三 出保嬰方
小兒初生合法先用虎骨一兩捶碎入達根葛心白三莖同煎熬濾去
粗以猪膽一枚取汁入合湯攪勻溫熱得所自首至足輕手洗令
子肌膚通身後以後不生瘡疥可無驚風之患
將護小兒法五
小兒初生先要乳母行息之[illegible]和為上最熱即生風令即傷風寒乳
母受病是以適之凡初生小兒肌膚輕脆腸胃細微宜令乳母捉時
乳母無令兒飢亦不可令兒傷飽易致嘔吐切要調和臟腑所成
但衣不宜將兒於風日洗浴乾淨若見天氣中和令乳母抱兒日中
嬉戲使氣血充實筋骨堅勁外邪不侵每見富貴之家憐惜太過常
之以綿衣但之以乳食閉於帷帳兒受寒熱易致驚病不保其生誤
有此論急令母乳於前法調理溫兒所成也 所當服之藥如常備丸
五色丸硬速而用之
拭兒口法 又法
嬰兒在胎口有惡物生下啼未出急用乾綿裹指拭口惡汁方不
有害凡甘草法朱蜜法猪乳法用之則兒從是均無下此之於心
[illegible]天行將氣見並不除乃衆在心主血脈得熱而散直入於胃
生肌肉發出於外致成瘡疹之候世之小兒無有可見者或以年不
出得[illegible]餘者亦未其見此為可令之學者所不知療之法疾
初生拭口若依此法得免瘡疹之患或有[illegible]之未得其要只在瘡疹
[illegible]新生草方書[illegible]
故備具此方也
朱砂法 出嬰方
嬰兒初生第一日鍵斷臍帶訖看兒形色若面紅潤色赤啼聲
快者宜用
朱砂半錢旋令兒吮之良久有臍糞便下為佳 次用
甘草法 出嬰方
用好厚州甘草中指一節拍碎以水二蜆殼煎一蜆殼以綿纏點令
兒吮之若吐出惡汁為佳若服一蜆殼不吐即不須更服不問冬
兒有實寒熱皆須服之以宜用
硃砂法 出嬰方
好硃砂一大豆許細研水飛煉蜜一蜆殼看稀稠和成膏每服一
豆大乳汁化下時時滴口中三日内止二服臨時更看形色多青白
啼聲不響即不須服次用
牛黃法 出嬰方
真牛黃一塊許用好蜜煉熟和成膏每服一豆大乳汁化時時滴口

中氣色不實者不宜多服若嬰兒肚熱或身體黃色宜多服之

嬰兒初生至滿月常將時候取猪乳滴口中最為佳矣 出聖惠方

剃泡法 出聖惠方

小兒纔生下即死用此法可救急看兒口中懸癰前腭上有泡以

手指摘破用帛裹拭血令淨若血入喉即不可治

小兒初生六日溫腸胃壯血氣方 出聖惠方

煉成硃砂如大豆許細研以蜜一棗大調以綿搵取令兒吮之一

日令盡

小兒初生畏寒

富於此雖暑月方未可遽去綿蓐熱氣去之乍出母腹不可暴

也積寒下帛為之暖衣之時將軟梳不犯生水則兒下生瘡如

此一月為佳

小兒初生服藥 出聖惠方 宜先以綿裹指拭盡口中惡血若不急拭啼聲一出

即入腹成百病矣亦未可便與乳且先與拍破黃連浸湯取濃汁調硃

砂細末抹口中打盡腹中舊屎方可與乳兒必多睡而且少驚與乳

以百日中

自然長而少病

地黃湯 出聖惠方 初生嬰兒吞惡血

赤芍 三兩　當歸 二兩　桂心 一兩　茯苓 一兩　山藥 一兩

生地 一兩　粉草 一兩　生地黃 一兩

右等分為末每服半錢生地黃汁調下

治小兒初生用五香湯煎水洗之 出聖惠方

茅香　藿香　陵苓香　檀香　木香 各一兩

右㕮咀水六升煎湯濾去滓以溫水先小兒極妙

治小兒一兩歲號乳無辜 出聖惠方

以飛過白礬搗為散任意拌飯香嬰食與嬰三歲

治小孩初生六日助穀神以導達腸胃 出聖惠方

研粟米煮粥飲厚薄如乳每日研與半粟殼哺兒

浴兒湯長 出聖惠方

以兒納香與茆香柳枝合為湯令小兒易長

治小兒新生三日應開腸胃助穀神用粟米煮汁飲如乳酪

大豆許教含飲之須臾三五上

令兒無病 出聖惠方

小兒初生取韭根搗汁半蜆殼之即吐出惡血令無病

治小兒未滿月驚啼看似中風欲死者

用硃砂以新汲水磨濃汁塗五心上兩手心兩腳心胃心立瘥最者

神驗

令小兒速語 出聖惠方

以社酒因小兒口中

小兒初生

以虎骨煎湯浴其孩子長大無病

臍風撮口 附論

臍風者斷臍之後為水濕風冷之所乘風濕之氣入於臍而流於心脾遂

令肚脹臍腫身體重著四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風

搐若臍邊青黑撮口不開是為內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胸堂

伸引努氣亦令臍腫可與千金龍膽湯如前三者是為之源并錢乙

大抵裹氣鬱結壅閉不通其用取下胎毒天麻散定命丹牙瘡可

量與之千金論云小兒始生其氣尚盛若有微患即須下之若不時下則

成大疾疾成則難療矣當審其狀可量用之○撮口者面目黃赤

氣喘息啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼為風邪入臍流毒心脾之經古

令舌強唇青聚口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救藥

其或肚脹青筋吊腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法

貴乎疎利撮口最為惡候一臘內見之尤急○斷臍後為水濕所傷或尿

在襁褓之內乳母失於照管換襁濕氣所侵且當風解脫風冷之氣傷於

內即令腫突多啼不乳發為風搐也先撮口而生瘡者乃臍風也○初生當畏寒

後斷其臍斷臍經便當以炙艾封裹之或是數壯勿令犯濕若先

斷臍後先洗則水搐抵下引或為邪氣所傷或為水入臍中皆致臍瘡

出瘡過百日者諸傷寒風邪入裏則口噤不乳輒思飲[illegible]風瘡

入惡候至于撮口而致危者皆臍風也故肚腹撮口手腳擻動而撮口瘡瘡是入

成風氣入心脾但能撮口尤甚在撮口者皆由積[illegible]在手中于及臍

胃則氣不通氣不能化臟中無脫肚上青筋撮口以為常則
候傳入豈可投藥療之用以珍珠天麻丸利之終通疳去
氣和兒吾用者教信而已

方

封臍散 治嬰兒初生洗兒水入臍中或尿濕繃袍致臍中生濕腫爛
成瘡或解脫風邪所襲入於經絡則成風痛若臍腫爛不乾者

綿帛灰　亂髮灰　白礬灰　紅白灰

南星　白斂　當歸　赤小豆　五倍子

血竭　龍骨　赤石脂　海螵蛸　百草霜

胭脂

右為末先以荊芥湯洗臍用清油調塗忌生水

撮風散

赤足蜈蚣　直殭蠶　辰砂一錢　麝香

川烏　半夏　南星　全蝎

天麻　荊芥穗

右或豬乳或竹瀝或用東引桃枝十根各五寸桃枝入大碗取津液
出投去灰以烏豬乳或豬乳內浸以桃枝蘸藥滴口中

丹砂丸 治小兒臍風撮口

丹砂　麝香　牛黃　半夏　丁香

白附子　鐵粉　天麻　天南星

右搗研為末用粳米飯丸如麻子大每服五丸荊芥湯下空心午後
各一服量兒大小以意加減

天麻丸 治因斷臍後為水濕風冷所乘入於臍流於心脾遂令
肚腹臍腫身體重着四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐
藥利當下疾兒的驗頗止撮口皆可用

南星　白附子　牙硝　天麻　五靈脂

全蝎　輕粉　巴霜

右為末麵糊丸麻子大每服一丸薄荷煎湯下若臍胃者
黑及爪甲黑者不治

益脾散

四君湯加陳皮厚朴木香薑棗煎服

辰砂膏 治噤風眼閉口噤啼聲不出舌上聚肉如粟米狀吮
乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中受熱氣毒入心脾故形
見於喉舌或為風邪所搏致之

辰砂　硼砂　馬牙硝　玄明粉　全蝎

直殭蠶　麝香

右為末油紙封裹貯用或薑每服豆粒許治諸驚用薄荷湯調乳
汁調傳乳上吮下金銀薄荷湯下有潮熱甘草湯服

蝎梢散 治撮口

右用蝎梢四十九箇每一箇用薄荷葉裹定以線扎紮於火中炙
焦砂合薄荷乾研為末再用白殭蠶四十九箇生薑汁炒乾去絲嘴
同為末以初生者每服一字許用紫金煎湯調下

撮風散 治撮口

赤腳蜈蚣　鉤藤　硃砂　直殭蠶

蝎梢　麝香一字

右為末每服一字取竹瀝調下竹瀝解熱

神灰散 治小兒臍風腫

棉繭灰　乾薑　臍帶　蝉蛻

胡粉　白石脂

右各燒存性為末細研如少許麝香為散看臍欲落不落即封臍
使遂如末患傳之於不患也燒存時不得令有別灰入外臺無臍
帶用白石脂聖惠方無白石脂有錦灰

控痰散 治噤風撮口臍風

蝎尾　甘草　銅青　膩粉　麝香

一方加半夏竟先生薑煎湯調前藥入豬乳點入口中吐下風痰

天漿子散 治小兒初降誕斷臍了便傳此散免臍腫

天漿子十二個　亂髮　蜈蚣　羚羊角　麝香一小

右研令極細斷了臍便用少許傳之

疾

哭風散 治風者口胎受熱毒流於心脾或生下為風邪

侵襲自滿月至百二十日見此名犯風禁不治○撮口者初生一臘乃
兒由胎受風熱入臍流毒心脾之經或成臍風胎風鵝口重腭
抑或乎證皆令氣促舌強唇青撮口如囊不乳其證面目黃赤撮口不
乳○臍風者由斷臍為水濕風冷之氣乘於心包絡或繃包所侵
或當風解脫為風邪所襲能令藏變腹脹四肢柔直多啼不乳先撮口
而生驚者非急者宜撮口不開是為內搐不治爪甲黑青即死至於命
其或既在胸堂伸引努氣亦令臍腫○小兒始生其來尚
蔵若有夜病即須下之若不得下則成大病小兒在胎受病非一大抵
襄氣熱結壅閉不通並宜取下胎毒之王當先與控風
散次與服吐次與和胃方與封囟撮風散

蟬蛻　全蝎　殭蚕　瓜蒂

右為末搐管吹入鼻中如嚏噴則可醫一方無瓜蒂用薄荷
湯調服

撮風散　治小兒初生至七日臍風發腫欲啞者

蜈蚣　蟬蛻　大棗　麝香

右搗研為散看臍欲下著即用藥封之初是外風入一方有胡粉半
兩

香螵散　治小兒斷臍之後不乾沒臍出耳中

枯礬　龍骨　黃丹　麝香

右為細末每用敷撲之

立聖散　治小兒口禁

蝎梢　乾蜈蚣

右同末研極細入麻粉少許每一字用乳汁調時時滴入口中

鈞藤湯　治小兒初生撮口

鈞藤　升麻　黃芩　蜣螂

右麁搗篩每服一錢匕水一小盞入竹根半分煎取五分去滓放溫徐徐
服量兒大小加減一方有草用甘草為時時點之

當歸散　治小兒胃臍風十出

當歸　甘草　鉛丹

右除鉛丹外搗為散入鉛丹合研令勻以傅臍中差

安臍散　治臍中汁出或赤中腫痛或因水與乳入
臍所致

右當歸為末傅臍白石脂末油髮灰傅皆可

菓墨散　治小兒斷後為水濕所傷或繃濕氣傷於臍
中或解脫風冷所乘致令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳
哺宜速療之

棗　菜末　釜下墨煤　亂髮

右為細末每用少許傅之

蜈蚣方　治口噤不開不能收乳

赤足蜈蚣

右為末入麝香少許以豬乳一合和之分三服豬乳主小兒
口噤不開最良

麝香散　治小兒生下三四日臍風撮口者蓋因生下時剪
臍不定傷動臍帶外風入臍故有此證下乳不得其候面
青啼聲不出唇青口撮若口出白沫四肢逆冷此
思候

赤脚蜈蚣　麝香　川烏尖

右細末同麝香研極細每服半字先吹入鼻內嚏啼可
治次用薄荷金銀薄荷湯調下此方治小兒驚風尤妙若
初生孩兒更斟酌多寡用之

蜘蛛方　治撮口不開不能收乳

蜘蛛

右用豬乳一合調和為三服徐徐灌之神妙牙疳亦用蜘蛛升

胡粉散　治臍瘡腫濕經久不瘥若至百日即危急宜
用

胡粉　乾薑　白石脂

右同再研細每用一字至半錢傅臍中時時用

麝香散　治小兒初生胎熱撮口

麝香　丹砂　蛇蛻皮

右細研如粉每用半字已津調塗兒脣上日五七次

金黄散 治嬰兒臍瘡不差風氣傳於經絡変為痛瘡者

川黄連 一分　胡粉 一分　龍骨 一分

右研為細末每用少許傳臍中時時用一方加亂髮灰

三灰散 治小兒臍血出不止

乾薑 燒　白礬 枯　皂莢子 燒 各一分

右細研入少許傳臍中一方亂髮燒為末封臍

封臍丸

一二錢　黄蠟 一分　麝香 少許

右同搗令爛為熱捻作餅子爾臍訖安臍上灸三壯艾炷如小麦大君不飲兒至五七壯灸了以風臍散封之方得全濕者恐臍有

白龍散 治小兒臍風

天竺子 有赤者　白殭蠶 炒去絲

右搗羅為散入麝香少許以薄荷自然汁調灌之取下毒物神效量兒大小分作二服亦得

牡蠣散 治小兒臍風久不瘥臍出汁者

牡蠣 一兩　蝦蟇 一枚

右並燒灰細研如粉每以少許傳臍中甚驗

甘草散 治小兒臍風汁出

甘草 炙剉　螻蛄 炙 各一分

右搗羅為散摻傳臍中瘥

枯礬散 治嬰兒因剪臍傷於外風致臍瘡不乾

白礬 枯　龍骨

右等分為末每用少許傳之一方用枯白礬末貼之

烏蛇散 治初生小兒撮口不收乳飲

烏蛇 酒浸去皮骨　麝香 一分

右將烏蛇搗羅為末同麝香再研勻每服半錢煎荊芥湯

治臍風濕腫

右以蛤粉相和灸熟安臍上亦用黄柏末傳之

治小兒撮口瘡先發小兒口傍令見血噴之

右取雀兒糞搗汁亦生濃……不得飲乳

杏骨膏 治小兒臍風汁出久不差

杏仁　猪牙頰骨中髓

右先研杏仁如泥入髓和令勻以塗臍中

甘草湯 治撮口發吐

甘草 生

右剉煎服令吐出痰涎却以猪乳點入口中即瘥

蜈蚣丸 治小兒撮口

赤足蜈蚣 一條　麻刺子

右二味燒成灰細研為丸如麻子大每服三丸至五丸乳汁下一方燒為末用一二分酒調下

牛黄竹瀝散 治小兒臍風熱撮口發噤亦治心熱發驚

牛黄　竹瀝

右每服半字以用淡竹瀝調下一二歲兒服之三四歲兒每服半錢日三服量兒大小以意加減一方猪乳點口中

蠐螬散 治小兒臍中血若臍中膿出亦乾

右用胭脂海螵蛸為末油調搽

蝎半散 治小兒臍熱撮口

蝎半子　蘇羅末

右同研令勻用乳汁和塗於口中即差

烏龍散 治撮口當用乳中高下早以線量長之三壯起死仍用

復方

烏駒乳 一兩　東引槐枝 十枚

右以槐枝火燒槐皮入火一半看不燒頭津出即取拭却灰內於乳頭度須臾便以槐枝點乳於口中大驗

白石脂散 治小兒臍赤腫汁出不止初生未滿月多啼哭致使臍中血出

右用白石脂一兩研為散熬令溫撲臍中日三夫愈再貼仍不得剝揭

又方

綿不拘多少燒灰為末乾摻之高氏活嬰方名綿灰散一方用

者亦佳
治臍傷水腫 用肉桂研如粟米大炙熟熟絹帛兜包熨臍即安
治臍赤腫
以杏人嚼研傅之
牛沫方 取末行牛口沫塗兒口及頰上即効
台小兒口噤乳不下
用白礬燒末水服一錢匕或塗乳上
治小兒臍[illegible]若不早治即成臍風或赤腫及腫水出
以當歸為細末乾[illegible]一方用胡粉等二味相和傅臍中須用
自差試之最驗此方一傅而乾便用豕入瘡病復作又一貼愈
治臍腫
右先用荊芥水洗了葱葉一皮火上炙過地上出火毒以手指甲
刮薄內搭放臍畔次日便消用痛心散
撮蚕方 治撮口面目黄赤氣息喘急啼聲不出並由臍氣挾
熱風毒心脾故令舌強唇青聚口撮面不飲乳有坊及發禁口者
用直殭蚕二枚去嘴炒為末蜜調傅唇中効有蝎梢二枚夫
黄丰蜜傅
治小兒撮口氣但看舌上及上下腭有瘡如粟米大者是也
以蜂窠汁刮破指甲研傅兩頭間上差如無生以乾作末熟之
治小兒臍風
用獨頭蒜切片安臍上以艾炙口中有蒜氣即止立効
治小兒撮口病
取夜合花枝濃煮汁拭口并洗
治小兒臍風且腫又不差
用蜂房燒末傅之
台小兒未滿月不飲乳亦不哭口吐白沫者
用丁香七粒用乳小許於器內煎沸即愈
治小兒臍風鎖口 歌曰
臍風鎖口為何緣千箇蠶中千箇難衣取胡桃地下黄頭乳調

吃下便安然
治小兒撮口氣 又歌曰
小兒撮口氣胡孫黄蘗最強燒灰煎嫁汗塗口自宜良
又方
取壁魚子細研作末每服小許令兒吮之
又方
以初生時豆芽嚼研以乳汁調與兒喫或生研絞取汁少許與兒吃
又方 得
以蝎中子五枚去炭取汁塗口上以差為即止
又方
取楮樹白皮穿作小孔子安於臍上以艾炷入楮皮孔中炙之即差
又方 以[illegible]帶燒灰研傅之効
又方 以父帶燒灰研傅之良
治小兒生來臍內有汁出經久不差方 出
右嗅雞屎灰研傅臍中
真山真珠天麻丸 治撮口弄腸鎖肚臍結腹脹青腳直
乳急與踈利重重驚風定搐
南星 天麻 白附子 膩粉 巴霜
蜈蚣 全蝎 滑石
右為末麵糊丸麻子大牙兒三日三丸五日五丸七日七丸加青黛
末名青黛丸薄荷湯茶清下
治臍中小兒臍風撮口法
小兒生後至七日或臍口受風令兒生病宜囑乳娘或乳母每日夠
牛前後細看兒口內上腭有粟米白泡隨用手指蘸軽磨破去
之可免他疾
治臍中小兒臍風撮口法
右治小兒上下斷當口中心處若有白色如豆大此病發之源
也急以手爪正當中掐之向外而掐令氣脈斷出亦不妨又於白
處兩邊頭亦依此掐令內外斷只掐令氣脈斷不可見血破肉指爪
勿令大鋸恐傷兒甚此法乃東坡家藏方句具述趙郡一老人用此

治小兒已為千飲人乳病者 乃吉風之大差

治小兒撮口及發噤

右取乳頭蟲殺取汁與兒少許服之

又方

右取桑樹上雀兒飯瓮子未開口者取瓮子內物和如米汁塗之

五聖散 治撮口

朴硝 白礬 甘草

右同查子小便中豆前呈二三分末乳前先用綿子蘸口中一二次逆然用之令兒腹中自將放護養至五七日再用五七滴與之永

吳胎陵

蜂房散 治撮口

蜂房 蛇退 硃砂 麝香 腦子

右研令細點兒唇上有效

牛黃散子

牛黃 雄黃 硃砂

右件同為末淡竹葉煎湯點服

竹瀝湯 治口噤

硃砂 麝香

右研細如居先將苦竹一莖中去兩頭節入火燒取油一二合入麥竹葉湯點服

五靈丸 治臍風

南星 五靈脂 草烏

右用羊膽汁調貼之

又方

謂臍是而腫者可用枯過白礬末坯子間傳然恐小兒肉嫩用礬則痛痛則啼哭而又當避損也莫代以烏賊魚骨為妙

治小兒口噤

右用麝香少許入大黑豆末中和乳飲之

治小兒臍風瘡歷年不差方

用東壁土傳之

治小兒臍中汁出不止并赤腫

用礬燒灰細研傳之

治小兒患風臍及臍瘡久不差者

以蝦蟇燒杵末傳之日三四度差

治小兒口噤

以蛇莓草汁灌口中死亦再活

治小兒口噤體熱者又吐沫不能乳哺者

用竹瀝二合暖之分三四服兒新生切不可先加鐵灸恐痛動其五臟因之成病是以田舍小兒任其自然皆無此疾可審之

治小兒牙關不開

用天南星一箇煨熟紙裹封留末要透氣於細處剪雞頭大一竅子透氣於鼻孔中牙關立開

治小兒撮口 用鹽豉傳臍上以艾於上灸之

胎寒 附論

凡小兒胎中受寒於臟腑動肥胎生下不能將護再傷風外其候面色青白四肢逆冷手足顫動似大人寒症或口噤不開乃胎寒之候也其寒氣或乘虛而入臟則令腹痛或作盤腸內吊皆因寒而得之大便青者是也

方

調中丸 治小兒胎寒虛脹滿不思食大便青或白膿及欲發癇宜服

當歸 川椒 附子

狼毒 巴豆 細辛

杏仁

右搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵以氣藏之未滿百日兒以溫水下一丸如麻子大一二歲兒服二丸量兒大小以意加減服之以利為度

當歸散 治小兒胎寒聚啼不足吐嘔反張悲驚

當歸 黃耆 細辛 黃芩 龍骨

桂心　赤芍藥

右件羅為末每服以乳汁調下一字日三服更看兒大小以意加減

聖濟方集成 治小兒胎中受寒生下面青感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腸絞盤腸內吊並皆治之

川白薑散 治產婦取冷太過胎中受寒令兒腹痛不飲乳

木香　陳皮　檳榔　官桂　川白薑

甘草

右剉每服一錢水一合煎以綿蘸與之漸加木瓜丁香

當歸丸 治小兒胎寒腹痛啼哭中止痛

腽肭臍　木香　赤芍藥　芎藭　當歸

右件羅為末鍊蜜和丸如麻子大百日兒每服以乳汁下一丸日三服量兒大小以意加減服之

茱萸散 治兒生七日腎縮乃初生受寒氣有此證

右用吳茱萸合半兩為末研大蒜拌塗其腹仍以蛇床子熏之

當歸散 治小兒五十日以來胎寒腹痛微熱而為聚唾弄舌躽啼上視此癇之候宜服此方

猪膏　當歸

右三味同和以清面一升煮至七合去滓每服取如杏仁大令兒唏之日三服夜一服量兒大小以意加減良

右用當歸末一小豆大用乳汁灌之日夜三四度服差

治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癇疾

芎藭丸 治小兒胎寒腹痛大便青

芎藭　黃耆　牛黃　麝香

當歸　芍藥

右為末鍊蜜和丸如麻子大每服兩丸至三丸米飲下早晨晚間各一服量兒大小加減

黃耆湯 治小兒胎寒腹中疞痛

黃耆　人參　芍藥　當歸　甘草

芎藭

右件節等二錢七以水一小盞半煎至七分去滓分為三服早晨日午近晚各一

芍藥丸 治小兒胎寒大便青不欲食

芍藥　當歸　芎藭　人參　甘草

右為末鍊蜜和丸如麻子大每服一丸以乳汁下早晨日午近晚各一服量兒大小加減

衣中白魚傳方 治小兒胎寒腹痛不出

衣中白魚

右為等絹裹包於兒腹上周轉摩之以差為度

梨汁散 治小兒腹痛夭矯汗出名胎寒

右為煮梨汁七合可三四度飲之

當歸散 治胎寒啼呼

當歸　桂心　甘草　白茯苓

右為末每服一錢或半錢乳汁調入口中

五加皮散 治胎寒多啼

當歸　甘草　五加皮　木香　白茯苓

右為末每服半錢煎冬瓜仁湯下

治胎寒口中白膜口瘡

黃連　甘草　硼砂

右為末用乳汁調滴入口中猪乳汁亦可

人參散 治胎寒

人參　當歸　白茯苓　白芍藥　川芎

甘草

右為末每服半錢乳汁調入口中

小柴胡湯 治胎病寒邪

柴胡　黃芩　人參　半夏　甘草

右件㕮咀每服一錢薑棗煎服

胎熱 附論

小兒受胎因母受熱或恣食爲起熱毒之物傳入胎中令兒生下面赤眼閉不開身體壯熱哭聲不止口熱如湯乃為胎熱之候也。初生嬰

兒以表用藥凡有胎熱證當令乳母服藥不可求動之速治法當釀乳令兒與次漸次解之百無一失若速以冷藥攻之必損脾胃加以嘔吐乃成大患學者當曉此理胎熱生下有血氣特叫哭身壯熱如淡茶色目赤大便赤黃煩急食乳浴法主之更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

方

地黃湯 治胎受母熱毒生下遍身面目俱黃熱大便秘小便黃色多啼不乳

赤芍藥 川芎 當歸 天花粉 猪苓
澤瀉 赤茯苓 甘草 山茵陳 各等分

右㕮咀生地黃煎子母同服

解胎熱釀乳方 解胎中受熱生下面赤眼閉大小便不通不食乳

澤瀉 木猪苓 赤茯苓 天麻 生乾地黃
山茵陳 甘草

右㕮咀每服五錢水一盞煎至六分食後服去滓乳母服

急風散 治胎氣挾熱亦因母有邪熱傳染或生下洗浴當風襁褓失度致令嬰兒啼聲不出乳哺艱難名曰撮口不開病在七日之內者甚宜用

蛇蛻皮 鈎藤 乾蝎梢 朱砂 好麝香
真牛黃

右為末每服一字用竹瀝一兩點同乳汁調下

黃連散 由洗兒先因不淨浸漬或在胎母食熱物熱藥令兒目赤爛

杏仁 黃連 黃栢 當歸 赤芍藥

右剉乳汁浸一宿曬乾為末每用一字生地黃汁調點眼中

洗心散
猪苓 右加天花粉山梔仁白水煎入生地黃汁子母俱服

胎驚

胎驚者兒在母腹中十相俱足或悲怖驚怪顛仆失驚而心至血脈凝之於胎故生下未滿月而發驚者是也初生嬰兒難以用藥凡有此候急用取猪乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中功效不可具述又入麝香當門子尤佳

方

龍膽湯 治胎驚月內氣盛發熱凡瘛風撮口吐哯皆可用

龍膽草 鈎藤 柴胡 黃芩 北梗
赤芍藥 茯苓 甘草 蜣螂 大黃
麥門冬 防風

右為末每服一錢加棗水煎服或加防風麥門冬以辛心熱黃芩減半用三因引用蠍蛻蜋餘藥並同

太一散 治胎驚

天漿子 天南星 白附子 天麻 防風
茯苓 全蝎 硃砂 麝香

右為末每服半錢乳汁化下

參蝎散 治胎驚發定心神

天漿子 天竺黃 人參 朱砂 全蝎
天麻 蟬殼 麝香

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸金銀湯下

獨活湯 治胎驚發散風邪

羌活 獨活 檳榔 天麻 麻黃
甘草

右剉散每服半錢水煎服於内南宜末蜜調可貼頂用

猪乳膏 治胎驚最妙

琥珀 防風 朱砂

右為末猪乳調一字抹入口中

全蝎散 治諸驚胎癇

全蝎 琥珀 朱砂

右為末每服一字麥門冬煎湯調下

蝎全散 治胎驚風皆可服

右以全蝎頭尾全者用生薄荷葉裹外以麻縷纏火上炙研爲度碾爲末別研生硃砂麝香各少許煎麥門冬湯下

牛黄豬乳膏 治兒在胎中受驚故生未滿月發驚

右爲末砂研細同牛黄少許取豬乳汁調稀抹入口中入麝香當門子尤妙此去諸家方書並不曾載因余傳之始東宫吴毅齋得于有一月病以周用之

牛黄散 治小兒胎驚及乳痰心熱

牛黄 馬牙硝 鐵粉 龍齒

右研極細勻每服一字乙熟水調下早晨午間臨臥各一服兒大小以意加減

胎風

夫胎風者由在胎之時臟腑未具神氣未全母動靜不常恣酒方芳或憂愁思慮叫喚號哭高聲自閃大驚傷動心神又因行步失宜喝罵驗理閉有風邪所傷入於胞中兒生之後邪氣在臟不能宣通或包裹

失度冷氣積凝風傷四肢君不能調令兒吐嘔時復面青或痰有食塞精則生壯熱時復面紅二者不已致令搐急驚臥不安手足動搖身反强直作靜作動此即胎病也○子在胞胎稟受不足肝心驚虛又其始生乳養無法臟腑外邪或因斷臍瘡痂未斂風邪一入則令臟腑虛弱經絡不通鬱結爲熱蓋風善行而數變入於榮衛氣血閉則令兒壯熱吐嘔精神不寧搐臥煩驚手足抽掣故名胎風和而無治則成癇疾

方

葛根湯 治小兒初生至百晬前後驚癇速發不醒及胎中感風體冷面青筋急反張

葛根 麻黄 亮古 甘草 枳殼

杏仁 升麻 黄芩 大黄

柴胡 芍藥 鈎藤 蛇蛻 蚱蟬

石膏

右㕮咀每服一錢乙水半盞煎至三分入竹瀝少許更煎一兩沸去滓分溫三服量兒大小以意增減

牟角丸 治小兒胎風搐搦筋脈拘急牙關或時緊硬

犀角 白花蛇 天南星 白附子

乾蝎 天麻 麻黄

巳上七味將羅爲末用無灰酒二大盞調令勻於慢火上煎旋添酒下住手攪以酒盡爲度

牛黄 麝香 膩粉 朱砂 虎睛

水銀 龍腦

右細研入前膏內看硬軟和丸如菉豆大不計時候以竹瀝下三丸至五丸量兒大小加減

朱銀丸 治胎風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中惡受之毒赤治爲積痰童用之

水銀 白附子 蝎 南星

朱砂 天漿子 牛黄 蘆薈 膩

鉛霜 麝 直殭蠶

右爲末煉蜜和丸如芥子大每一丸薄荷湯下如未通利加至二丸

虎睛丸 治小兒胎風

虎睛 牛黄 珍砂 龍腦 青黛

史君子 琥珀 麝香 金箔

右爲末用水浸蒸餅心爲丸如櫻桃大煎金銀薄荷湯磨下半丸如痰重服一丸更量大小加減

龍腦散 治小兒胎風及慢驚風服冷多壅延解熱

龍腦 麝香 白附子 牛黄

白殭蠶 乾蝎 白花蛇肉 天麻

天南星 麻黄

右除龍腦麝香牛黄同研令勻外餘將碎不羅用新水一盞浸一伏時冬月浸兩伏時生絹濾出汁調和寒食麪爲丸如大豆子大陰乾將羅爲散入前三味再同研勻每服一字乙薄荷湯調下量兒大小加減

露蜂房丸

治小兒胎中久積風熱發歇手足搐搦多驚不睡煩熱裡

露蜂房　蛇蛻　天漿子
天南星　朱砂　乾蝎　膩粉一分
牛黃　水銀
右爲末，都研令勻，以棗瓤和丸如菉豆大，不計時候，煎桃柳薄荷湯
下五丸，量大小以意加減
水銀丸　治小兒風發作，搐搦，手渾身急，溢眼目反張
水銀　天麻　天南星　白附子　乾蝎
麝香　龍腦　蘆薈　直殭蠶
右爲末，先用少許棗肉研水銀星盡，與諸藥末同研令勻，以棗瓤和
丸如菉豆大，不計時候，以薄荷酒研三丸服之，量兒大小以意加
減，得汗出立效
虎睛丸　治小兒胎風及驚風，目睛上視，手足搐搦
虎睛　天麻　乾蝎　烏蛇肉
羌活　獨活　殭蠶　麝香
右爲末，以麵糊和丸如菉豆大，每服三丸，研破，不計時候，以薄荷
湯服之。一方虎睛膏，金箔爲衣
天南星丸　治小兒胎風壯熱痰疾
天南星　白附子　乾蝎　牛黃　龍腦
丹砂　雄黃　天漿子
右爲末，煉蜜和丸如皂子大，以丹砂爲衣，二三歲兒每服一丸，五至十
歲服三丸，煎金銀薄荷湯化下，空心臨臥服
虎睛丸　治小兒胎風，服羚羊角丸後宜服
虎睛　代赭　丹砂　蘆薈　麝香
牛黃　桃仁　當歸
右爲末，煉蜜和丸如麻子大，一二歲兒每服三丸，三四歲兒每服五
丸，溫水下，日三
牛黃丸　治小兒胎風，手足搐搦，偏勻壯熱
牛黃　水銀　朱砂　羚羊角
麝香　雄黃　天漿子一　天南星
右爲末，以燒大棗肉和丸如菉豆大，不計時候，以薄荷湯化破三丸

服之，量兒大小以意加減
牛黃散　治小兒胎風驚熱，搐搦，心神煩亂，或寒
牛黃　人參　真珠末　甘草　鬱金
川大黃　朱砂　胡黃連
右爲末，都研令勻，不計時候，以蜜水調下半錢，量兒大小以意加減
服之
斷癎丸　治小兒胎風久驚癎，時發時愈
蛇蛻　蟬殼　黃耆　細辛　鉤藤鈎子
甘草　牛黃
右爲末，再同和勻，煮麵糊和丸如小豆大，百晬內小兒服三四丸，二
三歲兒十丸至十五丸，人參湯下，不計時候
麝香散　治胎風心熱痰壅
人參　朱砂　牛膽南星　天竺黃　牙硝
鐵粉　麝香
右爲末，每服一字，生薑薄荷湯調下
牛黃散　治小兒胎風驚熱，瘛瘲，發搐，手足強直，眼目反
張
牛黃　天竺黃　鉛霜　馬牙硝　人參
丹砂
甘草
右爲末，再同研勻，每服半錢，以薄荷湯下，量兒大小加減。一方有
水銀丸　治小兒胎風，四肢驚掣，痰涎壅滯，宜服
水銀　天麻　半夏　鬱金
白附子　乾蝎
右爲末，以軟飯和丸如菉豆大，不計時候，以薄荷湯下一丸，量兒大
小加減
定命丸　治小兒肥胎，氣盛既生，觸冒外邪，名曰胎風，令兒壯熱神昏
多驚掣手縱
蟾酥　乾蝎　白附子
天南星　麝香　青黛

右研細以粟米粥和丸如菉豆大別以青黛為衣如新生兒用
臍粉二捻生甘一兩煎及水半茶脚化藥一粒服下胎受者驚
風即是不驚重者則荊芥薄荷湯化下服藥後困睡無疑
但有患者先化半丸自入鼻中自[illegible]者必差
天竺黃散 治小兒胎風驚熱手脚急張
天竺黃一分 牛黃四分 胡黃連 羚羊角屑 天麻
蟬殼
右為末每令不計時候以新汲水調下半字二歲已上加藥服之
天竺黃丸 治小兒胎風搐搦壯熱多驚
天竺黃 天南星 鉛霜 胡黃連 牛黃
右為末研入牛黃等令勻用棗肉和丸如粟米大不計時候以乳汁研
破三丸服之量兒大小以意加減如三歲已上用荊芥湯下
乾蝎散 治小兒胎風壯熱驚搐搦
乾蝎 麝香 白芥子 阿魏 白僵蠶
右為散每服一字不計時候以薄荷湯調下量兒大小加減

丹砂散 治小兒胎風心熱驚痛
丹砂 牛黃 天竺黃 膩粉 麝香
右研勻細每服半錢以竹瀝調下不計時候量兒大小以意加減
聖惠如聖散 治小兒胎風驚風搐搦狀如天釣宜服
蛇蛻 白膠香 白芥子 阿魏 白僵蠶
右為散不計時候以薄荷湯調下一字量兒大小加減服之良久
發汗出差
牛黃丸 治小兒胎風手足抽掣宜服
牛黃 天竺黃 蛇蛻 麝香 蝎
右為細末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒不計時候以薄荷湯下三丸
至三四歲兒每服五丸量兒大小以意加減
犀角丸 治小兒胎風
生犀角 牛黃 黃連 代赭
右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸用乳汁研化三
四歲兒每服五丸以服後可乳晴丸量兒大小加減

治蛭散 治小兒胎風瘡
右用蛭螺子一兩燒作二片去腹中肉五個子末用蛭粉和入膿子
內用少許和匙匣瓷器子盛炙上炙焦為末者油調塗
虫蛀粉散 治小兒胎風瘡
右用蓋皮蛀屑為末輕粉少許濕瘡乾傅乾瘡油傅
松皮散 治小兒頭上瘡名胎風瘡
右取古老松樹上自脫者皮至豆[illegible]少許瓦器中同炒存性為末蛀
粉油調塗
烏蛇散 治小兒胎風瘡
右用烏蛇根水浸去骨焙乾為末以黃生油調傅之
水銀丸 治小兒天吊多驚搐搦眼忽戴上吐逆夜啼傴身如大
驚悸夜啼連青黃乳不入并無精神
水銀 [illegible] 天南星 白僵蠶
乾蝎 牛黃 麝香 白附子 鉛霜
右件藥除水銀膏牛黃麝香鉛霜等研令如粉餘藥搗
為末都研令勻用水銀膏和丸如黍米大一二歲兒每服用薄荷
湯下三丸三四歲兒每服五丸不許時候量兒大小以意加減服之
朱砂散 治胎風驚搐心神驚悸眼目直視
朱砂 天竺黃 牛黃 鉛霜 麝香
甘草 鐵粉
右為末薄荷湯調下
牛黃散 治胎風手足搐搦口眼喎斜
天麻 牛黃 犀角 蟬退 甘草
天竺黃 胡黃連
天麻丸 治瘈疭驚癇
牛黃 天麻 天竺黃 鉛霜 南星
胡黃連
右為末煉蜜為丸如黍米大[illegible]下
驚癇
治風日數[illegible]

殭蠶 天麻 全蝎 白附子 防風
羌活 甘草 白茯苓 蟬蛻 麝香
朱砂 山梔 金箔 鉤藤 遠志
茯神各等分
右件為末每服一錢或半錢燈心薄荷煎湯調服
附子散 治胎寒風證頭項軟弱
附子 白芨 百合 川烏 南星
栢子仁 五加皮各等分
右為末用好酒塗角項上乾即便再用又治小兒風中死去四肢厥
冷口白涎流眼目高吊身首天張用鉤藤煎兩服灌之或得甦省如
有此證請試之

胎黃 附論

凡小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如
梔汁乳食不思啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此
證乳母宜服生地黃湯仍忌酒麵五辛之物

方

生地黃湯 治小兒生下胎黃狀如金色身上壯熱大小便不
通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此
證乳母宜服并略與兒服之
生乾地黃 赤芍藥 川芎 當歸 [illegible]根各等分
右㕮咀每服五錢水一盞煎至六分去粗乳母亦可服抹些入兒口
中
甘豆湯 出衛生 治小兒初生下胎黃
黑豆 甘草各一兩
右水一大椀煮熟入沙糖少許同煎糖化令消停溫飲之加淡竹
葉一握能解五臟熱每夏月產者尤宜服之
茵龍湯 [illegible] 治嬰兒出胎血肉未斂面目俱黃不啼哭乾燥口四
肢不能伸縮並宜服之
山茱萸 山藥 生乾地黃 澤瀉 赤茯苓
甘草各 腦子 麝香
右為末每服一錢燈心水煎服如小便不通則用五苓散加人參加茵
陳 心煎服

變蒸 附論

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變一百二
十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變且蒸二
百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三
百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後
六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大蒸小兒自生三十二日
一變再變為一蒸凡十變而五小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸
畢乃成人小兒所以變蒸者是榮其血脈改其五臟故一變竟輒覺
情態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其輕者體熱
而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子微汗出其重者體壯熱
而脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐哯目白睛微赤黑睛微白又云目
白者重赤黑者微變蒸畢目睛明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡
蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後之五日為十日之中熱
乃除耳兒生三十二日一變二十九日先期而熱便治之如法至三十
六七日蒸乃畢其日變蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒變蒸或早或
晚不如法者多又初變之時或熱甚者違日數不歇審計變蒸之日當
其時有熱微驚慎不可治及灸刺但和視之若良久熱不可已少與紫
丸微下熱歇便止若於變蒸之中加以時行溫病或非變蒸時而得時
行者其診皆相似惟耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散以發其
汗汗出溫粉粉之熱當歇便就瘥若猶不都除乃與紫丸下之凡變蒸
時若有寒加之即寒熱交爭腹痛夭矯啼不止者熨之則愈也變蒸與
溫壯傷寒相似若非變蒸身熱尻亦熱耳熱此乃為他病可作餘治審
是變蒸不得餘治也○凡小兒生三十二日始變變者身熱也至六十
四日再變變且蒸其狀臥端正也至九十六日三變定者候丹孔出而泄
至一百二十八日四變變且蒸以能咳笑也至一百六十日五變以成
機關也至一百九十六日六變變且蒸五機成也至二百二十四日七變

以飛蠶也至二百五十六日八變生腎…知欲學語也至二百八十八日九變以亭亭…也凡小兒生至二百八十八日九變四蒸也第其變之日…不可妄治之則加其疾變且蒸者是兒送…月也蒸者甚熱而脉亂汗出是也近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也○錢氏云小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未具自生之後即長骨脉五臟六腑之神智也變者易也變蒸者自內而長自下而上又身熱以生之日後三十二日一變每變畢即情異於前何者長生腑臟智意故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨除手中足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日百段而上之十日百段而三十二日計三百二十段為一遍亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入齦中作三十二齒而齒牙不及三十二數者乃變不足其常也或二十八日即至長二十八齒已下…此但不過三十二之數也凡一周遍乃發虛熱諸病如是十周則蒸畢也計五百二十日生骨氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎…六十四日再變生膀胱其發耳與骶冷腎與膀胱俱主水水數一故先變生之九十六日三變生心…一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚心為火火數二一百六十日五變生肝…一百九十二日六變生膽其發目不開而赤肝主木木數三二百二十四日七變生肺…二百五十六日八變生大腸其發膚熱…不汗…者金數四二百八十八日九變生脾…三百二十日十變生胃其發不食腸痛而吐乳此後乃生…能言知喜怒故太…也…云氣入四肢長碎骨於十變後…十四日長其經脉手足手受血故能持脚足受血能行…會蒸畢而足一歲之日師曰不汗而熱者…汗大吐者微下不可別治是以小兒後蒸…之…所謂不…三十…四當日變…相合也…

[illegible]

方

龍膽湯 治小兒初生血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺飲食不消壯熱及變蒸不解人鬼氣并諸驚癇悉療

龍膽 鉤藤 柴胡 去蘆 白茯苓 去皮 桔梗 炒

黃芩 芍藥 大黃 濕紙包煨 甘草 炙

當歸 人參 各一分

右…每服一二歲兒每服一錢匕水五分煎至三分去滓溫服二四歲兒每服一錢半匕水一小盞煎至五分去滓連夜三四服 日量兒大小加減

惺惺散 治…變蒸及溫…病輕宜服及發熱咳嗽痰…

人參 白朮 白茯苓 甘草 白芍藥

天花粉 桔梗 細辛 一分

右末每服一錢水半小盞薑一片薄荷一葉煎至三分服之或除…加川芎或加粉…升麻柴胡等分一方無白芍藥

調中散 治變蒸吐瀉不乳 …

木香 香附 炒 人參 …

橘皮 藿香 去土 甘草 一分

右剉散每服三字水一盞生薑二片紅棗一枚煎溫服…

之但當以平和之劑微表熱實者微利之
柴胡湯（一名人參湯） 治小兒變蒸經時不止挾熱心煩啼叫不歇骨
熱面黄
柴胡 甘草 人參 玄參 龍膽
麥門冬
右麁搗篩每服一錢匕水分分煎至四分去滓溫服不拘時更量
兒大小加減一方用防風無玄參
清心湯 治嬰兒周晬內時或体熱眠睡不寧乳哺不調目睛
不明或差或作三十二日一變六十四日再變甚者微驚乃長血氣名
曰變蒸候過周晬漸除切不可亂投諸藥宜用
人參 麻黄 川大黄 麥門冬 甘草
犀角
右為細末每服一錢水八分入杏仁一箇去皮尖拍破同煎至四分
去滓放溫時時與服
前胡湯 治小兒變蒸熱氣衆心煩躁啼叫不已及骨蒸煩熱
前胡 燒膽 甘草 麥門冬 人參
右麁搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後量大小加減溫
服
紫砂丹 治蒸與前清心湯同
當歸 硃砂 木香 人參 代赭石
右為細末與代赭石同研勻入杏仁十箇去皮尖巴豆五箇去心膜
出油同研勻入麝香半錢拌勻滴水和如針頭大每服三粒至五粒
煎荊芥湯下乳後
當歸散 治變蒸有寒無熱
當歸 木香 官桂 甘草 人參
右剉散每一錢水一盞薑三片紅棗一枚煎食前服
紫丸 治小兒變蒸發熱不解并夾食傷寒溫壯汗後
熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哯食癇先寒後熱
赤石脂 代赭 巴豆 杏仁

右為末巴豆杏仁別研為膏相和更搗二千杵當自相得若硬入少
蜜同搗之密器中收三十日兒服如黍米一丸與少乳汁令下食頃
後與少乳勿令多至日中小小下熱若未全除明日且更與一丸百
日兒服如小豆一丸以此為量增減百月多熱喜令發疹二三十日
輒一服佳紫丸無所不療雖下不虛人代赭須真者若不真以左顧
牡蠣代之一方用礬烙為丸一歲二丸米湯下
四君子湯 小兒變蒸時用四君子加茯苓去白朮
人參 茯苓 茯神 甘草
右為細末薄荷煎湯調下切不可服驚藥恐心冷胃氣
黑散 治小兒變蒸中挾時行溫病或非變蒸時而得時行者
亦治傷寒頭熱
麻黄 杏仁 大黄
右搗麻黄大黄為散別研杏仁如脂乃細細內散又搗令調和內蜜
器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗出以粉粉之
勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之一方為末一歲兒半錢
熱水調下一方有甘草薄荷湯下
小紅綿散 治變蒸驚悸自汗
天麻 人參 全蝎 麻黄 甘草
茯苓 白附 紅花 荊芥 辰砂
麝香
右為末每服半錢薄荷同煎溫服
防風飲子 治變蒸驚悸煩啼哯乳手足抽掣
防風 羌活 白附 甘草 川芎
白茯苓 全蝎 人參
右㕮咀為散每服一錢釣藤同煎
防風散 治變蒸潮熱煩啼哯乳欲生瘡癬
山藥 白茯苓 白附 甘草 全蝎
人參 防風
右為末每服一字或半錢釣藤同煎
溫胃湯 治嬰兒變蒸潮熱驚悸吐乳泄青變蒸時啼嗁

哭晝思煩悸並宜服之
茯苓 遠志 羌活 防風 白附
川芎 天麻 全蝎 粉草 山藥
硃砂 代赭 麝香 白茯苓 白殭 各等分
右爲末每服一字金銀薄荷湯下
天麻四君子湯 治變蒸吐乳泄瀉
人參 白朮 白茯苓 天麻 甘草 各二錢
右爲末每服半錢棗子湯点服風治後驚怯弱又斂仁棗子湯点服
前胡散子 治變蒸潮熱頭目昏痛眉子況伏或夜且來勿宜
服之
升麻 白芍藥 乾葛 前胡 川芎
甘草 知母 麻黄 苦梗 黄芩 各等分
右爲散每服一錢白湯薄荷同煎
白朮散 治變蒸風吐乳自泄
人參 白朮 白茯苓 甘草 藿香
山藥 扁豆 炒各等分
右爲末每服一錢棗湯点服
清神散 治變蒸潮熱傷寒傷風咳嗽氣急夜啼煩燥頭
目昏沉
麻黄 去節 川芎 半兩 羌活 二錢 防風 一錢 荊芥 二錢
苦梗 二錢 甘草 二錢 茯苓 半兩 人參 一錢
右爲末每服二錢薄荷同煎
溫氣均脉膏 治變蒸驚啼
白附 茯神 甘草 茯苓 全蝎
羌活 天麻 防風 山藥 蟬退
僵蠶 炒 遠志 人參 硃砂 麝香
全蝎 各等分
右爲末煉蜜爲丸均脉膏蘇木湯化下
蟬花散 治變蒸風痰餌熱焦啼
蟬花 一隻 白茯苓 人參 防風 白附子

甘草 山藥 全蝎 天麻 硃砂
麝香 各等分
右爲末每服一字金銀薄荷湯点服
小紅丸 治變蒸潮熱咳嗽有痰吐乳驚悸無時焦啼夜腹痛疼
並宜服之
南星 生一錢 半夏 生二錢 朱砂 二錢 全蝎 一錢 代赭 一錢
白附 生一錢 杏仁 二錢 硃砂 二錢 巴豆 三七粒
右爲末糊丸如粟米大每服十五丸葱白薄荷湯下連進二服立
通
瀉心散 治變蒸胡熱焦啼煩燥口舌生瘡眼赤熱痛並宜服
之
荊芥 甘草 防風 羌活 苦梗
黄芩 赤芍藥 白芷 大黄 山梔子
山藥 川芎 赤茯苓 麻黄 各等分
右爲末每服一錢燈心麥門冬煎湯点服
通聖散 治變蒸昏睡驚熱
連翹 荊芥 防風 甘草
右各等分爲散白水点服
牛蒡散 治變蒸生瘡
防風 荊芥 甘草 各等分 牛蒡子 炒一分
右爲散白水煎服
硼砂散 治變蒸生口瘡
硼砂 豆粉 朱砂 各等分
右爲末搽口中
犀角散 治變蒸潮熱焦啼驚悸眼赤眼疼
茯神 茯苓 荊芥 防風 蘇葉
升麻 人參 薄荷 羌活 苦梗
黄芩 山梔子 川芎 白芷 山藥
山茨菇 赤芍藥 粉草 犀角 大黄 八分
右等分爲末每服半錢薄荷湯服

驚啼 附論

夜啼脾臟冷而痛也當以溫中藥去以導之花火膏主之○驚啼邪熱乘心也當安心安神丸主之○又有驚啼夜啼頰中鬲腸氣吊啼鬲驚風內吊啼胎寒胃冷啼胎熱伏心啼心腹刺痛啼邪干心痛當乳食作痛啼十者大同而小異○又啼而不哭是煩哭而不啼是躁凡初生兒日夜頻啼其如有祟或謂熱在心經業與鍊絲或以灸竹瀝與服溫煖乙者審而治之乃善也若兒啼哭有室而突首又夜啼者心經有熱宜以灯心湯調服三黃丸或洗心散加燈心麥門冬子良若兒啼哭頭低身曲眼閉肚疼者臟腑當冷宜與溫之胃風湯加炒黃芩木香散若不識證候但以蟬蛻二七枚全者去大腳為末加朱砂一字蜜調與吻立效○小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重口舌瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青口有冷氣腰以冷曲腰而啼此冷證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹暖啼時或有汗仰身而啼此熱證也若重口舌瘡則要乳不得口到乳上便啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡舌必腫也客忤者見人氣忤犯而啼也○如陽痛服對證藥不退者可與珍珠丸利之再與對證藥治之陰痛服對證藥不退亦可利之再服對證藥自立效蓋有積也○又治法一是邪熱在心本臟屬火復以熱所乘故炎上而焦哭其候舌白小便赤者是也宜服直珠散小便赤澀壯熱宜導赤散又宜服官局黃芩二是思有未所觀但口不能語而驚哭也其候兩手虎口俱無脈面變五色者是也宜服蘇三關虎口脈形狀云無脈兩手俱無見定如虛實思神明宜服蘇合香丸仍以辟穢發或帶之及燒降真腦麝之以甚現符令有德行法師禳謝之三是有臟腑積冷或乳母飲食生冷令乳寒冷氣入兒腹遇夜半陰盛又感或夫孟積孩兒腹肚故作疼九甚也其候大便青白而瀉宜服乳香沒藥等仍用忽連白煎湯燙洗乳母宜服木香匀氣散宜服魏香散大驚啼有陰陽二證亦有半陽半陰證陰則身體盛京大便青結時復驚啼陽則身體發熱精神不定睡中驚啼良由風冷熱之氣衛不調又有身涼大便赤黃而啼者有身熱大便青白而啼是半陰半陽之證也因用安神膏神寶龍齒丸字服鎮心膏半陰半陽用蘇香丸琥珀散

方

蟬黃散 治小兒風熱驚啼

蟬黃研 犀角炒 人參 白茯苓去皮
防風去叉 細辛去苗 蚱蟬去翅足微炙 乾蝎微炒
丹砂研 母丁香 山茱萸炒 甘草炙
牛黃研各一分

右羅為末更研令細一二歲兒每服一字乞用竹瀝調服三四歲兒每服半錢乞日三服不拘時候

安神散

人參 白朮 白茯苓各三一 甘草二分
辰砂半分 天麻半分 茯神半分 全蝎七個
銅青炭一分

右為末每服半錢則不為下如未安再用調中散

治小兒驚熱

犀角水磨取汁服

鎮驚丸 治小兒夜啼驚熱

龍齒 白殭蠶 當歸切焙 芍藥 蝸牛
鉤藤各等 代赭研 牡蠣二兩粉 麝香研 牛黃研各一分

右特研細煉蜜和丸如菉豆大二歲兒二丸井華水化下量兒大小以意加減

牛黃散 治小兒風熱驚啼

牛黃一分研 犀角屑一分 人參一分去蘆 茯神一分 防風一分去蘆
細辛一分 蛛蟬一分去足 蜘蛛一分微炒 朱砂一分研
甘草一分炙微赤

右為散入研了藥更研令勻一二歲兒每服一字用竹瀝調服三四歲兒每服半錢不計時候

安神丸 治心虛痞熱面黃頰赤壯熱驚啼神志恍惚不寧

麥門冬去心 馬牙硝 白茯苓 乾山藥 寒水石各半兩研
朱砂一兩研 甘草半兩 龍腦一字研

右為末煉蜜為丸雞頭大每服半丸砂糖水化下不拘時候

青金丸　治小兒體熱忽發吐逆夜多驚啼或泄瀉或變成慢
驚或為瘡疾定搐搦療瘡疹痰涎疾安心神
龍腦研　麝香研各一分　墨一分半　史君子去皮三个
膩粉一分　白麪三分　青黛二分　金銀箔一十五片
右為末滴井華水和丸如雞頭大每服半丸薄荷湯化下
桃紅丸　治小兒驚啼眠睡不穩
丹砂　麝香各半錢　白附子半錢炮　白僵蠶一錢
乾蝎炒一錢　牛粉一錢　金箔　銀箔各二片
右細研為末水浸蒸餅心和丸如黍米大每服一丸金銀薄荷湯化下
看兒大小臨時加減
萬金散　治小兒稟受胎寒腹痛啼或多眠翻面色青白遇夜多啼
甚者項強似若神崇亦由胎元受患所致又名夜啼宜用
沉香一錢　丁香一錢　人參一錢　五味子一錢
當歸一錢　赤芍藥半錢　白朮半錢　桂心一分
右件為細末每服一字用濃煎淡竹葉水小盞煎至五分放溫時時滴兒口中立效
清神散　治小兒驚熱啼叫不止
牛黃半錢研　天竺黃研　鉛白霜研　鬱金　麥門冬去心
甘草一分炙　人參半兩
右為散每服半錢人參湯放冷調下乳食後服
牛黃膏　治嬰孩驚啼眼睡不安夜間驚啼此乃心熱若神崇即
非夜啼乃風熱邪氣乘於心臟名曰驚啼宜用
真牛黃一分　朱砂一分　人參半兩　甘草半兩炙
辰州硃砂一分　雄黃一錢　龍腦半分
右為細末煉蜜和成膏如雞實大每服半粒至一粒薄荷湯化下乳食後
養臟湯　嬰兒在胎之時其母將養一切不如法及取涼飲冷
過度冷氣入兒腸胃使胎氣不強致生下氣弱多病俯仰多啼名曰臟
寒宜用
川當歸一兩　沉香半兩　丁香半兩　白朮半兩　桂心半兩
川芎半兩　木香半兩
右為細末每服一錢水八分生薑二片煎至四分去滓放溫時時
滴口中一方無木香
紅輪散　治小兒驚熱夜啼涎壅心煩并治由暑昏悶
牙硝　寒水石各二兩　麝香半錢　腦子半錢　硃砂二兩
甘草一兩炙
右為末周晬兒一字薄荷湯調下
龍角丸　治小兒五驚夜啼及壯熱心煩眠臥不安驚由或時搐
搦
龍角二錢　牡蠣一錢　川大黃半兩　黃芩半兩　蚱蟬二枚
牛黃如小豆大五枚
右為末蜜丸如麻子大每兒服二丸隨兒大小增減
龍齒散　治小兒拗哭夜啼
龍齒　蟬殼　鉤藤　羌活　茯苓
人參各等分
右為末每服一大錢水一大盞煎六分去滓溫熱服
治小兒驚啼發歇不定
真好麝香
右研為末每服清水調下一字日三服量兒大小服
鉤藤散　治小兒驚啼壯熱心煩不得穩睡宜服
鉤藤一分　龍膽一分去蘆　犀角屑一分　茯神一分　黃芩一分
甘草炙一分
右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減頻服
之
龍齒散　治小兒驚啼煩熱眠臥不安
龍齒半兩　麥門冬半兩去心　赤芍藥一分　川芎一分
川大黃一分剉微炒　甘草一分炙微赤剉
右為末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減頻服
之
虎睛丸　治小兒驚熱多啼不嗜乳食腹有氣痞脹由堅積不
可乳哺兼去風癇
虎睛一對　犀角屑一分　黃芩半兩　梔子人　大黃半兩剉碎微炒

右除鬼箭外搗羅為末再同研勻煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五七日三四服量兒大小加減一二歲兒用乳汁研破三丸四歲兒每服五丸温水研破下勤服微利為度

赤芍藥散 治小兒初生及一年内兒多驚啼不休或不得眠臥時時肚脹有似鬼神所為

赤芍藥一分 桂心一分 白朮一分 甘草一分炙 川大黄剉微炒

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分量兒大小加減温服

牛黄丸 治小兒驚啼腹痛甚無少得睡

牛黄一分細研 牡蠣燒為粉 川大黄一分剉微炒 黄芩一分 龍角一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大滿月兒以乳汁研破服二丸一歲兒以薄荷湯下五丸餘以意加減服之

雄黄丸 治小兒驚啼即撮口汗傷陽失便或青或黄赤白

雄黄一分研 牛黄一分細研 牡蠣一分燒 真珠末一分 巴豆一分去皮心研出油

右都研為末煉蜜和丸如黍米粒大小兒一月或五十日未發時飲服三丸毎抱閉坎一汁未通兒當寒身体輕汗出即解一服不解可再服若小兒傷乳不吃服中有痰孔當撤下如蝦蟆子烏尿鼻乳勿推便任服藥

雷丸浴湯 治小兒寒熱驚啼不安

雷丸三分 牡蠣三分 黄芩三分 細辛三分 蛇床子一兩

右以水一斗煎取七升去滓分為兩度看冷煖用先令浴兒頭勿令水入耳目次浴背膊後浴腰已下浴訖避風以粉撲之

真珠丸 治小兒驚啼及夜啼不止

真珠末 伏龍肝 丹砂各一分研 麝香一分

右研如粉煉蜜和丸如菉豆大以溫水下一丸大小加減

犀角丸 治小兒驚啼不止

犀角屑半兩 龜手一分 胡黄連一分 龍齒一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服前金銀湯研破三丸服之日三四服量兒大小以意加減

白玉散

白玉一分 寒水石半兩

右為末用米醋或新水調塗 治小兒未驚啼紀死或有人從外來邪氣所逐令兒得疾故乞不治

千金湯

蜀椒 左顧牡蠣各六銖

右斷碎以水一升煮取五合每服一合口禁不能服令含吐兒吃量兒大小加減服之

黄芩散 治小兒心熱驚啼

黄芩 人參各一分

右為散每服一字以竹葉湯調下不拘時候服

梔子仁散 治小兒驚啼壯如物刺

梔子仁一兩

右細研為散一二歲兒每服一字用粥飲調服三四歲兒每服半錢一日三四服更量兒大小加減服之

治小兒驚啼發歇不定

取蠶尿白炒為末以乳服之佳方本湯調服

又方

用乳頭燒灰酒服或温水調下一字去心寂有血也

又方

用臘月猪脂燒灰服之

又方

用猪皮三寸燒灰着乳頭飲之

代赭丸 治小兒驚啼手足搐搦

代赭石生用研 鐵粉研 丹砂研 白附子炮一 麝香研 龍腦研各一分

右研細勻煉蜜和丸如櫻桃大量大小加減煎薄荷湯化下

治小兒驚啼

用車轄脂如小豆許内口中及臍中瘥

治小兒夜驚大人因驚失心

以震肉作脯與食之此畜為天雷所霹者是

療小兒驚邪

取雞窠草多作湯洗浴兒即除驚邪也

治小兒夜後狂語

用竹瀝每一歲兒連夜二合服令盡之

虎睛丸 治驚啼疾病心神恐悸中風不語角弓反張或驚癎

大者並宜服之小而三五日進一服大能去驚安魂魄與青金丹間

服取効

青黛一分 全蝎五个 朱砂半分 麝香 膩粉

白附子半分 水銀 蟬蛻 茯苓

右為末用青黛煎為丸如梧桐子大一歲兒半丸薄荷湯研化隨大小

加減此驚啼又為之夜啼思忖間忽然而啼更用安神散

夜啼 附論

夫夜啼有藏陽兩證冷者臟冷也夜則陰盛與冷相搏冷與陰氣相搏故作痛而啼陽者臟熱夜則陽盛熱相搏熱與臟氣相搏故作痛而啼又有冷熱之氣與胎毒攻衝亦令夜啼也孩兒夜啼者非是神鬼為祟蓋因胎熱伏心令則為陽相搏熱則與陽相搏腹中疼痛是以為驚啼也經謂合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也夜為陰盛之時凡病在陰者至夜則邪氣可甚若兒氣弱臟有冷氣至夜陰盛與正氣相搏則啼腹痛不得安靜脾中痛故令啼呼於夜石曰夜啼又有觸犯禁忌亦令兒夜啼者皆以符術治之○初生嬰兒夜啼又不服藥但犯神祇壇或當天倉倉名於各里壁上謂小兒殃為甚多致有夜者必多瘦弱便判青木向後多病況兒腹中有痛即令啼叫也

方

牛黃丸 治小兒夜啼多驚煩熱

牛黃 朱砂 蘆薈 麝香

當歸 赤芍藥一分 鈎藤一分 蝸牛

代赭一分 牡蠣一分

右為末研入研了藥令勻煉蜜和丸如麻子大一月及百日兒每服用薄荷湯下三丸半年至一歲兒每服五丸連夜二服量兒大小加減服之

紫蘇子散 治小兒夜啼未定與乳敗之與氣相逆不得下

紫蘇子 蘿蔔子 訶梨勒皮 杏仁

人參 木香 青皮 甘草

右為細末每服一錢以水一盞入生薑一錢少許同煎至五分去滓溫服不拘時候量兒大小加減

人參散 治小兒夜啼不可禁止

人參 茯神 甘草 川大黃

牛黃 犀角屑 皂莢子

右為散每服用水煎沸投細研牛黃湯調下半錢頻服量兒大小加減服之

鈎藤散 治小兒夜啼臟冷也陰盛於夜則令動則為陰極發躁或作疼所以夜啼而不歇也

鈎藤 茯神 茯苓 川芎 當歸

木香 甘草

右末每服一錢薑棗略煎服其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證鈎藤散去當歸木香加朱砂末一錢研和每服一錢木通煎湯調下又有觸犯禁忌而夜啼者醋炭熏服蘇合香丸急以方術服之

當歸散 治小兒夜啼者臟寒而腹痛面青手冷不吮乳是也

當歸 白芍藥 人參 甘草

桔梗 陳橘皮

右為末水煎半錢時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人參湯下一方雙功散有官桂

五味子散 治小兒夜啼及多腹痛至夜輒劇狀似鬼祟

五味子 當歸 赤芍藥 白朮

甘草 桂心

右為散每服一錢用水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫

服乙字袋明有茯神陳皮一方無赤芍藥
蓮心散　治小兒夜啼驚熱
石蓮心半兩　人耳塞半兩　乳香一分　人參半兩
燈花一字　丹砂一分
右為散每服半字以薄荷湯調下不拘時候
黃香丸　治小兒夜啼不止腹中疼痛　一方乳頭散
黃香　甘草炙　當歸切焙　芍藥
附子炮　乾薑炮一分
右為末不用乳汁和丸如雞丸更入火熨爛丸如黍米大一月及百日
兒每服三丸用乳汁下半年至一歲兒每服五丸一日三五服量
兒大小加減服之
犀角散　治小兒夜啼及驚熱
犀角屑一分　鉤藤一分　川升麻一分　人參三分
黃芩一分　甘草半分炙
右擣為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減服之

羚角散　治小兒夜啼及驚熱
羚羊角屑一分　茯神一分　黃芩一分　犀角屑一分
甘草半分炙　麥門冬一分去心
右擣羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減
服之
鉤藤散　治小兒夜啼及驚熱
鉤藤一分　龍齒一分　犀角屑一分　茯神一分
黃芩一分　甘草半分炙
右擣羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減服之
芍藥散　治小兒夜啼不止為氣脹腸中痛啼腹痛
赤芍藥半兩　桂心半兩　芎藭半兩　黃芩半兩
當歸半兩
右擣細羅為散一月及百日兒每服一字粥飲調下半年至一歲兒服
半錢連夜三五服隨兒大小以意加減服之
鉤藤膏　治小兒內吊夜啼腹身冷哭唇面青冷

乳香一分研　五靈脂　沒藥　當歸焙一　麝香一錢
右為末煉蜜丸如豆大一百日內兒一丸煎鉤藤湯化下乳服一方以
燈花三叉煎乳香湯化下一方燒蛤粉入桃子麝香以鉤藤湯調下
乳頭散　治小兒夜啼不止腹中痛　一名寬中散
黃耆剉　甘草炙　當歸炒焙　赤芍藥　木香各一
右為散每服少許着乳頭上令兒吮乳服之
龍齒散　治小兒夜哭不住
蟬蛻去足　鉤藤　龍齒　茯苓去皮　人參各等
右為末每服一錢水半盞煎服
桂心湯　治小兒夜啼腹痛狀如鬼祟
桂去皮一分　五味子半兩　當歸切焙一分　枳殼麩炒去瓤　甘草炙一
右剉每一月及百日兒每一錢水半盞煎至三分去滓分溫二
服半年至一歲兒准前煎作一服不計時候
鉤藤膏　治小兒胎寒胃冷腹肚疼痛夜啼發時乳食不進渴
青以多驚啼時有冷汗

薑黃二分　沒藥研　木香　乳香研各一分
右為末煉蜜如彈子每服三錢小兒一丸如雞頭大煎鉤藤湯化下
更量大小加減不拘時候
代赭丸　治小兒夜啼腹痛鶻鳴即止　一名赭丹丸
代赭煅一分　牡丹皮　芍藥　麝香一分研
右為末煉蜜丸如麻子大一月及百日兒每服三丸用薄荷湯下半
年至一歲兒每服五丸連夜三四服蜜湯亦可
伏龍肝丸　治小兒夜啼
伏龍肝一分　丹砂一分　麝香一字
右為末煉蜜丸如菉豆大每服五丸量兒大小加減候夜深煎桃符
湯下
芍藥散　治小兒夜啼腹痛
芍藥　芎藭　廣茂煨各半兩
右為散一月及百日兒每服一字以用乳汁調服半年至一歲兒每
服半錢連夜四服量兒大小加減服之一方溫酒下

石膏散 治小兒夜啼壯熱驚懼

石膏一兩 人參 龍骨各半兩

右為每服一錢用水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫服之

燈花膏 治小兒夜啼蓋小兒方有之謂之燈花膏但只用一味此方加下二味亦治熱躁小便赤口乾有汗仰身而啼

燈花七顆 鵬砂一字 硃砂少許

右研令極細以蜜調成膏服兒睡時以少許抹口唇立驗只燈花用燈心湯下亦可

芍藥散 治小兒夜啼至明即安寐

芍藥 白朮 附子各半

右治下篩以乳和與兒服之量多少又以兒母手指謄中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服藥者以乳汁和服如麻子一丸兒大能服者以意斟酌與之燥啼下亦可 一方用人參無白朮

[illegible] 三八

蟬殼湯 治小兒夜啼

蟬蛻去足水洗 朱砂 白茯苓各一兩

治為末用鵝毛燒灰蜜湯調下臨卧服

劉寄奴散 治小兒夜啼不止

劉寄奴半兩 甘草一錢 地龍炒一分

右㕮咀以水二盞煎至一盞去滓時時與服

伏龍肝散

伏龍肝 交道中土各一

右為末篩水和少許飲之

蟬砂丸 治小兒驚熱夜啼

右用蟬蛻二七枚全者去大腳為末入朱砂一字蜜調為丸使吮之

蒜乳丸 治小兒冷證腹痛夜啼

右用大蒜一顆慢火煨熱細切焙乾乳香半錢別研極細丸如芥子大每七丸乳空時乳頭以乳汁化下

豺狼骨 治小兒夜啼已所不治也

豺皮 狼屎中骨

右燒作灰服如黍米許即定一方狼屎中骨燒灰水調服黍米粒大二枚即定

立効散 治小兒夜啼

乳香一分 燈花七枚

右為散每服半字塗母乳頭上令服一方燈心有塗上與兒喫

硃丹丸 治小兒夜啼

硫黃一分 鉛丹一錢炒

右研如粉一小盒子內盛畢固濟大火煆令赤候冷以竹筒中盛紙單封口埋在地下七日取出更研細用飯丸如黍米大一月及百日兒每服二丸用冷水下半年一歲兒每服五丸連夜三四服

蟬花散 治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花和殼 白殭蠶直者炒去絲 甘草各一分 延胡索半分

右為末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯調下食後服

前胡丸 治少小夜啼

右用前胡隨多少搗末以蜜和如大豆服一丸日三稍加至五六丸以差為度

麝香散 治小兒夜啼不止面青腹脹是中客忤

右麝香一分研細每服一字乳清調服之一方乳汁調塗口中即愈

治夜啼

右用青黛細研每服半錢新水調下

觸犯禁忌夜啼

右用蘇合香丸以醋炭熏及用方術辟之口到乳上使母身勿近熱急看口內或唇或舌生有依前口唇重者須治之其啼自止

治小兒夜啼

右用馬蹄末傅乳上飲之馬骨灰傅乳上與兒飲一方取一塊人將棺木燒明照之即止

治小兒夜啼

右用烏雞糞塗臍下勿令母知一方於臍下書田字差

治小兒夜啼

右用龍帶帶心門上一方取犬頭下毛以絳囊盛繫兒兩手立止

治小兒夜啼

一方取明燭并於床脚上差

治小兒夜啼

大蟲眼睛一隻

右爲散以竹瀝調少許與喫 一方取荒廢井中敗草安戶上差

治小兒夜啼

蝟粉

右每服水調三五大日三服

治小兒夜啼

右取馬骨燒灰乾者如手大安床卧席下勿令母知子母俱吉

蟬花散 治小兒夜啼不止狀若鬼祟

右以蟬殼下半截爲末一字生薄荷汁入酒少許調下或者不信試將上半截爲末依前湯調下復啼如初古人立法莫知其妙○一方蟬退七個去大足爲末每服上半夜則用上截瀉心七宝煎湯下欲止下半夜則用下截如前煎湯與服復如神効

治客忤夜啼差

右用本家廚下火柴頭一箇以朱書云吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛永不放急急如律令紫頭以火燒焦頭爲上書了勿令兒知立在床下倚床前脚裏男左女右

治小兒夜啼猪床治方

右取猪床坑灰以沸湯淋汁浴兒并與少許服之

又方

以日未出時及日午時仰卧於臍上横紋中屛氣以朱筆書作血白其夜即斷啼一方車轄脂取安母卧床勿令知

花火散 治夜啼邪熱在心内躁

右用燈花一顆取下塗乳上令兒吮乳一方水調朱砂塗五心上

治小兒夜啼

小兒夜啼時草連無明無夜無歇假田牛弟來騎上點真實悄悄自安歇

又方

以睡眠時食飲偏有所思者勿以此喃兒則愈

天麻四君子湯 治小兒夜啼

人參 白朮 白茯苓 天麻 麥門冬去心 甘草炙

右㕮咀燈心煎服

當歸散 治小兒夜啼

人參 當歸 白朮 甘草 藿葉小許

桂少許

右㕮咀白水煎溫服不拘時候

硃砂散 治小兒夜啼

硃砂一分 石膏一分 寒水石一分 滑石分 甘草一分

代赭石一字

右爲末每服一字燈心薄荷湯下

安神散 治小兒夜啼

麥門冬去心 牙硝一錢 白茯苓 山藥

寒水石各一分

硃砂半分 甘草一分 人參一分 腦子少許

右爲末煉蜜丸如雞頭大每丸荊芥湯下

治小兒腹痛夜啼

右取樹孔中草着戶上立止

治小兒夜啼符書三道



此符左右手中貼之



此符臍中貼之

貼身門上

治小兒驚病夜啼

以仙人杖安身伴睡良

治小兒夜啼

以猪窠中草安席下勿令母知

治小兒夜啼不止

取雞窠中草安席下勿令母知

主小兒夜啼

以井口邊草着母卧席下勿令母知

治小兒夜啼 以竈中土及四交道土合末以敷兒

治小兒夜啼 以狼屎中骨燒作末服如黍米許即定

躽啼（附論）

夫躽啼有陰陽兩證陰者由母妊娠之時將養失度取涼飲冷不避風寒冷氣入胞傷兒臟腑兒生之後胎寒腹內與正氣相搏令兒腹痛仰身而啼其證面白唇青黑大便青色是也陽者亦母妊娠之時酒食熱物衣著大烘焙令胞熱氣入胞傷兒臟腑兒生之後胎熱腹內與正氣相搏令兒腹痛躽身而啼其證面赤唇紅青大便黃色是也又有嬰兒出腹口中胎穢拭除不盡嚥下血穢傳留臟腑亦令躽啼也

方

養脾丸 治小兒躽啼脾胃虛冷心腹疼痛腸鳴洞泄

乾薑 炮 縮砂仁 去皮各一兩 白茯苓 去黑皮半兩

甘草 炙一分 大麥蘖 炒 人參 各半兩 白朮 一分

右為末煉蜜和丸如雞頭大每服五丸生薑湯化下不計時候乳母亦可服丸數服

養臟湯 治腸胃虛冷作痛內痢一名痢腸

當歸 沉香 木香 桂 川芎 各半兩

丁香 二錢

右為末每一錢用薑棗同煎食前服一方有白朮無木香

牡蠣散 治小兒躽啼腹脹胃滿

牡蠣 燒過 伏龍肝 甘草 炙剉 蒼朮 剉炒各一兩 麝香 研半分

右除麝香細杵為末次與麝香同研令勻每服半錢匕陳米飲或清煎竹茹湯調下量兒大小增減

紫蘇子丸 治小兒躽啼及一切氣逆心腹刺痛

紫蘇子 微炒 陳橘皮 去白 高良薑 桂 去皮

人參 各三分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸米飲或温酒化下不計時候乳母可加丸數服

白朮丸 治小兒躽啼胃傷風冷心下虛痞腹中疼痛胃弱泄瀉

白朮 乾薑 炮 人參 甘草 炙剉各一兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸米湯化下量兒大小加減

牛黃丸 治小兒躽啼不止

牛黃 一分 代赭 煅過一分 麝香 研 牡丹皮 三分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服兩丸温水下

馬齒礬石丸 治小兒胎寒躽啼驚癇腹脹滿不嗜食大便青黃或有實不可吐下並大人虛冷內冷皆治也

馬齒礬石 二兩燒作灰

右細研以棗肉和丸如菉豆大每服三丸米飲下加五丸以意增減以腹中溫暖為度

治小兒躽啼驚癇腹滿不乳食大便青色

用柏子仁為末溫水調下二錢

又方

燒猪屎以湯淋取汁看冷暖浴兒并與少許服之

治小兒躽啼面青腹強是客忤氣死大人亦可用

右以新放馬屎一團絞取汁灌之

盤腸氣躽啼（附論）

夫盤腸氣躽啼者每發時腹內如蛇盤之狀混兼有病由乳母妊娠之時受於邪冷傳及從心氣搏結不散而入胎中致生之後胎氣怯弱被正氣相搏令兒作痛其證有陰陽二證陰則曲身而啼大便青冷陽則伸體而啼大便青是二者皆乾啼無淚大便氣泄如兩證交互者是陰陽也○歌曰盤腸氣發先腰曲無淚可啼眼乾哭口閉腳冷上唇烏額上汗流珠碌碌 [illegible] 冷卻盞漆也又歌曰痛來難忍便身黑体硬如弓一向張如婦胎中得邪毒乙人何不用名方 [illegible] 幼幼有患盤腸非果所得元由氣積久不散發時衝結五臟六腑無一時暢其氣來處發動充流上下衝溢于腸胃之間

有聲泪綫連連而設如猫吐恐視之不見又有吊腸一證瘀氣壅結阴
不伸舒雖不乎氣使動臓腑胃寒臍上下吊促彩曲但偃卧忍疼痛
二證俱作驚乞驚寒然但寒所急多發不同盤腸宜以勾氣散加沉香
煎服之無不愈吊腸當用珎珠丸加以沉香乳香煎鈎藤湯送下微通
即瘥然後更與調氣須豹根本方性湯也

方

茴香散 治小兒盤腸氣痛

茴香炒 木香 黑附子 金鈴子去核 蒔蘿子炒

破故紙炒 白蒺藜炒 檳榔同上

右㕮咀每服二錢水半盞入鹽煎服 凡看此證急前葱湯淋洗其腹揉其腹然後服藥 間良

陰急方

又承曲痛中出其疼已止諸次服此方

乳香 没藥各少許通明者細研

右用木香一塊於乳鉢內磨水一分叅和前藥調乳香没藥於

方只一服取効

白薑蔻散 治盤腸氣痛

白薑蔻仁 縮砂仁 青皮 陳皮 甘草炙

香附子 蓬莪茂各等分

右為末每服一錢紫蘇煎湯調下一方無甘草

茴香散 治小兒臍下氣塊痛

莪蘂子炒 蓬莪术 茴香炒 青皮 甘草各一分

辣桂 木香各半分

右為細末每服半錢鹽湯調下

蒔蘿子散 治盤腸氣痛

蒔蘿子炒半不拘多少

右為末每服半錢辣桂煎湯下或只入蘇合香丸則用薑湯調下

乳沉膏 治小兒盤腸氣痛躯身啼叫面青黑不定大便

青白亦片不化

附子炮二 乳香 當歸焙一 麝香 沉香各一字

右為末酒糊為丸如小芡大月內兒一丸釣藤湯下或乳飲食前大

小加減用之三歲二丸

釣藤膏 治嬰孩小兒盤腸氣痛腹痛啼哭

乳香研細 没藥 木香炮 薑黄各一 木鼈子三十

右為末煉蜜為膏如砂糖內每服旋丸如皂子大煎釣藤湯化下一

丸日三服次服魏香散見本門後

木香散 治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫不如未甘

川楝子 延胡索 茴香各一分 木香 薑黄 君子肉

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

寧建丸 治盤腸氣痛

寧建 當歸各一分 木香二分炒

右為末用棗肉和丸如麻子大每服七丸飯飲下

巴附丸 治小兒盤腸氣痛因其母夜中時或則其母受冷物太

多或因驚中帶不乎入孩兒腹中每至夜深則陰氣盛通令小兒腹中

作痛冷啼哭不止故為盤腸氣也

大附子去

巴豆

右研勻以麺糊為丸如粟米大每服五丸以少許茴香煎湯下

不可多用也菖蒲茴香湯下酌度服只有一服新修合者未可

用的修合百日後通同也此藥修合下經年歲特妙治小兒盤腸氣

最佳

延胡索散 療兒初生下盤腸刺痛面青色啼哭不止

延胡索一分 乳香 木香各半分

右為細末水一大盞煎七分無時與服少許

檳榔丸 治小兒盤腸氣痛

麻黄 檳榔 大腹子 紅丹各等炒

右等分為末之麺糊丸大麻子大二歲已下小麻子大每服十丸薄荷

煎湯下三日燈心湯下三日霹靂湯下三日其湯用薑錢十片水一

盞燒秤錘淬水煎至去錘將此下藥號霹靂湯

魏香散 治盤腸氣痛

真阿魏一分 蓬莪茂半兩
右先用温水化阿魏浸蓬莪茂一晝夜焙乾爲細末每服一字或半
錢煎紫蘇米飲空心調下

趂痛散 治小兒盤腸氣痛
桃仁去皮尖麩炒 白芷 各等分
右爲細末每服半錢或一錢炒茴香煎酒下

乳香膏 理盤腸氣痛内痛惡痛外症但諸蟲心痛悉皆治
安息香 桃仁湯浸去皮尖 蓬莪茂
史君子 乾蝎一分 阿魏一分
茴香
右除桃仁别研外次以阿魏并安息香以酒少許熬成膏入口上以重
成蒸餅入少入桃仁中研勻爲末煉蜜爲膏如皂子大生薑
薄荷湯化下隨兒大小加減

溢腸氣痛 其證但腰腹曲啼哭無淚須有汗
以葱一握水煮以湯淋洗兒腹以葱熨臍間良久氣出痛止

驚風内瘹啼 附論

夫驚風内瘹啼者陰陽兩證陰者起於吐瀉之後因氣虚弱指冷
氣逆不寧或不乳腹硬反張手足瘈疭内瘹啼呼也陽者起於身體發
熱驚悸大哭搐神傷動恍惚不定或睡或不睡泄瀉氣粗手足潮搐驚
瘹啼叫也○歌曰内瘹多啼哭細看吳茱痛一般口唇是鼻祭爲蟲
痛 内瘹惡痛黑色但紅筋生脈見便知風癇本根源
鎮心使寧方爲妙始覺良工效古其寒
熱内瀉氣血凝滯結結不散腹中痛但調氣去其積熱積合調毒是愈
此候與蟲候一般啼口紫黑是蟲候目有紅
筋手在後者爲是内瘹也

方

乳香散 治小兒驚風入腹内瘹止熱肚疼
腹腰痛咽啞面青
乳香 木香 當歸 白朮 甘草炙

肉桂去皮 枳殼 五味子 赤芍藥
右㕮咀半歲兒抄錢水一盞半煎至三分去滓服大小加減

衣砂散 治小兒傷冷腹痛日久變成内瘹時人不識呼爲
祟
硝砂半分 紅芍藥 鉛白霜 兒的
眞珠
右爲末每服一字金銀薄荷湯調下

斬邪丹 治小兒驚搐内瘹腸發肚疼夜啼驚叫
乳香 沒藥 茴香 木香 鉤藤
右末先將乳香沒藥二味乳鉢中研細然後勻諸藥却入大蒜白三片
研細和前藥如綠豆子大每服十丸十五丸鉤藤茴香湯吞下無時

乳香丸 其證腹痛多啼唇黑囊腫或伛偻反張眼有紅筋 驚風内
瘹啼
乳香 沒藥 沉香各一錢 蝎梢十四 檳榔一錢半
右末煉蜜爲丸煎湯下丸如黍米大一才無時

乳香丸 治小兒驚風内瘹痛不可忍者
乳香半分 蝎梢 沒藥 沉香一分半
右爲末煉蜜丸如黍米大每服嬰孩三丸一歲五丸三歲七丸以意
加減乳香湯吞下

檳榔丸 治嬰孩小兒驚風内瘹
檳榔 乳香各一分 大蒜一子煨研
右先研乳香極細後入檳榔研細後入同大蒜研看軟便得所丸如菉
豆大每服半歲五丸一歲七丸二三歲十丸以意加減等以何湯化
下

沒石子丸 治小兒驚風内瘹腹痛不可忍
木香 螺粉炒 草烏頭生用去皮尖
右爲末用醋煮糊爲丸如黍米大每服十丸炎醋湯吞下

止痛丸 治小兒嬰孩内瘹
木鼈子肉 胡椒
右爲細末用黑豆末醋作糊丸如菉豆大每服三四粒荊芥湯下

治内㾗腹痛

病源曰爲風内㾗腹痛多啼汗出囟青哯乳眼慢
流涎或唇黑囊腫偃僂反張眼内有紅筋斑血虎口脈紋入掌
右以青龍丹奪命丹並用釣藤勾子七箇不蛀皂角子七粒薄
荷七葉煎湯調服

芎犀散 治内㾗胎寒腹痛啼哭
官桂　當歸　川芎　香附子各一　川白薑
木香　甘草各半兩
右爲末每服半錢白水煎乳食前服

木香散 治驚風内㾗盤腸氣吊痛
黑牽牛末半生半炒　大蓮子二錢　檳榔　當歸
蝎尾三枚　蓬术煨　木香　大黄各一
右細末每三錢空心煑水調下仍先用燒猪肝細
嚼不吞仍吐出卻服藥引虫

○胎寒胃冷啼 附論

夫胎寒胃冷啼者由孕娠之時寒溫失理動止乖違飲冷食
氣停而寒入胞中及生之後外因肝胃令兒吐嗽吐乳邪氣乘腸令兒啼
而面色青白時啼是胎寒胃冷故也○小兒胎寒之病本於在胎時其
母不足或飲寒冷既生之後婦人又不謹乳哺不化或腹痛或利痢色青而
甚則邪冷與正氣相搏令兒腹痛軀張蹙衆而啼是為胎寒之病

方

治小兒胎寒聚啼腹中痛舌上青黑或下 名當歸丸
蜀椒去目及閉口者炒出汗　當歸洗焙　吳茱萸湯洗焙乾炒
狼毒炙　細辛去苗　乾薑炮各半兩
巴豆十枚去心膜用油煎　莒子炒三
右將八味搗羅為末以巴豆一處同研令勻煉蜜和丸擣三千杵和丸一
月兒服如黍米大一丸早晨晚後各一服一歲兒兩丸三歲至五
歲兒服五丸並用米飲下更量兒大小加減

當歸丸 治小兒胎寒腹痛躽啼重並不吃食大便青白 腹
并治諸疳證

當歸切焙半兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗一分　附子一枚炮裂去皮臍　乾薑炮一分
杏仁十二枚湯浸去皮尖雙仁炒　豉炒　巴豆四箇去皮心出油盡
細辛去苗各一分
右為末煉蜜和杵千下臼中擣之每用旋丸如黍米大百日兒服如麻子大
一丸温水下一二歲兒二丸早晨只服更量兒大小加減以利為度

揚氏當歸散 治胎寒腹痛面色青白身温令腹痛多啼
當歸焙　黃耆蜜炙　北細辛去土　川桂去皮　陳皮去白
白薑炮　[illegible]仁　甘草炙各等分
右㕮咀生薑棗水煎空心服

[illegible]散 治小兒胎寒吐乳肚脹啼反張忽驚 方見驚啼門

[illegible]乳法 治中寒冷其壅手足厥冷寒噤口禁量貼口上泥
淋不能喫天
右用五靈脂散畫囊菜子每服一方消積散加丁香蓮囊菜子母
同服一方用食鹽同蒸黃炒過包熨人兒臍腹

乳附丸 治小兒胎寒胃冷便青夾白腹心腹痛須當氣虚
腹痛啼呼有汗
附子炮去皮臍　乳香　當歸　訶子炮去核　桂心
乾薑炮　吳茱萸各一分
右為末酒糊為丸如小豆大月內兒一丸釣藤湯下或米飲食前大
小加減用之

芎藭香 治小兒胎寒腹痛躽啼
芎藭　當歸切焙　黃耆二錢半兩　乾薑炮　甘草炙
黃芩各三錢去心
右㕮咀每一錢水一小盞煎至五分去滓分溫二服早晨日
晚各一量兒大小加減

逐痛丸 治小兒胎寒躽啼溫中止痛
蓬莪朮半分　牛黃別研　芍藥　芎藭各分半　當歸切焙一兩
右為末煉蜜和丸麻子大百日兒每服一丸乳汁下早晨日午近晚
各量兒大小加減

理中丸 治小兒胎寒腹痛躽啼不利

人參　乾薑炮　甘草炙等分

右爲末鍊蜜爲丸如彈子大每一丸水一盞入大棗一枚同煎〇至半盞分溫二服或以薑棗湯化下保嬰方爲末每服一錢白湯調下名理中湯無時

當歸湯　治小兒五十日以來胎寒腹痛微熱聚唾弄舌躽啼上視

當歸一分焙　黃芪　　桂肉切一分等

右細以清酒一盞煮至七分去滓每服取半呷許令兒嚥之日三夜一量兒大小加減

○胎熱伏心啼　附論

夫胎熱伏心啼者因母懷娠之時恣食辛辣多味炙煿厚衣燒服熱藥熏蒸觸入胎中故生之後與伏於經絡令兒悅悅風邪襲傷令兒驚啼面赤唇紅時時啼叫是胎熱伏心故也

方

導赤散　治心熱啼面赤小便赤澀口中熱腹上亦熱或有汗仰身而啼並見錢方息

右以導赤散加黃芩煎水追通心飲加麥門冬車前子燈心等煎

[illegible]兒飲

豬苓湯　治邪熱在心本臟爲火復爲熱所乘故其上焦更其證面紅小便赤口熱夜啼時有汗仰身啼煩燥哭聲逆文

右以豬苓湯加辰砂導赤散小柴胡湯加黃芩生地黃並用燈心麥門冬或竹茹煎服

芝燈湯　治小兒熱證心躁夜啼

右用芝麻清油燈花三兩顆研細用燈心散並煎湯調塗口中以乳汁送下

○邪干心痛啼　附論

夫邪干心痛啼者本非起於心卽邪氣客於心主之脉少陰者君火心也是五臟之主精神之舍心爭實則邪不干正心氣虛則邪傷於心則神去神去則死矣經曰真心痛旦發夕死夕發旦死凡諸邪在心者止在心包脉絡是心之別脉也蓋小兒骨氣虛怯被邪氣上逆痞而不散故發心痛而啼也〇一是邪熱在心本臟爲火復以熱所乘故炎上而焦哭其候舌白小便赤者是也宜服錢氏瀉心散小便赤澀壯熱宜導赤散又宜服當歸散者三是客忤邪物所侵小兒目有所覩但口不能語而驚哭也其候兩手虎口但無脉而見五色者是也王環等三關虎口脉形飲去惡然兩手但無見定知虎實惡神明宜服蘇合香丸仍以辟穢衆感冒之及說降真醋炭之三是有藏臟積冷或乳母飲食生冷令氣走冷氣入兒腹臟使寒搏於藏氣夫晝夜發兒腹脹故作啼者也其候大便青白而瀉宜服乳香丸沉香等仍用當歸白煎湯送元乳母宜服木香白蔻散宜服調氣香散

方

治邪崇所侵小兒目有所覩而驚哭其候兩手虎口但無脉紋而見五色

右研麝香細末以同蘇合香丸薄荷湯下

一方

右用熟艾紙上烘熱以帕子包熨臍腹中作兩包輪易如大便青瀉宜服錢氏益黃散

蚯蚓丸　治小兒本臟冷一名黃土散

右用淡豉蚯蚓中土蚯蚓糞用醋搗和丸如彈子大摩兒頂上及手足心并臍上下當七次啼自止卽效之

○心腹痛啼

夫卒熱心腹刺痛啼叫悶絕死者蓋小兒氣血軟弱精神不定易傷風冷邪氣中客忤皆虛而得之其證面色五色眼睛不視似驚癇狀是也無問大小皆陰陽相摶衝和平神守內堅邪不干正無諸暴疾也或腸胃於冷泰急卒邪所所邪氣分爭攻衝上下亦令心腹刺痛而啼也

方

蘇合香丸　治小兒心腹刺痛啼叫不止或中邪氣或衝客忤或驚氣入腹或夜啼腹痛面色不定宜服此丸辟邪氣瘦除痾霍亂

白朮　乳香　香附子　訶子　木香
檀香　華芷茄　丁香　犀角各　麝香半兩
蘇合香各半兩炒　乳香各　一　朱砂一兩　腦子半兩　安息香
人參各一
右為末同蘇合香安息香膏入煉蜜一處和為丸如雞頭大每服半分
作七服人參湯化下亂服

大神散　治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢皆冷曲腰而啼或大便
也瀉青白糞及不吮乳及治因自熱服涼藥既表解後身發熱者蓋氣不
歸原而陽浮於外故身熱非熱證也當用此藥加枝米煎和其胃氣歸
內易簡方
人參　山藥炒　白朮各半兩　甘草二錢　白茯苓
白扁豆一兩炒
右為末每服一錢薑二片棗一枚煎或一方用當歸白芍藥人參各二
錢半甘草桔梗陳皮各一錢為散每服二錢水煎時時與服○前方
治胃冷加附子治風加天麻治痢加罌粟殼

參香丸　治小兒心腹痛并腸冷便青腹急心痛
乳香　木香　石菖蒲　人參　良薑炒各等分
右為末酒糊丸如小豆大一歲五丸米湯下

遇仙丸　治小兒心腹刺痛驚身啼哭腸冷便青
桂心去皮　乳香　蓬莪朮一兩炮
右為末面糊為丸如小豆大一歲二丸釣藤湯下飢服

蘇乳丸　治冷熱腹痛夜啼面青手冷
大蒜一顆慢火煨香熟取出細切研　乳香研各五分
右研勻丸如芥子大每服七粒乳食前服以乳汁送下

治小兒腹痛夜啼
牛黃三錢大　用乳汁化服又將下書田字差

木香丸　治小兒腹中卒痛啼呼悶絕
半夏　一
右為末用酒糊丸如黍米大一月及百日兒每服二丸用薄荷湯
下半年至一歲兒每服五丸一日三五服

乳食作痛啼 附論

夫乳食作痛啼者因兒飲乳乳母不戒傷動脾胃脾胃氣弱不能消化
奶乳停留或有痰飲故成陣作痛兒啼也○楊氏曰腹痛多因乳
母食啖生冷觸冒風寒令乳母冷入兒腹中過夜半陰氣又盛或夾
蟲痛令兒腹痛作痛或胎中受寒亦令腹痛多啼其證大便青白或瀉
面白

方

治腹痛
用四君子湯加丁香白薑每服木香勻氣散五積散

又方
以紫霜丸快熱以寬氣飲快膈散

小兒不喫乳 附論

凡小兒初生看產人見兒口中有血以手指拭兒口無令惡血得入兒喉兒
咽和喉有疾痛者蓋拭不及則惡血穢液兒咽入腹令心腹
痛悶兒不喫乳也

方

朱砂丸　治小兒三歲已下胃口閉不喫乳
朱砂研一分　丁香一分　麝香一分研　人參去蘆半兩　犀角屑半兩
藿香研　五靈脂半兩　牛黃研一分
甘草炙微赤剉
右搗羅為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如黍米大每服以熟水
下三丸日四五服

龍膽散　治小兒壯熱腹脹不欲乳
龍膽去蘆頭　犀角屑一分　川升麻半兩　鉤藤一分　川大黃剉炒一分
甘草炙微赤剉　鱉甲塗醋炙令黃去裙襴
右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫分減漸漸
與服之

摩頂膏 治小兒驚癇體問吐不得

羊髓三兩 當歸焙三分 細辛一分 白芷一分 木通二分

野猪脂三兩

右搗碎先下髓於鐺中入猪脂以慢火煎候白芷色黄紫成以綿濾去

滓於瓷合內盛每用少許塗頂門上摩之兼以少許入鼻內立效

人參丸 治小兒腹脹不食乳

人參去蘆 [illegible] 龍膽 [illegible] 甘草 [illegible]

枳實 [illegible]

右件藥為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以乳汁研一丸灌口中日

四五服差

乳香散 治小兒腹痛不肯喫乳

赤茯苓一分 甘草 [illegible] 當歸 [illegible]

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每用一丸研破著奶頭上令兒

吮或研塗口中亦得

朱砂散 治小兒不喫乳眼目不開手足常拽此是驚風

朱砂一分 龍齒一分 消石一分

右細研為散每服以薄荷湯調下一字如[illegible]量兒大小每服半錢

至寶散 治初生兒不飲乳吐不止

[illegible]

右以[illegible]

青黛[illegible] 治小兒[illegible]

白[illegible]

右為細末[illegible]

真珠丸 治小兒失乳以食飼之未有食[illegible]

[illegible]色[illegible]常

橘皮[illegible] 大黃[illegible] 半夏[illegible]

青皮[illegible] 人參[illegible]

右[illegible]

普濟方卷之三百三十三 畢

普濟方卷之三百三十四目錄

嬰孩五臟門

論 方 類

總論

心臟 論 方 八物定志丸 瀉心湯

肝臟 論 方 瀉青丸

脾臟 論 方 益黃散 瀉黃散 溫脾散 張煥益脾散

肺臟 論 方 阿膠散 百部丸 瀉白散

腎臟 論 方 地黃丸 白茯散 甘豆湯 瀉腎丸

治小兒外腎腫硬

普濟方卷之三百三十四目錄 畢

普濟方卷之三百三十四

嬰孩五臟門

總論

錢氏論云：五臟所主，心主驚，實則叫哭發熱，飲水而搐；虛則困臥悸動不安。○肝主風，實則目直大叫，呵欠項急頓悶；虛則咬牙多欠。氣熱則外生氣，溫則內生氣。○脾主困，實則困睡身熱飲水；虛則吐瀉生風。○肺主喘，實則悶亂喘促，有飲水者，有不飲水者；虛則哽氣長出氣。○腎主虛，無實也，惟瘡疹入腎則黑陷。○更當別虛實證，假如肺病又見肝證，咬牙多呵欠者易治，肝虛不能勝肺故也。若目直大叫哭，項急頓悶者難治，蓋肺久病則虛冷，肝強實而反勝肺也。視病之新久虛實，虛則補母，實則瀉子也。○肝臟病見秋，木旺肝強勝肺也，宜補肺瀉肝。輕者肝病退，重者唇白而死。○肺病見春，金旺肺勝肝，當瀉肺。輕者肺病退，重者目淡青，必發驚，更有赤者當搐，為肝怯，當目淡青也。○心病見冬，火旺心強勝腎，當補腎治心。輕者心病退，重者下竄不語，腎怯虛也。○腎病見夏，水勝火，腎勝心也，當治腎。輕者腎病退，重者悸動當搐也。○脾病見四旁，皆仿此治之。順者易治，逆者難治。脾怯當面目赤黃，五臟相反，隨證治之。○胃怯汗上至頂，下至臍，此胃虛，當補脾，益黃散主之。○胃中小兒胸骨血脈未成，多哭者至小所有也。○胃氣虛，面晄白色瘦弱，腹痛不思乳食，當補脾，益黃散主之；下利者，調中丸主之。

[illegible]

肝風驚風[illegible]難治[illegible]即安。細視證候，若上色青黃者方可救。心黑色只[illegible]日死。腎絕[illegible]不能[illegible]若或中風邪，腹滿，通身色[illegible]。

[illegible]人[illegible]可治[illegible]手足冷，宜[illegible]三五日[illegible]能色困[illegible]黃發。

[illegible]難[illegible]而黑，腎之風，兩[illegible]病[illegible]攻[illegible]。

[illegible]有內[illegible]脈絕，五[illegible]不用[illegible]外[illegible]主臟，是和。

[illegible]自然[illegible]瀉為[illegible]有[illegible]方命[illegible]三五壯，始知妙訣在人間。

[illegible]

○心臟 附論

心熱者，視其睡，口中氣溫，或合面睡，及上竄咬牙，皆心熱也，導赤散主之。心氣實則氣上下行澀，合臥則氣不得通，故喜仰臥，則氣得上下通也，瀉心湯主之。心有[illegible]則不安，而伏地睡則[illegible]也，瀉主之。虛則驚悸不安，心胸有熱，或赤澀，氣血不通，故驚骨石散，紅龍散主之。心不足，驚悸恍惚，不寧，面無顏色，用寧心膏安神。[illegible]心熱，中[illegible]散，瀉心散主之。

方

寧心膏　鎮心化痰，除驚熱，去痰壅。

人參　南星 炮　天麻　遠志 去心
朱砂　白附子　僵蠶 炒　硼砂 一錢　茯神

右為末，煉蜜丸，朱砂為衣，每服一丸，麥門冬去心煎湯嚼下。

大寧志丸　補心氣，安精神。

遠志 去心　麥門冬 去心　菖蒲　茯神　茯苓
牛黃 一錢　白术 一分　人參

右為末，煉蜜丸，每一兩作二十丸，以朱砂為衣，每服一丸，人參湯化下，食後。

瀉心湯　瀉丁

右用黃連一兩，去鬚，為細末，每服一字至半錢一錢，臨臥溫水調下。海藏云：易老單瀉心湯，加減去出於此，乃實邪也，實則世甚子。

○肝臟 附論

肝主風，風者可欠，頓悶，口中氣熱，當發散，大青膏主之。若能食，飲水不止，當用大黃丸微下，餘不可下。○肝熱，手尋衣領，及亂捻物，瀉青丸

之壯熱飲食若渴者白散主之○若有風目連劄不搐得心熱則治肝

爲青丸治心導赤散主之○肝有熱目直視不搐得心熱則治肝熱青

丸治心導赤散主之○肝有風甚身反張强直不搐是肝受風也當補

腎○肝補腎地黃丸治肝瀉青丸主之○若病或新或久皆引肝風

動而上於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不任

故目連劄也若熱入於目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉視故目直也若

得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青丸治心導

赤散主之○肝有熱目亦多怒筋脈拘急肝風亦然或身熱者與瀉青

并當肝藥肝不足視不明兩眼拘攣面色青白多怒嗔地黃丸主之

方

瀉青丸 治小兒肝臟實熱手尋衣領亂捻物目直視不搐得心熱

則搐身反折強直目連劄或目內青或臟腑閉燥病時才止 驚風及虛症

宜服之 各等分

當歸 龍膽草 川芎 山梔子仁 川大黃 羌活 防風 各等分

右為末煉蜜丸雞頭大每服半丸至一丸煎竹葉湯同砂糖溫水化下

地黃丸 治小兒本氣虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其

顱顱開解面色㿠白又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜於下而縮身

也腎水陰也腎虛則畏明無精光者並宜服之

熟乾地黃 八錢 山茱萸 乾山藥 各四錢 澤瀉

牡丹皮 白茯苓 去皮各三錢

右為細末煉蜜和丸每兩作五十丸三歲已下每服一二丸至三丸

溫水空心化下

麝香青金丸 治小兒肝臟有風呵欠頓悶神昏不爽口中氣熱急

驚搐顛胃滿氣短並皆治之

天麻 半兩 白附子 三錢炮 蝎梢 去毒炒

青黛 二錢 烏蛇 酒浸去皮骨 麝香 別研

硇砂 別研 天竺黃 三味各[illegible]

右件為細末次入研者藥有硇砂研勻煉蜜為丸每一兩作四

十九丸每服一丸荊芥人參薄荷湯化下乳食空

○脾臟 附論

脾有餘脾胃有熱不思乳食或吐黃水或瀉黃沫如

蜜之狀宜瀉黃也胃食物不化實也云胃受熱五穀不能宜先以黃白

散行其積而後以五苓散脾虛熱并五苓散久黃白散各五苓散或以

以益黃散脾不足脾胃經冷不思乳食或吐青水或瀉白色食物不化

時復壯熱或渴或不渴其氏云小兒或因病乳冷氣入胃中氣弱

泄則胃氣不足故令噦也錢氏云瀉青白色不化脾胃冷王氏云宿食

不消脾胃冷也益黃散兩服嘗用治乳吐益黃散千金云脾虛腹脹

瀉痢瀉食物不化○脾胃有積不思乳食或吐酸水痛白醒酸食物不

化傷食并同或腹痛或下痢張渙實方云宿物不消是腸胃積實宜下

食積前黃散消積或食不知飢餓並能食而大便不化是府有積宜消積

汁香蔻丸瀉下後益黃散補并大甲丸脾胃有風不思乳食吐逆

食物不化大便難色瀉久不定定而復作時多困倦錢氏云身熱宜

脾散大便不秉先益黃散補脾次宣風散及治脾閒脈五益黃散并神

麝丹及益黃散又云吐瀉乳不化傷食下之後補云脾胃受濕則水穀

不分用瓜丸五苓散錢人曰五藏之病肝病之多也而脾無也高物

之發生皆由於土百病起因皆由脾之受傷飲食乃脾病之多

也○脾病當助其本味五藏相剋又護[illegible]之氣不和口中[illegible]

宜散主之食不消脾胃虛冷或不能消化當補脾益黃散主之并者脾[illegible]

微熱令舌絡緊[illegible]舌治之勿用冷藥及下之當少與瀉黃散[illegible]

服之亦可飲水者脾胃虛熱[illegible]令非也飲水者脾胃虛津液少也

又加面黃肌瘦五心煩熱[illegible]

舌者烏○延夜下收小兒因病不升降臟腑[illegible]

胃中通氣上益故多延[illegible]

調脾胃外降其逆則病可愈

方

鉛霜散 治小兒脾風多涎心胸壅悶不下乳食[illegible]

鉛霜 研 牛黃 研 半夏 湯洗 龍腦 研 白附子 炮

丹砂 研 天竺黃 研 犀角屑

細辛 黃芩 甘草各一分

右為散再同研勻每服一字用生薑蜜湯溫水調下更量兒大小以意加減不計時候

防風湯 治小兒脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食

防風 羚羊角 黃芩 人參 枳殼

甘草各半兩

右搗篩每服一錢水八分入生薑少許煎至五分去滓不計時候量兒大小分減服

降氣丸 治小兒胃氣上逆氣不升降涎液不收清

牛蒡子 蛇子人 甘草 川消 鬱金

枳殼 龍腦

右為末麵糊和為丸如麻子大用薄荷水化下二丸至三丸不計時候量兒大小加減服之

溫脾散 治小兒脾胃偏冷涎常流出在兩口角

半夏 人參 草蔻

乾薑 丁香一兩 甘草半兩

右為末每服二錢生薑三片煎服食前

溫脾丹 治小兒涎多涎出流於頤上此由脾冷涎多故也脾之液為涎脾氣冷不能收制其津液故令涎出流於頤下如當溫脾俗謂之攬斑涎蓋兒多有此方甚奇

半夏 丁香一兩 木香一兩 乾薑

青皮 白朮半兩

右為末糊丸如黍米大一歲十丸二歲二十丸大小加減米湯下

指方有陳皮半兩一方煉蜜和丸

金珠丹 治脾熱多涎

金箔 硃砂一兩 半夏 牛膽製南星一兩

白茯苓 石膏

右都拌勻再細研用生薑汁和丸如麻米大每服十粒人參湯下

乳後

肉蔻散 又名益脾散 治過脾熱胃虛口不能吮乳

藿香葉 山梔子仁 石膏 甘草 防風

右剉同蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞同煎至五分溫服清汁無時南方多以此水石為石膏以石膏為寒水石正與京師相反乃大誤也蓋石膏紋白堅硬有牆壁而寒水石則軟爛以手可碎外微青黑細紋方書中寒水石則火煅用之石膏則堅硬不可入火如白虎湯用石膏則能解肌熱破痰治頭痛若用寒水石則誤矣又有一等堅白全類石膏而方敲之亦皆成方者名方解石也何代石膏用之今人有不信此說者當忠嘉祐中於京師大樂肆中買石膏寒水石方解石三種又問諸醫和劑局諸醫皆合此說乃信服李忠順偏係生信錢方已為下論恐小兒尤不可從故便見於此

益黃散 治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦少力脾虛困起并疳虛溫中并治涎嗽頷下者名白朮散

陳皮一兩 丁香二錢 訶子炮去核 青皮去白 甘草炙各半兩

右為末三錢水一盞煎至三分去滓食前服大小加減服之海藏云此劑瀉肺熱

牛蒡丹 治脾熱多涎

牛蒡子一兩 鬱金 川朴硝 枳殼 皂子

右為細末用生薑汁打白麵糊和如黍米大每服十粒煎人參湯下大小加減

半夏丸 治小兒脾熱乳食不下涎膈多涎

半夏 皂莢子

右為末用生薑汁和丸如麻子大不計時候溫水下三丸隨兒大小以意加減服之

半夏丸

半夏 白礬

右為細末麵糊和丸如粟米大每服五七丸至十丸食後臨卧生薑湯下

桑白汁 治小兒脾熱乳食不下胸膈痞悶涎滯不收

用新桑根白皮不以多少細剉取自然汁塗於兒口內立効如無新

桑根白皮取乾桑根白皮一兩細剉用水一盞煎至半盞於溫處兒口內極效

又方 以白羊糞八許入水研取汁塗兒口中效

又方 取雞屎末以冷水更研令細以[illegible]飲之[illegible]一字

又方 取牛嚼草撥取汁以人與服之

龍金散 治口噤不開[illegible]驚啼並可進之

龍金 南星 白附子 大半夏[illegible]

右用生姜二十片皂角二寸水兩盞同煮同煎以乾為度去皂角及姜以四味焙乾同雄錢龍腦一錢以盞覆定每汁以荊芥[illegible]才內澄乾又澄以騰汁尽為度再用

鐵粉 甘草[illegible]

研以用為末每服一錢薄荷蜜湯調下

肺臟（附論）

[illegible]

肺有餘咳嗽氣急痰實喘滿瀉肺散[illegible]銀丸珍珠丸下[illegible]肺不足虛氣短喘息歉吐清涎日脫浮腫補肺散人參丸○肺虛復有冷痰者胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷瀉肺瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不胸滿肺寒手[illegible]面甘桔湯主之○肺虛熱唇深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散○肺臟怯唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛損故也○脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇白而澤者吉白如枯骨者死[illegible]

阿膠散 補肺 方

阿膠一兩半[illegible] 馬兜鈴[illegible]半兩 甘草[illegible] 鼠粘子二錢半[illegible]

杏仁[illegible]去[illegible] 糯米一兩

右為末每服一二錢水一盞煎至六分食後溫服錢氏藏云杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之補也當以意消息

百部丸 治小兒肺寒壅嗽微喘

百部 麻黃去節各三分 杏仁[illegible]

右末[illegible]丸芡子大溫水化下二三丸無時日三四丸此[illegible]方也仲陽加松子仁五十箇糖丸之含化大妙

瀉白散 瀉肺熱目黃口不吮乳喘嗽

桑白皮[illegible]

右為細末每服一二錢水一盞入粳米百粒同煎食後服易老加黃連○潔古云若肺熱傳骨蒸自汗用此以直瀉之梔子黃芩亦能瀉肺當以氣血分之

腎臟（附論）

[illegible]

[illegible]腎不足[illegible]重[illegible]服大[illegible]光[illegible]

[illegible]重顱縫開地黃丸主之○腎虛者兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顱即解面色晄白皆為腎虛[illegible]之最若瀉色惡多不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆由地黃丸主之○膀胱腎之腑[illegible]受三經之邪傳其[illegible]皆由心氣主之心經有熱熱入小腸或赤或白或[illegible]心經[illegible]腹或秘或赤或澀或尤凡小兒初生兩[illegible]子俱大名曰[illegible]遇者大名曰[illegible]由[illegible]氣所行傳受于中或[illegible]不藏腹腦之間兒亦受之所以生下使有此證外腎黑散傳之清心順之黑散者用黃連黃芩大黃甘草各等分[illegible]末搗膽汁同緊調傳之立效清心以牛角地黃膏與服若有熱大便艱秘宿夜安定

羚羊角丸 方 治小兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不能行宜

補益肝腎

虎脛骨（酒炙） 生乾地黃（焙） 酸棗仁（去皮炒）

羚羊角（鎊） 白茯苓（各 ） 桂（去皮）

防風（去叉） 當歸（切焙） 黃芪（剉各 ）

右為細末煉蜜和成劑每服一皂子大兒大者加之食前溫化下日三四服久服取效

地黃丸 治小兒肝腎虛兩脇拘脹多恐悲哭又治大病後不能作聲是腎怯不能上接於陽又治腎虛解顱

澤瀉 牡丹皮 白茯苓（各三錢） 熟乾地黃（八錢）

山茱萸 山藥（各四錢）

右為末煉蜜丸如小豆大三丸至七丸空心溫水下一方無牛膝

白及散 治小兒腎氣不成腦縫不足小兒年六歲顱合而不頭縫開者是也宜以此傅之

白及 柏仁 防風（去叉） 細辛（去葉各一兩）

右為末每服一錢以乳汁調塗於兒顱骨上每日一次用之

治腎虛有熱大小便不通

黑豆（一合） 甘草（二錢） 薑（七片）

右剉用新水煎服 治腹脹而實

瀉腎丸 右用錢氏地黃丸熟地黃改生地黃去山茱萸是也此治虛中寒邪除若右尺洪實以瀉腎湯瀉之 七味黃丸仲景八味丸去桂附者加五味子腎氣丸也益肺之源以生腎水爲

治腎縮 治小兒初生兩腎縮乃初生受寒氣之

硫黃 茱萸 大蒜

右同研塗其腹仍以蛇床子二味煎湯淋洗莖之蓋初生受其寒氣而然

治寒疝性腎虛不推腎囊寒小兒腎氣未就鈎虛而不容補但以地黃丸之厥冷者以生乾薑炙甘草煎湯調下洞泄者用專用木香白术生乾薑各一分炒桂炙甘草各半分剉細量大小作劑入陳米煎服

治小兒外腎腫硬成瘡腫硬 名四龍散

右乾蚯蚓為細末用唾調塗常避風冷濕地

治小兒外腎腫硬或瘡或風熱暴腫

用地龍糞生薄荷汁調塗之效

普濟方卷之四百三十四

考校教諭汪叉陳恪

刪正王性存

對方醫士

寫字人朱雄

嬰孩癖積脹滿門

諸癖　[illegible]　食癖　癖瘕
乳癖　痃氣　痃癖
積聚　[illegible]　宿食不消
腹脹　丁奚腹大　哺露
脾胃不和　[illegible]

諸癖結脹滿

[illegible]氣湯　生薑丸　中[illegible]甲丸
逐甲丸　大附[illegible]硇砂煎丸　鱉甲散
三稜散　鱉甲丸　馬通粟丸　大紫菀丸
消解散　雙和丸　[illegible]　二[illegible]丸
七聖丸　代赭丸　甘遂丸　大腹子湯
[illegible]子　[illegible]　牛黃[illegible]丸　[illegible]丸
七味[illegible]丸　[illegible]散
牽牛子丸　[illegible]飲子　枯[illegible]湯　[illegible]丸　[illegible]散
知母大黃丸　紫[illegible]丸　一白餅子　人參[illegible]散
治小兒癥癖百病　[illegible]丸　[illegible]丸　[illegible]散
目達散　治小兒腸方　[illegible]　木香[illegible]
[illegible]　[illegible]丸　大黃[illegible]　[illegible]丸
治小兒下[illegible]腹大且堅　又方　[illegible]散　治小兒[illegible]
大黃[illegible]　治小兒[illegible]散　[illegible]理中丸
[illegible]五色丸　消積丸　[illegible]丸　[illegible]丸
[illegible]丸　六神[illegible]　[illegible]丸　[illegible]
[illegible]丸　[illegible]
治小兒[illegible]

食癖

[illegible]丸　代赭丸　硇砂丸　[illegible]丸
大黃丸　[illegible]丸　治小兒食癖大腹[illegible]
又方二[illegible]　[illegible]丸　[illegible]丸

痃氣

[illegible]丸　鱉甲丸　鱉甲[illegible]丸　[illegible]丸
[illegible]丸　[illegible]丸　鱉甲[illegible]丸　[illegible]丸
防葵丸　[illegible]丸　[illegible]丸
治小兒[illegible]癖　[illegible]丸　大黃[illegible]丸　前胡丸
治十五已下[illegible]　[illegible]丸
知母丸　[illegible]子　取癖丸　鱉甲丸　小[illegible]
大黃丸　七味鱉甲丸　知[illegible]丸　[illegible]丸
治乙八歲[illegible]腹[illegible]　[illegible]散　[illegible]丸
防葵丸　[illegible]花丸　治小兒[illegible]癖[illegible]
[illegible]丸　[illegible]丸　知母丸
二敵　大戟餅子　治大人小兒[illegible]　治癖
又方　[illegible]大人小兒[illegible]　治小兒[illegible]
治小兒[illegible]　治小兒[illegible]癖　[illegible]
治小兒[illegible]癖　治小兒[illegible]　[illegible]　治小兒[illegible]
治小兒[illegible]癖　治小兒[illegible]

乳癖

人參丸　牽牛丸　[illegible]甲丸　水銀丸　[illegible]丸
木香丸　[illegible]丸　[illegible]散　[illegible]子　[illegible]丸
大黃丸　大黃丸　治[illegible]癖　二香散　水銀丸
[illegible]丸　[illegible]丸　[illegible]丸　治小兒[illegible]癖
三稜散　[illegible]丸　[illegible]散　[illegible]丸　三稜散
硃砂丸　[illegible]丸　[illegible]丸　[illegible]散　知聖散　[illegible]丸
[illegible]丸　[illegible]丸　[illegible]散　[illegible]丸　治小兒[illegible]癖

如神散　硫黃丸　又方　二丁丸　消癖丸
治小兒奶癖氣瘦　治小兒奶脾　治奶癖
蓬莪茂散　膩粉丸　治未滿月小兒奶癖　治小兒奶脾
治小兒奶癖　治小兒奶癖　青皮丸
治小兒奶脾　治小兒奶癖　聖散透肌散
香附散　治小兒食癖　治小兒乳癖　水銀丸

○痃氣

鱉甲丸　前三棱散　當歸枳殼丸　鱉甲大黃丸
大黃散　七味鱉甲丸　蓬莪茂散　治小兒痃氣
又方

○痞結

增骨丸　五參丸　消石丸　鶴骨丸　鱉甲足丸
[illegible]　直雄章果飲子　肉豆蔻散　柴胡散
大腹皮散　檳榔散　前胡散　大黃頭足丸
取小兒癖方　甘遂丸　甘遂散　紫蘇丸
甘遂湯　治小兒患腹中痞結　鵝子湯　治小兒痞癖
又方

○積聚

五積丸　消積散　消積丸　百當丸　磨積丸
蓬莪朮丸　蓬莪丹　調中檳榔丸　妙香丸
紫霜丸　保安丸　小丸子　真珠丹　木香丸
異香散　消食丸　曹青丸　七宣丸　青金丹
歡金丸　三出丸　滌熱丸　扣聖丸　萬靈丸
木香真珠丸　[illegible]　龍腦丹　紫金丹　消細散
雞林丸　[illegible]散　聖金餅子　太陽丹　三棱散
[illegible]紫[illegible]　[illegible]心丸　[illegible]丁　柴胡飲　北亭丸
白芷散　乳香丸　硃砂丸　下積丸　三稜丸

真珠丸　丹砂丸　真珠丸　麥門冬煎丸子
聖餅子　桃紅散　三聖丹　紫金丸　浮珠丸子
[illegible]刀丸　取積丸　五珍丸　蔥湯丸
化鐵丹　消積丸　三味消積丸　桂黃丸
追陰散　木香散　青黛三聖丸　靈砂丹
乘霜丹　治小兒脾積　蘇感丸　養胃知胃消積
治小兒積滴　[illegible]金湯　消積方丸　三棱丸　療積[illegible]丸
丁香脾積丸　三稜煎丸　紫湯丸　延胡索散
[illegible]氣丸　麻二丸　[illegible]　如聖餅子
檳皮丸　[illegible]丸　六味三棱丸
丁皮散　紅丸

○傷飽

積[illegible]散　前胡散　赤茯苓丸　大黃丸　半夏散
[illegible]湯方　飛[illegible]丸　木香散　[illegible]脾丸　治小兒食不知飽

○宿食不消

金治丸　胡黃連丸　牛黃鱉甲丸　代赭丸
丁香丸　九味當歸湯　真珠丸　快膈消食丸
三棱丹　消積丸　[illegible]角丸　平胃丸　調中[illegible]散
代赭丸　黃芩散　麝香[illegible]中丸　木香丸
七味進食丸　三棱散　香朴散　茯苓皮散
檳榔丸　人參丸　榆根丸　三棱散　千金丸
消積丸　人參湯　牛黃丸　青木香丸
進食丸　白朮丸　順氣丸　[illegible]　白芷丸
三味消滯丸　五靈脂丸　[illegible]心散　肉豆蔻散
鷄子湯　[illegible]丸　治小兒腹脹滿　[illegible]散　木香枳實丸
紫霜丸　陰陽湯　三棱煎丸　廣朮化癖丸　[illegible]薑末丸

○腹脹

鱉甲散 茯苓湯 調中丸 訶梨勒丸 調中丸
木香散 茯苓人參散 白术湯 肖亮丸 黄連散
丁香散 茯苓散 橘紅丸 煨肉散 芎莪丸
桂枝鱉甲湯 豆蔻散 訖寂丸 失肚丸 地黄散子
前胡散 治小兒腸內氣壅脹滿 人參湯 通氣散
胡椒丸 木香湯 丁香湯 消脹丸 褐丸子
檳榔散 枳殼散 枳殼丸 分氣丸 治小兒黄瘦腹脹
治小兒腹脹 又方三方 中見丸 治小兒腹肚脹滿
厚腸丸 蘇子湯 升陽益血湯 塌氣散
白术散 塌氣丸 調中益黄湯 二聖丸 溫胃丸

○丁奚腹大

十全丹 大鱉骨丸 人參丸 蘆薈丸 紫菀甲丸
史君子丸 八蹟丸 大麝香丹 十全丹 黄連丸
蘆薈丸 代赭丸 麝香丸 麝香丸 訶梨勒丸
大黄丸 芍藥丸 仙人重臺丸 芍藥丸 野鼠丸
勻氣丸 猪肝丸 勾藤散 無辜甘草丸 二聖丸
調氣丸 治患疳氣大腹瘦弱 又方 六物黄芩湯

○哺露

大黄丸 人參丸 調中檳榔丸 十全丹
五味子湯 雞骨丸 破積丸 芍藥丸 代赭丸
丹砂丸 鱉甲丸 鱉甲散 治小兒哺露大腹者

脾胃不和

七香丸 五香散 人參湯 益智仁湯 萬靈丹
前胡散 參香湯 白豆蔻散 益脾散 調中散
不換丹 集香散 丁香散 訶梨勒散
勻氣散 木香散 白术散 開胃丸 快散湯
六味人參湯 乾地黄丸 高良薑湯 阿膠散
六神湯 醒脾散 消食丸 人參丸 當歸丸
桂朴散 陳橘皮湯 知母湯 史君子丸 益黄散
人參膏 四君子湯 白术湯 橘皮湯 治小兒胃寒虛
治大小人不進乳食 寬胃和脾散 建脾丸
香橘丸 丁香麴藥丸 蘇化丹 四君子湯
長壽散 治小兒脾胃虛弱 助胃膏 觀音散
太玉柱丸 助胃膏 養胃散 丁香平胃丸
溫胃丸 豆蔻香連丸 治小兒胃寒
溫脾散 木香散 苦針丸 四君子丸 玉柱杖丸

○羸瘦

秦艽丸 訶梨勒散 丁香散 麝香丸 麥門冬丸
燒餅丸 甘草丸 治小兒羸瘦 治孩子瘦損

普濟方卷之一百四十九目錄

普濟方卷之三百九十九

嬰孩癖積脹滿門

總論

夫腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用紫霜丸白餅子
不喘者虛也不可下若誤下致脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛
肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛甚即目胞腮腫之也黃者屬脾也
治之用塌氣丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香橘皮豆蔻較
溫散藥治之何以然脾虛氣未出腹脹而不喘可以散藥治之使上下
分消其氣則愈也若虛氣已出附肺而行即脾胃內弱每生虛氣入于
四肢面目矣小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱
當識此勿誤也胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺
之氣上行於四肢若水狀腎氣浸浮於肺則大喘也此當服塌氣丸病
愈後面未紅者虛衰未復故也○治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未
出林以兵攻之必可獲寇若出林不可急攻攻必有失當以意漸收之
即順也○治虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便黃時微
喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而後結有積所治宜先
補脾後下之下後又補脾即愈也補肺恐生虛喘○腹中有癖不食但
飲乳是也當漸用白餅子下之○小兒病癖由乳食不消伏在腹中作
寒熱飲水或喘嗽與潮熱相類不早治必成疳以其有癖則令兒不
食致脾胃虛衰發熱引飲水過多則蕩滌腸胃亡失津液脾胃不能
傳化水穀其脈沉細益不食脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生鼻[illegible]而流
疳矣[illegible]
○食癖者其狀在右脇日復來衝心多痛時失也宜服進食
丸化之○乳癖者其形在心時或上下疼痛呼時作熱此不可取
宜用前乳丸○痞癖者其狀在右脇下生如杯子大狀令乳食不生
肌成癰疸或作寒熱肚大青筋之類宜服進食丸○酒癖者其狀或在
左右脇間致令[illegible]取之○驚癖者其狀在心頭不動[illegible]

此因小兒積成塊狀或成癖伏之於心此症消化磁石藥方可取之
大凡癖[illegible]二種遂成痛皮已且胡椒砂烏梅等藥難磨化不可
急取○治脹之狀[illegible]如熱之[illegible]
[illegible]為患[illegible]皆由食乘所傷[illegible]痞滯於脾內
不可[illegible]不飢宿食胃上不降而下不升或飲食過度致傷脾胃脾
胃氣[illegible]腹脹有虛實二證亦有半虛半實謹虛者腹脹不
喘或[illegible]實者[illegible]半虛半實者[illegible]泄瀉或腹脹
不喘小便如常皆半虛半實也○實者先益黃散次塌氣丸再
益黃散實者妙香丸子下次白朮散若心腹脹滿大便秘[illegible]送
下妙香丸子半虛半實者宜益黃散次妙香丸子下再宜益黃散若腹脹不喘
大便如常喘乳丸等乳丸漸消之有一等腹脹滿肚大青筋四肢瘦
湯謂之痞癖多見○[illegible]傷食得之痞塞腸[illegible]心腹損相[illegible]
食不吐逆惡心久不得治漸成痞結又曰食結○痃癖[illegible]傷血得
之腸胃攻痛引少腹時或攻上搶心[illegible]不消飢肉不生久而
不治漸成痃癖又曰血結○痞[illegible]傷氣得之心腹脹肚大腸
滿痛剌[illegible]在右曲而黃肌瘦便悲怠力乏而不治漸成痞塊又曰
氣塊○痞癖瘕疾得之大怒[illegible]脾之病便[illegible]或成積
兩[illegible]腹肚氣痛上築心胸[illegible]不治積結不散便結成塊
可散痞狀○以上四證皆作寒熱有如瘧狀一般遂由傷乃五臟惟痞
癖[illegible]男女幼在左脇[illegible]大同小異凡治寒熱先以
柴胡飲進一二服退其寒熱已消去三五日後方可與服當癖
丸取日日頻頻與服追癖盡之後只與三棱丸下盡積癖以消為度
痞氣脹痛性脾肉積脹氣積核小兒痞癖[illegible]皆由[illegible]積
[illegible]遂成痞疾其名數種皆斷所致不可更與通利方
[illegible]則宜和氣消痞調理若[illegible]有[illegible]積便白[illegible]以去之
丸[illegible]以至世[illegible]為快說世送氣如散不傷其氣功效至
良[illegible]癖積便利[illegible]度大有功效○治頸肚腹急此一證惟治在[illegible]胎中
無[illegible]初生七日內有[illegible]水[illegible]其作[illegible]久漸見如重
[illegible]

其色未變精神未亂者速便下藥以通為度才通便止宜服丸藥以麻
丸〇人縣生下男女各有一證男在三五七女在二四六日前為之附
數陰出之類遺青者或發作則正頭干亦令兒壯熱青筋等日不乳此
由客情文求欲發其邪令陽不順胃脘其正氣至不舒[illegible]定捕[illegible]
[illegible]
雖錫頭至要世各疳有加文根無定法[illegible]
以形時母河父命藥心待覺〇凡上腑脹中脘脹食胃臨張者腸與脘
上下相通共與脹軽重自別既受病久則積凋與作痛每則發結是知
腸胃之間脹滿脾胃臨有痛胸也有如停飲者滴食也通則氣利二
便皆由食滿宿為氣囙物停痞停積氣不順於三焦氣弱胸隨胃於五臟
所謂脾不磨食不化胃不受食無益所以致脹者於飲服之時不與消
則過致血滿又於血滿不為食斷其氣所攻中焦又於中痛不化即胃
上腸既在上腸為痛作劝痰涌邪為重背莫容易敢念食傷脹服服
三稜散九中焦痞脹服王氏所氣九上腸脅脹服大蒜連九〇揚氏曰
小兒乳哺失調三焦關隔以致水穀乳哺停滯腸胃不能宣行於氣結
聚初則成積久則血痕氣致時時作痛或為寒熱或生寒熱及虛實多
於中脘當稍黃水白久結癖寒熱不已初幼方日由脾胃虛弱乳食積
滯不能運化以致並腹痛療癖積而成癖湯氏曰食飲乳癖痞療癖痼
宜以甘遂丸苡蒁木三稜巴豆等取之推驚積當於取積藥中加江南
星半夏化痰之劑實者取而後調虛者不復取由脾冑脾散療積
則消積飲用巴豆以去巴或硇砂杏仁取積則米當丸神保丸五積
丸重者消積丸〇痞者塞也結者實也氣結於胸膈之間留飲取於
腹脇之內於是榮衛不得流行臟腑不得宣通由脹滿而至痞結使
然耳此虛實之證之時或發為吐然甘遂散主之〇源小兒痃癖結
係五臟不和三焦不調有寒冷之氣客之則令乳哺不消化結聚成疣
癖也其狀按之不動有形段者癥也推之浮沉者瘕也其弦急牢強或
在左或在右若癖也皆由冷氣痰水食飲結聚所成故云癥瘕癖結也
〇夫小兒寒溫失調飲食不化與臟氣相持結聚不動名為癥也其食
結在腹喜寒四肢羸瘦如瘧不能飲食常自隱隱而痛此則食癥也〇
小兒癥者在腹中痰痛發不痛定一處者癥也〇小兒結癥狀堅者為

不直乃味書哭[illegible]柱殖入裹胃了不知結實雖化散療胸
之間以衛榮[illegible]為痞漲[illegible]更加[illegible]或歸於下則泄瀉
痛[illegible]嘔吐[illegible]利或便或則飲食不化[illegible]痞〇凡
小兒上下有痃癖其有痛者積[illegible]有[illegible]在氣有抱心居氣痞氣
發[illegible]來在右腸下[illegible]逆是下[illegible]圓通利後以勻氣散服
之痛[illegible]已服[illegible]水末住便下[illegible]
[illegible]子[illegible]之[illegible]生下[illegible]市上[illegible]氣[illegible]
[illegible]水無時[illegible]胃
[illegible]調理二三日亦已通利[illegible]生下未週歲至兩歲一見[illegible]腹青紀
[illegible]中大[illegible]之導定光明[illegible]之伐[illegible]門[illegible]
未食水調[illegible]之[illegible]末是[illegible]木石白[illegible]土[illegible]
草青附三味為末[illegible]水調下

諸癖結脹滿

方

金露丸 治心腹脹滿[illegible]癖氣塊大如[illegible]及黃疸朝起嘔逆四
[illegible]上氣結血[illegible]膀胱兩脇脹[illegible]五淋
五痔背[illegible]麻[illegible]不遂眉毛脫落皮膚瘙癢如常[illegible]
[illegible]年月深遠行成勞病[illegible]又不能[illegible]
經閉祖[illegible]血脈不通[illegible]不思飲食

人參　官桂[illegible]　紫花木[illegible]　附子[illegible]　川烏[illegible]
厚朴[illegible]　大黃[illegible]　[illegible]牙皂角[illegible]　[illegible]
桔梗[illegible]　乾薑[illegible]　川椒[illegible]　柴胡[illegible]　吳茱萸[illegible]
白茯苓[illegible]

右為細末別研甜葶藶子半兩巴豆三分去皮心膜油續隨子半兩後
三味別研泥[illegible]同前藥一處麪糊為丸如麻子大[illegible]
[illegible]十歲[illegible]空心[illegible]下五丸如[illegible]

小補氣湯 治[illegible]

防風[illegible]　羌活[illegible]　[illegible]　[illegible]
升麻[illegible]　葛根[illegible]　[illegible]　黃耆[illegible]　人參[illegible]

當歸 [illegible] 陳皮 黃耆 [illegible] 甘草

右剉爲散，每服三錢，水煎去滓溫服。

牛黃丸 治小兒癖氣，百病羸瘦，肚大黃瘦，發熱不常，寒熱咳嗽

吐逆不足，心腹多痛，氣急驚風，天瘹等

牛黃　龍腦　木香　當歸

人參　川大黃　芫明　桔梗

鱉甲　[illegible]　巴豆　杏人

右爲末，同研令勻，煉蜜和丸，如菉豆大，小兒百日已下乳汁化下一丸，

二三歲空心粥飲下二丸，腑臟有病吐出，臟腑有病即瀉出

病驗後以漿水一盞，其病自當五日至十日吐瀉一服，取藥滯結出

量兒大小加減服之

牛黃鱉甲丸 治少小癖實壯熱，食不消化，中惡作氣

牛黃　厚朴　茯苓　桂心　芍藥

乾薑　[illegible]　[illegible]　柴胡　[illegible]

枳實　芎藭

右爲末，煉蜜丸如小豆大，日三服，以意量之，一方有麥門冬

鱉甲丸 治小兒癖癖

鱉甲　[illegible]　丹砂　桂　大黃

當歸　[illegible]　代赭　巴豆

枳殼　牛黃　麝香

右爲末，煉蜜和丸，如麻子大，三四歲每服二丸至三丸，空心新汲

水下，更隨兒大小加減

鱉甲丸 治小兒癖氣羸弱不能乳食

鱉甲　京三棱　川大黃　檳榔

郁李仁　木香　青橘皮

肉桂　柴胡　人參　桔梗　防風

右爲末，煉蜜和丸，如菉豆大，五六歲兒空心以熟水下七丸，晚後再服

更隨兒大小以意加減

木香硇砂煎丸 治癥瘕癖積聚，嘔噦刺疼

木香　大黃　京三棱　巴豆

官桂　[illegible]　青橘皮　蓬莪茂　附子

乾薑　香墨　硇砂

右將大黃、木香、三棱末、巴豆等三味，同於銀石器內，以好醋一升煎

一兩沸，次入硇砂同熬，次入香墨，次入諸藥末和勻，再入臼杵千下

丸如菉豆大，每服五丸，溫生薑湯下，食後，腹內氣悶痛，用乾

薑湯或橘皮湯下，爽食傷冷，白湯下，亦可，食不消，氣悶

老人[illegible]下，食後[illegible]

[illegible]

鱉甲散 治小兒癖癖壯熱，頭痛，嘔逆，腹痛，寒熱，頭髮作穗，不食

痛氣

鱉甲　枳殼　木香　川大黃

京三棱　檳榔　人參　赤茯苓　柴胡

桂心

右爲麤散，每服以水一小盞，煎至五分，去滓溫服，日三服，量兒

大小加減

聖效丹 治癖結諸病久不差

當歸　木香　朱砂　桂心　甘遂

京三棱　鱉甲　巴豆　麝香

薏苡仁

右同研細，用蒸餅為丸，如黍米大，每服

歲小兒一粒，二三歲二粒，四五歲三粒，六七歲五粒，十歲已上七粒，溫

米飲下，乳食後，量兒大小加減

京三棱散 治小兒癖氣食癖

京三棱　鱉甲　枳殼　大腹子　陳麴

杏葉　蓬莪茂　厚朴　訶梨勒皮

青橘皮

右為散，六七歲兒每服半錢，空腹米飲調下，日三，更量兒大小加減

鱉甲丸 治少小腹中結堅脇下有癖，手足煩熱

鼈甲 芍藥 大黄 茯苓 柴胡
乾薑 桂心 鹿茸 檳榔
右為末蜜和服如梧子大七丸漸漸加之以知為度
馬通粟丸 治少小腹下有氣内痛喘逆氣息難往來寒熱羸瘦
不食
馬通中粟 杏仁 紫菀 細辛 五味子
石膏 秦艽 半夏 茯苓
右為末蜜丸如小豆大每服十丸日三不知加至二十丸
大黄建丸 治小兒飲食過度脾胃上下氣不宣通腹滿迷悶
情思少樂大腑作泄強食不化作渴煩躁坐卧不佳肢體倦怠腹脇
疼痛
蓬莪朮 荊三稜 乾薑炮 青皮 陳皮
木香 丁香 縮小紅棗
巴豆
右為末醋糊為丸麻子大每服七丸至十丸大者加服生薑棗子湯
下○議曰癖之為病[illegible]飲食生冷結痼積氣不化者在脇間
脾胃乃總名上口曰三焦下口曰三脘上下相去相從虛處所交結
氣所聚故痰乃因久不能化成吉成由此痰涎痞結積之所
由生痞痰吐瀉積之所由作今用此方剪除腸胃正氣溫中消
痞塞積能止吐瀉進美飲食
代赭丸 治小兒腹中結癖塊痛
代赭石 川大黄 木香 五靈脂 朱砂
鼈甲 桃仁 辣桂 巴豆
右為細末糊丸如麻子大風藥湯服五丸薑湯下
過脾散 治小兒脾癖
石膏 白丁香 定粉 人參
訶子 輕粉 硇砂 雄黄
右為極細末每服一錢薑小兒大小加減大者二日一服小者三日
一服早辰米湯調服食乳小兒女氏男汁可三歲服一字
五歲服一錢

麥蘗丸 治小兒吐熱頭痛食飯不消腹中長硬或小腹攻痛大
小便不通[illegible]其疾[illegible]過度不知止[illegible]失調或
[illegible]不化[illegible]不[illegible]
[illegible]
巴豆
朱砂 牡蠣 甘草 甘遂
右以[illegible]研[illegible]去油[illegible]甘遂牡蠣
[illegible]研[illegible]熟乃[illegible]一[illegible]二千[illegible]不[illegible]入少[illegible]
[illegible]如麻子[illegible]一[illegible]二[illegible]如半麻子大一[illegible]三四
歲漏服如麻子二丸五六歲者服如大麻子二丸七歲八歲服如小
豆二丸九歲十歲大如小豆二丸[illegible]服至日出時不下
[illegible]散[illegible]下[illegible]也下[illegible]者[illegible]以治[illegible]止
芍藥湯 治小兒胎中宿熱乳母飲食恐惡苦乳汁不調兒乳
[illegible]不為肌膚心[illegible]痛[illegible]瘦瘠四肢痿弱[illegible]之可令充悅
[illegible]
疏兒子 治小兒陰流不知饑飽[illegible]乳食不消心腹[illegible]
忽或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食成乳癖痰痞結積聚時[illegible]或
[illegible]不思乳食及療五種疳氣入腹[illegible]疾肌肉消瘦[illegible]腹大
神色昏慢情意不樂[illegible]和臟腑去痛積止瀉進乳食
生肌肉悅顏色
蓬莪朮 青皮 木香 京三稜 蒔蘿子 陳皮 巴豆
[illegible]
右為細末麵糊為丸麻子大每服三五十丸煎蒔蘿湯下一方加胡
黄連半兩苦楝子半兩蒔蘿子只使一兩○議曰陰陽不明當之過也
元氣不足上之[illegible]去其病禁當慎能消者權衡以定標本尋常
[illegible]金之道凡小兒臟腑有疳證積候乃五臟所傳久至變作
也先失流遠而不反所以作疾此方克腸下氣散結去癖消積
已作未作[illegible]逆傳並宜且服○兒痞癖之形同根異名作疾有塊
背在左脇者其一同然痞者[illegible]癖者陰盛小兒脾胃不和陰陽二

氣交增於熱相剋皆由積之所致故壯熱復熱一如其症汗出則息
者先下部必積熱然性不去後當加重而又作腫當責於前所服丸有
是疾為者不可輕易投之治之其石丸毒所胃三焦作滿引飲水
停在脾胃為此證亦作浮腫重則喘為腫益脹傳息不安故之為
藥豈可妄投宜先以服藥後飲加湯使如是服起三五日了
湯是三稜丸療此積毒以利為度去其根本若未通更服已上忌生
硬冷物○宜服方加檳榔五靈脂各一兩春紫霜丸治癖脹
三稜煎丸　治嬰孩小兒食傷生冷粘膩熱毒等物脾胃積滯久不
消化與乳壯熱合腸癖發熱及痰瘕中脘不和膨脹上喘氣壅心
腹不得宣通所以作疾此藥並療但是諸積滯食不化

荊三稜　蓬莪朮　芫花　淡豆豉
鱉甲　巴豆　川當歸　杏仁

右前六味一處以米醋一碗煮乾焙炒細研更細截焙為末次入
當歸末又入杏仁巴豆和勻水煮麵糊為丸麻子大每服二十丸
生薑湯下大小加減服之○此方亦名消痞丸又名化積丸其藥破
氣行血和脾胃匱腹諸積氣淨並皆療之大胃者乃致
食之職積也然欲食有利氣消血脈勻肌精神肉所
以則精胃枝後面目黃瘁病作是以藥用腸胃氣和則穀
食自然留之脾胃壯即飲食自之君飲食運化則氣弱致食不
化和氣瀉小兒服之和飲三焦胸膈功能

紅丸子　治血積包水癖傍時作痛狀熱中脘
當黃水日久結癖亦効

三稜　莪朮　芫花　桃仁　杏仁
朱砂　烏梅　巴豆

右為末醋糊丸小菉豆大米飲為末朱為空腹下

七聖丸　治消積滯調脾胃及治小兒食不化成痞積不消欲癖又
而作疼宜服

三稜　莪朮　川楝　陳皮　青皮
芫花

右以芫花醋浸一夕炒漸乾入三稜莪朮同炒又入川楝陳皮青皮
同炒候乾取為末每分加杏仁少用米兩去皮尖別研巴豆二
十粒去油膜同和醋糊丸如菉豆大一歲二丸臨睡米飲下此二方稍
相似不若方中和桃仁烏梅則丸又可採而下滿此丸化痰涎
一日一服或兩服日用如此間隔水亦可日服合之一夜而化
不然脹疾一方可去巴豆則入杏仁

代赭丸　治少小及大人腹中宿食積成痰癖兩脇脹滿氣急喘
急不能食面黃日漸瘦悴大便

代赭　朱砂　大黃　青木香
當歸　桂心　巴豆
麝香

右為細末和丸如梧子大小兒量之十歲兒如大豆許二丸六歲
者小豆許二丸以下臨時斟酌量瀉癖出為度以米日一丸以溏泄
而已不在禁忌如常法一方去桂心用杏仁

遂丸　治小兒痰癖腸下堅硬如石四肢黃瘦不欲乳食

甘遂　杏仁　雄黃　朱砂
石膏　麝香　巴豆

右為末巴豆研令勻煉蜜和丸如黍米大每服以粥飲下一丸日
二服量兒大小加減服之

大腹子湯　治痃癖腹脹小便不利

大腹皮　木通　枳殼　赤茯苓
知母　甘草　人參

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服量兒大小加減

七味進食丸　治不消心腹脹滿壯熱喘麤嘔吐痰逆腸鳴泄
瀉米穀不化或下痢赤白腹痛後重及食瘕乳癖痃癖結塊皆治又
久有百積不消或為此熱或夜消進飲食不思食痢癖結
之疾常用之不可

代赭石　當歸　硃砂　枳殼　木香
麝香　巴豆霜

右為末入研藥勻糊丸如麻子大每一歲兒服一丸溫米飲下更

量重增加減服之食後

白小香散　治小兒大人癖積

丁香　蓬莪朮　訶子皮

蝎梢　木香

右爲細末每服一錢用乳汁調服女用男乳令男用女乳食遠服

一方　日三服　大人不拘　空心服

十香丸　治小兒停乳食不消心腹痛

牛黃　木香　杏仁

黃芩　巴豆

右爲末蒸餅一歲兒服如麻子二丸但隨兒大小加減服

滿應丸　治小兒宿滯積氣不消胸膈痞悶腹脹肚脇結痛

病

檳榔　陳橘皮　青橘皮　木香

黃連　蓬莪朮　雄黃

右爲末每用　七八巴豆一粒去皮心膜研爛蒸杏仁一枚

去皮尖　研　前藥末同二味合研同和用麵糊和丸如

粟米大每服二丸食後生薑湯下量兒大小加減

消乳丸　治小兒水癖按之作聲及潮熱　下　手足

牽牛子炒　枳殼　葶藶炒　甘遂炒

桂　牡丹皮　大黃

右爲末煉蜜和丸如綠豆大每服五丸空腹溫湯下量兒大小加減

雙參散

人參　黃連　枇杷葉　乾葛

玄參　麥門冬　甘草

右爲等分爲末每服一錢水一盞煎兩三沸去滓放冷

桔梗枳殼湯　治熱痰涎咽喉痛

枳殼　黃連　半夏　黃芩　杏仁

右剉散每服一錢水一盞生薑煎去滓服

蘆薈丸　治小兒脾癖

木香　胡黃連　丁香　蘆薈

使君子　訶子

右爲細末煉蜜爲丸如黃豆大每服二十丸空心白湯下日二服

量小兒大小加減

治小兒疳疾癖痞腹脹

鱉甲

郁李仁

右除郁李仁每貼以水一盞生薑煎去滓

如聖大黃丸　治小兒疳疾癖痞瘦黃瘦

川大黃　知母

當歸　鱉甲　枳殼

右爲末煉蜜和丸如黍米大每服空心下五丸

後量兒大小以意加減

紫霜丸　治小兒癖氣腹下積中有積聚堅痛

甘皮　杏仁

右爲末麵糊丸如小豆二丸日三大便不利加大黃

白餅子　治小兒腹中有癖吐及乳食

滑石　半夏　天南星

巴豆

右研勻巴豆入以糯米飯爲丸小菉豆大子三歲以上

三五餅子以下一二餅子臨臥服之

人參羌活散　治小兒傷寒

壯熱坐臥不得

白朮　桔梗　甘草　人參　麥門冬

右等分爲末每服一大錢水一盞生薑煎至半

治小兒驚風

多痰及驚風天病

朱砂[illegible]　杏仁[illegible]　巴豆[illegible]　鱉甲[illegible]

右為末入巴豆杏仁研令勻，煉蜜和丸如黍米大，百日兒乳汁下一丸，三歲兒薄荷湯下三丸，以兒大小加減服之。

[illegible]丸　治小兒乳不消，心腹脹滿，身體壯熱，不欲哺乳。

[illegible]　黃芩[illegible]　大黃　杏仁[illegible]

右為末，蜜和丸如[illegible]，一歲已下不服，如粟米一丸，服稍加，以意消息服之，與乳哺相[illegible]。

真珠丸　治小兒乳哺結實，腹脹[illegible]不能飲食。

真珠[illegible]　麥門冬[illegible]　杏仁[illegible]　巴豆[illegible]

右為末，蜜丸如小豆大，百日兒服麻子二丸，[illegible]汁下，[illegible]下[illegible]，以知為度，[illegible]白[illegible]下[illegible]，兒肥白無病已試[illegible]。

葶藶散　治肺[illegible]喘[illegible]，兩脇[illegible]下作[illegible]，[illegible]渴[illegible]不[illegible]，[illegible]若不急治，死在朝夕。

川大黃　白牽牛　黑牽牛[illegible]

右為細末，三歲兒服二錢，[illegible]水[illegible]下，[illegible]多[illegible]減[illegible]

比治散　治[illegible]結[illegible]，[illegible]

治小兒脾方

牛黃[illegible]　[illegible]

右為末，[illegible]大小[illegible]之小兒口中，[illegible]度。

[illegible]

右除甘之末，外[illegible]以水二大盞煎五五分，去滓，下[illegible]，兒一二百日兒[illegible]一日與服之盡，半合二五歲兒一日服盡一合四五歲兒一日服盡二合，如利多即少服，若兒虛實[illegible]之，如是利不止[illegible]亦主[illegible]。

木[illegible]膏

[illegible]

木[illegible]

右[illegible]入[illegible]少許[illegible]

千金散　治小兒一切[illegible]

[illegible]大黃[illegible]

右為末[illegible]，細工硫黃[illegible]，一歲兒服半錢，一二歲者服一錢，十歲已下服二錢，十六七者五錢，一服[illegible]，[illegible]不[illegible]二十日[illegible]一服，更不[illegible]，如已[illegible]生冷[illegible]，[illegible]羊[illegible]肉[illegible]可食[illegible]，至[illegible]切要忌口，如不忌口，[illegible]

[illegible]

[illegible]

右同於[illegible]上[illegible]，每服一二[illegible]，[illegible]調下，不[illegible]時。

胡椒[illegible]　[illegible]

右為末[illegible]丸[illegible]粟米大，每服五七丸至一二十丸，[illegible]下，無時。

一方有木香一錢。又一方胡椒[illegible]各四十九箇。

[illegible]　治小兒大人[illegible]

大黃　朴硝[illegible]

右為細末，同[illegible]泥和成膏，[illegible]

[illegible]　治小兒一切[illegible]，[illegible]不[illegible]，[illegible]不能消化，致五臟不和，三焦壅滯，結[illegible]，[illegible]生[illegible]

[illegible]

[illegible]，不能飲食，[illegible]宜服之。

[illegible]

右先將[illegible]為細末，却入巴豆[illegible]研令勻，用[illegible]丸，[illegible]小菉豆大。小兒三歲已前，每服三丸，五更[illegible]不[illegible]下，更[illegible]加減與。

治小兒下痢頭大豆[illegible]

右以[illegible]一升，水三升，煮取一升，分三服。

又方

右以[illegible]中白[illegible]，亦治[illegible]。

鵓鴿散 治小兒心腹脹滿[illegible]死

右以鵓[illegible]子[illegible]為末滴[illegible]下二歲半錢

治小兒氣促止[illegible]

右用蓮藕[illegible]不以多少[illegible]末[illegible]大一錢[illegible]下

大黃煎 治小兒無辜[illegible]黃[illegible]下[illegible]諸狀

[illegible]音

右用大黃九兩錦紋新實者[illegible]不中用削去[illegible]乃焙搗篩為散以上好米醋三升和之置銀[illegible]中於大[illegible]中[illegible]上[illegible]火煎之人不用[illegible]又以竹木[illegible]藥[illegible]丸[illegible]於小兒[illegible]中[illegible]三服一服七丸如梧桐子大日再服[illegible]以下青赤[illegible]為度若不下[illegible]或下[illegible]少者稍[illegible]加丸[illegible]下[illegible]若多[illegible]又[illegible]或[illegible]重者[illegible]至七[illegible]小兒以意量之[illegible]下[illegible]

呼[illegible]法

小兒[illegible]

用黃[illegible]汁[illegible]粥與食

[illegible]胎[illegible]飲[illegible]水[illegible]或加服[illegible]不可

右用四君子湯加[illegible]去[illegible]大熱[illegible]化下為加瓜蔞[illegible]下利加[illegible]各等分

治小兒一切所傷[illegible]不利乳食不消[illegible]

生[illegible]積[illegible]片[illegible]之[illegible]痛[illegible]治一切[illegible]風[illegible]疾[illegible]服之

青丸子 青黛 天南星 巴豆霜

紅丸子 朱砂 半夏 巴豆霜

白丸子 白附子 寒水石 巴豆霜

黑丸子 五靈脂 全蝎 巴豆霜

黃丸子 大黃 [illegible] 巴豆[illegible]

右件前五味各[illegible]為細末入巴豆[illegible]同研[illegible]水麵糊為丸如粟米大每一歲服五丸乳汁送下二三歲[illegible]至十五丸五六歲如綠豆大每服十五丸至二十丸溫生薑湯送下食後臨卧日進二服[illegible]

消積[illegible] 治小兒一切所傷面黃肌瘦腹脹[illegible]飲食不生肌[illegible]作痛下痢[illegible]宜服之[illegible]消化[illegible]乳食

縮砂仁 青皮 陳皮 廣茂 [illegible]三稜

巴豆

右為細末[illegible]糊為丸如黃米大每服二三十丸[illegible]送下日進二服量兒大小加減服之

[illegible]丸 治小兒[illegible]腹脹大[illegible]及治大人[illegible]

[illegible]服之神效

[illegible]

右用無[illegible]一箇約重三四兩去其頂[illegible]去心[illegible]上用文武火[illegible]上[illegible]黃[illegible]三十箇[illegible]一大碗[illegible]生[illegible]和丸如黃米大每服三十丸加至四五十丸溫米飲湯送下空心臨卧日進二服如男子婦人服之丸如梧桐子大每服三四十丸生薑湯送下[illegible]一切生硬之物

東垣分消丸

黃連 枳實 厚朴 生薑

猪苓 橘皮 白朮 甘草 砂仁

澤瀉 茯苓 半夏 黃芩

右為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服三五十丸溫水送下食前

消痞丸

黃連 枳實 黃芩 甘草 人參

右件細末…為丸如…大每服二三十丸…

與神丸 治小兒久患脾疳面黃肚大…

不可服之…

蘆薈二錢 大…

肉豆蔻…

右除荊三稜外細末用…一箇去肚腸…荊三稜在肚內

縫合煮熟…

為細末…為丸…每服三五十丸溫米飲…或熟白湯

下…食前日進二服…

磨積丸 治小兒…疳瘦…

消…

荊三稜…

杏仁…

右為細末…為丸如…大每服三四十丸至五六十丸

丸…下食後服…日進二服…

化癖丸 治小兒…

因消導不運氣食…

宜服…

荊三稜 石三稜 雞爪三稜 木香

茯苓 枳殼 青皮

檳榔 草撥 硇砂 陳皮

巴豆 大…

右件…大黃末外為細末用米醋二升八大黃末同熬成膏子…

丸如…大每服二十丸加至三四十丸…

可量兒大小…加丸數空心臨臥日進二服

草果湯 治…

黃瓜葉…

研取汁…

雞屎…丸 治…

黃連… 青黛…

右為…丸…

治小兒腹脹…如神

枯…

右為細末…

治小兒…

取土瓜根…搗絞汁服當吐不以少進之…也

食癥

夫小兒…食不化…

食…在…

木香丸方

木香丸 治小兒食癥…

木香 … 荊三稜…

代赭丸 治小兒食癥…

代赭 巴豆…

右為末…研令勻…和丸…

五靈脂 桂心 丁香

硇砂丸…

右為末…

硇砂 青礞石…

荊三稜… 赤石脂

水銀… 巴豆…

右為末入巴豆…每服三丸…小兒一歲…

丸以…

硝石丸 治小兒食癥成寒熱，四肢黃瘦，不欲飲食

硝石 乾漆 杏仁 巴豆

硇砂

已上五味研令細，以米醋一升熬如膏，次以

荊三稜 蓬莪茂

右為末，以所煎膏和丸如菉豆大，三歲兒每服以茶清下一丸，兒稍

大以意加之。更治癖氣積時作吐利

方癖丸 治小兒食癥寒熱，羸瘦不能飲食

防葵 荊三稜 鬱李仁 木香

枳殼 川大黃 鱉甲

右為末，煉蜜和丸如菉豆大，三歲兒每服以粥飲下五丸，日二三服

量兒大小以意加減

大黃丸 治小兒食癥，大腸澀，心腹妨悶

川大黃 大麻仁 檳榔

右搗末，煉蜜和丸如菉豆大，三歲兒每早晨以溫水下五丸，晚後更

量兒大小以意加減。一方有木香無青皮，治小兒癖氣腹痛，四肢黃

瘦

芍藥丸 治小兒食癖，本於腸胃，飲食不化，結聚不散，腹中隱

隱成塊，按之即痛

芍藥 大黃 鱉甲 麻仁 防葵

陳橘 白朮

右為末，煉蜜和丸如菉豆大，一歲兒每服三丸，三歲至五歲五丸，並

溫熟水下，日再。更量兒大小加減

治小兒食癖，大腸澀，心腹妨悶

膩粉 乾漆 巴豆霜 硃砂

右件同以醋煮麵糊和丸如黍米大，每服空心煎橘皮湯下二丸，量

兒大小加減服之

又方

荊三稜 五靈脂 巴豆

右研令勻，以醋煮麵糊和丸如菉豆大，每服空心茶清下一丸，量兒大

小加減服之

又方

葶藶 巴豆 杏仁

右為末，入巴豆膏和丸如黍米大，每服空心以茶清下二丸，量兒大

小加減

香朴丸 治食傷，冷熱不調，嘔吐不止，胸膈痞悶，乳食不化

藿香葉 厚朴 陳橘皮 半夏麴

白茯苓 甘草 乾薑 三稜 白朮

右為末，蜜丸指頭大，每一丸，薑棗煎湯化下

癖氣 附論

夫絕乳小兒五臟調和，榮衛氣血……哺乳失度，多飲水漿，不能消

散，若調養失宜……停飲不散

更遇寒氣相搏，結聚而成癖。癖者謂僻側在兩脇之間，有時而痛也

方

防葵丸 治小兒冷癖，癖氣不下食，時時脇下痛

防葵 當歸 枳實 檳榔

人參 黃耆 茯神 厚朴 訶梨勒皮 白朮

牛膝 郁李仁 柴胡 大麻仁 芍藥

橘皮 防風 紫菀 薏苡仁 鱉甲

三稜根 桂心 大附子 乾薑 甘草

乾地黃 大黃 五味子 檳榔 仙靈脾

右搗篩，蜜丸如梧子大，小兒以意量之，食後飲服之良

消癖丸 此藥功力至重，宜量兒虛實服之

木香 人參 白朮 白茯 當歸

枳殼 東安 三稜 莪朮 桃仁

麥芽 香附子 練肉 豆蔻

酸棗仁一兩 硃砂一錢 金箔 代赭石 丁香
白豆蔻肉 阿膠 五靈脂 半夏 南星
白僵蠶 巴豆 大麴 厚朴
右各製為末用甘遂芫花各三錢醋煮一宿取芫遂焙為末入前藥
內又以硇砂三錢水浸去毛上紙上蓋內熬成膏子再入前藥
醋同膏子煮麵糊丸粟米大硃砂為衣量大小虛實增減丸數空心
肉汁吞下一方 藥內有甘草者不可服忌三日

鱉甲丸 治小兒疳瘦腹有癖塊堅滿時痛食不生肌肉
酒煮鱉甲 蜀漆 柴胡
桔梗 人參 芍藥 大黃 黃芩
杏仁 枳實 茯苓 白朮 [illegible]
右為末蜜丸菉豆大四五歲兒服二丸日再服漸進

雞骨丸 治小兒氣瘦腹內痃痛雖食不成肌肉
烏雞骨 川大黃 鱉甲
黃芩 草澄 柴胡 桔梗 人參
赤芍藥 枳實 防葵 䗪蟲 杏仁
右為末煉蜜和丸如菉豆大四五歲兒以粥飲下七丸日二
四小疳時加減服之

木香丸 治小兒疳氣手腳心熱面色黃不下食日漸羸瘦往往
腹脹又不為瘦成西痢入夏即瀉痢
木香 茯神 人參 白朮
當歸 前三稜 知母 鱉甲
生薑 檳榔 桂
右為末煉蜜和丸如麻子一二百日兒每服一丸一二歲兒二丸
至三丸並空腹日晚米飲下微利下惡物為度更迭兒大小增減

枳實丸 治疳疾小腹中痞氣
牛膝 枳實 鱉甲 茯苓 桔梗
芍藥 白朮 人參 厚朴 大黃
桂心 檳榔

右搗篩蜜和丸空腹五四服如梧子一十丸日二服漸加至三十丸
老小以意加減 忌生冷熱小豆魚食蒜莧桃李雀肉大醋生蔥豬
肉

鱉甲丸 治小兒癖氣手腳心熱面色萎黃不思飲食日漸羸瘦
鱉甲 川大黃 柴胡
人參 赤茯苓 當歸 桂心 白朮
木香 檳榔 生薑
右為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒空心以粥研下五丸更量兒
大小以意加減 當下諸惡物為效

訶梨勒丸 治小兒癖氣壯熱瘦瘁不欲乳食
訶梨勒皮 柴胡 川大黃 赤芍藥 鱉甲
厚朴 大麥蘗 芎藭 赤茯苓
枳殼 乾薑 桂心
右為末煉蜜和丸如菉大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小
以意加減

鱉甲防葵丸 治老小痃癖不食羸瘦
防葵 當歸 旋覆花 橘皮
訶梨勒皮 鱉甲 桂心 桔梗 杏仁
大附子 大黃 吳茱萸
右為末蜜丸如梧子大每服十五丸日再服粥飲下量兒大小以意加
減

治小兒悶癖
青橘皮 細辛 黃連 大棗
梔子仁 常山 桔梗 薑黃 苦參
耳草 蜀漆
右搗篩蜜和為丸如梧子大飲服五丸漸加至十五丸日再以知為
度自至利小兒或丸量度服忌豬肉熱麵蒜炙生菜蕪荑粘食

荊三稜丸 治小兒癖氣手腳心熱脾胃虛弱不下飲食面色萎黃
新加羸瘦
荊三稜 防葵 木香 枳殼

赤茯苓 白朮 桂心 大黃
郁李仁 鱉甲
右為末煉蜜和丸如小豆大以粥飲下週年兒每日一服兒稍大助
以意下之
治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方
芍藥 梔子 知母 大黃 柴胡
升麻 黃連 黃芩 竹葉 桔梗
右以水六升煮取二升八合去滓分四服十歲兒為三服千金
方云一方有杏仁各一兩半無桔梗黃連
治十五歲已下兒熱結多痰食飲不下方
大黃 柴胡 黃芩 枳實 防風
芍藥 知母 梔子 上黨 杏仁
竹葉
右㕮咀以水六升半煮取二升十歲至十五歲者分三服

大黃丸 治小兒腹中痞氣不散肌肉瘦瘁或多心煩不能飲食
食即壯熱或大小便秘澀或天行驚風並宜服之
代赭 朱砂 水杏仁 犀角
麝香 牛黃 巴豆 當歸
川大黃 鱉甲
右為末令勻煉蜜和搗三二百杵丸麻子大每服飲下二丸日三
服量兒大小以意加減荊芥薄荷湯下更量兒大小加減服之以
利下惡物為効如驚風天吊荊芥薄荷湯下
[illegible]丸 治小兒癖氣腹痛
前胡 桔梗 赤芍藥 赤茯苓 枳殼
川大黃 郁李仁 鱉甲
檳榔
右為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服空心以粥飲化破五丸服
量兒大小加減服之
治小兒大人腸下有疾心下痞硬頭中苦痛微熱[illegible]黃小

如赤色往來寒熱手足厥冷不能飲食夏秋精甚令人疾遽苦手足
煩躁或瘧病之後飲水不消或漸多增加寒作熱心腹下有癥結及
瘧後疾不止或是痃癖或作瘧頭項苦強或[illegible]脹滿[illegible]癖飲小兒
[illegible]湯下腹堅又傷寒後七八日結熱癖積不除久則寒熱癰疽害
飲食[illegible]痰實[illegible]如是[illegible]結不去此方能
[illegible]實熱和胃[illegible]小便[illegible]黃小兒熱諸
痞癖並主之又不令也
知母 大黃 黃芩 杏仁 常山
蜀漆 甘草 麻黃 牡蠣
右為末蜜丸如麻子大飲下五丸日進三服加至二十丸兒小半之小
兒以意加減
黑丸子 治小兒水癖
當歸 細辛 附子 乾薑 胡椒
蝎頭 巴豆 杏仁
右為末蜜丸菉豆大飲服三丸日一服

破癖丸 治小兒腹中水癖側於脇傍時時作痛也惟癖為能發
潮熱亦能生寒熱故俗云家中脘多蓄黃水日久而後結癖寒熱不已小
兒臟腑和平營衛調暢則津液自然流通[illegible]多飲水[illegible]能為癖惟乳
哺失調三焦關隔以致水飲停滯腸胃不能宣行冷氣搏之於是結聚
而成癖輕者用木香丸重者用此方
甘遂 芫花 陳桂 青皮 蓬朮
五靈脂 桃仁 木香 牽牛
右為細末入去油巴豆一錢研和十分細飛面糊丸麻子大風乾每
服一二丸[illegible]湯下[illegible]後冷粥補仍和胃
鱉甲丸 治小兒腹中結聚脇下有癖手足煩熱
鱉甲 川大黃 柴胡
赤茯苓 乾薑 桂心
厚朴
右為末煉蜜和丸如麻子大二三歲兒空腹以粥飲下三丸日三服
量兒大小以意加減

小紫雙丸 治小兒宿食不消積成癖氣兩肋妨悶氣急不能
下食腹大脹硬
大黃丸 治小兒癖氣不清四肢黃瘦時有腹痛
七味鱉甲丸 治療小兒痃癖發痛不食黃瘦
鱉甲 郁李仁 防葵 人參 訶梨勒皮
大黃 桑消
右搗陳蜜丸大小豆之以粥飲乳服五丸至十丸量兒大小
動但鱉甲防葵大黃郁李仁各半兩人參桑菌各六分訶梨勒三分
積殼丸 治小兒癖氣脇肋下妨悶手足微腫並宜服之
治七八歲兒多積氣時壯熱日加羸瘦身雖不痛飲時刺腹逆不食
是癖氣之候其狀似瘧疾
黃芩 枳殼 甘草炙 知母
芍藥 大訶梨勒
右為末取一錢煎服

麝香丸散 治小兒宿食癖結可思飲食或時吐逆
青皮一分 白薑 甘草 訶子
沒藥 乳香 巴豆霜
右為末唯巴豆霜不止每服二字米飲調下如要思食為癖入巴豆
以稀麵糊為丸如菉豆大每服七丸等溫湯下日進三服兩服
加減服之
芒硝紫丸 治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦
芒硝 大黃 甘遂 代赭一兩
巴豆 杏仁
右為末別搗巴豆杏仁治如膏旋內藥末搗三千杵令相和合強者
內少蜜百日兒服如胡豆大一丸過百日至一歲服二丸隨兒大小以
節度當服兒大便中藥出為愈若不出更服之
木香丸 治小兒氣癖上下左右移動不常
木香 白檳榔 大黃 枳實
乾薑 朴硝 附子

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服三丸至五丸生薑湯下更量大
小加減
防葵丸 治小兒癖氣久不消
防葵 人參 桑菌
川大黃 郁李仁 訶梨勒皮
右為末煉蜜和丸如麻子大每服溫湯下五丸日三服量兒大小
加減服之
芫花丸 治小兒癖氣堅硬疼不欲食
芫花 鱉甲 川大黃
荊三棱 桂 黃 桃仁
右為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服七八丸以生薑湯下三丸量
兒大小增減服之
治小兒閃癖身體壯熱頻服冷藥冷氣爰入成癖下焦又冷腸結大便
雞
茯苓 芍 鱉甲炙 枳殼 芍藥各二

柴胡
右切以水一大升三合煎至三合空心為二服去五六里再服忌莧
菜
治腹肚不調并癖氣久不愈
枳實 知母 牡蠣 鱉甲 甘草
大黃
右為末蜜丸如菉豆大粥飲下五丸
遐睍丸 治大人小兒傷寒四五日及數年諸癖結堅心下飲食不
消目眩四肢疼咽喉不利壯熱脾胃腸鳴
或為驚風傷寒背痛手足不仁口苦舌燥天行發作有時
甘遂
巴豆 甘草 杏仁
右搗篩合和以蜜搗三千杵丸如梧桐子大每服二丸當下小
兒二歲已上服如麻子大
血物

治小兒諸癖每至午後時作寒熱微有欬嗽脇肋癖硬[illegible]

知母丸 [illegible] 治小兒脾癖不[illegible]乘癖氣

知母 [illegible] 黃甲 [illegible] 貝母 [illegible] 大黃 [illegible]

牡蠣 [illegible]

右爲末煉蜜丸如菉豆大飲下五丸大人以意加減

二丁丸 [illegible] 治小兒諸癖久不[illegible]作寒熱[illegible]

巴豆 [illegible] 有[illegible]如[illegible]

揀丁香 [illegible] 丁香 [illegible] 硫黃 [illegible]

右爲細末同研每服一字至半錢白湯調下空心臨卧日二服以利爲度

大戟餅子 治小兒食癖脇下有一塊飲食不生肌肉

大戟 [illegible]

右濃水和丸捻作餅子如小錢大每三分[illegible]上[illegible]飲[illegible]下一餅

兒小者服

治大人小兒痃癖氣塊積聚[illegible]疼痛不止又治心氣痛不可忍者

白玉 [illegible]

右爲細末用水爲丸如麻子大每服三十丸生薑湯下

治癖

牛旁子 草烏 [illegible]

右爲末以鷄子青調丸用厚絹攤塗安癖上仍以厚紙包[illegible]

絹上以[illegible]更易數餅其疾内消

又方

以食茱萸半升剉細酒煮和包[illegible]癖上冷則又炒[illegible]

之

療大人小兒癖疾 [illegible]

取車下李仁微湯退皮及仁與乾麵相拌搗之爲餅如猪乾和[illegible]

水如常搜麵大小一如病人手掌爲二餅微炙使黃勿令至熟空肚

食一枚當快利如不利更食一枚並飲熱粥十即利以快利爲度至

午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力二三日更進

一服以病盡爲限小兒以意量之不得食酪及牛馬肉無不効

病重者李仁與麵相半輕者以意減之後[illegible]治[illegible]量力[illegible]

治小兒氣癖 [illegible]

用三稜汁作麵粥以米麵爲之與乳母食每日取一棗大與小兒喫

亦得作粥與病兒食之治小兒十歲已下及新百日無問[illegible]數[illegible]

治小兒閃癖頭髮黃瘦[illegible]

癖痛皆理之極效不可具言大效

右[illegible]以和[illegible]

治小兒大癖 [illegible]

[illegible]

[illegible]大蒜大段癖[illegible]

用雞[illegible]

治小兒閃癖 [illegible]

用[illegible]

治小兒痃癖 [illegible]

用貝[illegible]成之

取半匕以水半盞研[illegible]調勻[illegible]空心只服

一服服之得利惡物出如不利須盡出[illegible]三五日大[illegible]量兒大小與

之

治小兒閃癖 以苦茱萸葉搗末傅之

治小兒閃癖 用苦瓠苗子研傅之

治小兒閃癖 用胡荽葉一歲服一葉已上斟酌[illegible]之生按[illegible]得吐下

治小兒閃癖 搗苦瓠葉傅之

乳癖

夫小兒乳[illegible]不[illegible]三焦不調乳飲不化[illegible]而成疾流於

脇下[illegible]之[illegible]久不[illegible]上至心下[illegible]之[illegible]

新瘦疳有黃多種目澀寒熱往來嘔吐或嗽腹脹渴之乳癖世呼為奶癖是也○小兒乳癖者因乳母食飲無常無節過度便飲乳兒不知劑節小兒脾胃虛弱不能消化或乳母病氣一切乳之不紉而時兒亦壅滯乳津滯積不因勉諸聚成塊而痛者是也其候面色青黃發熱壯熱吐乳多睡口內生瘡漸漸瘦將成為飲癖面黃腹內結塊不散故為乳癖也○小兒生下便身多發寒熱肚腹小便赤黃微微氣熱此候本因胎熱又因受後母食酒毒邪熱之毒不因化遂成壯積所為者先用牛黃膏天竺黃散調中飲三五服即食知見黃色限積自明氣病自口手裡春夏候不治○比連利便取積後調胃氣無足矣又云先用惺惺丸取後銀白散調氣

方

人參丸 治小兒乳癖手腳心熱面色青黃不下乳食日漸羸瘦

人參 [illegible] 赤茯苓 白术 桂心 枳殼 [illegible] 檳榔 木香 當歸 [illegible] 前胡 三稜 [illegible] 鱉甲 [illegible] 川大黃 [illegible]

右為末鍊蜜和丸如菉豆大每一歲以粥飲化下三丸日三服量兒大小以意加減

牽牛丸 治小兒奶癖腹脇緊硬時作寒熱

白牽牛 [illegible] 粉霜 一錢 膩粉 [illegible] 硇砂 [illegible] 黃鷹糞 [illegible] 白丁香 [illegible] 石燕子 [illegible] 延胡索 [illegible] 白麵 [illegible] 沒藥 研 白滑石 [illegible]

右為細末和勻酒水和作餅子先於火上炙乾次入天火煨熟為度放冷細研更入硇黃一錢同研勻酒水和為丸如菉豆大每兒大小每服三丸至五丸煎柳枝乾柿湯下速服之

鱉甲丸 治小兒乳癖面色黃瘦食乳微細日漸羸瘦

鱉甲 [illegible] 前胡 三稜 [illegible] 檳榔 [illegible] 人參 [illegible] 赤茯苓 白术 木香 枳殼 [illegible] 當歸 [illegible] 桂心 川大黃 [illegible]

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲研下三丸日再服以利為度量兒大小以意加減

水銀丸 治奶癖積聚發癖

水銀 一錢 硇砂 白丁香 [illegible] 瀉子 [illegible] 輕粉 [illegible] 香墨 鷹條 巴豆 [illegible] 青黛 [illegible] 黃明膠 [illegible]

右為末白水和丸如菉豆大用溫酒湯下三五丸看大小加減

惺惺丸 治小兒宿積及實積奶癖

白丁香 硃砂 [illegible] 楊起石 [illegible] 黃鷹條 [illegible] 輕粉 [illegible] 麝香 [illegible] 硇砂 [illegible] 續隨子 [illegible] 石燕子 [illegible]

右為末麵糊和丸如黍米大每服一十丸量兒大小加減皂子仁湯[illegible]白煎湯送服

木香丸 治小兒乳癖不消心腹脹滿

木香 前胡 三稜 [illegible] 檳榔 青橘皮 [illegible] 人參 赤茯苓 各一兩 牽牛子 [illegible] 草豆蔻 [illegible]

右為末以醋煮麵糊為丸如麻子大每服以粥飲下三丸量兒大小加減服之

硇砂丸 治乳癖

硇砂 礞石 粉霜 鷹條 無食子 前胡 三稜 [illegible] 膩粉 [illegible] 腦麝 [illegible]

右同研勻以麵糊杵丸如菉豆大每服三丸或五丸煎杏仁湯下量兒大小加減兼乳母久服麵坊藥不壞藥須用忌油膩

外貼散 治乳癖

芫菁子 [illegible] 麥食麵 [illegible]

右同研勻用新水調如糊紙上攤貼乳癖上頻以水潤之

聖餅子 治宿中挾積并乳癖

石燕子 [illegible] 粉霜 膩粉 硇砂 白麵 [illegible] 丹砂 延胡索 [illegible] 鷹屎白 [illegible]

右同研勻丸如綠豆大作餅子傅天門內燒過每服米飲化下
半餅子

□金丸 治小兒乳積乳癖

膩粉 蓬莪朮 黃連
黃鷹糞 巴豆 大陰玄精石 硇砂 粉霜

右為末再同研勻棗肉和用麵裹文武火中煨以麵熟為度去麵取藥丸如黍米大每服一二丸甘草荊芥湯下量兒大小加減

大黃丸 治小兒初生至百日以來腹內有氣衝心腹痞壯熱啼腹痛便熱乳癖宜下胸中實物

大黃 丹砂 人參 枳殼
柴胡 桂心 木香 白茯苓

右為末煉蜜丸如菉豆大每服五丸乳汁下日三夫者加至二十丸

大黃丸 治小兒乳癖脇下堅硬大便難小便赤

川大黃 訶梨勒皮 烏梅肉 陳橘皮
木香 郁李仁 川朴硝 桔梗

右為末煉蜜和丸如菉豆大一歲兒每服以粥飲研下五丸晚後再服更量兒大小以意加減

治癖方

訶子 蓬莪朮 密陀僧 硫黃 輕粉 白丁香
黑丁香 粉霜 硇砂

右為末每服半錢男用女兒奶汁化服女用男兒乳汁化下

三香散 治小兒乳癖

密陀僧 硫黃 石燕子 白丁香
丁香 膩粉

右同研勻為細散每服一歲半錢匕二歲一錢匕十歲已上二錢匕用麵湯調下如左脇下病臥左邊如右脇下病臥右邊至晚取下病積是驗

水銀丸 治小兒乳癖脇肋堅硬喘急時作痛

水銀 硫黃 膩粉 密陀僧 硇砂
石燕子 巴豆

右同研勻麵糊為丸如黃米大每服三丸煎槐葉湯下乳食後臨臥服更量兒大小加減

南水丸 治小兒乳癖

黃蘗 輕粉 巴豆 水銀
丹砂 天南星 半夏

右為末再同研勻南水和丸如粟米大每服二丸三丸煎生薑湯白湯量兒大小加減服之

又黃丸 治小兒乳癖積聚腹大若痛肌膚瘦面色青黃

枳殼丸 治小兒乳癖嘔吐腹脹寒熱

枳殼 木香 赤茯苓 人參
桂心 川大黃 柴胡

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水化破三丸服之日三服量兒大小加減服之

治小兒奶癖

白丁香 黑丁香 石燕子 細上硫黃 寒水石
密陀僧 膩粉

右為末每服一錢用第二遍米泔水調服即取下病如未下更一服

三棱散 治小兒乳癖結實不消

京三棱 赤茯苓 當歸 鱉甲
枳殼 白朮 木香

右為細散每服一錢水一盞入生薑七片煎至五分去滓放溫時時與服

挨癖丸 治乳癖氣塊腹中堵痛

代赭石 青皮 木香 蓬莪朮
五靈脂 北大黃 巴豆

右為末用麵糊丸如麻子大每服二丸食後煎橘皮湯下

積氣散 治小兒乳癖

粉霜 硫黃 密陀僧 白丁香 京三棱
銅青

右擣散拌研勻每服一錢生薑煎水調下食後五更服奇效

青黛丸 治小兒乳癖

粉霜 硇砂 膩粉 各一 水銀

麝香 青黛 巴豆

右各細研拌勻和勻麵糊為丸如黃米大每荷葉湯下五丸至七丸新

水亦得

三棱散 治小兒乳癖結實其腹不消思便消不散令兒日漸羸瘦面

色痿黃春夏多發不欲乳食

荊三棱 川大黃 檳榔 鱉甲

赤茯苓 枳殼

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓分為二服日三四服下

惡物為效

硇砂丸 治小兒乳癖壯熱羸瘦

寒水石 膩粉 檳榔 朱砂

雄黃

右同研令勻麵糊和丸如菉豆大三二歲兒以生薑湯下三丸日再

服量兒大小以意加減

化癖丸 治小兒乳癖結硬久不消化

巴豆霜 膩粉 朱砂 黃鷹糞 硇砂

雄雀糞

右同研如粉用糯米飯和丸如黍米粒大一歲兒每服安人蔥白煎

仁湯下二丸取下惡物為度

軟銀丸 治小兒奶癖

水銀 白丁香 膩粉 續隨子

巴豆

右同研勻棗肉為丸如菉豆大一歲兒一丸五更水下

聖白散 如生薑取下後再服

人參 茯苓 甘草 白朮 炒麵 白扁豆

藿香葉

右各等分為末每服一錢紫蘇湯調下

如聖散 治小兒奶癖壯熱肌瘦可思飲乳漸漸羸瘦飲食一切

疳

硇砂 粉霜 大丁香 白丁香

膩上硫黃

右為末每服半錢冷茶清下日一服一二時見效二歲已上每服半

錢三歲已下半錢一字

通消世

硯粉丸 治小兒奶癖積聚止消食食作肚疼及治腹脹

急中積行氣

利聖丸 治小兒奶癖及下痞奶消痰退熱膈實取積

硇砂 巴豆 訶子 好墨

水銀 輕粉

右為末白飯為丸如小豆大三歲二丸下食前

側流水下

虎青丸 治小兒乳癖食癖積至午後壯熱微有欬嗽

脇肋癖硬

輕粉 大陰玄精石 粉霜

白麵 硇砂

右再同研細滴水和為餅子以文武火燒熟為度時研為末和為丸

如黃米大三歲以上每服五丸淡水下三歲以下以意增減或飲

下錢氏加白丁香百粒字定粉一錢半研雞肚半字研方至天

明取下惡物是效如奶癖未消盡隔三兩日又一服癖消為度

金花散 治小兒乳癖神效

白丁香 丁香 密陀僧

硫黃

右合研勻每服三歲以下一字三歲以上半錢至一錢并用奶汁調

下臨臥服至來日取下黑青糊上物即愈再服

比癖丹 治小兒乳癖兒覺熱不硬痛

丹砂 巴豆霜

白滑石 硇砂

右同研勻更米飯和為丸如黃米大每服二丸煎荷葉湯下奶食後臨
臥服
治小兒奶癖 [illegible]
密陀僧 訶子 丁香 肉豆蔻 木香各等
右研羅為細末入膩粉少許再研每服一錢半米飲下如不動來日
再服三服
如神散 [illegible] 治小兒乳癖攻脇肋脅痛
獨頭蒜一枚 [illegible] 膩粉半錢 [illegible]
右同研勻貼腸肋上硬處以醋麵餅子貼蓋之候口內聞蒜氣為
用昌者去
硫黃散 [illegible] 治小兒乳癖
硫黃研 密陀僧研 膩粉研 訶梨勒皮 [illegible]
右和令勻每服一錢奶汁調下更量兒大小加減
又方 [illegible]
黑丁香 二十 舶上硫黃 [illegible] 白丁香 五箇 密陀僧 [illegible]

右生用為細末如一歲者只一字臨卧服三兩歲者服半錢用奶汁
如男兒用左奶汁下女兒用右奶汁下
二丁丸 [illegible] 治小兒奶癖在於兩脇下或左或右如狗舌之狀令兒面
黃瘦大[illegible]多渴日中發熱夜間多哭
丁香半錢 白丁香一分 密陀僧 輕粉各一
右為末糊丸如小豆大三歲五丸水下惡物下為效
消癖丸 [illegible] 治小兒乳癖積塊
牽牛子 [illegible] 白牽牛 肥皂 [illegible]
巴豆 [illegible]
右除巴豆外擣末後入巴豆再同研勻用粟米飯丸如菉豆大每服
三丸橘皮湯下如常服丸如粟米大茶湯下三丸量兒大小加減
治小兒脇癖腹內有積脇下硬有形
寒食麵 [illegible] 水粉半兩 青黛 [illegible]
右研令勻以乳汁和分為二十餅須汁上以炭火煿乾一餅子分
為四段逐服飲化服四分之一服一日次服八服取效未能再得效

食者化如棗指在口內
治小兒奶癖 [illegible]
芫花 [illegible] 雄黃 [illegible]
右同研藥末研爛令勻男左女右用藥塗在乳母手心慰擦癖上時
聞患人口中如有藥氣即取了立效
治奶癖 [illegible]
丁香 [illegible] 密陀僧 生硫黃 [illegible]
右為細末每服半錢大者一錢米飲調下頻一宿取下黑物效
蓬莪茂散 [illegible] 治小兒脾胃氣弱乳食不化乳飲留於脇下因而成癖
蓬莪茂 [illegible] 阿魏 [illegible]
右為細散每服半錢 [illegible] 米飲調量兒大小加減
膩粉丸 [illegible] 治小兒乳癖脇下結塊不消面黃發熱
膩粉一錢 猪膽 [illegible]
右同研令勻以棗肉和丸如粟米大每服以新汲水下一丸取下黏
滯惡物為效量兒虛實大小以意加減一方糊丸熟水下癖塊消即

物
治未滿月小兒奶癖 [illegible]
紫河車 人參
右各等分為末用好醋調作餅子如大錢子大如左脇有奶癖者藥
貼左脇用緋帛乳 [illegible] 後見効左右一般使藥
治小兒奶癖 [illegible]
紫河車二兩 寒食麵二錢
右同為末每用一匙許水下調塗足心病在左塗左病在右塗右當
取紅白上積良久其病大便中下大便盡洗去
治小兒奶癖 [illegible]
白芥子 芸薹子 [illegible]
右為末水調攤紙上貼奶病又用醋麵餅子蓋之立効必須急去
如不急去則成瘡
治小兒乳癖 [illegible]
用獨蒜一顆搗爛看兒乳癖大小服兒輕肩隨病大小貼兒腹

内作穀芽悉取去不用

青黛丸 治小兒奶脾...

用青黛不計多少去白...爲細末...丸如...每服五丸七

丸生薑湯下日進二服

治小兒奶脾 ...

用黃蜂巢不拘多少研極細...有奶脾

亂過其大小屈過又不可益之太過夏...所是癖

後...以手按之...以五六分劑使用溫水先去切滯

劑度不可令...也如未消...別使溫水潤之

治小兒奶癖 ...

用...不以多少爲末每服一錢冷水調...

聖効妙應散 治小兒...脇下結硬

雄黃 粉霜 輕粉 海金砂 硇砂

草薢 川山甲 當歸 蓬莪 荊芥

京三稜

右件一十一味...研爲極細末...一味

半...

病...

待一二時...

乃更...

香殼散 治小兒奶癖不消心腹脹硬

石燕子 丁香 膩粉 ...

右件爲細末每服一錢溫米飲調下乳食空

木鼈子去...

治小兒奶癖 ...

右以白朮子不以多少研成膏攤紙花子上貼痛硬處其中効

治小兒乳癖胸腹高痛急吐乳方

右以不入倉黑豆七粒去皮研細滴水七滴和成作七丸以青黛

末裹之令偏更用...

粉生腦子麝香各少許...作七丸每服一丸臨卧溫水送下

兒子小哯...無妨極効

水銀丸 治小兒...吐不止乳母...奶頭因被...

亂...面色...發熱吐逆方

右用...中三出...五七...入水銀...研令勻...

度赤醋麪糊爲丸如...大...下三五丸乳食

後

疳氣 附論

夫小兒疳氣者由飲食不調生冷過度...所成也其

...名疳氣

也○小兒生下...月日上至七歲有結癖在腹成塊如梅核大...

或...

嚴...

死

鼈甲丸 治小兒疳氣...

鼈甲 荊三稜 ...

人參 乾薑 白朮 川大黃 ...

當歸 ... 陳橘皮 ... 柴胡 ...

厚朴

右爲末煉蜜和丸如菉豆大每服以生薑湯下七丸日三服...

大小加減服之

荊三稜散 治小兒疳氣急痛

荊三稜 枳殼 大腹子 鼈甲

神麴 訶梨勒皮 麥蘖 ...

青橘皮 黑三稜 厚朴

右爲細散以粥飲調下半錢日三服更量兒大小加減服

當歸防葵丸 ...

鼈甲大黃丸 治小兒疳氣食不消化四肢瘦弱

鼈甲 川大黃 荊三稜 ...

枳殻 麩炒去瓤 芎藭 桔梗 炒 赤茯苓 赤芍藥
乾漆 炒烟盡 桂心 各一分
右為末，錬蜜和丸如麻子大，每服以粥飲下五丸，日三服，更量兒大
小增減服

大黃散方 治小兒痃氣腹脇妨悶不欲飲食
川大黃 剉碎微炒 鱉甲 塗醋炙令黃去裙襴 各一兩 赤芍藥 半兩 木香 各一
荊三稜 煨剉 檳榔 甘草 炙微赤剉 各半兩
右為細散，研令勻，每服以粥飲調下半錢，日三四服，量兒大小以
意加減

七味鱉甲丸 治小兒痃氣腹脇妨痛，不欲飲食，日漸羸瘦
蓬莪朮散 治小兒痃氣一切氣疾
蓬莪朮 青橘皮 湯浸去白焙 益智 去皮 木香 各一分 糯米 一兩
右為末，每服一大錢，用陳米飲調下，日進四服
治小兒痃氣疾，消化四肢瘦弱 檳榔 川大黃
荊三稜 煨

右為散，每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，分溫二服，就
再服。更量兒大小以意加減
又方
用鱉甲一枚，塗醋炙令黃，去裙襴，為細末，每服一錢，以童子小便一
小盞，煎至五分，量兒大小加減服之，日三服，神效

痞結 附論

大小兒痞結候，結者塞也。小兒胸膈熱實，腹內有留飲，致令痞塞，
而壅滯之氣不得宣通，其病腹內氣結脹滿，或時壯熱是也

方

治小兒八痞。一當心下堅痛，大如小杯，名寒痞，主之。
二如飯起於脇下，搶心，名蛇痞，主之。三如手，名龜痞，鱉甲主之。四□□腹，名□痞，主之。五當心如杯，不可搖動，名氣痞，牡丹主之。六心下如盤，名氣痞，鱉甲主之。七生於兩脇，脇胸痛，狀如瘧，名血痞，主之。八腸出腹中，名□痞，蟅蟲主之

曾青 乾薑 紫石英 牡丹 去心
桂心 各二 大黃 龍骨 各五 蜀椒 七分 龜甲 醋炙
真珠 蜀漆 各三 細辛 六分 附子
右為末，規上所說，依病所主，藥倍之，分和以蜜丸如梧桐子大，空心服
四丸，此是五六歲兒所服，若小兒以意量之，日三服，丸子大小量兒
與之。服之當滿，腸中痞皆出，已上八說
有留中並用也

五參丸 治小兒脇下有痞，發寒熱
人參 苦參 丹參 沙參 玄參
防風 附子 大黃
蜀椒 去目 巴豆 去皮心
右為末，別研巴豆入勻，煉蜜丸如小豆大，一歲兒一丸，日再服
加減

礞石丸 治小兒腹內痞結
礞石 柴胡 川大黃 黃芩 細辛 去土
芎藭 茯神 赤芍藥 木香
甘草 巴豆
右為末，煉蜜和丸如麻子大，每服一丸，一歲兒一丸，二歲二丸，
三歲三丸，四五歲兒可服五丸，並空心以粥飲下，以得快利為度，若
未利，明旦再服之，更量兒虛實以意加減

鱉甲丸 治小兒先寒後熱，腹堅，強羸，不能飲食，不生肌肉，時若
壯熱
芎藭 當歸 紫菀 大黃 茯苓
杏仁 桂心 杜蘅 白芷 石膏
半夏 黃
右為末，蜜和為丸，如小豆大，每服二丸，日進三服，稍稍加之

鱉甲足丸 治小兒腹堅
蟅蟲 頭足 人參 丹
蜈蚣 乾薑 芍藥
牛黃 一分 桂心 一兩

右為末鍊蜜為丸如小豆大二丸日再服

牛黃丸 治小兒腹內痞結多餘

牛黃 麝香 甘遂 巴豆霜

川椒 蝎 蜣螂

川芒硝 真珠末 雄黃

右為末同研令勻用鍊成蜜一合入白蠟一兩合煎令鎔和丸如麻子大每服以粥飲下二丸以利為度未利再服看兒大小以意加減

荳蔻草果飲子 治小兒痞氣未除重複取利致之虛之腹肚疼痛不思飲食面目虛浮強食嘔吐宜服

肉豆蔻 草果 檳榔 縮砂 白茯苓

白芍藥 白朮 甘草 陳皮 半夏

右吹咀每服二錢生薑三小片烏梅半箇棗子一箇用鹽紙包裹煨熟去紙用水一小盞煎至半盞去滓通口空心食前兩滓併煎與小兒喫乳服之一方無半夏麴

肉豆蔻散 治小兒胸中有寒氣痞不消腹中疼痛泄不能乳食

肉豆蔻 人參 藿香 白茯苓

木香 甘草 厚朴 乾薑 白朮 訶子

右為細末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三服量大小加減服之

柴胡散 治小兒腹內痞結身體壯熱中焦壅悶胸膈不利

柴胡（去苗） 赤茯苓 芍藥 鱉甲

枳殼 赤芍藥 桃仁 檳榔

甘草

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三服更量兒大小加減服之

大腹皮散 治小兒腹內痞結壯熱煩渴大小便不利

大腹皮 陳橘皮 桔梗 鱉甲

人參 赤芍藥 川大黃 木通

甘草

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓看兒大小分減溫服之

檳榔散 治小兒腹內痞結壯熱不能乳食心胸煩壅

檳榔 川大黃 枳殼 人參

柴胡 知母 赤芍藥 地骨皮 甘草（各一分）

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服之

前胡散 治小兒胸中寒氣結塞不通時欲嘔吐泄瀉腹脹時痛為停

前胡 白朮 人參 陳皮 高良薑

藿香 厚朴 甘草

右為散每服一錢以水一小盞煎至八分去滓不計時候溫服大小加減

前胡散 治小兒腹內痞結壯熱

前胡 川大黃 枳殼 赤茯苓

郁李仁 鱉甲

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓看兒大小分減溫服以利為度

大黃丸 治小兒脇下積氣胃立便不節

大黃 鱉甲 乾漆 桃仁

人參 甘草 芍藥

右為末蜜和丸如胡豆大一丸日進三服以意加減之去頷下段足取脫

前

取小兒癖方

白丁香 五倍子 船上硫黃 蜜陀僧

大子

右為末如小兒瘦者米飲下半錢肥者大米飲下并吊七椎下兩邊灸之候臍下火自出如麩片相似效

甘遂丸 治小兒腹內痞結乳食不消心腹刺痛

甘遂 真珠 黃芩 赤芍藥

巴豆霜 杏仁

右為末入杏仁巴豆霜同研令勻鍊蜜和丸如麻子大二三歲兒空腹以溫水下二丸以利為効未利再服更量兒大小加減

甘遂散 治小兒腹內病結聚服湯得利而滯實不去心下堅滿按之輒啼內有伏熱諸併集成此疾宜服破痞除熱

甘遂一分 青橘皮 白朮各半兩 黄芩

川大黄一分

右擣羅為散每服三錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小加減溫服以利爲止利後以漿粥放令補之無不作効

當頭丸 治小兒腸胃脹下服當腹中積聚堅痛

鼈甲一兩 蜜炙 桃仁三分

右為末鍊蜜丸小豆大二丸日進三服以知為度如不利加大黄三分

甘遂湯 治小兒服湯已得大利溫壯已折而滯實不去心下堅痞滿不可按輒啼內有伏熱諸病併成此疾宜破痞除熱

甘遂 甘草各 黄芩 大黄各一

右以水二升破鷄子一箇和取白投水中攪令沫長大去之內諸藥煮九合爲二服

治小兒暴腹中痞結滯燥熱

大黄 鼈甲 茯苓等分

右為末蜜丸大豆大飲下日三服兒知為服之一方用鼈甲

鷄子湯方 治小兒六七歲腹堅痞時時寒熱如瘧服紫丸十日吐下痞乃堅以此湯一劑去惡物數升遂愈常用之効

甘遂 甘草 芒硝

右以水二升半鷄子一枚少打開出白投水中攪令沫出去滓內藥煮取開通小兒大小汁可得下合和與之

合堅實多者加芒硝細辛各一兩大效

治小兒痞滿

用三白草擣絞汁服令人吐[illegible]胸膈熱痰亦主瘧及小兒痞滿

此草初生無白入夏葉半白如粉農人候之蒔田三葉[illegible]草白便[illegible]故謂之三白

又方 治小兒痞滿脹痛

用胡[illegible]擣傅之

積聚 附論

夫小兒有嫉病候但是吐下嫉來有臭酸氣此候因兒呼未住母將嫉與喫致不消化日久停滯胃而至此所治者先用丁香散調胃後下實積牛黄丸取下嫉積後下[illegible]氣散補治服建脾散即愈食積候閒此微微作熱或吐或瀉此因飲食傷飽而更輕至此所治者下實積牛黄丸通下後用白朮散補氣有服益黄丸即愈[illegible]積候而[illegible]不進食脾微有元痛咯吐此因[illegible]氣候久而不安[illegible]氣[illegible]至此所治者用[illegible]醒脾散建脾散相交調理即愈中積候但面黄如土色[illegible]背[illegible]下[illegible]食減少嫌食便吐[illegible]上及肚中痛所食不化[illegible]此因乳食[illegible]所傷[illegible]所治者先下青金丹取下脾中積後用[illegible]散[illegible]脾散[illegible]

[illegible]

假因[illegible]久泄瀉不止而虛得此候所治者先下青金丹[illegible]肚中積後用[illegible]理[illegible]大便不[illegible]

[illegible]

是脾之所傷[illegible]

故早[illegible]

[illegible]

白玩其積在肺受傳大腸及有外候以而得何以知之其痛主西方庚
辛金其色白後青引是外邪故知爾大腸為肺之府也宜取後調
氣兩眼黃赤睛青其根在肝何以知之肝主東方甲乙木色青却標積
氣所干即黃赤睛青者脾為五臟所忌凡主肝者受相剋故令眼睛青凡
肝受積轉傳轉其人若不要喫物胃亦病滑之過食所傷其積不在藏
只在腑何以知之為其積曾取後被其損動即不在臟故出寒濁目之間
為轉也凡宜下取盡中積並依後補之耳○多傳白黃是受其積在脾
何以知之脾主土受令積在脾令多有白黃也知在脾宜先轉後熟
補之○小兒積病不可醫者六喘急是肺積肺主氣其喘不定肺絕
其人面白全無血色者不可醫也面黑是腎積其人面黑者是腎絕
也人色不變好喫泥土是脾積無全不食者胃絕其人不食
者只血後不可治也面主心心不能生血故出熱不止耳手腳心生瘡
是衛積者胃氣不生故手足生瘡者胃絕則氣不出尸得半日
也死心吐乾嘔是胃積何以不[illegible]也者化食而胃絕則嘔吐故不治其
人必食乳不化不食亦嘔吐嘔面色青黃無血色也乃久往又瀉是積

咬脾爛何以知其脾損其人當瀉食不消化了即奴食者中[illegible]
死脾知脾胃不可治○積病口中氣出而兼白日無精光成內積多及
多睡是食或大便酸臭者當下藥消積丸甚者當白餅子下之後加
胃○小兒五積為臟氣不行蓄積一處不動故曰積大凡為伏且有肺
上上攻其心下攻胃口蓋為痞氣在胃口上按之而為肥氣在脅之左
邊肺為息賁在脅之右賁豚屬腎也在臍下各有定形非食之所成乃
氣積也臟屬陰故在一處而不動也小兒有聚積六腑之氣留滯也對
[illegible]
積者[illegible]
冷人[illegible]
動拍取[illegible]
如是[illegible]
也不[illegible]取下[illegible]白色也○小兒八種積[illegible]
面腫手腳[illegible]中有[illegible]

痛大腹中有積面多甲閉眼不開脾臟中有積小便似米泔子瞪目臟
中有積沿為不止膀胱中有積眼內黃啼小兒齊小腸中有積多吐
逆不吃食上腦中有積○渾身虛腫者脾之有積久取不下號曰虛中
積先調氣後取之○肚腫四肢黃色者受水氣須取之小便如米泔脾臟
受積此假用取之頭髮[illegible]者須受保候發此積之法用取之服睛當其
出水者脾有積乃風搐之候當取之亦須先調其氣此脈內久積用
取之腸內雷鳴者此氣衰之症用取之多在法式日通及氣衰宜可取
○若已久不可遽取恐作慢驚且調理合也而取此難於積心用取之也
諸成積聚者小兒肥實血氣強壯取次調和取積之○小兒積病其
脉洪大下運血不行瘦不行生久患積疾[illegible]肢冷口禁舌不
食並是死候○積消磨者當以本方丸藥者以與之宜看信用之○小兒
消積多用青皮陳皮消積丸者行之取之○凡有積須辨虛
實虛則補之實則取之古方不問四季合服四味大黃飲子錢氏消小
兒宜服下積丸二者俱不可用大攻治疾不同長短不同寒熱兒白

消兒亦同不同有北方之地不同而又况古今不同豈可一概而論也
大法實者可服進食丸瘦肥白者及消瘦積宜服肥兒丸○風積者
服白青丸子壯熱形瘦也消積者服[illegible]大便黃能食積者能食不
生肌但腹急[illegible]消積者乳食減少時吐哭多涕嗝吐壯熱是乳積
者大誤服[illegible]宜用妙香丸取大抵取積之法只用巴豆
或言取小兒巴豆大小壯者一歲五六丸虛者三四丸用餅子
一枚剪兩孔一寸入于內[illegible]心連[illegible]與兒吃乳食取
下積[illegible]之物只白粥補之此[illegible]取積之藥[illegible]引入[illegible]
則其積取盡後補之[illegible]至補之食[illegible]而食積也

方

五積丸　治一切食積乳積痰積肉積血積[illegible]理氣之劑不
損胃氣有積則消積去則止且積[illegible]化積者先服之以去其積

硇砂仁 二錢　木香 二錢　丁香 二錢　肉豆蔻 三錢　大麴餅 [illegible]
三稜 炮　莪朮 二錢　白茯苓 二錢　[illegible] 麵粉 炒

人參去蘆 白朮 代赭石火煅醋淬 白薑炮各二

麥芽生各分 百草霜炒 巴豆去殼去油

右除巴豆、霜粉另研外，餘味各製為細末，再入巴豆、百草霜拌勻，搗飯為丸，大小隨意，空心白湯吞下，五更服。如取積，未動再服一服。乳飯放過溫食，包與食相拌，吐逆惡心，如止，取食白粥即止。易氏方取虛中積，以熟雞子黃和在丸內與兒食之，立樂取積而食備

消積飲

治脾胃虛冷，不能消化乳食，致成積痢，及治食亂、氣亂虛虛積吐痢，常服調脾進食

縮砂仁五分 陳皮去白 良薑二兩炒 丁香 粉草炙各

茴香炒三 香附子去毛炒 麥芽生 三稜炮 蒼朮各三兩米泔

莪朮煨 厚朴薑製 青皮去白 枳殼麩炒 大麯餅三兩各

右為細末，米湯調入燒鹽，空心服，或冬瓜仁湯下；虛中積，米湯調下。五積丸磨化積滯，以巴豆去殼，以麩炒，研去巴，又麩用硇砂少許，全氣加白薑，治痢木鐘回香湯入生薑下

消積丸

白薑炮 肉豆蔻麵裹煨 枳殼麩炒 三稜炮

莪朮炮 蓬黃炮 蓽澄茄各五 百草霜 陳皮去白

粉草炙 大麯餅 巴豆去油 杏仁去皮尖 青黛各兩

西薑黃煨各兩

右除巴杏另研外，餘為細末，入巴杏拌勻，以清油、蠟化開入藥末，搗千百杵，旋旋作一蠟糖丸，合收，臨用旋丸，空心薑湯下。一云凡用燒丸，取其入於腸胃消化積也

百當膏

治一切積聚，心腹疼痛，年月深久者皆治之，百歲至一歲皆可服

丹砂研 膩粉 黃蠟 水銀 陽起石研

粉霜研 蚵蚾炙末 鉛丹 牛黃 鉛霜研

龍腦各二 巴豆去殼 半夏

右件研極勻，鎔蠟和成膏，旋丸如梧桐子大，小兒如黍米大，每服三丸至五丸，量大小虛實加減服。吐逆，煎丁香湯下；取熟積，生薑蜜水下；取食積，丁香湯下；便利，米飲下

磨積丸

治痢積泄瀉

荊三稜 蓬莪朮 陳皮 青皮 神麯

麥芽 鬱金 胡黃連 雷丸 使君子肉

蘆薈 香附 檳榔

右為細末，米醋為丸，如菉豆大，每服三十丸，糯米湯下。虛弱加木香，虛極加附子，有極加麝香

蘆薈丸

治疳積

蘆薈 史君子 蕪荑 檳榔一个

胡黃連 木香 麝香 龍膽草

硃砂 夜明砂

右焙乾末，用醋糊丸如梧子大，每服十粒，米飲下，常服妙

龍虎丹

治虛中積，泄痢腹痛後重

硃砂研 膩粉炒 粉霜炒 礞石研 丁香研

桔梗 定粉 黃丹 硝石 硇砂各

右研勻，蒸餅心水浸和丸如櫻桃大，大人每服二丸，小兒一丸，米飲下

調中檳榔丸

治小兒食積，長肌膚，益顏色，化宿食，治腹脹，破積聚，和氣

檳榔剉 丹砂研 阿魏 代赭 乳香研

木香 五靈脂炒 肉豆蔻去殼

巴豆去皮心膜出油 蟾頭炙一枚

右研勻細，麵糊和丸如黍米大，每服二丸，生薑湯下，更量兒大小加減。一方有麝香

妙香丸

治小兒虛中積熱，心腹脹滿疼痛

辰砂一兩 牛黃 生龍腦 麝香各一

粉霜 膩粉 蠟二兩 巴豆百二十

右丸如彈子大，量虛實分減，龍腦漿水下，夜半後服，取虛即以龍腦米飲下，每服三丸如小豆，欲藥效速即以針刺令孔，疾堅者加至十丸，皆以針刺作數孔，以行藥力。小兒取積，如菉豆大，治小兒吐逆尤效。此藥最下搐中須負虛積

紫霜丸 治乳食過度，去積

代赭石 杏仁 去皮尖

丁香 陳皮 巴豆 甘草

右末，麵糊丸如菉豆大，每服七丸，飲下。

桂星丸 治小兒食積，中伏，用此藥

積，宜用此藥

陽起石 輕粉 粉霜 白丁香

硃砂

右為細末，湯浸蒸餅為丸如梧子大，每服七丸至十五丸，用服，見角白湯下，非時服，不動臟腑

蟾丸子 治一切積滯瀉痢，或取轉，氣已虛，病來者，大人小兒並宜服之

硇砂 粉霜 巴豆

青橘皮 黃牛 川烏頭

巴豆

醫方類聚卷第一百二十九 四十一

右藥末每一兩用黃蠟二兩，先消，放冷丸如梧桐子大，每服量人虛實五粒，如常經年加至十粒，至七粒，小兒虛積潮熱寒熱亦服，菉豆大三粒，不為下度，凡有冷熱痢，不利先服一服，合瀉不止，或赤白痢，服藥即愈。如痢甚者，三更初一服，五更一服立效。

直珠丸 治小兒久積，化風涎，利膈

直珠末 半夏 巴豆霜 滑石

白附子 天南星

右末，滴水丸如梧子大，每服一丸，二歲者一二丸，加減用葱白湯下

治積，君子湯下

木香丸 治乳積、食積、氣積

木香 蓬莪朮 縮砂仁 青皮 硃砂

代赭石 丁香 川巴豆

右細末和勻，飛羅麵糊丸麻子大，每服二三丸，乳傷乳汁下，飲

傷米飲下，後與大異香散，或和劑異香散亦得。乳積消，宜煎湯下，後與和劑沉氣散

異香散 取積後調理

石蓮肉 蓬莪朮 益智仁 甘草

青皮 陳皮 厚朴

右剉散，每服二錢，水一盞，生薑二片，棗一枚，鹽少許，煎服，鹽湯點，鹽酒調亦可，不拘時服

消食丸 化積

香附子 縮砂仁 橘皮

麥糵 三稜 莪朮 甘草 神麴

右為末，化蒸餅為丸如黍米大，食後溫水下，一歲十丸，加減

會青丸 大人小兒久寒積聚，留飲宿食，天行傷寒，首服之二十日愈，食天行傷寒，所在久病痼疾者，宜服藥，或吐或下，或汗出

醫方類聚卷第一百二十九 五十一

會青 附子 巴豆 朴硝 茯苓 寒水石 大黃

右擣下篩，巴豆、硝石合擣六千杵，次內附子擣相得，次內茯苓擣相得，次內大黃擣相得，次內會青擣相得，次內寒水石擣相得，蜜和擣十杵，大人服如大豆二丸，小兒五歲以下如麻子大一丸，如黍米一丸，如服，清粥，吐下，依服二丸，傷乳服三丸，泄瀉不止服一丸，可至二丸，一方用

分之，水大

七宣丸 療風氣結聚，宿食不消，兼沙石皮毛在腹中，久積年，令如水石，腳氣衝心，煩憒悶亂，頭旋暗倒，肩背重悶，心腹脹滿，胸膈閉塞，風毒氣連及頭面，大便或秘，小便時澀，脾胃氣痞，不能飲食，筋

到七，神丸，服，安，疾

大黃 枳實 木香

柴胡 訶黎勒皮 桃仁 甘草

右為末，煉蜜為丸如梧桐子大，每服二十丸，米飲下，食後或臨臥服

稍增至四十丸取宣利為度量虛實增減兒病歇退即服五補元丸不
問男女老少並可服細量加減

青金丹 治小兒諸積病

滑石末 白丁香 天南星 青黛

輕粉 水銀

川巴豆

右前件藥同拌合用軟飯為丸梧子大巴豆不出油依形證用湯使
下項乳癖吏取積……吞下 取冷患用牛肉汁下 傷風肚中
堅硬面青黑金銀薄荷湯下 因傷有肚中冷腹皮上微熱肚脹
夜啼作熱似瘧又不思飲食面青色 腹脹此般中有積用皂角子
二七粒以水煮過用水一盞煎至半盞下 有積作瀉魚鱗湯下 氣積
炒茴香湯下 凡下此藥周歲十四丸一歲十八丸七歲二十四丸看
大小加減下須是四更初下至天明通下積來量時可依形證使下
藥補之臨與此藥恐先吐下者不妨

絞金丸 治驚疳下積聚

青黛 膩粉 胡黃連 麝香各一分 寒食麵一錢

使君子 天漿子

右研勻滴水丸梧桐子大每一丸用金銀薄荷湯化下

三出丸 去積聚

陳皮去白 縮砂 藿香 荊三稜 蓬莪茂

芫花 巴豆

右丸六味為末次拌巴豆令勻與諸藥拌勻以醋麵糊為丸如菉豆
大朱砂為衣每服三五丸荊芥湯化下乳食後

膽礬丸 治小兒脾積氣肌瘦

石膽礬研 麝香 龍腦研 鹿肝香 丹砂研各一分

黃連末 胡黃連末一分

右同研勻細醋煮麵糊丸如菉豆大每服十丸早晨臨臥温米飲下
更量兒大小加減

抵聖丸 治下虛中積又曾取轉不得者

犀角 蠍梢 鉛末 朱砂

芫花 巴豆

右同為細末并研如麵將巴豆另研如粉和勻以水煮麵糊為丸如
小菉豆大如小兒因驚積聚動者每物在於脾胃早晨取下變成虛
積……下 熱……不開出連甘草……桃仁湯化膩粉一字
許下一歲已上三歲已下二丸……可只一丸米飲下大人與食吐逆
心腹脹滿夜有盜汗日漸羸瘦用甘草湯下婦人血氣米醋湯下五
七丸更看臨時約其虛實加減用之名學金丹

消積丸 治小兒胃積依形證用之

木香 黃連 陳橘皮 青橘皮

京三稜一兩

右為末每藥一錢用巴豆一粒去心膜用醋煮巴豆一個……
豆紫色用杏仁一箇去皮尖燈火上燒留性二味都研用醋麵糊為
丸如梧子大每服五丸七丸十丸薄荷蔥白湯下

木香豆蔻丸 治小兒虛中一切積聚……乳癖大小便
澀滯腹脹行滯氣

木香 白丁香 丁香 輕粉

白滑石 巴豆

右為末研勻湯浸蒸餅丸如麻子大一歲一丸八九歲以上至
十五歲服八丸皂子煎湯放冷下……動者先服……一服
乳癖者加丸數隔日臨臥一服

龍骨丹 取化有餘老兒及初生兒一切虛中積聚取不下日漸
肌瘦

硇砂 硃砂 粉霜 膩粉 白礬

黃丹

右研勻細如粉湯浸蒸餅丸如龍眼核大每服加減大人一兩丸
臨臥陳米飲下……小兒半丸此藥有積則化無積不動小兒半粒
分丸

黎金丹 治下膈取虛積兒積逆風涎

鐵粉 白丁香 膩粉 硇砂 粉霜

巴豆

右研勻用番葱淨者半兩銀器內重湯煮爛入藥杵勻取出放冷作劑旋丸小豆大捏匾每服二粒薑一片細嚼米飲下臨卧並不使攪亦不動氣要利看虛實臨時加減小兒亦可服之

【消積散】 治小兒積食癖氣肚脹等疾

甘草炙 木香 檳榔 青橘皮

陳米 巴豆

右為末每服半錢或一字葱湯調下服後病利下則痊

【桃符丸】 取驚積

硃砂 天麻末 鉛白霜 輕粉二錢 水銀

巴豆

右為末用蒸餅滴水丸如梧子大每服 或吐或瀉 此是驚積以下五丸桃符湯下加減服之

【壓驚散】 治驚心取積

鬱金 辰砂 麝香 乳香 陳皮

巴豆

右為末每服一字看大小加減薄荷湯下

【勝金餅子】 治虛中積

粉霜 延胡索 巴豆霜 輕粉一錢 硃砂

石腦一箇

右為末冷水為餅子如梧桐子大每服一丸皂子湯下大小加減

【大碧丹】 治水癖食癖五積果子毒但是腹中疾並治五積好不消四季服之

光明砂二錢 滑石 膩粉 鉛上硫黃 鷹糞

小巴豆

右為末同研勻入巴豆再研飯丸如黍米大半周一丸一歲二丸量兒大小加減用之春冬溫 秋夏 薄荷湯下如驚風金銀薄荷湯下

【三稜散】 治積氣肚疼

益智 三稜 莪朮 青皮 縮砂仁

甘草炙

右等分為末白湯點下

【草豆蔻散】 治小兒胸中寒氣結聚氣逆不下乳食

草豆蔻三枚 檳榔一分 訶黎勒 人參

前胡一分 甘草炙

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時溫服更量大小以意加減

【鎮心丸】 訣曰小兒心硬病難痊脇下衝心有數般忽即當心一片硬不然分作兩邊安丁香牛黃石膏共天竺生犀丸作丹更入些茯苓并枳殼煎服三粒必心寬

丁香 天竺黃 石膏 生犀 牛黃少許

右為末蜜丸如菉豆大每服二粒春夏枳殼湯下秋冬茯苓湯下

【[illegible]丸子】 治小兒結實不散乳食不消心腹痛

大山甘遂 真珠一分 杏仁 芍藥

右為末蜜丸麻子大一歲兒飲下二丸量兒加減

【柴胡飲】 治小兒自下後得寒熱血結成癖痃在左脇下或寒飲或冷食積聚氣動胸心留熱不下食飲羸瘦宜先服此飲子散氣下食後服紫霜丸去宿積白丸益氣

柴胡 茯苓 人參 白朮 鱉甲

右切如豆大水二升煮五合空心分溫二四服相去如人行一二里久再服務以將息

【北亭丸】 治小兒積聚黃瘦吐食

北亭 馬牙硝 硃砂 膩粉

巴豆

右研勻用研中要令乳去油硬者留少許麵者用水為丸如黍豆大荊芥湯下一歲一丸

【白芷散】 治小兒癖瘕中積及始痃等疾

白芷 硫黃 密陀僧 母丁香 白丁香

右為末每服半錢葱麵湯調下未發時一服取下黑物不用服補藥發時一服如用補只煎醋石榴皮湯下要日二服至日下黑物為効

忌鍋由果子乳母亦忌

〔乳香丸〕取小兒一切積聚[illegible]取下下腹脹[illegible]斯併

乳香　硇砂　半夏[illegible]　巴豆[illegible]

右用大棗一枚[illegible]重封灰火內包熟取出去紙與棗肉同乳鉢

內研為膏若不遍研入少許飛羅麵丸如黍米大每服七丸至三

丸五更用冬瓜子湯下取下元傷物

〔硃砂丸〕治小兒宿熱[illegible]

硃砂　膩粉　[illegible]　雄黃一分　巴豆[illegible]

右為末蒸丸如黍米大一歲一丸[illegible]下大小加減

〔消積丸〕治乳食傷積心腹脹滿氣粗[illegible]

丁香　縮砂仁[illegible]　烏梅肉[illegible]

川巴豆肉[illegible]

右為末研細和勻[illegible]丸麻子大每三丸橘皮湯下

〔三棱丸〕治小兒腹積氣

荊三棱　石三棱　鵝爪三棱[illegible]　木香一分

[illegible]

右五味並生杵羅為末麵糊和丸如麻子大膩粉為衣每服五丸

烏梅生薑湯下量兒大小加減

〔直珠丸〕療小兒疳實結聚痞癖[illegible]不能飲食[illegible]

〔丹砂丸〕[illegible]化胃[illegible]伏積聚

巴豆[illegible]

蓬莪[illegible]　木香　硃砂一分研[illegible]

右同研令細以麵糊和丸如綠豆大每服三五丸小兒一丸酒食

所傷鹽湯下溫水亦得小兒疳氣肚脹腹脹米飲下一切虛塞量

湯下婦人血氣當歸酒下吐酒不止煨薑湯下咳嗽烏梅甘草湯下

水瀉新汲水下赤痢乾薑湯下白痢甘草湯下血痢沒藥湯下一切

疾更酌其虛實用之

〔真珠丸〕治驚風止吐逆腹內有癥癖積聚脹滿

滑石二分　天南星二分　膩粉一分　巴豆[illegible]

右研為細末以糯米粥研為丸如綠豆大若腹內有癥積[illegible]皂

角子[illegible]湯下若有延吐逆用丁香[illegible]湯下

每服一丸至三丸量兒大小加減

〔麥門冬雙丸子〕治小兒[illegible]實結脹

麥門冬[illegible]　杏仁[illegible]　丹砂二分　巴豆[illegible]去

右為末蜜丸黍米大一歲二丸三歲[illegible]丸大四丸一方有真珠

不用丹砂[illegible]湯下

〔聖餅子〕治一切積聚虛中積[illegible]全不[illegible]特

作泄熱[illegible]腹脹不消

輕粉[illegible]霜[illegible]　石燕子[illegible]

延胡索[illegible]

右同研勻滴水和[illegible]大[illegible]一餅子先用熱水

浸軟令發[illegible]下[illegible]不推氣

更臨[illegible]加減若[illegible]入麻砂生龍腦各一錢重小兒

一餅分為四服或便捏成小餅子

〔紅散〕治小兒[illegible]進食面如黃

馬牙硝　硃砂　茯苓　人參等分

[illegible]

右為末二歲服二字一歲一字三歲二字四五歲三字新汲水入

蜜少許調下蜜水調亦可三分

〔五聖丹〕治一切遠年日近酒食所傷[illegible]化冷果食

逐五飲服[illegible]消積塊

大烏梅　巴豆[illegible]　半夏[illegible]　丁香[illegible]

右為細末滴水為丸如麻子大硃砂為衣小兒一兩[illegible]大人每服三

五丸至七丸量虛實加減生薑湯下不計時候

〔聖金丸〕治小兒大人因[illegible]

不下受病遲中積大人喫食吐[illegible]心服[illegible]

[illegible]　犀末[illegible]　硃砂[illegible]

右為末極細用水麵糊為丸如綠豆大用[illegible]湯下七丸婦人[illegible]

飲下五丸至七丸小兒[illegible]甘草[illegible]仁[illegible]

宿滯化膩粉一字許下一歲以上二歲以下三丸小兒只可一丸二

丸

〔牛黃丸子〕治小兒腹積

雄黃（水飛）　硃砂（細研）　膩粉（炒）　巴豆（去皮出油）

右相和，以天南星末酒煮糊為丸，小兒粟米大，大人桐子大，用全蝎薄荷湯下，加減服之。

〔磨刀丸〕取小兒久因驚積滯，食急慢驚風，乳奶不下，作痢作熱，作吐瀉多時不瘥。

全蝎　硃砂（一錢）　粉霜（二錢）　半夏（湯洗七次為末）

右為末，巴豆十四箇，都研不出油，細研，蜜湯浸蒸餅心為丸，入麝香少許，丸如菉豆大，磨刀石水下，一歲一丸，有塵宣加減服，食如上。凡不奶吐瀉，即用驚藥調理，不得更和氣散理渾身有氣。

〔取積青黛丸〕（六歲以上）

輕粉　青黛　膩粉　巴豆

右為末，麵糊丸如菉豆大，每服五丸，米飲化下。

〔五珍丸〕治酒食積，通用

青皮（去穰）　乾薑（炮）　北五靈脂　蓬莪朮

右為末，大知秤每末一兩，用肥巴豆肉，以石壓推去半油，秤一錢研細，拌和，粳米飯丸麻子大，每服三五丸，米湯下，不飢飽時服。

〔蔥湯丸〕治積

巴豆　滑石（五錢）　輕粉

右為末，研飯為丸如粟米大，週歲以下每用三丸，以上四七丸，未効再加丸數，隔上有涎或吐亦無妨，如有虫，用苦楝皮少許，甘草二寸，煎湯五更初先將化蟲藥服了，後用此丸，下當李子蔥湯下，要李蘇鹽湯下，秋冬李蘇湯，冬李蔥白湯下，初生兒以一粒放口中，乳汁下。

〔化癖丹〕治食積，肚硬帶熱，渴瀉或痢，皆因飲食無度，多食易飽，飽後即睡得之。

烏梅（六箇取肉）　巴豆（十二粒去皮）　青皮（去白）　陳皮（去白各五錢）

右為末，水糊丸粟米大，每服七九丸，米飲下，化癖亦消。

〔消積丸〕（方見第二卷）治小兒食積，兒口中氣溫，面黃白，多睡，及乳吐乳，溏泄。乳此由啼哭未已，以乳與兒，停滯不化得之。

縮砂（十二箇）　丁香（十箇）　烏梅肉（三箇）　巴豆（去油）

右為細末，糊丸如黍米大，三歲以上五六丸，已下三二丸，用溫水下，無時服。凡小兒身溫壯，非驚熱之候，大便白而酸臭，為胃有寒，宜丸藥下後，服溫胃藥。若身熱壯，大便黃而酸臭，為胃有熱，宜先藥下後，服凉胃藥，無不效。一方用藿香湯下。乳後一方，加百草霜和勻。

〔三味消積丸〕消積聚

巴豆（去油）　杏仁（去皮尖）　代赭石

右為細末，飯丸如粟米大，每服三五丸至十丸，食後杏仁湯下，無時。兒小者減之。一方巴豆七粒，代赭石二兩，杏人一錢一字。治乳食不消，飲研細丸，多米飲下。

雄黃丸　治取積

雄黃（三錢）　巴豆

右為末，麵糊丸如菉豆大，加減服，每五丸，空心茶清下。

〔槐散〕治果子傷積

白丁香　輕粉　官桂（去皮各三錢）

右為末，冷水調下，米飲時服，未取下，所傷物果，皇功散蒸餅。

大人加湯調三服，如糸。

〔木香散〕治小兒諸般氣積，或氣結不通，此藥立取下

木香　陳皮（二錢）　巴豆（五粒去心膜）

右將陳皮、巴豆同炒黃色，只取下巴豆五片，餘不用，與前木香末同研勻，每服半錢或一字，陳米飲下，若吐瀉，飲湯煎香附子湯下，大小加減。

〔青黛丸〕治小兒疳，好驚風，消奶食，痃癖積聚，瘡

青黛（一分）　牽牛末（三分）　膩粉（一錢）

右為末，麵糊為丸，米飲下。

〔靈砂丹〕治久不止，神効無比

硇砂（一錢細研）　有齒壁者一分，細研

右二味，細研，先於盞內研成汁，入去皮巴豆取三七粒全者，為度，入前二味共研勻於

黃蠟內三分中取一分再溶成汁傾藥末內手攪令勻剖出於瓷合
內收之每服[illegible]三丸如菉豆大[illegible]三五口
就後吞下水為令水吞下如取積並服三丸如梧桐子大[illegible]
為效〈令吞下搐動〉後其又積藥隨積下其小可不動便安

〈觀音丸〉 一切[illegible]積下痢[illegible]後重[illegible]服
石燕 砒[illegible] 研 石灰 粉霜 一錢研
右同研勻用蒸餅和作小餅箇子方圓二寸半厚二分許以藥末鋪
在兩片餅子上摺子地[illegible]三四寸其上以瓦盆蓋用火燒令極熱勿
害其火[illegible]熱火三兩炷放在四六置單扇于在四大上多用瓦盆蓋
五炷以同[illegible]細上[illegible]又三[illegible]候冷取出以手
捏試藥足[illegible]可燒時須用好炭火即不致燒藥如兩炷徹火即
也如大餅即再蒸大燒之及兩炊飯久候藥冷即開取出[illegible]
上有[illegible]研細為一處皆下研細令細見[illegible]得同研大上[illegible]
入蒸餅丸錢散將一錢再蒸研令勻水浸[illegible]如菉豆大大人
每服十丸至十五丸乳香湯下小兒三五丸如[illegible]可一兩日方[illegible]
得利下也

〈治小兒瘦〉
獨附[illegible] 一兩 白芷 等分
右為末時[illegible]入麝香[illegible]同白芷[illegible]
中用半錢男用上[illegible]女用下[illegible]同用[illegible]

〈蘇感丸〉 治氣積腹脹[illegible]
劑之治小兒口鼻中出[illegible]氣香[illegible]
去腐消食積下痢
蘇合香丸 感應丸 各等分
右和丸如粟米大紫蘇湯下二十丸一方灸薑湯空心下

〈消氣和胃消積〉
縮砂 香附子 平胃散
右細合每服一錢蘇薑湯下 多服尤妙

〈治小兒積滯腹〉 食傷等症
用芫花末服者反時[illegible]炒去枝梗用和淡米湯或[illegible]

藥面上鋪高一指[illegible]取[illegible]起當[illegible]鐵針[illegible]以[illegible]之不住
手攪拌水脉斷[illegible]以藥器盛之食[illegible]出青痰[illegible]者不用[illegible]
用手[illegible]者即浴乾為細末即以毛皮[illegible]藥醋可取[illegible]為丸如粟米大
每服三二十丸未飲下不拘時候一時許進[illegible]一兩行即止甚
快[illegible]者[illegible]更作一如[illegible]大者[illegible]入酒令 所[illegible]
[illegible]者用[illegible]打[illegible]湯下打[illegible]
丸散量[illegible]重[illegible]服之[illegible]大[illegible]皆[illegible]
了[illegible]一日[illegible]

〈青礞石丸〉 治小兒[illegible]積[illegible]不能飲食
[illegible]食積[illegible]皆治之
青礞石 木香 乾薑 一兩
皂角 [illegible] 丁香 各半兩 巴豆
右為細末蒸餅為丸如黍米大週歲兒每服十丸溫生薑湯送
下乳食後

〈三棱丸〉 治停積不散腹脹[illegible]全不入食
荊三棱 四兩 木香 神麯 炒 陳橘皮 去白
半夏 [illegible]
右為細末麵糊為丸如黍米大每服十丸至二十丸溫生薑湯送下乳食後

〈磨積丸〉
三棱 蓬朮 青皮 陳皮 青礞子
木香 檳榔子 牽牛子 炒 神麯 麥芽
檳榔 各等分
右為末糊丸如黍米大[illegible]湯下

〈丁香脾積丸〉 治一切積氣腹脹堅脹不進飲食
皂角 青皮 半兩 三棱 二兩 莪朮 二錢 丁香 半兩
砂仁 半兩 麥芽 一錢 青黛 一錢 巴豆 三七粒出油
右為末[illegible]肉[illegible]為丸空心飯飲吞下[illegible]三服[illegible]
如麻子大

〈三棱煎丸〉 治腹中有積頭痛不進飲食
三棱 莪朮 芫花 [illegible] 南木香 三錢

烏梅肉[illegible]　丁香二分
右為末醋糊為丸如菉豆大每服二十丸飯飲呑下亦能長肌肉[illegible]
紫霜丸　治癖中堅積作疼[illegible]大彭脹[illegible]
雷丸二錢　甘遂二分　粉霜[illegible]　滑石二分　白膠香一分
輕粉半分　芫花[illegible]　青黛一分　水銀[illegible]
右為末研勻搗成丸如麻子大未匝者週月數與之半歲不可用如
驚或[illegible]痞金服[illegible]荷為下或急白為下三歲二十丸痞度五十丸盡
身乳[illegible]毛髮黃壁用淨洗[illegible]新布為下痞癖腹大為使如前一日止
可兩服不可連進五六歲常服五十五丸用[illegible]沫如利去痞積如未
盡且如一二服積盡而[illegible]白眼但[illegible]白粥補之不可用甘草藥胡[illegible]
成相反忌葷物一月為妙
延胡索散　治氣積食成塊及[illegible]積腹痛
延胡索　茴香炒　甘草　蓬朮各三分
右㕮咀每服一錢水五分煎至二三分温服如取後揚[illegible]一切冷痛
並宜治之
胃[illegible]丸　治積水驚水飲水多停積於脾脹[illegible]而氣
赤小豆　陳皮　蘿蔔子　甘草炙　木香各一分
右為末用神麴末麥糊為丸如菉豆大每服十丸薑湯送下
麻仁丸　破氣消積心腹痞塞並能治之
麻仁[illegible]　芍藥八分　大黃[illegible]　枳殼八分炒　厚朴[illegible]
杏仁[illegible]
右為末蜜丸如菉豆大每服十丸温水呑下
外宣藥　治小兒積氣腹大如吹氣塞痞滿
郁李仁一分　巴豆[illegible]　烏梅[illegible]　皂角炙　桃膠二分
朴硝少許　檳榔[illegible]　枳殼[illegible]
右為末煉蜜令稠入藥搗成分如棗核入大腸
荊芥湯　治宿[illegible]閉不通臟腑痞結
枳殼　大黃　荊芥　朴硝　梔子
甘草各等分
右為末每用一錢燈心湯調服立下日與二兩三服

㓜幼聖餅子　白癖積
陳皮[illegible]　巴豆[illegible]　廣茂炮　荊三稜炮
香附子[illegible]
右為細末打麪糊為丸如菉豆大捻作餅子每服三十餅温水送下
橘皮丸　治癖積堅硬不消
橘皮一兩　巴豆[illegible]
右將橘皮剉碎同巴豆炒令重黃色為度揀去巴豆不用只將橘皮
為細末用軟飯爛研為丸如菉豆大每服二十丸温湯生薑湯送下
食前量小兒歲數旋丸大小
廣茂潰堅丸　治小兒癖積腹脹喘[illegible]可思飲食
青皮　陳皮　廣茂炮　木香　烏梅
三稜[illegible]　大黃[illegible]　巴豆[illegible]
右為細末麪糊為丸如麻子大每服五七丸至[illegible]米飲湯送下量小兒
大小為丸加減服之食遠服
六味三稜丸　錢明仲云五六歲月小孩兒未與食有癖積者[illegible]
每丸大量只服此六味為佳
莪朮[illegible]　三稜[illegible]　神麴炒　麥蘗炒　青皮
陳皮
右等分為細末水煮清糊為丸熟水下
丁皮散　治小兒脾積疼痛有效
丁皮　白朮　茯苓　青皮　陳皮
良薑　縮砂　神麴　麥蘗　甘草
真桂心
右各等分為末飯湯[illegible]點服
蘇紅丸[illegible]　專磨積殺諸蟲進飲食神効驗無問男子婦人小兒
並[illegible]虛實加減服之有孕婦人不可服
乾漆[illegible]　紫芫花[illegible]　巴豆[illegible]
斑猫[illegible]
右為[illegible]末米醋打麪糊為丸如小指頭[illegible]子大每服一丸紅紙包紅線
繫定[illegible]下來亦此丸為[illegible]紅丸每服一丸間後藥服之

南木香　雷丸　荆三稜生　百部微炒　廣茂生

貝母　檳榔　大黃生　史君子仁

牽牛子

右為細末，外用皂角肥者一十鋌，捶碎，山茵蔯一兩，剉，苦楝根皮二兩，剉，水四五碗，慢火熬，銅內熬至一小碗已上，藥搜和為丸，如小綠豆子大。小兒粟米大。每服二錢，半量各各從證，改引子湯送下。但服此藥至五更，雞鳴服之，追一切惡蟲生硬，蠱毒吐之。此方與諸方甚異，辛母忍為丁吃呷[illegible]，煎桑白皮湯送下○取寸白蟲，煎石榴湯送下○蚘蟲，苦楝根湯送下○腳氣腫不能行，安息送下，木香湯亦可○酒痢，酒蒸百草霜煎湯送下○大小便不通，[illegible]湯送下○婦人血氣病，煎艾葉湯送下○婦人血脈不行，蘇木紅花湯送下○小兒一切諸證，蜜水送下，少綠水亦可○腸風下血，山梔子煎湯送下○食積氣塊諸證，並可以蜜水，沿萊湯送下

傷飽附論

凡小兒傷飽候，小兒食不可過飽，飽則傷脾，脾傷不能磨消食，食[illegible]兒四肢沉重，[illegible]面黃腹大是也。又小兒食不知飽，候小兒有乳食，食已仍不知飽足，又不生肌肉，其肚腹大，其大便數而多泄瀉，為治此脾胃不守故也。

方

檳榔散　治小兒傷飽太過，脾氣積聚，面色赤黃，手足俱熱，心腹脹悶

檳榔　枳殼　人參　川大黃

赤茯苓　神麴　陳橘皮　甘草

麥蘗

右件搗羅為散，每服一錢，以水一小盞，入生薑少許，蔥白二寸，煎至五分，去滓溫服，日三四服，更量兒大小以意加減服

前胡散　治小兒傷飽，心腹滿悶，不能乳哺

前胡　檳榔　川大黃

赤茯苓　沉香　訶梨勒皮　木香

甘草

右搗為粗羅散，每服一錢，以水一小盞，入生薑少許，煎至五分，去滓溫服，日三四服，更量兒大小以意加減

赤芍藥丸　治小兒傷飽，心腹妨悶，或下或痛

赤芍藥　柴胡　赤茯苓　訶梨勒皮　檳榔

川大黃　鱉甲　桂心　木香

右為末，煉蜜和丸，如菉豆大，每服以粥飲下五丸，日三四服，更量兒大小以意加減

大黃丸　治少小傷食，若飽卧失衣，當風受涼，地其為病，腹大腸脹，時寒熱，如吐如疟，狀又如霍亂動作，將利腸出膿血

大黃　黃芩　人參　桔梗　杏仁

芎藭　半夏　黃芩　葶藶

右為末，蜜為丸，小豆大，一丸，日進三服，白湯下

半夏散　治小兒哭食太多，傷脾，即不食，吐逆

半夏　黃葵子　防風　遠志　款冬花

桂心　前胡　乳薑

右五搗為散，空心米飲下一錢服之，立效。乳母不可服

芍藥丸　療四五歲兒，因食及在胎中宿熱，乳母飲食[illegible]，乳汁不起，兒喫不為肌膚，心腹痞滿，萎黃，羸瘦，四肢痿躄，[illegible]充悅

芍藥　黃耆　鱉甲　人參　柴胡

茯苓　甘草　乳薑

右搗篩，蜜和丸如大豆，服五丸，日二服，忌如常法。一方有大黃，無黃耆，云服一丸，一歲以上乳服三丸，七歲兒服十丸，日二服

芍藥丸　治傷飽羸瘦，不生肌肉，乳食

芍藥　柴胡　大黃　桂心　茯苓

乳薑　鱉甲

右為末，蜜丸，一歲兒以乳吞小豆大三丸，日三服

木香散　治小兒乳食過度，腹中脹滿

木香　鱉甲　牽牛子　川大黃

射干 赤茯苓一分
右搗羅為散每服以溫熟水調下半錢被後再服更看兒大小以
意增減服之
調脾丸 治小兒脾疳腹虛羸
丁香 半夏九箇湯洗 巴豆九箇[illegible] 胡椒九箇
右為細末棗肉為劑入甲中杵一千五百下為度如粟米大溫湯米
送下食後每服一丸如胸膈不和煎生薑湯下渴瀉氣薑湯下如脾
大者冬寸湯下如嘔吐粟白皮湯下
治小兒食不知飢飽
用鼠屎二七粒燒為末服之

宿食不消附論

夫小兒脾胃嫩弱飲食易傷若將養失宜乳哺不節致脾胃不能傳化
水穀之氣故令乳食宿滯停留不消其候腹滿壯熱脹滿不安或發虛
熱候溫者乳不消也○經云人以胃氣為根本而以飲食為命胃為
市中乃土也胃受土氣之氣磨除萬物茲積日食入胃而脾為磨化而
五味以養五臟除養百骸謂津四散則其根本也乘久日胃氣調和則
乳哺消化脾胃虛冷則宿食不消病成日驚湯不食者心為脾母火衰
生土宜以心藥入脾胃藥中每服令子壯右人進食方用益黃等散
也○小兒宿食不消身體發熱或多吐瀉宜用水精丹利之卻不補藥
調理如身上熱不退瀉不止仍發為心躁宜進玉珍散二三服如更不
退更進銀延散一二服卻將調胃氣藥相間服若只以清水宜用曲麵
丸二三服○錢一論宿不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之
金箔丸 方 治小兒驚風傷食不化或外風傷 全蝎 並一切諸疾
悉皆治之
金箔[illegible] 硃砂水飛 水銀 牛黃 青黛各研
白殭蠶[illegible] 麻黃[illegible] 白附子 天麻[illegible]
麝香別研 犀角 [illegible] 乾蝎 天南星炮 膩粉研
右於乳鉢內研令勻細用生蜜和為錠子以油單子裹每服
二丸梧桐子大薄荷汁化下傷寒用生薑薄荷湯化下小兒諸疾無
不効
胡黃連丸 治小兒驚癎化涎消食
胡黃連 牛黃 硃砂 麝香少許 蘆薈細研
青黛 釣藤炙 貫仲 膩粉少許 [illegible]
香圓 天竺黃細研
右為末麵糊為丸如粟米大每服三丸至五丸如有驚食只取下食
如無不動
牛黃膽丸 治少小病實并熱食不消化中忌杵氣宜治之
方見本門諸病論
代赭丸 治小兒驚熱腹脹宿食不消積聚瘦弱
代赭石[illegible] 丹砂別研 麝香細研 犀角[illegible] 大黃[illegible]
牛黃[illegible] 當歸[illegible] [illegible] 巴豆[illegible]
枳殼[illegible]
右件藥先末為散入巴豆再同研勻煉蜜和搗一二百杵丸如麻子
大二三歲兒空服熟水下二丸四五歲兒已上量大小加之
丁香丸 治小兒宿食不消心腹虛脹
丁香 木香 乳香細研 雄黃細研 青橘皮[illegible]
訶子[illegible] 肉豆蔻[illegible] 檳榔[illegible] 巴豆霜[illegible] 硫黃細研
硃砂細研水飛
右為末入研藥同研令勻煉蜜和丸如黍米大每服以粥飲下三丸
量兒大小加減服之
九味當歸湯 療小兒宿食不消發熱
當歸 甘草炙 芍藥 人參 桂心
黃芩 乾薑炮 大棗五枚 大黃二分
右藥切以水一升半煎取六合去滓分服增減量之
真珠丸 治小兒驚熱化痰涕除食滯運利大腸
真珠[illegible] 天竺黃[illegible] 白珠砂[illegible] 丁頭代赭[illegible]
麝香[illegible] 杏仁[illegible] 巴豆[illegible]
右為細末研令勻煉蜜為丸如黃豆大每服以生薑湯下一丸三歲

以上加減服之

快膈育食丸 紋以宿實壽

縮砂仁　橘皮炒　荊三稜　蓬莪朮炒　神麴炒

麥蘖炒　香附子　甘草炙

右為末麵糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減一方無甘草

三稜丹　調治無宿食

荊三稜炮　神麴　木香各一　乾薑半兩　半夏一兩

丁香　陳橘皮去白　桂心各半

右為細末煉蜜和如雞頭大每服一粒薑湯化下

消膏丸　治小兒宿食不消體熱多服嘔氣上

陳麴炒　木香　人參　乾薑炮　麝香研

甘草炙剉　枳殼麩炒

右各等分搗研為細末煉蜜為丸如黃米大每服二十丸至米飲下

犀角丸　治小兒宿食不消腹脹喘止痰逆調乳進乳食

犀角屑　青橘皮炒去白　荊三稜炮剉　木香各半　黑牽牛炒三

巴豆去心膜出油　皂莢三挺不蛀者

右搗六味為末與巴豆研勻麵糊丸如麻子大每服七丸至十丸食

後生薑橘皮湯下量兒大小加減

平胃丸　治丈夫小兒食實不消胃氣不調或壯熱結大小便不

利者有病令者服露宿丸熱藥後宜進此丸調胃

大黃二兩　小草　甘草炙　芍藥　葶藶熬

芍藥一兩　杏仁去皮尖

右為末蜜丸飲服如梧子五丸日三一歲兒二丸漸加之千金翼有

菖蒲當歸乾薑茯苓麥門冬細辛無杏仁為十二味

訶梨勒散　治小兒宿食不化少欲飲食四肢消瘦腹脹多服

訶黎勒皮三分　白朮　麥蘖炒令微黃　陳橘皮去白

紙煨　檳榔　甘草炙微赤剉　人參去蘆頭

右搗羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大小加減

溫服日四五服

代赭丸　治小兒宿食不消壯熱腹脹

代赭煅研　當歸剉炒　烏梅肉微炒　枳殼麩炒　木香各半

麝香細研　巴豆霜半分

右搗羅為末入研了藥更研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲

下二丸更隨兒大小以意加減

黃芩散　治少小腹大短氣有進退不安穀為之不化

黃芩　大黃　甘草炙　麥門冬去心　芒硝各二

石膏一兩　桂心八銖

右切以水三升煮取一升分為三服一歲已上為五服

麝香安中丸　治小兒飲食不化寬止吐

甘松葉去土二兩　益智　香皮　香附子各三　蓬莪一兩

南木香半兩　麝香一錢

右除麝別研外餘藥同為細末白麵糊為丸更用生麝熟白少許一

處和劑量兒大小丸如黍米大每服二十丸至三十丸薑湯下不拘

時候

[illegible]香丸　治小兒滯氣開胃進食

木香　人參　白茯苓　青皮　陳皮各去白

肉豆蔻已上各　荊三稜炮一兩

右為末麵糊丸麻子大每服十丸薑湯下

七味進食丸　常服消進飲食有見本門消癖結脹篇

三稜散　健脾去消食化積

三稜炮　莪朮炮　益智仁去殼　甘草炙　神麴

麥蘖　橘紅各五

右為末白湯下

香朴散　治小兒脾胃氣弱乳食遲化宿昔成積久而不消兼和氣

止嘔吐泄瀉脇肋刺痛延止疼痛不思飲食

厚朴去粗皮生薑汁炙　木香　麥蘖炒　陳麴炒

青橘皮去白各一分　陳橘皮一兩去白

右為細散每服半錢湯調下

陳橘皮散　治小兒宿食不消心腹脹悶亦治嘔逆惡心胃寒腳冷

陳橘皮湯浸去白　高良薑剉　人參去蘆　檳榔各一分

白茯苓　甘草（炙微赤剉）
右擣篩為散每服一錢以水一小盞入生薑少許棗一枚煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服
積術丸　治小兒宿食不化壯熱有時
檳榔　牽牛子（微炒）　川大黃（剉碎微炒）　乾薑（炮裂）
枳殼（麩炒微黃去瓤）　甘草（炙微赤剉）
右為末煉蜜和丸如菉豆大每日空心以溫水下五丸微利再服更看兒大小臨時增減服之
人參丸　治小兒宿食不消吐痰逆亦治乳食後乾嘔食少
人參（去蘆一兩）　丁香　乾薑（炮）　白术　陳橘皮（湯浸去白）
半夏（湯洗七遍去滑）
右為末煉蜜和丸如麻子大每服以溫水下五丸日三服量兒大小以意加減
褊銀丸　歌曰壯熱時時又作寒都緣食作不多安早求洗肺消積兒心似火煎白术桔梗橘皮豆蔻細和合去須逆水銀丹入生摩粒神丹病來痊
白术　桔梗　陳橘皮（各一錢）
犀角（鎊）　巴豆（二十一粒去皮）
右為末蜜丸小豆大綠金錢薄荷水研下一丸
玉珍散　治嬰孩小兒乳食不消腹脇有癖驚啼驚積
滑石（白者）　石青　甘草（炙）　白附子　白殭蠶（直者）
輕粉（半分）
右為末入腦麝各少許每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲一錢麥門冬熟水調下如渴為烏梅湯調下驚癇心湯調下小兒氣粘者
腦麝（真）　種少許
千金丸　治小兒食不消
木香　烏梅　肉桂（各一兩）　硇砂（半錢）　胡椒（半分）
巴豆（三十粒去油）
右為細末稀糊為丸菉豆大每服十丸或十五丸紫蘇湯下
挨積丸　治小兒脾胃不和宿滯不化腹脹腸鳴嘔逆惡心便利不調乳食減少或痢瀉積瀉大便酸臭亦治丈夫婦人胸滿不快酒積食積嘔逆惡心吐瀉脾疼
荊三稜（炮）　丁皮（各二兩）　丁香（不見火）　青皮（去白一兩）　乾薑（炮）
巴豆（去皮膜半兩）
右為細末入巴豆拌勻麵醋糊為丸如粟米大每服五十丸至六十丸二歲兒可服七丸至十丸生薑湯吞下熟水亦得不拘時候更量兒歲數加減與之此藥不用大黃硇砂水粉之類並是溫性之藥常服消積滯進乳食退黃和長肌
芍藥丸　治小兒不生肌膚腹大食不消化
芍藥（二分）　柴胡（去苗）　大黃（剉炒）　桂（去皮）　赤茯苓（去黑皮各）
右末煉蜜和擣三二百杵丸如麻子大五六歲兒空腹米飲下三丸日再服量兒大小加減
人參湯　治小兒胃氣虛宿食不消吐利
人參　赤茯苓（去黑皮）　白术（各半）　甘草（炙）
右麁擣篩每服二錢水一盞生薑二片煎至五分去滓溫服不計時候日三量兒大小加減
牛黃丸　治小兒宿食乳不消腹痛驚啼
牛黃（二錢）　附子（炮裂去皮臍）　真珠
杏仁（去皮尖）　巴豆（去皮）
右五味擣附子真珠為末下篩別擣巴豆杏仁令如泥內藥及牛黃擣一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之膈上下悉當微轉藥丸全出者病愈散出者更服以藥丸全出為度
青木香丸　治大人小兒寬中利膈行滯氣消飲治胸膈噎塞腹脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食
木香（二十兩）　補骨脂（炒）　蓽澄茄（四十兩）　黑牽牛（二百四十兩炒香別擣取末一百二十兩）　檳榔（酸粟米飯裹濕紙包火中煨令紙焦去飯）
右為細末入牽牛末令勻漸入清水和令得所丸如菉豆大每服二

十丸茶湯氣水任下食後服每間食後可服五丸七丸小兒一歲服
一丸懷姙婦人不可服
進食丸 安和脾胃消化積滯止逆嘔吐利除心腹脹滿刺脇膈
散滿痞常服
丁香一錢 肉豆蔻二個 木香半錢 巴豆 五靈脂七錢
右為細末麵糊為丸如菉豆大每一歲一二丸食後生薑湯下桃[illegible]
湯下亦得一方用陳皮湯送下
磨積丸 治小兒臟腑怯弱內受積冷胸肋脹痛嘔吐痰逆腸鳴泄
瀉日夜頻併四肢困倦面無顏色肌肉消瘦不進飲食及痢氣疳癥生
大青筋口乾煩渴小便白濁食不生肌或發虛腫寒熱往來或因食甘
肥蟲動作痛叫天合眼並能治之
乾漆炒 丁香各一 青皮去白 荊三稜煨 蓬莪朮半兩
右為細末水糊為丸如黍米大每一二歲兒可服五丸淡薑湯吞下
不拘時候更量歲數虛實加減與之
順氣丸 一名異氣丸 治小兒乳食不化腹急氣逆

巴豆 去皮 胡椒 丁香 青橘皮
右用黍米一升 候爛熟取出焙乾為末爛飯丸如黍米大每服二
丸米飲下更量兒大小加減
延年草 安神寧氣消食益脾老人小兒皆可服
青皮 新粕上 茴香 甘草 上等白鹽花
右用河水一斗同藥入金鍋內數不住手攪勿令着底
器中仍不得走氣候水盡取出慢火炒令乾不得有焦氣
者一人專主之去甘草茴香不用只取陳青皮如傷生冷果實
之類細嚼數片即消常服一兩片
白芷丸 治小兒服食與乳食
白芷 檳榔一個 青橘皮 巴豆
右為末同研麵糊為丸如粟米大溫水下三丸至五丸常服

三味[illegible]丸 治小兒乳食不消
五靈脂丸 治小兒宿食不消心腹脹悶
五靈脂 代赭石 巴豆霜
右為末入巴豆霜同研令勻用麵糊和丸如黍米大每一歲以溫水
下一丸加至三丸
洗心散 治小兒蘊食
甘草生 麥門冬
右爛杵不羅每服二錢水一盞煎至八分 五服
肉豆蔻散 治小兒宿食不消
肉豆蔻 川大黃
右持羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三服
更隨兒大小以意加減
鵝子方 治少小兒食不消腹滿不利
鵝子 亂髮
右取服鵝子十枚髮上反數捻之令汁出取服量兒大小與之無
得下

白龍丸 治嬰孩乳食不消瀉不止
白龍骨 白石脂各一
右為末滴水丸如菉豆大每服三丸紫蘇木瓜湯吞下一日二服量
兒大小加減
治小兒心腹脹滿痞氣傷食痃癖腸痛不轉
青州棗一箇 巴豆一粒
右巴豆安棗內慢火炙令焦黑乳缽細研入麝少許用少飯丸如麻
子大一歲一丸如傷食用熱米飲下如瀉用冷熟水下忌生冷甜膩
熱物
銀涎散 治嬰孩乳食不消發渴心躁
用粉霜不拘多少入乳缽令研極細每服嬰孩一字四五歲以下半
錢煎蓮花湯下冬月以蓮肉煎湯下
木香化滯丸 治小兒宿食不消心腹脹悶嘔吐壯熱
木香 荊三稜 青橘皮去白 五靈脂二兩

黑牽牛半生半熟取頭末各等分

右為末，麵水和丸如菉米大，每服一二十丸，温水下，不拘時候。

紫霜丸　治乳食宿滯不化，胸膈不利，嘔吐惡心，便利不調，大便酸臭，重傷乳食，或作諸病

代赭石火煅醋淬　赤石脂各一兩　杏仁去皮尖麩炒五十粒

巴霜一錢

右除杏仁巴霜外，為細末，却入杏巴研勻，水煮糊丸黍米大，每五七丸，温米湯下

發痛湯　治小兒痛病，皆由乳食不勻，不能消化而成

三棱　蓬朮　青皮　陳皮　藿香

川芎　白芷　甘草炙各等

右為散，每二錢，生薑二片，棗一箇，食前，斷斷與服

三棱煎丸　治小兒食飲過多，痞悶疼痛，宿食不化，久而成痞也。此藥尋能治婦人血積血塊

廣茂煨　荊三棱各二兩醋煮　大黃去皮八兩

右將大黃為末，於銀器內或砂石器內，以好醋漬令平，用慢火熬，可以二味為丸，如麻子大，或菉豆大，每服十丸至二十丸，食後温水送下，量人加減，大人如梧桐子大，每服四十丸

廣茂化癖丸　治乳食不消，心腹脹滿，壯熱喘麄，嘔吐痰逆，腸鳴泄瀉，米穀完出，下痢赤白，腹痛後重，及食癥乳癖，痃氣痞氣，並皆治之

代赭石火煅醋淬　當歸炒　硃砂細研

廣茂炮　木香一兩　麝香細研　巴豆霜一錢　荊三棱炮　枳殼麩炒

右為末，入研藥勻，麵糊為丸，如麻子大，每一歲兒服二丸，米飲下，更看虛實加減服之，食後

荊蓬朮丸　治小兒一切所傷，乳食不化，心腹脹滿，並宜服之，常服和胃氣，進乳食，久服甚有功效

荊三棱煨　廣茂煨剉　陳皮去白　香附子炒　蘿蔔子炒

青皮去白　枳殼麩炒　縮砂炒　胡黃連　藿香各一錢

胡椒二錢

右為細末，麥麵糊為丸，如菉米大，每服二十丸，加至四五十丸，温米飲湯送下，三四歲麻子大，日進二三服，忌生硬冷物

腹脹

夫小兒腹脹者，是冷氣時於臟腑故也。小兒臟腑軟弱，有風冷邪氣客之，搏於臟腑，則令腹脹。若胃虛冷，移入於胃，食則不消，若脾虛，冷氣乘之，則更下痢也

方

鱉甲散　治小兒肚脹，漸瘦，不食，四肢熱，不調

甘草炙　鱉甲炙　柴胡　茯神　子芩各六

訶梨勒皮炒　檳榔　芍藥　橘皮各二　生薑

當歸炒四　知母五分　大黃一分

右切，以水一升半，煎取七合，分為散服，得瀉病痊

茯苓湯　治小兒腹虛脹，脾氣不調

赤茯苓去皮　黑犀角　赤石脂　黃連去鬚　龍骨

厚朴薑汁炙　陳橘皮去白　人參　乾薑炮各等分

桂去皮　甘草炙各等分

右為末，每服一錢，水一盞，煎至四分，去滓温服，量兒大小加減。一方去龍骨，加麥門冬一兩

調中丸出林氏方　治小兒久傷脾胃，腹脹

乾薑　橘紅　白朮　茯苓　木香

縮砂仁　官桂　良薑各等分

右為細末，糊丸如麻子大，每服二三十丸，食後熟水下

訶梨勒丸出聖惠方　治小兒脾虛腹脹，不能乳食

訶梨勒煨用皮　人參去蘆　白朮

乾薑　甘草炙各一錢　木香　厚朴去皮薑汁炙　生薑

陳橘皮去白

右為末，煉蜜和丸，如麻子大，每服以粥飲下五丸，日三四服，量兒大小加減服之

調中丸出聖惠方　治小兒陰氣乘心，腹脹滿

木香散出聖惠方　治小兒心腹虛脹

木香 川大黃剉碎微炒各二分 陳橘皮湯浸去白瓤焙
益智子去皮 甘草炙微赤剉各一分
右件藥搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓
不計時候量兒大小分減服
赤茯苓散方 治小兒心腹氣壅脹滿不能乳食大小便澀
赤茯苓 木通剉 人參去蘆頭 甘草炙微赤剉 當歸剉微炒
一分 川大黃剉碎微炒 枳殼麩炒微黃去瓤
右件藥搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫
服量兒大小以意加減
白朮湯方 治小兒腹脹虛羸不能食
白朮 人參 甘草炙 枳殼麩炒 當歸剉微炒
[illegible]
右件藥搗篩為散每服一錢以水七分煎至四分去滓分溫二服量
兒大小加減

消氣丸 治小兒腹脹
硇砂細研 阿魏 胡椒各半兩 丁香一分 木香一兩 檳榔
右為末入研藥令勻以粟米飯和丸如麻子大每服以薑湯下五丸至七丸
香連散 治小兒腹脹冷氣攻痛
黃連去鬚微炒 人參 甘草炙 當歸剉微炒 桂心
良薑剉
右細剉如麻豆大每服一錢以水七分煎取四分去滓溫服
丁香散 治小兒脾胃虛冷腹脹四肢不和乳食減少
丁香 桂心 人參去蘆頭 白朮各一兩 陳橘皮湯浸去白瓤焙
數炒 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟
右件藥搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許棗一枚煎至五
分去滓溫服日三四服更量兒大小以意加減服之
鱉甲散 治小兒心腹氣壅脹滿不能乳食大小腸氣澀
鱉甲塗醋炙令黃去裙襴 赤茯苓 青橘皮湯浸去白瓤焙
枳殼麩炒微黃去瓤各一分 川大黃剉碎微炒 川朴硝各半兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫
服量兒大小以意加減
橘紅丸 治小兒胃虛脹滿
陳橘皮湯浸去白瓤焙 胡椒 黑牽牛子半生半炒 木香一分
巴豆去皮心研紙裹壓去油
右除巴豆外為細末用生薑汁丸如黍米大每服三丸至五丸蘿蔔子
湯下乳食後臨臥服更量兒大小加減
縮砂散 治小兒腹脹手足虛腫精神昏悶不欲乳食
縮砂仁 木香 丁香
牽牛子微炒 膩粉一錢
右搗羅為散每服一字以溫水調下
蘿蔔子丸 治小兒腹脹氣急不可食一方以胡椒湯下 [illegible]
服之
蘿蔔子 青皮 皂角 黑牽牛子半生半炒
右等分為末糊丸如小豆大三歲三十丸米湯下

桂枝橘皮湯 治嬰孩少小五六日不食氣逆喘滿
桂心 橘皮 薤白 黍米 人參各等分
右切以水七升煮取二升以下薤米米熟湯成去滓稍稍服
豆蔻散 治小兒胃虛腹脹
肉豆蔻去殼 木香一分 粟米一合
右將粟米同巴豆三七枚炒巴豆焦黑去巴豆
不用 為細散每服半錢生薑湯下更量兒大小加減
積氣丸 治小兒腹脹
巴豆 丁香二錢 木香一分 麝香半錢
右為末麵糊丸粟米大每服三丸煎萊菔子湯下乳食後服更量
兒大小加減
快肚丸 治小兒脾氣腹脹
乾薑 木香 巴豆
右為末麵糊丸如小豆大三歲三十丸米湯下 食前 [illegible]
木香止用一分去殼

地黃散 治小兒心腹痛食不下
生地黃汁 生薑汁各三[illegible]
右相和調勻分溫服之以利為度
前胡散 治小兒心腹氣脹悶痛煩滿
前胡 丁香 甘草 炙微赤 人參 去蘆頭各一分
右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服
量兒大小以意加減
治小兒腹內氣脹滿不下飲食
川大黃 微炒 木香 青橘皮 湯浸去白瓤焙
檳榔 各一
右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫
服以利為效量兒大小以意加減
人參湯 治小兒心腹脹滿不下乾嘔不止
人參 陳橘皮 各一分 甘草 炙半
右件[illegible]六歲兒每服一錢水七分生薑三片煎至四分去滓溫

[illegible]

服日再服更量兒大小加減
匀氣散 治小兒腹脹
青橘皮 去白 木香 檳榔 各一
右細剉用巴豆三十粒同炒令[illegible]去巴豆只將三味為細末
每服半錢[illegible]湯調下更量兒大小加減
胡椒丸 治小兒腹脹
胡椒 [illegible] 甘遂 [illegible]
右等分為末用[illegible]丸如[illegible]大每服三二丸[illegible]下乳食前服
理脾湯 治[illegible]量兒大小加減
紫蘇湯 治小兒心腹氣脹[illegible]不下食及[illegible]
牽牛子 生半 馬兜鈴 一兩 木香 半兩
右搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服更量兒大小加減
不拘時候
丁香散 治小兒乳癖腹脹
丁香 甘草 炙 人參 [illegible]

右篩搗為末三歲以內兒每服半錢水半盞煎至三分去滓溫服日三
四歲兒漸加至一錢
消脹丸 治小兒腹急悶心下滿
半夏 [illegible] 枳殼 [illegible] 巴豆 [illegible]
右為末糊丸如小豆大三歲三十丸陳皮湯下
褐丸子 治小兒傷食腹脹
蘿蔔子 [illegible] 蓬莪朮 [illegible] 胡椒 半兩
右為末麵糊為丸如黃米大不拘時候[illegible]湯下每服十五丸至二
十丸
檳榔散 治小兒氣不和心腹脹滿不欲乳食
檳榔 厚朴 [illegible] 丁香 一分
右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫
服量兒大小以意加減
枳殼散 治小兒裡氣腹脹喘急
枳殼 [illegible] 巴豆 [illegible]

[illegible]

右為末三歲兒半錢[illegible]調下[illegible]作丸子白糊丸如小豆大三十丸
桑白皮湯下
枳橘丸 治嬰兒白日外[illegible]服氣粗心下滿急[illegible]此證不如[illegible]多
莪朮 治腹脹咳嗽
半夏 [illegible] 枳殼 [illegible]
右為末[illegible]糊丸如小豆大每兒二十丸[illegible]湯下小者芥子
大又方[illegible]丸小豆大一歲一十
丸白湯送下
分氣丸 治小兒宿氣腹脹[illegible]可食
木香 [illegible] 黑牽牛 [illegible]
右為末白糊丸小豆大二歲二十丸米湯下
治小兒[illegible]腹脹[illegible]
乾蠍 [illegible] 丁香一錢
右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十丸米飲湯送下

使父母指甲爪乳頭上飲之

又方千金

以韭根汁和豬脂煎細細服

又方千金

用車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方千金治小兒腹脹并治嬰兒腹皮青色不急治須臾即死

用米粉鹽等分炒變色腹上摩之

半夏丸千金 治小兒腹脹滿欲死

用半夏少許洗擣末酒和丸如粟米大每服一丸生薑湯下不差加之日再服又若以火炮之為末貼臍下佳又炮熟用酒服如朱粒大

五疳

治小兒腹肚脹滿不可忍者

用[illegible]

[illegible]丸 治小兒失乳以食飼之未有食腸不能剋化或生腹脹

腹脹[illegible]無常

橘皮　半夏　蒼朮　人參各三　厚朴二分

青皮二分　大腹皮　枳實　麴末各半

右為細末煮麵糊為丸如麻子大每服一十丸溫水送下[illegible]

茯苓滲濕湯 治小兒黃色浮黃腹脹服食不下

麻黃　桂枝　草豆蔻　厚朴　麴末

羌活　吳茱萸　蒼朮　澤瀉　茯苓

豬苓　橘紅　茴藥各二　杏仁二箇　柴胡

白朮各半　青皮　黃連各半　升麻一分

右剉作一服水一大盞煎至七分去滓大溫服食前

升陽益血湯[illegible] 治小兒未滿百日病腹脹二日大便一度

[illegible]身黃色宜升陽益血和血潤腸胃乾燥也

蝎梢二分　麴末　升麻各三　厚朴　當歸[illegible]

桃仁十箇

右剉作一服水一盞煎至半盞去滓稍熱服食前

塌氣散[illegible]家 治小兒[illegible]腹脹[illegible]上氣喘[illegible]浮

陳木炒　青橘皮[illegible]　肉豆蔻[illegible]

甘草炙　黑牽牛生熟各半

右為細末每服半錢[illegible]米飲湯調下五歲已上服一錢不拘時候

白朮散[illegible] 治小兒脾胃不調飲食[illegible]腹脹喘[illegible]手足[illegible]

木香一分　白朮　青橘皮去白　黑牽牛半生半炒　桑白皮[illegible]

右件為細末每服半錢溫米飲調下不拘時候

塌氣丸[illegible] 治小兒脾虛腹脹[illegible]

木香二錢　青皮[illegible]　[illegible]　胡椒[illegible]　全蝎[illegible]

右為極細末麵糊和丸如黍米大一周歲服五十丸[illegible]

[illegible]

塌氣退黃湯[illegible] 治小兒面色萎黃腹脹食不下

麻黃　澤瀉各二　白朮　黃連各半　杏仁一錢

柴胡根　青皮　桂枝　吳茱萸　厚朴

草豆蔻　麴末　升麻根　羌活　蒼朮

白茯苓　豬苓　橘皮　黃柏各一

右剉作一服水一盞煎法如前食前

三聖丸錢氏 治小兒腹脹足冷或腹中氣塞而足冷或水聚而足冷或喘渴而足冷或煩躁而足冷或頭額溫而足冷或脈沉微而足冷

石亭脂[illegible]　黑附子[illegible]

右為細末[illegible]為丸如黍米大每服一十五丸乳汁送下肚饑時服服一時後可與乳[illegible]

惺惺丸 百日內腹脹

青木香　青皮去白　巴豆[illegible]　胡椒七粒　砂仁三粒

蝎梢[illegible]

右為末淡醋煮麵糊為丸如麻子大每服三四丸[illegible]水吞下[illegible]

用保童丸一二服取功[illegible]

無青皮[illegible]以[illegible]

[illegible]

家水吞下[illegible]

臍下痛不可治獨此藥最能治之[illegible]人参附[illegible]
之難目不生乃入背脊又注左肩亦痛若甚以令服之一服即愈
後當再服之立効

丁奚腹大（附論）

大小兒丁奚大病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也哺食不消則水穀之精減損無以榮其血氣致肌肉消瘠其病腹大頸小黃瘦是也若久不差則變成疳或腹大[illegible]名哺露病一名丁奚三種大體相似輕重立名也○小兒丁奚謂之[illegible]羸瘦或腹大[illegible]不能行[illegible]大腸[illegible]號曰丁奚七歲已下謂之[illegible]十五已下名[illegible]風此[illegible]其腎主骨故也小兒[illegible]大如有青筋見即可治[illegible]也如無青筋乃名丁奚是因過飽傷食而得之

方

十全丹　治丁奚哺露由脾胃久虛不能傳化水谷以榮血氣致肌肉消瘦腎氣不足復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎中稟受不足致疾

青皮　陳皮（各五錢）　五靈脂　莪朮（炒）　川芎
白豆蔻仁　檳榔　木香　蘆薈　史君子（肉）
蝦蟆（炙焦）　三稜（煨）　縮砂仁（各五錢）　丁香（二錢）　[illegible]

右為末以神麴末糊為丸米湯下

大雞骨丸　治小兒丁奚脊中骨起腹內不調食不為肌膚或羸瘦

熟腹大

雞骨（[illegible]）　赤芍藥　赤茯苓（[illegible]）
石膏　川大黃　紫菀　陳橘皮
[illegible]　白鬱金（[illegible]）　細辛　附子　桂心
苦參　甜葶藶

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服更量兒大小以意加減

人參丸　治小兒傷寒失治一兩風冷令水沴腹大丁奚時上肚皮皺如瘦不欲飲食羸瘦不能生肌肉又不能消化乳哺不耐

人參　茯苓（[illegible]）　半夏（[illegible]）　蓄薷（[illegible]）　大黃（剉炒）

苦參　礬石（[illegible]）　甘草（炙）　遠志（去心）　黃芩
硝石（研）　芎藭（[illegible]）

右為末煉蜜為丸如麻子大一二歲兒每服三丸不飲下四五歲兒五丸早晚各一服量兒大小加減

麝香丸　治小兒新生至一年所中藥物[illegible]哺[illegible]不消中風腹脹心肚青筋注面青目上撥頭摇丁奚[illegible]三歲不能行
麝香（研）　牛黃（研）　雄黃（研）　丹砂（研）　黃連
桂心　烏賊魚骨　特生礬石（[illegible]）
赤足蜈蚣（[illegible]）　附子（[illegible]）
巴豆（[illegible]）

右為末煉蜜和丸[illegible]勿令泄氣每服旋丸兒生十日至三十日服如黍米大二丸乳汁下四十日至百日服如麻子大三丸未飲下一歲至三歲以意增之兒雖小而宿食甚者亦當增丸數

鱉甲丸（[illegible]）　治小兒丁奚不生肌食欲不多腹大面目[illegible]

鱉甲（[illegible]）　桂心（[illegible]）　大黃（五分）　人參　前胡

茯苓　乾地黃　芍藥　乾薑（各三[illegible]）　黃芩（[illegible]）
蟅蟲（[illegible]）

右為末蜜丸小豆大三丸日進三服量兒大小加之佳

使君子丸　治小兒腹大氣滿[illegible]滿腹痛[illegible]食

史君子（一兩）　木香　胡黃連　麝香（研）　蘆薈（[illegible]）
蜂頭（[illegible]）　黑[illegible]（研）　青黛（研）　雄黃（研）　熊膽（[illegible]）

右為細末煉蜜和丸如綠豆大每服以粥飲下十丸量兒大小增減

桃花丸　治小兒堅積面黃羸瘦丁奚不欲食食不生肌膚心中煩悶發時時寒熱五臟並脹腹中疼痛當言下痢

鬼箭（[illegible]）　細辛（六分）　熊膽（五分）　乾薑（一分）　附子（[illegible]）
蜀漆（七分）　桂心（[illegible]）　蝟頭（[illegible]）　曾青（[illegible]）
牡丹

右為末蜜丸如梧子大飲下二丸日進三服以知為度忌豬魚生冷菜等物

大麝香丸（[illegible]）　治小兒五疳羸瘦腹大兒青筋及丁奚等病

麝香　粉霜（另研）　朱砂（水飛）　白礬（枯）　五靈脂
肉豆蔻仁　乾蝎（炒）　乾地龍（炒）　夜明砂（半兩）
乾蝦蟆（炙）
右為末，與朱砂等同研勻，細煉蜜和丸如黍米大，每服三粒至五粒，溫
水下，量兒大小加減。
十全丹（出聖惠方）治丁奚哺露，乳食不調，傷於脾胃。
檳榔（生）　枳殼（麩炒）　青皮（去白）　陳皮（去白）　三稜（炒）
蓬莪朮（炒）　縮砂仁（各半兩）　丁香（一分）　木香（一分）　香附子（炒，一兩）
右為末，以神麴末打糊為丸，如黍米大，空心，食前米湯下一百丸。
黃連丸（出聖惠方）治小兒丁奚腹大，脂氣羸瘦。
黃連（去鬚）　桂（去皮）　代赭（研）　木香（半兩）　丹砂（一分）
杏仁（湯浸去皮尖，麩炒）　肉豆蔻（去殼，各半兩）　麝香（一分）
巴豆（去皮心，研，出油）
右為末，令勻，煉蜜和丸如麻子大，每服粥飲下三丸，量兒大小服之。
蜀漆丸（出聖惠方）治小兒呈病面黃羸瘦，丁奚不欲食，或不充肌，小便澄濁，
脊強寒熱羸瘦，腹中病痛。
蜀漆　細辛　龍膽　附子（炮裂去皮臍，半兩）
乾薑（炮）　牡丹皮　黃芩　桂（去皮）　當歸
右為末，煉蜜和丸如菉豆大，空心五丸，米飲下，量兒大小加減服。
代赭丸（出聖惠方）治小兒丁奚
代赭（研）　川大黃　朱砂（細研水飛）　巴豆霜
鱉甲　赤芍藥
木香　知母　杏仁　茯苓
右為末同研令勻，煉蜜和丸如麻子大，每服以粥飲下二丸，更量兒
大小加減服之，日一兩服，以溏利為度。
麝香丸（出聖惠方）治小兒丁奚，肚大青脈起，不生肌肉，腹乾瘦，頭大髮枯。
麝香（細研）　肉豆蔻（去殼）　乾蟾　夜明砂　地龍
朱砂　五靈脂
右為末，研令勻，煉蜜和丸如菉豆大，每日空心以溫水下五丸，晚再
服，量兒大小以意加減。

麝香丸　治小兒心腹身體壯熱，毛髮焦黃，常有瘡，又肌膚羸細，胸
腹肋鼓脹，好食泥土，飲水不休。
麝香　牛黃　丹砂　夜明砂（炒）
瓜蒂　熊膽（研）　蟾酥　青黛　胡黃連（各半兩）
右為末，燒粟米飯為丸如黍米大，每服一歲二丸，二歲已上四五丸，
量兒加減，溫水下。
訶梨勒丸　治小兒丁奚腹大，羸瘦骨立，遍身水氣不消。
訶梨勒　肉豆蔻（去殼）　青黛（研）
麝香（研）　蘆薈（一兩）　龍膽　丹砂（研）
右為末，粟米飯和丸如黍粒大，每服七丸，粥飲下，日二服，量兒大小
增減。
大黃丸　治小兒丁奚腹脹，頭大頸細，手腳心熱，唯喫冷水，此是脾
藏內有
川大黃　乾蟾　陳橘皮　鱉甲　巴豆霜（一分）
鉛霜（研）　皮巾子
右為末，研令勻，煉蜜和丸如菉豆大，三歲兒每服空心以溫水粥
飲下三丸，後以粥飲投，先乾以青衣蟲，量兒大
小以意加減服之。
芍藥丸　治小兒有癖塊，寒熱大腹，食不消化，不生肌肉，落地
芍藥　茯苓　大黃（炮）　柴胡（四分）　鱉甲（炙）
桂心（三分）　人參（三分）
右為末，蜜丸，三歲已下服三小豆大，不知加之，七八歲三梧子大，不
知加之，若腹堅大者，加鱉甲一分，渴者加栝樓二分，病甚者服十
日效。一方有杏仁三兩，人參三分，紫菀三分。
仙人玉壺丸　治小兒癖瘦，丁奚不能食，食不消化。
雄黃　藜蘆　丹砂　礜石　巴豆（去皮）
八角附子
右先搗巴豆三千杵，次用礜石又搗三千杵，內藜蘆三千杵，次內
附子三千杵，次用雄黃三千杵，次內丹砂三千杵，內蜜又搗萬杵佳。
若不用丹砂者，內真珠四兩，每內藥輒治五百杵，內少蜜恐飛揚。

治蔡用王相吉日良時童子齋戒向東天時日出

密器中封之勿泄氣兒百日

歲者以一丸如黍米乳汁服之一歲以上如麻子丸日三

以飲服小兒大腹及中熱惡毒不化服一丸小兒寒

熱頭痛身熱及吐哯服一丸如麻子大小兒蠱毒不能食

以暖水服二丸日三又吞如梧桐子大上良

芍藥丸 治小兒丁奚雖不生肌肉腹大食不

野鼠丸 治小兒丁奚肚大羸瘦弱

野鼠 甘草 厚朴

桂心

右為末以棗肉和丸如小豆大三歲兒每服用生薑湯下七丸日三

服量兒大小以意加減

芍藥丸 治小兒不生肌肉丁奚大腹食不消化

狼毒丸 治腹中有熱渴不思飲食大小便不利右苦腹痛

血下重下痢大腹痛肚肛脇下有痞

八五

狼毒二分 附子 川椒 巴豆

右為末以粘米粥和丸飲下一丸天明又日午再服一丸數服消

落下食日進三服

鈎藤散 治小兒蠱積腹大項細

鈎藤 甘草 人參 桔梗

右為粗末每用一錢水一小盞煎至五分去滓分服溫作二服空心

午後服隨兒大小加減

黑辛黃芩丸 治小兒丁奚腹大項細

黃芩 黃連 附子

右三味搗羅為末用

小數子

飯丸如綠豆大量兒大小十丸至十五丸二十丸米飲下不拘時候

日三

二聖丸 治小兒丁奚腹脹乾瘦毛髮焦黃

大蝦蟆 皂莢

右以取却蝦蟆肚腸後用皂莢末以泥封令乾更

泥如此可三遍泥乾即於大火中燒令煙盡搗羅為末用粟米飯

和丸如粟米大兒一歲以粥飲下一丸服藥後以生熟水浴兒拭乾

以青衣覆之令睡良久有蟲出即効

增氣丸 治小兒疳氣腹大氣急不思飲食

青橘皮 巴豆

右為末麵糊為丸如綠豆大三歲以上每服五丸或七丸米飲下不

計時候

治丁奚氣大腹瘦弱

搗生藕根以豬脂和服之

又方

用熟炙鼠肉若伏翼肉哺之亦治哺露

六物黃芩湯 治少小腹大短氣熱有進退食不安穀為之下

黃芩 大青 甘草 麥門冬 石膏

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

八六

哺露 附論

夫哺露者因乳哺不調傷於脾胃致令脾胃虛弱漸不能食血氣減損

肌肉不榮而柴骨羸露其臟腑之氣不宣則吸吸苦熱謂之哺露也宜

服進食丸

大黃丸 治小兒哺露腹下痞堅腹虛服手足往來寒時

方

大黃 乾薑 人參 丹參 沙參

苦參 防風 桂 玄參

附子 葶藶 白朮 赤茯苓

蜀椒 杏仁 巴豆

右搗羅十五味為末以巴豆杏仁同研煉蜜丸如麻子大每服二丸

至三丸米飲下量兒大小加減

人參丸　治小兒哺露失衣當風濕冷水浴苦腹大時痢或寒熱如
壹不欲食食不生肌肉或不消化四肢羸瘦
人參　麥門冬　半夏　大黃　川大黃
白茯苓　柴胡　黃芩　訶梨勒　甘草
鱉甲　芎藭
右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服以粥飲下二丸至五
丸五丸日三服量兒大小以意加減
調中撥抑丸　治小兒哺露腹脹
十金丹　治小兒手足極細項小骨高尻削臍凸腹大
或生穀癥是名丁奚其證寒熱往來頭骨分開食
哺露二者皆因脾胃久虛不能消化水穀以致氣血枯耗肌肉銷鑠胃氣
不足腹中血氣之
至於極羸之疾並宜治
青皮　陳皮　蓬莪朮　川芎　北五靈脂
白豆蔻仁　雞心檳榔　蘆薈　木香　使君子肉

右為末猪膽汁浸糊丸如麻子大每服二十丸米飲下
湯
五味子湯　療小兒夏冬病不除肌瘦羸劣骨立
五味子　大黃　芒硝　麥門冬　石膏一兩
甘草　當歸　黃芩　黃連　前胡
右切以水三升煮取一升半分服二合下利即止增減量之
雞骨丸　治小兒哺露傷飢手足細瘦不生肌肉
雞骨　柴胡　細辛　黃芩　桂心
赤茯苓　芍藥　川大黃
右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水下五丸早晨晚後各一服
量兒大小加減服之一方有鱉甲一分無柴胡桂心
破積丸　治小兒哺露
木香　青橘皮　桂
吳茱萸　硇砂　巴豆霜

右搗羅前四味為末與硇砂巴豆霜同拌研勻醋煮麵糊為丸如菉
豆大每服三丸至五丸早晨臨卧服量兒大小
以意加減
苦參丸　治小兒寒熱久不解
苦參　柴胡　大黃　赤茯苓
下利不止
鱉甲
右搗羅為末煉蜜丸如麻子大一歲已上每服一丸米飲下早晨日
午夜卧各一服一方桂心三味各三分
下五丸治丁奚腹大不生肌一方有紫菀
代赭丸　治小兒哺露羸瘦
代赭　赤石脂　丹砂　巴豆
杏仁
右先別研細再合研勻煉蜜丸如粟米大每服一丸米飲下
量兒大小加減

丹砂丸　治少小哺露不生肌
下痢骨肉消瘦
丹砂　巴豆　甘遂　雄黃
右等分為末蜜和搗千下一服二丸一月兒如粟米大五十日已上
如米大日三服兒大行視之若病
未盡出者勿復與不下者增之兒有
發者加之
鱉甲丸　治小兒哺露羸瘦
鱉甲　茯苓　常山
右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小
以意加減
鱉甲散　治小兒哺露
鱉甲　青皮　三稜
白朮　白茯苓　半夏
秦艽　北柴胡　香附　甘草

右㕮咀每服一錢薑一錢棗子煎服
治小兒哺露大㱡者
以牡鼠肉炙食之

脾胃不和 附論

夫脾者藏也胃者腑也脾胃二氣合爲表裏胃受穀而脾磨之二氣平調則穀化而能食若虛實不等水穀不消故令腹脹或泄利不能飲食所以謂之脾胃氣不和不能飲食也

方

七香丸 治消食快膈和胃止痛
木香 丁皮 檀香 甘松 丁香
陳皮 縮砂仁 三棱 莪朮 白豆蔻
香附子 益智仁
右爲末糊丸薑湯吞下

五香散 治小兒脾胃久虛乏食或以四肢羸瘦
丁香 沉香 檀香 木香 藿香
白朮 訶梨勒皮 陳橘皮
黃耆 甘草 白茯苓
右搗篩爲散以水五升慢火煎至一升以前校取汁却入鍋內入麝香蜜三合生薑汁半合棗肉二十枚慢火熬成煎每服以粥飲調下半茶匙量兒大小以意加減

人參湯 治小兒脾胃氣不和不能飲食腹脇脹滿壯熱增寒困倦
人參 白朮 訶梨勒皮 木香
黃耆 白茯苓 藿香葉 陳橘皮
甘草 桔梗
右麤搗羅爲散每服一錢水七分入生薑二片棗一枚擘同煎至四分去滓不計時候量兒大小增減溫服

益智仁湯 夫心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾胃藥之中庶幾兩得古人進食方多用益智者此也
益智仁 石菖蒲 白茯苓 連子肉 陳皮
縮砂仁 半夏麴 木香 厚朴 甘草
右剉細每服一錢薑三片棗一枚水一盞煎不拘時服

萬靈丹 治小兒脾胃久不和快積脹溫熱藥皆不効此藥神效
官桂 川黃連 蓬朮 檳榔 白豆蔻
陳橘皮 木香 丁香 巴豆
杏仁
右同研爲末丸如黍米大每服一歲一粒二三歲二粒三四歲三粒七八歲五粒十歲以上七粒生薑湯空心下乳食後又積或乳癖並宜服之

前胡散 治小兒脾胃氣不和見食欲嘔心胸壅悶
前胡 藿香 桂心 赤茯苓 人參
白朮 甘草 枇杷葉
厚朴
右搗羅爲散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

參香湯 理脾吐肉寒痰
藿香 人參 茯苓 木香 丁香
丁皮 青皮 甘草
右㕮咀每一錢水一盞薑二片煎取五分溫服

白豆蔻散 治小兒脾胃不和胃寒壯熱腹痛吐不思乳食
白豆蔻 陳皮 川芎 枇杷葉 甘草
乾木瓜 人參 藿香
右爲粗末二小匙每服一錢水一小盞生薑一錢棗一枚同煎至七分去滓溫服不拘時候

益黃散 和胃止吐
白茯苓 人參 草果仁 木香
甘草 陳皮 厚朴

右剉散每服一錢生薑一片紅棗一枚水一盞煎服合乳母服

調中散 治小兒乳食不調致脾胃不和

木香 人參 青皮 丁香 白术

白茯苓 大腹皮 甘草

右為細末每服一錢水一小盞生薑三片煎至五分去滓温服

益胃丹 治脾胃虛弱乳食不調和脾胃

蓽澄茄 木香 白术 沉香 訶子

人參 蒼术 縮砂仁

右為細末入麵糊丸如麻子大每服十五丸米飲下

加減以治小兒乳哺失宜

等分致不足傳脾胃虛則世

六味散 四盞煎脾胃最怯虛則郭同方

丁香散 治脾胃虛冷不欲食

丁香 沉香 木香 藿香葉 厚朴

白术 白茯苓 白豆蔻

右為末每服一錢水一小盞半生薑大棗三十枚煎至半

作熟飲置中入大熱病患者生薑棗不用如乾每服如見子大

米飲化下乳前

丁香黃耆散 治小兒脾胃虛弱不能飲食已數傷損致令肥

膩虛實時附下亦可當用

丁香 錦黃耆 人參 白术 當歸

鱉甲 胡黃連 甘草

右為細末每服一錢水一盞生薑二片棗二枚同煎至五分

去滓食前温服

訶梨勒散 治小兒脾胃不和腸虛腹脹不欲乳食

訶梨勒皮 桂心 乾薑 甘草

白三稜 人參 陳橘皮

草果

右搗細羅為散不計時候以温棗湯調下半錢量兒大小以意加減

白氣散

桔梗 甘草 乾薑 縮砂 益智子

茴香

右為末每服半錢水煎紫蘇木瓜煎湯下調脾胃生薑棗子煎湯

調服

木香散 治小兒胃中有氣積虛

草豆蔻 人參 茯苓 防風

藿香 陳橘皮

右為末每服一字或半錢薑湯米飲調下

白术散 理脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯竭煩渴多燥但

欲飲水乳食不進羸瘦少力因而失治變成風癇不問陰陽虛實並宜

服之

乾葛 人參 白术 茯苓 甘草

藿香 木香 各一兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎取半盞去滓温服不拘時渴甚者併

煎服加山藥心神不定加辰砂棗仁湯加乾葛木瓜

加丁香砂仁嘔吐加藿香汁吐瀉加扁豆陳皮藿香豆蔻

加杏仁桑白皮熱加前胡黃芩

加陳皮大便滑加訶子天花粉細辛桔梗各等分薑煎

煨埋煎方治小兒

開胃丸 治小兒臟腑怯弱內受風冷腹脇脹滿腸鳴泄瀉或

青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹痛

木香 蓬莪茂 當歸 白术 人參

麝香 白芍藥 各一分

右為末研入麝香飯和丸為黍米大每服十五丸温米飲下又一法煉

蜜和搜每兩作五十丸每服一丸米飲化下不拘時候

枳殼湯 寬中進食

枳殼 青皮 大香 丁香 當歸

縮砂仁 陳皮

右為細末煉蜜湯調下

六味人參湯 治小兒脾胃氣不和腹脇脹悶不能飲食四肢羸瘦

人參　甘草炙　丁香　黃耆蜜炙　陳橘皮去白
訶梨勒皮各半兩
右為細末，每服一錢，水七分，入生薑二片，棗一枚，擘，煎至四分，去滓，
食前溫服。量兒大小，以意加減。
乾地黃丸　治小兒脾胃氣不調，不嗜飲食，生肌肉。
熟乾地黃焙　大黃濕紙裹煨　當歸各半兩　柴胡去苗　杏仁去皮尖，麩炒
炒黃各半　白茯苓去黑皮
右為末，煉蜜為丸，如綠豆大。每服五丸至十丸，薑湯下，日三服。量兒大小，
以意加減，不拘時。
高良薑丸　治小兒傷冷，令脾胃氣不和，腹痛，不欲飲食。
高良薑　陳橘皮去白　草豆蔻去皮　當歸洗焙
桂去粗皮各一分　人參半兩
右為細末，每服一錢，水七分，煎至四分，去滓，不計時候。量兒大小加減。
溫脾散　一方加人參
阿膠散　治……實正氣，理……渴，胃熱……不……陰陽……
宜服之……乳食不……因少力困而失治，遂成慢驚，服白朮散……
……
散……不可下，只用煎三升許……服……
投此藥二服即安，白朮煎亦可……
藥止渴，治痰退熱，清神……甚者……多飲之。
阿膠一兩，麩炒　鼠粘子一分，炒　馬兜鈴半兩　甘草一分　杏仁七個，去皮尖
糯米一兩
右為散，每服二錢，用水煎服。
六神湯　理脾胃，虛止吐瀉，進飲食，養氣。
黃耆　白扁豆炒　人參　白朮　白茯苓
甘草炙　藿香葉
右為末，每服二錢，鹽湯下……
醒脾散
人參　白朮　豆蔻　甘草　乾薑
藿香

右為末，每服一錢或半錢，薑湯下。如脾胃久冷，子仁米飲下。
消食丸　溫中快膈
香附炒，三兩　縮砂仁一兩　陳皮二兩　甘草炙　神麴炒
麥蘖炒，各一兩
右為末，麵糊丸，如黍米大，七歲已上菉豆大。二十丸，食後薑湯下。或
作麥子用，百沸湯入鹽點亦佳。
人參丸　治小兒乳哺飲冷過度，傷冷脾胃，腹脹滿，多吐痰涎。方
……食不……
當歸丸　治小兒冷熱不調，大便青黃，心腹多痛，或腹中氣泄，或時
嘔逆，不欲乳食。
白芍藥　當歸　人參　芎藭各三　白朮
甘草炙
右為末，水煮麵糊丸，如麻子大。三歲小兒每服十丸，粥飲下，日三服。
更量兒大小加減。
桂朴散　溫脾胃
肉桂　當歸　厚朴製　白朮　乾薑各半兩
甘草炙
右為細末，每服一錢，水一小盞，煎至五分，去滓溫服。
陳橘皮湯　治小兒脾胃氣弱，乳不消化。
陳橘皮去白　高良薑　人參各一分　白茯苓去黑皮
甘草炙半兩
右為粗末，每服一錢，水七分，煎至三分，去滓，食前溫服。至
晚三服，適兒大小加減。
和中湯　治小兒脾胃虛冷，吐利，不思飲食。
人參半兩　白朮　白茯苓去黑皮　甘草炙
厚朴去粗皮，薑汁炙
右為粗末，每服一錢，水半盞，同煎至三分，去滓，稍熱服，至
夜可三服。量兒大小，以意增減。
使君子丸　正脾助胃
厚朴去粗皮，薑汁炙　陳皮　甘草　使君子去殼　訶子去核

右為末煉蜜丸菉豆大每服三七丸甘滷楂湯米飲下熱瀉加青宜
米飲冷瀉並中暑瀉香薷湯下積瀉並主之治疳瀉白朮烏梅湯瀉
鹽姑草已上並用米飲下 鹽姑草方
益黃散 治脾胃虛弱吐瀉及治脾府腹大牙瘦七手補脾圓
冷腹痛久冷並效
陳皮 青皮 訶子 甘草各一 丁香二錢
右剉散每服二錢水一中盞生薑一片煎三分服一方為末每一錢
兒服一字二粟服一錢百日前者調下日進三服忌一切生硬冷物
人參膏 白嬰兒飲乳自不知飢飽全在乳母存卹若見兒啼哭定
是乳母即時令兒飲乳若啼哭未定氣喘未調便兒急飲乳知兒飽
乳不得下反致嘔逆甚則吐利成胃虛有虛一切脾胃不和並宜服之
人參一兩 白朮 丁香 藿香葉各一 白茯苓
右為細末煉蜜丸如大青如雞頭實每服一粒至二粒米飲下
四君子湯 隨證加味量兒大小用
人參去蘆 白朮 茯苓 甘草各等分
九五
右為末每服二錢傷寒麻黃豆豉葱白柴胡吐瀉南木香藿香乾葛煎湯
牛黃鎮金粉鎮金蠍薄荷麻豆十莽子紫蘇煎利腹脹枳殼木通
蘇子薑錢金錢薄荷豆蔻薑錢桑白皮吐苦竹茹
積熱上攻茅根竹葉甘草乳食不下訶子木香丁香行肢浮腫藿香枳殼
薑錢桑白皮葶藶荊芥牛蒡子枳殼青湯羌活麻
黃防風肉豆蔻木香骨訶子榴皮如白痢或有血赤
腦麝豆蔻地榆粟殼赤痢粟殼烏梅白痢粟殼白痢大便不利
硝小便不利木通車前子虛乳木瓜藿香用丁香腹痛
式用手仁木瓜豆蔻枳殼
下有麻子仁生地車前子每金小麥
蜀椒杷葉炙去毛八枚皮數杏仁去皮尖貝母知母
驚癇
黃人參
金
當歸

殼苦楝皮頭痛白芷川芎氣肚痛氣疾天雄
三稜大黃五心熱子水下氣不升陷蘇子
氣肥兒蘇葉紅棗
白朮散 治小兒脾胃氣虛乳食不消瘦
白朮 人參 厚朴
右㕮咀每服二歲兒每服一錢煎至三分去滓温服至晚三服
進兒大小以意加減
橘皮湯 治小兒脾胃虛冷氣逆不能飲食
陳橘皮去白 桂
右細剉分作三貼每用一貼水三盞入蔥白五莖細切黍米一合同煮
稀粥熱去滓分二服
治小兒胃寒吐瀉上諸證危惡與薄相合
乾薑炒焦 白茯苓
右為細末米飲調下一字至一錢
治大人小兒不食乳食和氣去疾
九六
人參一兩 半夏一兩
右以生薑汁一宿焙乾為末薑汁糊丸如菉豆大每服十丸食後生
薑湯下
安胃和脾散 治小兒脾胃不和中脘氣痞心腹脹滿全不思食嘔吐
痰嗽逆氣吞酸面色痿黃肌肉消瘦腹脇刺痛泄瀉不止便利不調大
力嗜卧脾胃虛弱飲食不化並宜服之此藥仙方世間老幼氣弱皆可
常服
淨蒼朮
小麥
人參去蘆 白朮去芦 白茯苓去皮
青皮去白 木香 藿香葉 縮砂仁
廣茂煨 甘草炙 陳皮去白
右為細末每一二錢煎生薑湯調下日進二服忌一切生硬冷物一方
無木香
透關丸 治小兒脾胃挾傷中滿硬氣及治伏熱生涎
霍亂嘔吐或作食癇手足搐搦不省人事並宜服之

人許擣一千下日淘出細砂[illegible]
細 松煙墨[illegible] 巴豆[illegible]
右同入瓷罐子內密封掛通風處百日取出丸如黍米大每服一丸
至五丸新汲水送下不拘時候

香橘丸 治小兒脾胃被傷心腹脹滿脇肋不快便氣痛兼小便不
利常服寬中快膈消化乳食後宜臥
青橘皮去白 肉豆蔻各二錢半 木香半錢
右將青橘皮炒黃次下肉豆蔻等同炒木香一味同炒轉色並為細末煮
麪糊為丸如黍米大週歲每服十丸生薑湯下乳食空

丁香麪藥丸 治小兒脾胃怯弱乳食遲化胃冷吐乳
服 開胃口化宿食消停滯美飲食
丁香一錢 神麴炒 麥芽炒黃 乾薑炮 陳橘皮去白
兩 烏梅去核 檳榔二兩
右為細末煮麪糊丸如黍米大每服一十丸米飲[illegible]

消化丹 治脾胃不和或因驚疳結成癖積脇腹不疼痛
三棱炮 莪朮炮 乾漆炒 木香 青皮

右為末麪糊為丸每服二十丸飯飲吞下

[illegible] 治小兒脾胃虛弱補五臟生津液調氣血進飲食解虛
煩益肌體功效不可具錄矣
治久吐胃寒加蓮肉木香[illegible]生薑[illegible]煎服○治嘔逆氣不止
加白扁豆薏苡仁並炒[illegible]煎[illegible]自然汁[illegible]服○治脾胃虛冷
冷熱不調[illegible]嗽不食飲食日夜[illegible]熱加知母[illegible]
白茯苓[illegible]皮同煎服之○治腹肚痛加陳皮[illegible]同煎服之
○治夜間冷啼煩躁腹肚疼痛加[illegible]木香[illegible]同煎服之○
○治表裏虛弱時氣[illegible]加細辛[illegible]煎服
○治脾寒胃熱[illegible]不順溫壯常作加滑石地骨皮同煎服之○治
霍亂吐瀉神不安穩加藿香丁香木瓜生薑同煎服○治脾胃虛
弱飲食不進加厚朴陳皮等分[illegible]同煎服之 治吐食不納
穀氣加丁香半夏生薑[illegible]同煎服之○治脾胃久虛不納

飲食吐瀉不止加肉豆蔻青皮天台烏藥木瓜生薑煎服○治虛中熱
渴米穀不分加罌粟[illegible]前子煎○治虛[illegible]煩躁安神定志加[illegible]
驚煩心煎服○治心氣不足神情恍惚加石菖蒲石蓮肉[illegible]
冬煎服○治虛煩體熱夜啼加白附子全蝎蟬蛻燈心銀器煎服○
治脾虛[illegible]肌肉消瘦面色痿黃飲食不化腸胃久寒吐逆無時加
黑附子枳殼吳茱萸人參草果細辛生薑棗子煎服○治霍亂吐逆腸鳴
自利腹肚疼痛加白薑陳皮同煎服之○治虛中傷寒身熱咳嗽
渴加麻黃乾葛天麻茯苓生薑蔥白煎服○治心神不寧驚悸夜啼
加硃砂羌活防風天麻薄荷金銀器同煎○治脾虛下利腸肚疼痛加
陳皮訶子陳米同煎方見同前

長壽散 治小兒脾胃虛弱常服強壯去寒熱
天麻煨 甘草 蠍梢炒 半夏湯泡 人參
白扁豆炒 糯米炒 薏苡仁 [illegible]木香一字
右為末每服二錢水一盞薑三片棗子一個煎至半盞服之

調脾[illegible] 治小兒脾胃虛弱羸瘦[illegible]

白朮 丁香 甘草 肉豆蔻麪裹煨各二分
右為細末每服一錢米飲調下乳食前服

助胃膏 治小兒脾胃虛弱或吐逆泄瀉腹疼痛不進飲食
白茯苓 白朮 川厚朴[illegible] 藿香葉[illegible] 甘草
訶子[illegible] 人參 陳皮[illegible] 木香煨 草果去皮
丁香不見火 肉豆蔻[illegible]各三錢半 滑石[illegible]
右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸[illegible]以上兒一丸煎生薑棗湯下
食前[illegible]入小便以意加減如小兒胃有寒泄脈弱小便白而多大
便或青[illegible]不足常服之甚妙

觀音散 理小兒脾胃不和氣弱睏倦多困不思飲食
白朮 人參 甘草 乾薑炮 藿香葉
綿黃耆 木香各一 白扁豆 茯苓 罌粟殼[illegible]
右為細末每服二錢用生薑棗子紫蘇湯調下不計時日進三服

大王拈丸 治脾胃虛弱肚腹脹滿飲食進退腸鳴不調嘔吐惡
心肢體倦怠

白术　人參　厚朴　藿香　當歸
茯苓　芎藭　青橘皮　甘草　陳橘皮各一兩
神麴　麥蘖各半兩　肉豆蔻　丁香各一分
右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸至二丸生薑湯化下食前
大人亦可服

助胃膏　助小兒胃氣思食止渴常服甚妙
人參　白术　甘草　茴香　烏梅肉
白豆蔻仁各半兩　檀香一錢　乾山藥　乾木瓜各一兩
右為細末煉蜜為膏如皂子大空心每服一丸嚼服或溫水吞下

養胃散　養胃氣快脾進嗌止嘔吐美飲食
丁香　藿香葉　陳橘皮　白豆蔻仁　縮砂仁各等
右為細末每服半錢煎生薑湯調下乳食空時

丁香半胃丸　治小兒胃虛氣逆上行胃脘不快大吐逆不定
腹脹煙氣中滿痞悶
丁香　木香　藿香葉　沉香　附子
枇杷葉　水銀　硫黃同水銀結砂子各一分　肉豆蔻五枚
肉桂半兩
右為細末煉蜜為丸每一兩作四十丸每服一丸煎生薑棗湯化
下乳食前

溫胃丸　治小兒胃虛氣逆乾噦惡心胃膈痞滿嘔吐乳食
丁香　肉豆蔻煨二　木香　人參　蓮子心
薏苡仁炒各一錢半
右為細末煮神麴糊為丸如黍米大每服二十丸温熟水送下兒大
空

豆蔻香連丸　治小兒乳食所傷脾胃怯弱挾熱不調泄瀉嘔吐並宜服之
黃連　木香　訶子去核各半兩　丁香二錢
肉豆蔻去殼麪裹煨熟去麪不用
右為細末粟米飯搜和為丸如黃米大每服三四十丸空心食前温米
飲湯送下遇乳汁下亦可日進三服

治小兒胃寒

木香　白术　丁香各四錢
右件剉作一服水半盞入燈心一把煎五七沸去滓分兩次服

溫脾散　泄者脾之候脾胃虛冷故泄自利不能收約而責於脾間
也法當溫脾
半夏麴　丁香　木香各半兩　乾薑炮二錢　白术炒
白茯苓　人參　粉草炙各半兩
右為末大歛調局方理中丸百𠬝一方用東行出尾試其方角〇張
與方名溫脾丹與上散同去人參茯苓甘草加青皮陳皮二錢半錢
丸黍米大

木香散　能和表裏通行津液
木香　大腹皮　官桂　前胡　陳皮
丁香　訶子　人參　半夏　赤茯苓
甘草　縮砂各三錢
右為麁散每服三錢水一大盞生薑二片煎至六分稍熱空肚
服量兒大小意增減

[illegible]丸　治因冷傷脾心腹痛脇肋疼硬不思乳食臟腑不調
青皮　陳皮　荊三棱　枳殼　厚朴
訶子　白豆蔻各一兩　肉豆蔻　檳榔各半兩
乾薑三分
右為細末水煮麪糊為丸如麻子大生薑橘皮湯下二十丸食前

四君子丸　治小兒脾虛受食不能化停積中脘吐逆惡心臟腑泄瀉
常服消化食滯進美飲食厚腸胃充肌體悅顏色退黃
縮砂仁　烏梅肉焙乾　訶子肉各一兩
右為末煮好大棗取肉為丸如麻子大每服三十丸至五十丸棗湯
熟水送下無時

玉柱杖丸　治小兒飲食減少臟腑不調
厚朴　藿香　陳橘皮　神麴　訶子皮煨各三
川芎　丁香　木香　白术　甘草各二錢
人參二錢
右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸至二丸生薑湯下食前服

小兒一丸分二服米飲化下

○羸瘦 附論

夫小兒羸瘦不生肌肉者皆為脾胃不和不能飲食故血氣衰弱不能榮於肌膚也凡小兒在胎而遇寒冷或生出時挾伏熱皆令兒不能飲食故羸瘦也挾熱者則身體壯熱肌肉微黃其挾冷者時時下利唇口青白也

方

秦艽丸 治小兒羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃

秦艽去苗 桑根白皮 枳殼麩炒微黃去瓤 犀角屑 地骨皮 甘草炙微赤剉 黃耆剉 人參去蘆頭 赤茯苓 龍膽去蘆頭 柴胡去苗

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候用粥飲下五丸更量兒大小增減

訶梨勒散 治小兒羸瘦脾胃氣弱挾於宿食不欲乳食面色不和

訶梨勒皮 陳橘皮湯浸去白瓤焙 甘草炙微赤剉 黃耆剉 人參去蘆頭 白朮 藿香 桂心 白茯苓各一分

右搗篩羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許棗一枚煎至五分去滓温服日三四服量兒大小以意加減

丁香散 治小兒羸瘦脾胃虛冷四肢不和少欲乳食

丁香 桂心 白朮 高良薑 白茯苓 厚朴 甘草 陳橘皮 人參去蘆頭

右搗篩羅為散每服一錢以水一小盞入棗一枚煎至五分去滓量兒大小分減温服日三四服

黃耆丸 治小兒羸瘦體熱面色萎黃不欲乳食

黃耆 赤芍藥 人參 胡黃連 鱉甲 柴胡去苗

右為末煉蜜和丸如麻子大不計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

麥門冬丸 治小兒羸瘦不著肌膚體熱小便赤黃

麥門冬去心焙 人參去蘆頭 黃耆剉 青蒿子 黃連去鬚 桑根白皮剉 枳殼麩炒微黃去瓤 地骨皮 柴胡去苗

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以熟水研五丸服量兒大小以意加減

燒黃瓜丸 治小兒羸瘦體熱乳食全少

黃瓜一枚 黃連去鬚 胡黃連 柴胡 鱉甲 陳橘皮

右搗細羅為散以黃瓜切開頭去瓤內藥末令滿以切下蓋子蓋之用蕎麥麪和麪周匝可厚三分於塘灰火內燒令麪焦黃為度去麪放冷入麝香一錢都研和丸如菉豆大每服食前米飲下三丸更量兒大小以意加減

甘草丸 治小兒羸瘦氣微宜常服不妨乳

用甘草二兩炙微赤剉搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水下五丸日三服量兒大小加減服之

治小兒勞瘦并瘡疾 本草

以黃色大蝦蟆謂之山蛤者食之 以去皮并肚腸等和羹作餅

白孩子瘦損 本草

用奴會子為煎服

普濟方卷之二百四十九

普濟方卷之一百五十四目錄

○嬰孩痘疹門 論十七道 附[illegible] 頌十六首 方[illegible]

總論 附

瘡痘證法十二事 瘡痘避忌者十

瘡痘可治者十 論瘡痘約日訣

辨瘡疹諸證 辨瘡疹斑瘡丹毒

頌

一切瘡疹 瘡疹已出未出

痘瘡未見乃可疎利 瘡疹出不快

痘瘡未見乃可表發 瘡出壯熱加渴

瘡疹大熱 瘡疹大小便不通

瘡疹倒靨 瘡疹發斑 瘡疹咽喉

瘡疹[illegible]利 瘡疹入眼 瘡疹便膿血

瘡疹後解餘毒 瘡疹後[illegible]

○一切瘡疹 論一道 方八十方

宣風散 牛蒡[illegible]散 薄荷散 [illegible]參湯

安癍散 余記治一小兒瘡痘毒氣入心

余記一婦人年十八九歲出痘 當歸丸 [illegible]散

紫草飲子 中和飲子 建脾散 木香散

[illegible]功散 人參羌活散加麻黃 胡荽酒

人參羌活散 消風散 [illegible]荷[illegible]散

五積散 辟穢丹 瀉膀胱法 大功散 聖功散

天花散 淡竹葉湯 蟬蛻物散 三豆飲 惺惺散

白虎加人參湯 人參散 枳殼桔梗湯 小兒麻豆方

紫草湯 治[illegible]百日患痘瘡[illegible]白芷湯浴方

浮萍[illegible] [illegible]散 又方散 人參丸 沖和散

[illegible]散 [illegible]丸 敗毒散 又方

斑瘡作喉痛甚者 綿繭散 瘡[illegible]方 麥湯散

瘡方 治小兒斑豆瘡方 又方 治小兒患斑瘡瘡

治小兒斑豆瘡方 又方 又方 治小兒發斑豆瘡

治疏豆瘡 又方 青[illegible]散 治小兒斑瘡斑豆瘡方

又方 治斑豆瘡 治發[illegible]方 治小兒斑豆瘡入肚者

鼠粘湯 一方 治小兒瘡豆方 加減異功散

豆蔻丸 玄參升麻湯 升麻湯 人參散

[illegible]散 治瘡痘不透者伏熱因者 [illegible]發斑湯

[illegible]六一湯 治[illegible]發熱[illegible]驗方 治一切瘡

治瘡痘 治[illegible] 治[illegible]

○瘡疹已出未出 論[illegible] 方[illegible]

如聖[illegible] 四物湯 二寶散 紅子湯一名[illegible]散

快斑散 調中散 竹葉湯 犀角飲子 抱龍丸

一出控心散 [illegible]散 奪命散 [illegible]散

治小兒瘡疹已出未出便膿此藥即稀 四聖湯

紫草飲 活血散 蟬蛻膏 消毒散 人參湯

治大人小兒瘡疹已出 抱子升麻湯 [illegible]散

治瘡疹[illegible] 治天行瘡子不出 治時氣發瘡疹不出者

○痘瘡未見乃可疎利 論一道 方十方

油剂[illegible] [illegible]油剂 又方 化毒湯 黃連散

青[illegible]散 當歸散 治瘡[illegible]作渴心躁煩不安者

油剂方 化毒散 [illegible]

○瘡疹出不快 論一道 方[illegible]方

[illegible]散 四物湯 化毒湯 紅花湯 驅毒散

無比散 如聖紫草[illegible] 麝香膏 無價散

[illegible]散 [illegible]散 神效散 加味四聖散

綠豆湯發瘡疹最妙 [illegible]斑散 快斑散 羊角消毒飲

豬苓湯　小柴胡湯　快毒丹　托裏散　又托裏散
紅粉丹　滑石散　抱龍散　淨金散　如聖散
鷄茸方　玉詠通聖散　紫草湯　治小兒斑瘡出不快偽實不語
治小兒發斑瘡　治小兒斑瘡不發　至聖木星飲子　紫草膏
治瘡子出未透黑靨者　紫草木香湯　加味四聖散　快斑散
神驗散　四君子湯　快斑散　味聖奪命膏　紫草回斑散
四聖散　二味散　犀角散　紫草湯　黃耆散

痘瘡未見乃可表發　論一道　方十二方

惺惺散　四味升麻葛根湯　羌活散　麻黃湯
葛根湯　參蘇飲　紅綿散　調解散　不換金正氣散
人參羌活散　八寶散　五積散

瘡疹壯熱煩渴　論一道　方二十五方

葛根麥門冬散　生地黃散　人參清膈散
前胡枳殼湯　人參白朮散　赤茯苓散　犀角飲
山梔子湯　牛黃丹　通關散　黃芪散
黃芩甘草湯　大青四物湯　白虎湯　[illegible]敗毒散
導赤散　神功散　甘草散　烏梅湯　又方
人參麥門冬散　抱金散　透肌散
消毒飲子　紅花升麻散

瘡疹大渴　論一道　方十方

黍粘子湯　小柴胡湯　犀角地黃湯　又方
消毒飲　抱龍丸　瘡疹論甘草散　調肝散
治小兒麻痘瘡　治小兒因患瘡疹

瘡疹大小便不通　論一道　方七方

利毒丸　川黃散　敗毒牛黃丹　東垣白餅丸
治小兒四五日不大便者　瑩心散　五苓散

瘡疹倒靨　論一道　方四十七方

大快斑丸　治瘡疹倒靨黑陷　豬血膏
治小兒伏熱在心胃不出　又方
百祥丸　宣毒膏　治瘡疹大便不通　治小兒瘡疹黑陷方
治瘡疹不透乾黑危困神妙　治瘡疹黑陷
治痘瘡倒靨方　再甦散　人齒散　治瘡子出不透黑靨者
治痘瘡倒靨不出　又方　治小兒一切斑瘡倒靨欲死者
又方二十七　固天散　神通散　信金散　抵聖丸
救生散　既效散　化斑散　治小兒瘡疹倒靨不出者
治小兒斑瘡倒靨并黑色者　又方　治瘡子倒靨方
治大人小兒瘡子倒搐方　治瘡子倒靨方　治瘡子倒靨方
麻黃湯　治瘡子倒靨　加味宣風散　獨聖散
靈砂酒　射香湯　丁香散　通神散　治小兒瘡子倒陷方
紫金散　再生散　治小兒瘡痘作變惡證皆可
神聖丸　發斑紫草散

瘡疹發斑　論一道　方十四方

羊角散　大青散　大黃散　又方　葛根橘皮湯
玄參升麻湯　調胃承氣湯　紫草散
黑膏　治小兒發斑散是毒氣　治斑瘡
治小兒斑瘡及痘瘡心躁眠臥不安　千金散
發斑藥

瘡痘攻咽喉　論一道　方十二方

神仙紫雪　地黃丸　甘草桔梗升麻湯　桔梗甘草防風湯
甘露飲子　如聖湯　紫河車散　鼠粘子湯
解毒防風湯　桔梗湯　牛蒡散　治痘瘡後餘毒上攻咽喉閉塞

瘡疹吐利　論一道　方五方

理中湯 胃愛散 紫草木香湯 肉豆蔻丸
五味木香丸

○瘡疹入眼 論一道 方七十七首

謂肝散 鵝翎散 仙靈脾散 黄蘗膏 芥子膏
雞心散 治大人小兒瘡疹出後眼目 治瘡疹入眼
蛇皮散 又方仙靈散 蟬花散 穀精草散
決明散 撥雲散 自聖散 浮萍散 兔肝丸
涼肝丸 秦皮湯 威靈仙散 金華散
治小兒出瘡疹後眼內有翳膜 透耳藥 治小兒斑瘡入眼
治瘡疹入眼蒺藜散 護目膏 決明丸 治瘡疹入眼
七退散 羊肝散 治瘡入眼 秦皮散 決明丹
凝仁散 蜜蒙花散 象石散 羚羊角丸
治孩子瘡疹入眼 治小兒斑瘡入眼 蛇退散
撥皮散 又方 治斑瘡入眼方 治小兒瘡疹入眼方
治小兒斑瘡入眼 治斑瘡入眼方 黄芩散
蟬退散 甘菊花散 治小兒目中瘡疹成翳方
治瘡疹入眼腫痛不可開羞明不出 治諸眼翳昏風痒方
知母四物湯 蟬菊散 洗方 塞耳丹
瀉青丸 補肝丸 鎮肝丸 治小兒瘡疹後眼生翳膜
透關散 大效明目膏 治小兒斑瘡入眼
柴胡散 治小兒瘡疹後眼上生膜 犀角散
決明散 消翳丸 撥雲散 蒺藜花散 烏豆麥門冬湯
蒼朮散 菊花散 復明散 紫貝散
治小兒瘡疹入眼方

○瘡疹便膿血 論一道 方四首

鹽白湯 牛黃散 黃連阿膠湯 治小兒瘡疹之後大便膿血

○瘡疹後解餘毒 論一道 方二十二首

金功散 連翹散 五福化毒丹 大和散
柴胡湯 辛寒散 三黃熟艾湯
四順飲 小承氣湯 大黃散 黃芩散 梔花散
牛黃生金散 射干鼠粘子湯
消毒加味犀角飲 犀角散 解毒丸 百草膏
以勝湯 黃連散 大效氣湯 化金丸 青黛散

○瘡疹後滅瘢痕 論一道 方二十四首

韶粉散 蒺藜散 又方二方 青金散 治瘡疹瘢
百花膏 治小兒面上瘡疹子瘢
治小兒痘瘡瘢痕 又方七方 滅痘豆瘡瘢無痕
拂實膏 又方 治天行斑發瘡 治丹瘤
又方二方 治瘡疹出後滿身瘡無瘢

普濟方卷之一百五十四目錄 畢

普濟方卷之二百五十四

○嬰孩痘疹門

總論

夫天行斑豆瘡自西漢以前經方不載或云建武中南征虜所得呼為虜瘡[illegible]大小兒相繼傳染[illegible]故也後世明堂經方始有豆瘡斑疹之名[illegible]在胎[illegible]母[illegible]骨髓[illegible]胎毒不下[illegible]血穢之氣[illegible]於五臟其毒當出穢氣入肝與淚相感則為水泡色青以應肝之象[illegible]入心與血相感則為斑子色赤以應心之象[illegible]入脾[illegible]相感則為[illegible]色黃以應脾之象[illegible]相感則為[illegible]肥以應肺之象[illegible]腎[illegible]不受穢氣[illegible]黑色以應腎之象[illegible]小兒[illegible]時發[illegible]日[illegible]二日[illegible]

因[illegible]熱而[illegible]動肝也故[illegible]知水包也[illegible]時發熱[illegible]作時以出斑子也若辰戌丑未時[illegible]發熱[illegible]日又占一[illegible]知此瘡子也如中[illegible]時[illegible]本[illegible]不[illegible]知[illegible]水疱[illegible]出[illegible]之[illegible]下不[illegible]諸陽[illegible]會於頭[illegible]小兒大概不可不為詳審也○錢氏云面燥腮赤目[illegible]知[illegible]作[illegible]手足稍冷[illegible]用溫涼藥治之不可妄下[illegible]攻發受[illegible]令五臟各[illegible]一證[illegible]故也若[illegible]五臟[illegible]大心[illegible]主[illegible]血色赤[illegible]主[illegible]血故色赤黃[illegible]

不也病色若[illegible]俱[illegible]水[illegible]故也○始發[illegible]三日以上[illegible]入[illegible]不[illegible]多者[illegible]之間[illegible]出[illegible]不已[illegible]之期也○瘡[illegible]五臟[illegible]見[illegible]是也[illegible]耳俱屬腎其[illegible]死病也凡瘡[illegible]重者一發便出盡者必重也[illegible]大小便不通者[illegible]有大熱者當利小便有小熱者宜[illegible]者[illegible]下之不黑者[illegible]下更看時月輕重大抵瘡疹屬陽出則為順故春夏病為順秋冬病為[illegible]冬月腎王又盛寒病多歸腎變黑[illegible]夏黑陷秋斑子[illegible]一二[illegible]宜急以百祥丸下之[illegible]不已[illegible]死[illegible]

不[illegible]治[illegible]水者可治以[illegible]寒去而[illegible]者[illegible]不可妄下[illegible]腎[illegible]而[illegible]起[illegible]實者可[illegible]更不[illegible]者[illegible]散[illegible]之若五七日痂不生是[illegible]用[illegible]由[illegible]大熱[illegible]動於心神[illegible]不安[illegible]生[illegible]則生[illegible]肝二臟相搏風火相[illegible]湯主之○瘡黑而[illegible]瀉[illegible]者[illegible]黑[illegible]腎[illegible]強[illegible]治之令瘡入[illegible]安[illegible]不化者是脾虛不能制腎故自[illegible]

[illegible]

○傷寒[illegible]口中氣[illegible]是瘡疹[illegible]

日類傷寒[illegible]散之治發行溫平有太

熱者解毒○陳氏方論曰小兒在胎之時乃母五臟所養成形也其母

不以其尊足忘意所欲加以五味[illegible]或食毒物其氣滲入胎胞之

中所以小兒在胞胎之時受得此毒名曰三一曰五臟六腑穢液之毒

發爲水疱瘡二者皮膚筋肉穢液之毒發爲膿水疱瘡三者氣血骨髓

穢液之毒發爲膿血水疱瘡三毒既出然後爲疹痘于母體當換口卻不

可食毒物非前所誤[illegible]犬可以其命并物世俗[illegible]未發

藥性不顧其後必傷矣○凡痘瘡不分表裏虛實不分

則無所治如表裏俱實其瘡易出易靨如表實裏虛者其瘡易出難

靨已出未出之間或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛速與十一味木香

散治之以和五臟之氣已出未出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅

謂之表虛速與十二味異功散治之以表大腑之氣已出未出之間其

瘡不光澤不起發根窠不紅或腹脹或瀉或氣促是表裏俱虛也速

與十二味異功散送下七味肉豆蔻丸治之以助五臟六腑表裏之氣

倘出一日至十日身壯熱大便黃稠是表裏俱實也其瘡必光澤必

起發必肥滿必易靨而不致損傷也若身熱口乾煩躁不止者切不可以令

水又服紅柿西瓜等令悞食之不可妄投清涼飲消毒散等藥恐令氣

[illegible]乃血氣不快也

邪不可[illegible]熱[illegible]之症瘡已出不化[illegible]三日毒氣在內[illegible]宜用其熱以藥

宜利[illegible]收斂[illegible]不能充貫皮膚肌肉其瘡

不起發不光澤不能貫不成痂故多痒塌煩躁喘者而死者皆因宜利

邪氣之過故有生者必寒戰天地萬物遇春而生至夏而長

成乃陽氣熏蒸故得長成今痘瘡之病陽氣調和則血氣充實自然易

出易靨蓋因外常和暖內無冷氣之所由也異功散能治風寒泄瀉痒

如陰陽[illegible]使發痘易出易靨不致痒塌○小兒痘瘡[illegible]

夫明是過不足[illegible]可服四味木香散[illegible]而出

中至五七日之間雖身熱或腹脹是渴令者不宜服異功散[illegible]

腹脹熱渴者不宜服[illegible]以上四味宜以十一味木香散治之

○如渴水飲或瀉白色或以發青色者宜十一味木香散[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]以十一味木香散[illegible]之不愈

者異功散治之木香散性溫平能和表裏之氣行津液清上實下扶陰助

陽之藥也嘗看小兒痘瘡[illegible]不能者○如四五日不大

便者可用肥豬膏一塊以湯煮[illegible]勿令[illegible]

子大與兒食之令臟腑自潤使毒氣易出[illegible]如不可多服[illegible]

藥恐內虛[illegible]入裏傷元氣○如六七日身壯熱不大便者[illegible]

與三味消毒散微微利即住○小兒有神氣敗亂者初出兩三日至

十三日當慎外人恐有外來風寒微息之氣觸兒痘瘡○凡痘瘡作

三次出大小不等或先稀少根中稠根窠紅肥滿光澤者一齊[illegible]

出如蠶種灰白色[illegible]明亮是全[illegible]重肥[illegible]

口乾曾渴[illegible]大便稠





若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白术散○若痘瘡欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜若與者難治而死急用十一味木香散救之○若痘瘡欲靨已靨之間頭温足指冷或腹脹煩渴氣促者不可與水蜜與者即死速用十二味異功散救之○痘瘡十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧卧則哽氣煩渴咬牙足冷十二味異功散更加木香當歸以救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物者殺之太速○十二日十三日瘡痂已落其瘢猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴亦不宜食炙煿動氣不宜食五辛五味辛者毒之物恐熱毒薰于肝膈眼目多生翳障若不依此當為兒子終身之患用兩[illegible]散[illegible]草散治之○若身壯熱經日不除

則無他證六味[illegible]散治之若還者任服如不愈只服七味人參白术散極妙○若頭温足熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡毒發未盡四味射干鼠粘子湯治之如不愈者七味人參白术散主之○若風熱咳嗽咽隔不利三味桔梗甘草防風湯治之如不愈者七味人參白术散主之○若瘡重瘡癢身熱大便如常小便赤六味人參清肺散治之如不愈只服七味人參白术散主之○若瘡實壯熱胃中煩悶大便堅實則瘡痂不落五味[illegible]散治之○或問已飲毛髮陽何也好飲冷者[illegible]不知實好飲熱者虚不知實岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲熱不知熱治之何如故陽盛則補陰木香散加之以丁香官桂陰盛陽虛異功散加之以木香當歸每一兩藥共加一錢之 兒宜悉旨兒不宜與水與若洪與之瘡靨之後其病返甚或不能痊若誤與之或[illegible]者如水不能甚則面黃唇白以治雖入之者可也盖脾胃属土外主肌肉之氣水即飲水過多則損脾胃脾胃既弱則肌肉虚則榮衛澀滞衛虚帶則氣血不能[illegible]充故瘡痂不落而身生癰腫○若痘小渴

若大便人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白术散極妙○若身熱大渴者七味人參白术散主之如不愈者只服十一味木香散○如痘瘡[illegible]著或為癢塌或足指冷或驚悸或身溫者或身熱面色白或寒戰或不止者或氣急咬牙或飲水轉渴不已者已上九證即非熱乃脾胃肌肉虛津液衰少故也宜服十一味木香散治之如不愈者更加丁香官桂更不愈者加丁香官桂及附子去其表裏俱虛而瘡不光澤者渴死矣○小兒瘡疹已靨未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪傷之則痘便凝滞破或為瘡腫或[illegible]散[illegible]不愈者謹勿[illegible]以致殺人

治瘡座方

消毒散第一 小兒因傷寒時氣運毒瘡疹欲出身熱[illegible]心煩[illegible]則

[illegible]

右件[illegible]心[illegible]

惡實散第二 小兒因傷寒時氣瘡疹[illegible]大小便不通[illegible]

右用竹葉湯[illegible]

夏月[illegible]

[illegible]

瘡參以日第三 [illegible]

瘦者[illegible]

右用[illegible]

蟬蛻[illegible]第四

[illegible]

右用四[illegible]

黃芪[illegible]第五 [illegible]

右用[illegible]

[illegible]

一害大之思[illegible]

瘡豆痛状第六　瘡豆正出大便如常或堅實或黒黄勿忽增寒或齒者
是瘡毒痛状多作此證
右用大戰散首病若退隨證更發瘡豆如不退者死
瘡豆吐瀉第七　瘡豆正出吐瀉不食忽增寒戰齒者瘡必黒陷喉中
涎當盡逆先受風冷血氣虛弱出變此證難治多死
右用益黄散甚者金液丹正食前者吐瀉定後思食證平復方可用
發瘡痘藥　設有安者必生癰腫
大小便閉第八　瘡豆盛出身熱煩悶腹脹而喘大小便不通面赤悶亂
右用八正散四順飲下退宣風散
瘡豆入眼第九　瘡豆盛出熱毒來攻則斑瘡入眼多是毒物所致者
覺眼腫或赤痛多淚時時與服看[illegible]瘡即不害者有瘡不腫者
右用四順飲每日食後一服常令微利滑泄不令不害目
鮮利瘡豆第十　瘡豆出盡毒未盡大便如常者
右用四順飲子利三兩次後不生別病如失鮮利恐赤眼癰腫身上
痾疥瘡[illegible]皆不能免也
豆毒發驚十一　瘡豆出後身熱不退時時搖頭手足抽掣發驚搐
右用抱龍丸[illegible]散救之四順飲入王散羌活湯白术湯
不退[illegible]此散蓋豆毒所作也若瀉者此證者多死
瘡豆作痢十二　瘡豆欲出不曾傷食有[illegible]者是豆毒大盛氣血熱
結腹中不散久必作膿血痢
右用四物湯加鼈甲更使大便堅實或瀉焦黄或熱或不熱有肚脹者
四順飲者瀉白散具瀉食肚痛者先益黄散後解毒丸令微利耳
瘡豆避忌者十[illegible]
益黄散
[illegible]房中[illegible]〇婦人[illegible]
[illegible]
〇[illegible]
〇保[illegible]頭髮[illegible]
[illegible]上皆不可犯令兒變動不可不忌
盖乳哺之母也或曰有田舍小兒往之目然犯之者都無變動何也蓋

貴賤有異稟受不同也
凡出瘡豆首尾不可出風直於屋裏香生臥室通傳所見動風物食白
魚野味猪[illegible]雞鴨肉安食見瘡豆才出著[illegible]即用酥蜜而[illegible]不住圍
之可揭其[illegible]遍身瘡破成瘢痕[illegible]
瘡豆可畏者十
不食多渴[illegible]〇長壅[illegible]
〇增寒[illegible]〇煩燥[illegible]〇[illegible]
逆泄[illegible]瘡作黒[illegible]
大小便[illegible]〇腎[illegible]面[illegible]
痰盛[illegible]喘急
是瘡豆忌諱首[illegible]可畏也除此之外皆不妨內犯其一二者但飲食
如常雖困重醫[illegible]不可生之[illegible]如飲食減半日一半者死有飲食如
積[illegible]內犯其三四亦死[illegible]
[illegible]
論瘡疹形日數
小兒瘡豆與傷寒相類或寒或熱或見或隱皆六七日之間歸證明矣
凡瘡疹出先發熱輕者三四日次者五日遠者不過七日此則法也一
日太陽傳膀胱二日陽明傳胃三日少陽傳膽四日太陰傳脾五日少
陰傳腎六日厥陰傳肝七日遲經傳遍五臟六腑故七日而止也又有
小兒因傷寒至七日後或已汗未汗或吐下後熱不除此毒氣盛而
未發熱毒入胃發於皮膚或斑者狀如蚊蚤所齧赤斑十生一死黑斑
十死一生又有胃熱發黄者狀如橘色不利者死又有成癮疹或白泡
皆此胃傷熱毒不同多寡必喪也
辨瘡疹諸證
[illegible]氏云瘡疹之熱與諸熱似是而非者同而異此病之所以能惑人
也乞小兒瘡豆其初不見未發熱之以辨見面瞼之證可火須[illegible]時作
驚悸作[illegible]手足冷多睡面赤咳嗽打噴嚏耳尖耳後[illegible]但[illegible]病之熱
種種不同如手足[illegible]微冷發熱惡寒而無汗面色青慘而不舒左額有

青文者傷寒邪也手足稍微温發熱自汗面赤而光者傷風熱也目胞
腫而右頰有青筋發熱而項頸強壯成甚或兼嘔吐腹疼者傷食熱
也面色青紅額正中有青紋手心有汗時作驚惕手脚脉微動而發熱者
此驚熱也身熱而倦懶食唇紅頰赤大小便秘脅下汗者此風熱也又
又脚熱者發渴有時壯熱者一向熱而不已如常其不分一臟調治
難不敢事○諸熱失治皆能作痘瘡者盡病有初無而後同者要當為
之所且痘豆之毒蘊伏在裏非熱不發熱則血自而出是以古書云熱蒸三
日而斑生往往其間已見痘豆之證今也不問爲寒為風傷食之熱與
夫驚熱風熱或寒熱壯熱之類又而不去内外感發則所發痘豆之毒
相能乘間而出用藥者既先知熱之所以異又能處熱之不辭者將為
瘡症之證斯可謂之良工矣嘗觀傷寒有目胃閉發斑豆毒發斑三者
其均發熱也方其熱作之初熱正明其有發斑之證則其諸熱火治而
既爲瘡豆者斯言信矣○挾熱而吐利者不可誤服溫藥蓋痘豆後
而先發搐者不可遽投驚藥經云諸痛痒瘡皆出於心今痘豆之出雖四
臟各有證要之心實爲之主毒氣始作未形見之間忽發驚搐是毒氣
自心經而出也苟不以内外證辨之不爲瘡豆而爲驚風誤投朱砂腦
麝青黛寒藥則心實而肌欲肉閉往往瘡豆之初似驚風搐者
多喜見候服寒藥而死者氣絕之甚者或便斑出已無及矣豈心實一
實則毒氣閉伏表裏不透又況心主一身之血心實則血凝而不行瘡
子欲出不可得也且瘡豆發驚必有它證相雜又有小兒平居素無
無疾苦而忽作搐者必是瘡豆先當調理血氣使毒氣如性易
升麻湯紅綿散數服快氣利小便等藥服之雖未能即効亦不敗事待
其熱氣得泄心神亦自安矣或有風寒與内熱相搏而致此者則各有
其證治之亦如前法但加勾氣藥爲妙張氏云瘡豆氣勾即出快蓋氣
勾則榮衛無滯有實亦散大凡治驚推平肝利小便最爲要○小兒
臟腑特先有伏熱而適外感風寒或内傷生冷以致陰陽相拒發作寒
戰或腹中作痛攻擊者手足稍及尻陰俱冷而腹中硬痛者是瘡疹證無
疑矣更參以其它證候尤爲詳審但以平和勾氣而發散藥爲妙苟不
知此便投巴豆大黃等藥戕賊胃氣使毒氣不能宣發或毒歸其間致
有能發見者往往中道而變爲倒靨爲陷伏紋歸不救○古人之升麻

湯治小兒瘡豆嘗見古人之意蓋治瘡豆之常不治瘡豆之變何也未
有斑點之前均發熱者常也已結痂死之後均有餘熱擁閉而肌表未
清涼者亦常也是以升麻湯方狀云治瘡疹未發已發未發者謂未見
斑點之前已發者謂已作痂死之後此升麻湯所以爲治瘡疹之常者
也若夫斑點既見與夫痂死未結其傳千變萬化治法在隨證活法曾
非定論之可拘如傳變之變異不一也當此之際安可執一藥以應無
窮之變哉且升麻湯所用之藥不過涼肌解表而已未見斑點之前已
結痂死之後則可以涼肌可以解表古人處方之意如此焉言今見之
於瘡疹正作之時即令服者不能免此陷見斑點尚令兒服[illegible]致肌寒
表虛陷伏而死殆多矣[illegible]
[illegible]
以而不救[illegible]○如求可驗者定熱兼三日則紅斑生紅斑
生豆是心為青不拘多少重者是數數而已紅斑生血疱起如
豆在肌膚之上故以痘為名豆疱結膿疱血疱結痂者未有為愈也紅
點既見慎不可用升麻湯蓋升麻湯大解肌古人已見而出忌者用
素草飲子甜酒如鐵旗平和者力量服藥惟宜穀實養之紅點出齊
之後作血疱七日結膿實膿實結定七日成痂死此皆大旨之言耳
為人虛實不等不可一切拘以日數且古人云熱三日而生斑今有熱
七日或數日而方生者有熱一二日而即生者自紅斑出齊之後當
以成血疱若如痘之中又嘗有紅斑點相雜者不可拘定日數待其齊
作血疱爲其如紅斑出齊生血疱血疱七日結膿充膿疱七日結痂死
此乃學術調和内外無滯傷犯于能如斯或正作之際遇風寒變遷
違忌而失序不可之拘以日數或其有當結膿疱而不結者是毒氣
少盛而不得罔濟己毒以解之殆為毒見是治毒氣太過血疱脹起不結
膿者壞瘡已成不結而死毒仍未毒服解之候入于心令兒昏悶而死故也
非若外感風寒而曾發盡吐瀉而陷伏者之比○出不快者數證不

言不可不辨白紅斑出者之後當有成血疱血疱成膿疱膿疱結痂而愈也若紅斑已見三四日而反不出者乃毒氣內陷其證危甚切不可妄發及妄下發之則為斑爛下之則為痘脫凡小兒痘毒在內遇冬溫或春夏暄熱勝也蒸熱[illegible]而為痘正若發之際忽天氣大寒毒氣鬱伏而不出外[illegible]神昏胃血[illegible]諸當此合用解肌表出如紫草[illegible]發散兼溫養和血散之類實證平[illegible]者只和解發散之劑皆可斟量用之又有紅斑方出或[illegible]因胃[illegible]自利者[illegible]不食[illegible]而不出者宜用[illegible]大抵[illegible]可用大抵[illegible]一時之不及不可[illegible]以常[illegible]血疱之際一[illegible]是紅斑[illegible]者此毒氣[illegible]起[illegible]也當此必不能乳食大便如常者[illegible]生痘大便[illegible]宜理中[illegible]以養之[illegible]見不伏陷更又有內實之人[illegible]視皆若有之痘而得平順者[illegible]昏迷而發作不伏用白虎石膏[illegible]

痲疹證隨時審諦不可輕忽也○大凡平居安樂則心神調暢氣脉和平一旦有病則陰陽俱勝氣衰不能發痘已出而不能[illegible]者心人治法唯透肌解毒而已肌透毒解則無壅塞之患自然出可從而[illegible]痘之時[illegible]藥酒之類出大[illegible]而面黃大便色黑煩躁喘嗽者此為有瘀血在裏宜犀角地黃湯及[illegible]中加紅[illegible]甚者若大盛之際不能解利則其[illegible]如抱龍丸生[illegible]青生犀[illegible]香之類皆可選而用之若大便不利實小便不[illegible]又當以求合法者觀傷寒邪在裏則不可妄發汗邪在表則不可妄下痘瘡之不可妄發妄下者尤甚於傷寒雖然治痘瘡之家有云非微汗則表不解非微下則裏不解者何也此說微汗則在表熱方[illegible]見之先微下之在痘之始及痘之末裏熱壅實之際何嘗於痘瘡正發作之時而輒施汗下哉蓋妄發之則成斑爛妄下之則成虛脫不可不審如治傷寒[illegible]表和裏病下之則愈汗之則死表病裏和汗之則愈下之則死有此理也[illegible]

[illegible]

不緩大腸主傳送已化之物[illegible]平居令裏實令[illegible]之處宜飲食進[illegible]則知人[illegible]大便[illegible]中平和[illegible]非合下[illegible]日而[illegible]出者可[illegible]之[illegible]是痘未[illegible]不[illegible]變致也今人才見發之不出則加藥加藥又不出[illegible]者因[illegible]不出[illegible]為[illegible]痘[illegible]致也[illegible]以百祥丸下[illegible]毒則膿土[illegible]之後莫先得[illegible]上[illegible]來下之先則不[illegible]

有三證一者痲二者[illegible]三日未[illegible]日[illegible]痲疹宜預下之又[illegible]云痘瘡出定大便不通[illegible]汗不乾者可下之以此觀之當[illegible]是病之始未出之前及病之末[illegible]定之後非正出之時可下也大抵用藥治病能通權達變斯為良工至於可用下藥者當出於不得已然傷寒有承氣之戒當慎之至也戰然有當下證而不卽下者又為失下之患所貴乎細審察耳○有可下證者痘瘡出得太盛毒氣結聚疱[illegible]而不結者此是毒氣內外實甚若不速解之毒氣內入攻心為害極大古法宜[illegible]膏[illegible]不結[illegible]脈濇諸不大便者當以承氣湯下之如無熱甚而胃面赤煩亂大小便秘或大吐者合利其小便通其[illegible]數主之或痘疹已出定膿汁不乾而大便不通者宜[illegible]丹或痘疹證而未見斑點胃熱相作[illegible]脹大小便秘[illegible]脈沉滑而[illegible]者此是毒盛而不得世[illegible]下之則內[illegible]寒[illegible]汗[illegible]其[illegible]自出此皆合下證也○有發出有[illegible]毒者五病有輕重善[illegible]者能令重者輕輕者安和仲景論治傷寒[illegible]世走[illegible]身[illegible]喘[illegible]有痘疹證而斑點不見其[illegible]

者以麻黃湯等發之若斑熱才見即止從服此謂表發而出之也或曰
受法弱脾胃虛令大便自利而手足厥逆者烟陸蓋表甘草湯益黃理
中輩可選而用之此選數使之自出也或瘡症正出有毒入大腸下利
黃赤膿血身熱而渴者以雄白湯三黃熟艾湯解之此解其大毒而從
之自出也然斯三者或發或温或解其毒其證不同在書而用之也○
有令大便過者翁曰譬猶蓋瘡未傷寒傷食等病身有熱者如大便六
七日不通頁之智過作取其峻快也然亦當以外證參之如神異論陽
結塗結頻十四日十七日方劇若其人不服病不重急使更則亦不以攻之
令言六七日令聞過者汗氣道升降則無壅遏之患小兒脾弱有熱
而大便不通者易實大使自利者則易壅惟令得所取為要法其有
壅或唐燥者須要理中易凡當愈之又恐出得正盛而兒腹痛小便赤
掌心及腹下有汗或譫語而大便不通者[illegible]承氣之類以下之下
後瘡子紅活諸證悉退者更不須再服也○已出而瘡症出則不可再
利者飲食滋味雖能益人失之太過亦能害人況熱毒燥悍之藥在也
下之後其可再用乎但當其未出因熱勢太盛曾利臟腑令瘡痘

出則是內無壅滯明矣雖其熱尚熾但當解毒切不可更用利藥
藥蓋實實虛虛古人之深戒雖然若使不令再利亦當更用但小其劑可也○
大熱當利小便小熱當解毒者大熱謂身熱脈實大小便秘澀津液澀
而焦氣滿子胃中能食而不結腸閉瘡疹痘之際慣其變生它疾故
利小便使心大有所導引則雖不用冷藥熱亦自減是瘡痘不至熱盛
過不為令[illegible]甚為良法小熱解毒之說謂小熱不解大熱必生利其小
便則恐損氣故但可解毒而已利小便之藥為上解毒之[illegible]
然[illegible]易獨聖散如聖蘆草湯等用[illegible]皆可選而用之○浮脈熱[illegible]
自瓊令藥則天陽者蓋五臟平和能相資養一有太過不及則病從而
生令瘡疹者是支裏俱熱而發出或能之以觀其勢大危難而[illegible]
喉癰腫之症甚則[illegible]生風熱之毒炎上不已無不害目者或卿之
以冷藥則[illegible]土無[illegible]之氣胃本又腸為[illegible]而伏結至夭[illegible]不可
不戒○有瘡症有膚疹者臟腑不同表裏有異膚疹瘡症分別瘡
寒六腑屬陽有熱則易出是以作膚疹一出則過而肌皮之上如風癬
細[illegible]子見而便沒其所受氣[illegible]故也五臟屬陰有熱則難出其為瘡症

在肌肉血脈之間必先發紅斑而後如豆瘢名瘡痘其所受氣深故也
大抵暴熱而便出者必膚疹久熱而難出者必正瘡痘膚疹非正瘡痘
也○傷寒熱毒發疱瘡相似者傷寒熱邪在表未能作汗或當汗不汗
熱鬱於肌膚故發疱瘡色白或赤如火丹頭作瘰蔓向根者輕根下漸
色深隱在肌肉者重甚者五六七日發皆有之其形亦如豆小兒肌肉嫩
薄尤多此證非正瘡痘也[illegible]溫疫溫毒發斑者
活人書云冬月溫暖[illegible]在表或已汗或未汗表
證未發毒氣未散[illegible]之又冬月溫暖人或感乖戾之氣冬未
卯病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉
斑爛癮疹如錦紋而心悶但嘔清汁者根據發為毒小兒當多此證
醫人不識妄亂[illegible]不救事非正瘡痘也○[illegible]為重痛為
實內熱外痛為外實內虛外熱內痛為內實外虛又云結實為痛令痛
痘瘡身疼者是發作之時虛實虛而[illegible]外寒相搏故也[illegible]以自
氣去寒解肌達毒之劑為妙不必外此而究之身痒有二[illegible]則氣
細不足其痒為虛活血或因君子加黃芪桂[illegible]散主之一則不能食湊

以致發痒皆由胃為主之毒痘作痒深為可畏宜調胃散加黃芪芍藥令有
此可為上策○瘡毒入大腸者常發作之時其人或嗽氣自利或因服
寒凉藥傷動致令瘡毒陷入大腸屬下血黑汁或便膿血或便黑屎才頻者
如豉口內臭氣多黑目閉如睡脈者必死之證當急服解毒之劑
救之得大腸壅閉瘡痘紅活亦死中求生也○咽喉痛者必有熱上
攻於咽喉而疼如蕪口舌生瘡咽喉浮腫痛者宜甘露飲大便不下者
宜以如聖湯加龍腦消毒飲皆可選而用之已上並須用能食者
消毒飲亦可用加上焦痰熱小便赤大便秘結飲食不思者宜以
前上溫下清調和之○白入目方書云心熱風肝熱肝主目熱毒重
則故為目赤治以涼肝丸洗以黍皮散[illegible]良毒物清大
也宜仙靈皮散兼宜蘆薈丸[illegible]宜羅此散
稱宜人參敗毒散[illegible]肝疳者宜大黃散
貼[illegible]
瘡症以心經有熱[illegible]
父氣毒盛是也不收病則靡身狂不調之逆當更宜[illegible]必生

紅腫而後知之大抵名亦各異其所受氣深故也大抵暴熱而便出者必屬疹
又稱麻而難出者必正瘡痘屬亦不正瘡疱也○傷寒熱毒發疱
瘡相似者傷寒熱毒在表未能作汗或留汗未乾熱毒於肌膚故發
疱瘡而小者其狀如火丹頭作寧或有腫者輕根下紫色是疹在肌肉者重
甚者五內七穀皆有之其形亦如豆小兒肌肉嫩薄尤多此證非正瘡
瘡也[illegible]冬溫發斑者活人書云冬月溫暖
觸冒寒氣至春始發病初在表或已汗或未汗表證未罷毒氣未
散故發斑黑者一生之又冬月溫暖人感乖戾之氣冬未即病至春或被積寒
所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛癮疹如錦紋發
而心悶嘔吐清汁葛根橘皮湯主之小兒尤多此證醫人不識妄亂調
治遍不散毒先[illegible]正瘡痘也○經云痒為虛痛為實內快外痛為外
實內虛外快內痛為內實外虛又云諸痛為實諸痒為虛今瘡症痛者身疼者是
發作之時皮膚內實[illegible]故也皆以內氣去寒解肌達
毒之劑為○不[illegible]而痒者也身痒有二證一則氣血不足其痒為虛宜
血散加黃芪木香主之一則不能食以致發痒蟬蛻一物湯

主之瘡症作痒深為可慮能調和氣血則不致今有此乃為上策○瘡毒
入大腸者當發作之時其人或臟氣自敗或因服寒藥傷動致令瘡毒
陷入大腸泄下如豆汁或便膿血或便黑汁額赤如錢口內臭氣唇焦
目閉加腹脹者必死之證也急用實脾暖胃之劑救之得大腸救固瘡
痘紅活亦死中求生也○攻咽喉者心胃有熱上攻於咽喉乾澀而疼痛如
魚口舌生瘡咽喉浮腫者宜甘桔湯飲小兒不下者紫雪或如聖湯抱
龍丸消毒飲皆可選而用之已上諸證俱能食壅熱亦熱者方可用如上
焦雖熱而卻見小便清大便溏薄飲食不進者當以清上溫下藥調和之
○治入目方法熱盛則生肝風肝主目熱毒痘之故為目患治以涼
肝丸洗以秦皮散或同食毒物積熱出者宜仙靈皮散暴赤腫痛者
宜蕤仁赤散遠半年一年餘者宜蟬蛻散成翳者宜蒺藜散密蒙仙散
目腫疼痛者宜浮萍散生瘡瘡者宜大黃散貼之赤脈傳睛者宜羚
羊角丸傳睛者宜金花散已上各證論列之○面青為逆者瘡瘧之血
為主身熱煩燥面赤皆陽[illegible]見也所以面赤者為順今反見
青色是色不與病相應安得不謂之逆當更參他證以實防之實以生

風重者必下利變證各宜思所以預救之之意治未病之意也○遍身
俱青紫紋者此由外感風寒致內熱氣故也瘡症之出蓋熱邪自內外
出發其有當熱作之時忽遇邪氣入寒熱毒方運出而暴被寒折之外
寒為內熱拒而不得入內熱為外寒附而不能出毒氣壅於肌皮之
間如瘧疾如瘧熱或青或紫便秘或云身熱青者是也壯年出者皮
膚等有理寒多此證宜用透肌散紫草散荊芥飲散
知火盛則遍來之劑可見用也狀如蚊蚤所咬而色黑者何此特血不能
流行內外毒氣壅遏散而未散故也大瘡黑者血熱凝血和則其色如
丹砂如臙脂石毒氣凝則聚則成黑色有此證者甚為危困其人
必大小便秘而思煩躁宜用山梔子湯宣毒膏治黑奪子無比散其
云紅瘡倒靨而黑色者謂之黑瘡十見猪尾山將腦子和猪尾血
調腦子塗其人自利不食者難用不可不審○瘡出而腹脹者有二證
一則陰陽不和一則毒氣內伏入裏瘡疹王作熱毒既出必生煩渴
或飲冷過多或誤投寒涼之劑令所欲出而不能令熱相拒毒不得
越故令腹脹甚者氣喘發厥腹滿無血色多至不救急當以溫中

藥殊自令氣令致服藥白術散者又不又因當歸致令重困
且傷於令者以不飲食大小便利腹中虛脹此傷令之證宜溫氣和中者
毒氣深伏者必[illegible]但用溫平解毒伏氣之劑如人參救活散之類大
抵毒氣深伏者必又有色潛相鬱或煩躁大渴或大小便秘或啼哭不
止為一證腹脹而目閉口中如爛肉臭者其證為大惡○小便赤澀心腹
脹滿者伏熱在胃則中有所鬱上焉心氣不降小便澀少而下焉
陰氣不升腹中脹滿或用四聖散發出其毒得胃中熱散則邪氣
自然不擾詳其藥味紫草發散為君以養瘡症解毒和氣為臣木
通導心氣而利小便又以甘草調和之○出痘而日夕啼哭者何凡人五臟
和平則精神安靜有病則不然今瘡症是五臟毒外發時致
作之時朝夕啼哭者由神不安舍然其毒氣在表在裏若虛若實
陽證熱甚大陰寒盛衛氣虛則神守清快昧者不知見其啼夜啼哭或以為心熱
或以為腹痛妄亂投藥以致令熱倘勝變生它證可不審哉○煩躁渴
煩不得睡者謂痘瘡當盛之時作之時必令心火有所攻引而或
不然毒氣已出而大盛及逆生煩躁以生黑豆煎湯令冷不飲之渴

者常食飲可以解散熱毒乃復陰氣抱龍丸生犀磨汁等皆可選用甚
者新汲水調砂糖少許飲之又有津液不足虛煩不得眠者活人書酸
棗仁湯最佳○或吐或瀉而不能食者有冷熱二證吐而不渴瀉而手
足冷而色青白此冷證也益黃理中等主之既吐且渴雖瀉而手足心
熱面帶赤色此熱證也五苓散竹葉石膏湯加橘皮等主
之不食亦有虛實之異脾胃怯弱精神慢而不食者爲虛當溫養之身
熱中滿渴而不食者爲實當清利之○便血或下黑糞睡不醒者瘡疹
雖是疫毒而發所以爲之宣行者實血也今大便下血是裏毒大盛或
下黑糞者其理亦同加之睡不醒者譫語俱爲甚惡蓋一身之血心爲之
主便血下黑糞而又睡不醒則是心之神昏矣犀角地黃湯抱龍丸小
柴胡加生地黃等主之○當下當救裏不同者瘡子未出未出此裏
毒未盡也若其人大便不通腹急喘脹悶亂作渴譫言不安者宜急
下之蓋毒氣鬱留內外皆熱當令大便微利若其人過吉自和四
肢厥冷腹脹發渴者以裏氣虛也宜急溫理中輩急救之一則言當下
者恐毒氣太盛伏悶而死故也一則言當救裏者恐重虛胃氣脫

細故也虛實之證相反如此權衡之際可輕易耶○驚搐不寧者瘡疹
之初斑點未見者惟當用辛和散行解表使風散抱子湯等藥安斂
子等解之或有不問虛實便以胡荽酒四之滿面噀之又火烘入
陰濕調服之治之瘡毒攻肺虧損爲害輕實之人則禍害至是毒之未
盡更攻耳目口鼻咽中閉塞大便堅如小便如實可解毒未散毒
氣無所從出反攻臟腑瘡而不起變成倒靨當此之際不能解利至
於難治矣是陽盛熱熾而陰氣以感之也如猪尾膏犀角地黃湯
角膏猪尾膏可選而用也○凡毒氣解散瘡痘通瘡子將出出矣且初
覺頭痛發熱惡寒須辨咽痛者宜升麻湯如聖湯麻疹或痘疹者
宜荊芥湯甘草大便秘小便少而或咽者宜小柴胡湯不惡寒但煩
燥而渴作斑點者宜竹葉石膏湯犀角飲子大便秘通者宜四順飲
子如譫言毒甚者宜承氣湯或大便自利亦黃而渴者宜三黃熟艾湯
黃連解毒湯中病即止不必盡劑也○瘡痂者病瘡發熱而不發痂則
毒氣閉塞喘促悶亂不當發散而竟發散則熱毒隨陽氣發不出痂自
交劫知此不善者之過也○此法宜調理進食令大便得所安養榮衛

生氣耗散則目赤咽痛口瘡之類是也所謂之不至於冷損養不至於
熱矣爲是治斑疹作瘡痛者皆用乾黃土爲細末付之輕者則研芭蕉根之
猪膽汁調塗勿令動者宜作痂而死有毒入陂不能眠臥者用麥麩
又有因發表過甚外爲斑爛而内虛陽氣不守作嘔寒自利此又急當
救裏用理中之類臟腑既平則斑外亦可護也○患汗不能者
出得太盛裏虛滿不可等參苓白术黃芪甘草之類不可歇瘡
瘡者只暖乾中黃土細以浸漬之大錢當參麩鋪臥如毒月熱盛
發實之以色紫黑爲狂○陷伏倒靨者乃瘡不能出者謂之陷伏以發
靨是或被惡氣侵觸而不得出者謂之倒靨此二者[illegible]末經[illegible]不同若
一發用藥少緩失於瘡痘以出[illegible]爲中於腠理亦死爲
表且熱甚之時熱毒方盛出未有陷伏亦有倒靨者若外爲風寒所襲
閉塞血氣而不行以身體四肢[illegible]不能發黑色或青紫病疹
死爲倒靨四五日之間[illegible]
瘡毒[illegible]行則[illegible]胃虛而不能[illegible]榮衛[illegible]而[illegible]
從[illegible]色或黑色其人必不能飲食大便自利或嘔或喘此胃虛[illegible]
不能出謂之陷伏也宜用溫中之劑令其胃氣榮衛復行則瘡自出矣
宜理中湯丁香煮散之類甚者[illegible]可用[illegible]爲中者是[illegible]
出瘡之後其以[illegible]至起發之上乃[illegible]也
七日當結靨而死治此或風寒[illegible]或胃虛[illegible]利而[illegible]
使者治之亦如前法又有[illegible]等[illegible]死而黑者宜用猪甲[illegible]
者當須[illegible]解之良方猪血[illegible]毒入臟而不出○黑陷而
目閉反臥者[illegible]以其不[illegible]也當其陷伏之初及[illegible]
之際一身俱熱而反手足冷此即胃之弱也蓋足耳[illegible]爲脾胃
[illegible]陷是[illegible]耳亦爲之[illegible]爲大逆戴人立論用百祥
丸瀉[illegible]而[illegible]表裏[illegible]身熱[illegible]飲水者可治以[illegible]
[illegible]而[illegible]也百祥丸之意即活人書[illegible]傷寒[illegible]用
[illegible]爲[illegible]不得已而用之[illegible]十救一二而已○瘡有逆順者大
凡[illegible]從本是逆[illegible]有順者[illegible]可以[illegible]
[illegible]此必[illegible]令[illegible]不[illegible]入[illegible]爲
[illegible]也經云[illegible]病[illegible]之今[illegible]既[illegible]他[illegible]矣[illegible]而逆者謂[illegible]

虛不能制腎氣食不消水穀雜下脾虛受毒四臟皆困而危殆然古人云
病在腑者易治在臟者難治瘡黑乃變壞入臟雖得脾胃強盛是亦九
死一生之證耳○既出而狂叫喘呼者瘡疹已出熱毒自裏而達外狂
叫喘呼者臟腑熱燥而無津液也今五臟皆熱無陰氣以和之故令陽
獨盛於上爲狂叫爲喘呼宜犀角地黃湯皆熱抱龍丸竹葉石膏湯更
看大小便何如不利利之則平○熱盛則出愈難其證大便不通小便如血
或爲癰瘡身上破裂者○瘡疹本因熱而出熱勢甚則其出愈難蓋熱
盛則榮衛爲之閉塞毒氣壅重表裏皆盛者大便不通小便如血裏毒盛
者或爲癰瘡身上破裂表此由不善解利之故救之之法宜犀角地黃湯小
柴胡加生地黃四順飲牛黃散紫雪之類可選而用之○不結痂疕者
血疱既成當結膿窠痂疕而愈當結而不結者由內外極熱毒氣散
蔓無陰氣以斂之古方以宣風散導之生犀磨汁以解之或斂之以涼
肌之藥皆隨手而愈然用斂藥不可失之太早恐使瘡子入目切宜忌
之○誤以巴豆丸藥下之則腸虛而熱不除蓋腸胃有熱而須入湯
滌者宜湯液之劑飲食盛積而須下者宜丸子藥今瘡子有合不

謬以巴豆丸藥則徒損胃氣熱毒反得以深入其熱愈甚不除或數便膿
血爲癰瘡爲壞生變證皆用藥者當知之百祥丸證瘡黑紫而乾陷
者以百祥丸下之不黑者慎勿下然陷下有數種當以外證參詳避風寒
而黑陷者宜溫養而表出之被穢惡氣觸而黑陷者當重解之
若大熱毒盛陷內外蒸熱不結痂疕大小便秘膿血而黑陷者宜以百祥丸
瀉膀胱經毒服之身溫欲飲水者可治是脾強勝腎陷者當復出矣若
加以寒戰身冷汗出耳尻反熱者死○豬尾膏證瘡汗實汗皆汗也虛
熱實熱皆熱也瘡疹倒靨亦有虛實之不同可不分析而辨正之哉
如瘡疹始發或斑點或血疱未結痂疕之際因久不食或自利或感風寒
至不能出者雖名倒靨亦不虛實宜溫之甚或心煩狂躁氣喘妄言如
見鬼神大小便秘澀而能食毒盛而倒靨者此證爲實宜請證遠
宜豬尾膏又有血疱六七日當結膿窠痂疕而不結者是毒氣盛宜心
火獨降當爭宜用豬尾膏同之既一服者得手結痂疕神速特
意以異恩之人過寒暑不常之時脫着衣服令先呷冷水
一二口即不感冒者

是心成熱經絡血熱則風火不能侵也今用豬尾膏正以血能歸心引
腦子以涼之心不受毒不得擾其榮衛矣是以血疱結膿窠結痂而
愈諸但退矣如傷寒厥陰冷土敗木賊以承氣湯下之脾胃毒去則脾
土和水升火降其氣行而大汗解豬尾膏之意等心氣通轉裏轉熱
則氣和神藏自然痂疕亦當結而不結者心毒復入於裏則喘而死
故也以此言之瘡疹至血疱欲作膿之際而毒氣已盡在外矣殊普兒
斑瘡之變血疱由是便用豬尾膏殊不知毒氣未盡而使心胃寒氣
則毒氣內陷殺人甚速然則豬尾膏一藥是實熱證方可用也纔結
痂疕即以真膩粉之用手捺破或去又更出之時頻是乾硬深入肌
肉故又方說速成瘢痕之理也然人多不晚至瘡疕平早剝成瘢痕何
其謬也然既剝去之後卻不許乍見風令須當愛護其氣不然剝去即
又出風太早以致成瘢痕者是也宜以滅瘢金之方芙蓉散[illegible]爲詳
黃散青金散皆可選而用之○瘡疹起而能食者人參以參耆爲當補
有瘡病則精神氣血爲之不無況小兒瘡豆百骸然後見豆既痂疕日
數雖有遲速之不同其病始終若不安實皆是大率瘡疹痂起則中氣衰虛

多不能食此時參芪實滿皆至其宜若有瘡病起而能食者是胃中富
有穀氣故也蓋胃熱則殺穀所以能食其人更大便稠秘或大便難當
用三黃丸利之否則恐胃熱不盡爲口臭齒齦生風之證遂致凶敗
則發爲癰疽瘡腫之毒是說也惟善治者知之然亦有一事聯胃
氣壯實者自然能食大便亦不至有秘結之患此又不可不知也○病
後解利當瘡實者當定有虛實病有此實病後亦有虛實不可一概
論者如後當須解利此世俗通稱實可也且小兒實受效實榮
衛充壯病後有熱者宜與解利其證大便秘小便赤能食而大便秘
者宜大黃散留熱在胃嘔吐不止○古方瘡後下利黃赤者宜黃連散
煩渴而小便少者宜五苓散除熱退熱腫疼或膿且宜胃苓散甘露飲
宜抱龍丸如聖[illegible]者熱毒蓄之思呼而不得眠者宜[illegible]散大腸下血
瘡疹者宜牛蒡散三黃散又初生瘡者宜小柴胡加生地黃湯犀角
地黃[illegible]當須將其長而已虛其人面[illegible]瘡疹既出之
後榮衛不壯[illegible]大便不秘小便不赤飲食不甚進者宜胃愛散
異功散四君子類以扶持之其飲食如舊起居和勝榮衛既充然

後收斂解毒，至靨之人不必解毒也。昔見庸醫小兒不應解毒而強與解毒，過為寒中，為下利，生病多端。○痘毒作嘔吐者，脾胃主納而不出，大小腸主出而不納，齊病則嘔吐並見。嘔吐者是餘毒在胃也，然有冷熱之不同。如心煩作渴，食乳甚急，飲滿乎脘中，嘔復吐出，如對其人，必面色常赤，手足心熱，若愛冷水，此熱吐也。如乳食水漿停吐而色青，口手足冷，大小便自利，此冷吐也。熱吐者竹茹湯、人參竹葉石膏湯加橘皮之類主之。冷吐者益黃散、理中湯。凡主之要之，痘症餘毒多是熱邪，其間冷證十有一二也。○痘後忽過發青黑色，手足厥冷，口噤，喉中鋸聲如中風也。小兒居處寒冷，養護不忌，作前項證候者，由節令氣逆之不正之風，乘虛中入也。如脊手足直，宜敗毒散三錢，薄荷末一錢，分為三服，服生薑湯，待才走則喉中發熱，是為後之邊。三風邪者病作搐，外感寒，當前所為京師醫官夏…宜用先…不食者，小續命湯…附加熱赤可用也。○痘後非時發搐者，一則心熱留而不去，痰…風火相搏，莫必喉中有痰，目直上視，面赤引飲，若…凡小兒…如生地黃之類，導赤散。

福是人必煩熱，大便閉，是燥熱不通，或慎也。理宜…一不易事利之用藥之際，要在加審。○瘡疹膿血稀者，此由毒氣留連經絡，經投於氣，因虛或閒，寒飲傷風，而成瘡，又或既平之後，失於解利，餘毒大泄外，不得以發，更實而不得入，不得入於臟腑，發而不出，遂為之瘡。如毒氣多者，發膿，膿而已，甚者宜更易胃臟。手足腹痛作瘡，白湯惟小柴胡如生地黃湯最妙，如外麻沸散。毒飲乘甫也，黃湯宜可選而用也。○病後背胃為用…熱痢…氣之為，自蓋因毒而遂外之。又去便為血解毒，而已治血不至於熱，解毒不至於冷，五臟平和，此…自去，或…熱藥則是非…藥而又言之不可不慎之也。○病後大小便不通，或便膿血者，此由失解利之後，熱氣併于小腸，則小便不通，併于大腸則大便不通，血尚被鬱。不通者，熱毒…陰虛…散之類，可選而用之。其有熱毒流入大腸，而便膿血者，宜黃…散…當…用之。○餘毒…痛者，經云左右者陰陽之道路，左右兩脇之謂也。痘瘡後咳嗽，脇痛如餘毒在中，陰陽之氣不能升降也。當

身之左右，陰陽二氣之所行也。若痛是氣不能升降之故，但解其毒氣去，其氣行而痛自平。赤茯苓湯（小柴胡加五味子桔梗枳殼等）療之。○餘毒作煩者，心胃二經受邪熱故也，五苓散、竹葉石膏湯、黃連散、導赤散主之。○天行瘟熱，即與疏利，膿疱之後亦當疏利者，經云言上工治未病也，女兒童子體實者不同，置之陽毒臟症未出之先，或過夫氣體熱，當施疏利，庶幾發作之日，其勢必輕。之膿疱之後，毒氣太盛，未結痂疕，能食而大便秘，面赤引飲者，亦當疏利之。疏利之說，非是轉下，不必用峻藥也，如三豆飲子、升麻湯、消毒飲、犀角赤散之類是也。○用藥不可執一，前輩言老人之病，必先助火，以其陰盛而陽微，當補溫之；治小兒則當先瀉火，謂其陽多而陰少，因其引勿令生熱。然亦有老而實、幼而虛者，此又當隨時變通。又五實當瀉，謂身熱，脈大，大小便不利，能食，悶瞀，為五實之證也；五虛當補，謂身寒，厥逆，不食，前後利，汗出，為五虛之證。或曰用利藥者，使大小便快利則利之，愈用溫藥者，使大小便利而溫溫之，愈二者合利而利，合溫而溫也。其或外證合利，大小便已自利，何必利；外證合溫，大小便既自秘，何必溫？大抵治病，宜權陰陽偏勝者，用藥者調令陰陽和平，則是宜有生者，又況小兒臟腑嬌脆，易寒易熱，易虛易實，但宜調和，所以用藥不可執一也。○用藥怪藥反致害人者，病有外同而內異者，又有病中遇天時節令暴變，過寒過暑，異氣者，又有病中飲食不定，宿有癥瘕之疾，遇之舉動，其證未易辨論。用藥之際，須當審證切中病源，但欲合熱，熱去而不令冷，冷去而不熱，則無不愈者。治風以治風藥，合溫以治溫藥，合冷合熱皆然，令人不知病原，因醫閉不足之藥，如四君子之類，其去症欲速，差誤病殊，不知縱令病勢雖重，以人參多要之，君和緩之藥，亦各從其類而和緩，乎何常謂不切病情而徒和緩也。

醫聖元戎云：夫痘之為病，皆由子在母腹中時，浸漬食母血穢，蘊而成毒，皆太陰濕土壅滯，君相二火之所作也。因兒小真氣既盛，正氣又旺，邪無所容，或因天寒，或因傷表，或因傷裏，痘由是而生焉。自裏何如外者，外自內者，內治中外皆和，其斑自出。至於是寒者解之，表大熱者奪之，渴者清之，大便秘結者下之，小便不通者利之，驚者安之，八方之可以執一為哉？大抵傷寒同合一藏為高，論隨經用藥，不可闕也。假令五

曰已衰謂病與瘡疹不能另辨者不可疑作瘡疹必肖發之但各從其所傷
應見白之皆不妨瘡出若強發之其變不可勝數矣前人言首尾俱不
可下者何也曰首不可下者為瘡未顯於表下則邪氣不得伸越此
脈證有表而無裏故其首不可下者尾不可下也為瘡毒已顯於
外內無根帶大便不實無一切裏證下之則瘡氣和逆而致禍尾不可下也
有如所言是疑是實皆下令論風以其瘡未出身表凉而惡寒或大令
寒而惡冷是發是瘡不令通風也瘡若已出身熱天時何必用蓋覆
乘失之過也至後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令通風不知天令
之所加人身之所感致使悞人多矣大抵前人之言隨時應變以其所
可者而言之後人不知其變故執常而不移也豈必首尾俱不可下者以
其始終歲施元無凝滯也若有一切裏證及大便結者安得不下溫煖
不便之過風以其發在冬時故如此也若發在夏時雖未出亦不用
如此也瘡之閑藥大率以脈為主浮中沉之診平素按之虛實其虛
實定其中外則可以萬全矣○未顯瘡證所用之藥外傷寒麻黃湯主之
內傷和實丸主之大便與枳朮丸主之傷冷者溫之和中丸主之惡寒
者參之宜防風蒼朮湯表大熱者發之既表者當發之陽也陽盛則氣必

二十一

上行言瘡者治法不令上行也渴者清之如白虎湯小渴涼膈散大
便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲子瘡出宜其表衰而在血
小便不通者利之導赤散八正散之類當其上下二焦熱何疑而用之瘡
者安之涼驚丸重者瀉青丸泄者分之寒則異功散四君子湯熱則犀
角地黃湯○已顯瘡證所用之藥出不快化毒湯出太多犀角地黃湯
地骨皮鼠粘子湯咽不利桔梗甘草鼠粘子湯煩者桔梗梔子甘草湯
脈不利紫草甘草枳殼湯太陽出不快荊芥防風甘草湯陽明出不
快升麻加紫草湯少陽出不快連翹防風湯四肢出不快防風芍藥甘
草湯○瘡疹輕重論○凡未出而發搐者是外感風寒之邪內發心熱
之所作也當用茶粉下解毒丹用地黃湯主之一發便密如針頭形勢
重者合輕其表而涼其內連翹升麻湯若瘡已發密聖微喘飲水者
有熱證用鼠粘微下若出不快清便自調知其在表不在裏當微發散
升麻葛根湯若青乾黑陷不大熱大小便澀則是熱在內前大黃湯下
宣風散若身表大熱者表證未罷不可下若瘡疹已出只不熱小便不

利八正散若已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當用茶粉下解
毒丸瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病也未出先聲音不出者乃
形不病而氣病也若瘡疹出而聲音不出者是形氣俱病也當清其肺
氣宜用八風湯升涼膈散去消大黃亦可孫氏云瘡疹證初發或身熱
或氣粗或驚悸狂躁叫哭頻煩或自汗或譫語或呵欠頓悶神昏或嘔
吐皆因五臟虛實不同身熱後切其脈又有便發搐者此是熱毒在
經絡未得發越不必合搐只發散瘡毒瘡出搐便住不可不知大緊之
出得快為尚如出後或被風抹以致黑凹者急用參芪白芍藥補藥
或用胡荽燒酒噴之不可忽視古人治法有云未出宜疏利有云已出不
可疏利有云首尾不可轉以余觀之不可轉之說為是
經驗方論云予見鄉中近年以來小兒患瘡疹瞎瘡甚多醫士用固陽湯
真武湯黃芪附湯四逆湯歸茸三建湯獨雄湯熱藥治之名曰貼出服者
多誤甚為痛惜予暇日因通前古今經驗方論並無用熱藥貼出瘡之
說陳氏理論未嘗不用附子熱藥世有其證而用之如陳文中小兒痘幼方
異功一料內止用附子一錢令之醫士不問寒熱虛實之證但見豆瘡

六十四

黑陷或不紅活或出參差便投熱藥可見其非此又不可全咎於
醫士乃病家父母之心嗣進熱藥甚有用藥劑甚不空之服熱藥實
與再生之期此乃醫士病家互相為誤若不略具古先聖賢用藥論證誠
恐說傳有誤後世謹按素問云火陽寒勝則丹瘡外發又云丹疹屬手
少陽三焦相火素問謂瘡疹大者少陽相火之所為也俗呼曰班疹便寒
又曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火豈有寒乎故治丹疹豆瘡與白傷寒時
氣同法當先推天地寒暑之宜察氣運勝復之理小兒稟性如急氣
充實實宜寒宜涼氣緩和氣鮮怯稍宜服辛溫兩手脈浮大可服辛
兩手脈沉微可溫辛溫如辛涼之劑防風通聖散涼膈散之類是也辛
溫之劑升麻葛根湯和中散惺惺散之類是也聖惠方云江南今夏瘡
行疫瘡多作瘢孩兒出熱毒瘡此故也未參未發而表已虛熱氣衰
入於皮膚亦以發斑痘瘡用參本大黃梔子石膏升麻犀角大黃主之
易氏溫論小兒瘡疹之候乃天行時氣熱不能解蘊積於胃而胃
主肌肉其熱氣夾毒氣蘊積於胃毒氣薰發於肌肉狀
如蚊子所嚙成斑毒也赤者

安斑散四聖散主之黑者化毒散川山甲散主之其豆瘡漸黑而悶大
便不通四君子湯加黃耆肉豆蔻若大渴四聖散加附子主之又云瘡
疹之疾不問輕重當用護目免致豆瘡入眼而生瞖障若生瞖障
明光兎蟬蛻蟬蛻散穀精草散主之未奉議活人書云斑爛用犀角地黃湯主
之冬時大溫豆瘡為寒氣所折豆毒不得泄發而為斑葛根橘皮湯主之
一證下之早熱氣乘虛入胃故發斑宜加人參或加葛根名化斑湯
主之一證下之遲熱留胃中亦發斑服熱藥過多亦發斑[illegible]
主之痘大中云凡豆瘡方覺未出之時其證頗傷寒之狀若豆瘡三
日始見微出如粟米大或蒼米大或如菉豆大似水珠光澤明淨者又豆
瘡四五日大小不一根窠紅活六七日肥滿紅色八九日長足肥滿蒼蠟色
逆不須服藥若痘瘡四五日如槐子樹頭灰白色渴者木香散
之如不效服肉豆蔻丸止其泄瀉若六七日身溫氣促口乾腹脹足指
冷者或八九日後寒戰咬牙[illegible]頭溫者氣急咬牙宜木香散加丁香
桂如不效服異功散若豆瘡出[illegible]癢塌其身或熱或不熱悶亂不寧
臥則便泄腹脹[illegible]咬牙宜用異功散加當歸木香主之十二
日瘡痂漸落其[illegible]內尚[illegible]見與亂母切忌辛辣有
毒之物恐傷眼目為兒終身之疾如是傷目穀精草散主之若瘡
收膚盡之後身熱不除別無他證麥門冬散柴胡散主之若身熱咳嗽便堅
口舌生瘡咽喉腫痛皆是餘毒未除荊芥子湯主之若瘡熱咳嗽咽隔
不利甘桔湯主之若豆瘡痒搔抓成瘡膿血淋漓謂之斑瘡肌肉虛故也
宜敗草散主之仍服木香散加丁香肉桂同煎熟[illegible]依方救療萬無一失

辨認痘疹斑瘡丹毒等 按方用藥者引

正痘瘡 董氏曰初出如紅點遂漸起發如豌豆而稍漿實方結痂而
愈

疹瘡 董氏曰有熱則易出一出過於肌膚之上如麻疹細如芥子見而
便沒楊氏曰赤疹遇清涼而後消白疹遇溫暖而後滅

傷寒熱毒發危瘡 胡氏曰乃熱在表而汗不出熱毒蒸發其瘡色白
或赤如丹頭帶白漿者輕根下紫色在肌肉者重非痘瘡也

斑毒發逆 楊氏曰陽證誤投溫藥或大汗下陽毒內熱蒸浮於外逆
氣入胃令人發斑其證昏憒悶亂狀若大光紅後赤多見於胃腹輕則
如疹子重則如錦紋紅者易治黑者難救○陽證陽脈不洪病人自靜
先紅後黃多在手足之間乃放逆也

丹毒 湯氏曰赤[illegible]肉[illegible]色遊走[illegible]認痘瘡方論所載皆
以耳冷尻冷中指冷驗之或中或否當以耳後有紅脈赤縷為的當○錢氏
曰宜以紅紙燃照清油照心胃間必有小紅點如粟起乃痘證也○謝
氏曰忽然發搐但無痰涎不發[illegible]作[illegible]則雖先出[illegible]則眼先
出熱輕症亦輕熱重症亦重身熱則不出直候身涼方出
痘疹論云痘疹之候有三五日[illegible]作歇[illegible]毛冷肌慄
[illegible]不開作寒戰以溫[illegible]之者初出之時當用導荷散微微發汗汗後
進調中散[illegible]自愈[illegible]荷散汗未出者亦服調中散即
汗出[illegible]
不定目[illegible]耳鼻冷此[illegible]不得[illegible]
[illegible]
[illegible]
不利目赤頰紅脈不[illegible]大者[illegible]
[illegible]
痘[illegible]
[illegible]
不進[illegible]
次[illegible]色[illegible]而色赤者亦是[illegible]先赤而後青為逆惟也
或[illegible]而色青或[illegible]四肢[illegible]冷上[illegible]手足[illegible]以三[illegible]
如[illegible]不[illegible]於[illegible]小兒[illegible]
熱汗[illegible]之[illegible]不[illegible]當下之[illegible]得有此證疹
豆未發之前[illegible]
[illegible]不止足指冷口作[illegible]兩手[illegible]
而[illegible]失食[illegible]赤疹及[illegible]不大
熱口[illegible]咽[illegible]兩目如火熱耳尖手足指冷兩手
脈洪大[illegible]作[illegible]目[illegible]如朱色
赤[illegible]之[illegible]之不用巳 豆水

銀硃粉此等則無去熱毒之理及理傷於臟也或與見已結於皮毛之間

微微似出憤不可利或誤用之則瘡毒反沒害伏心胸邪入肺中瘡毒內

壞而死若瘡疹既出大便實襲水者卻當以大黃承氣微利除毒如未

發毒疹已前曾經利者即不用大黃藥但以解熱藥微利除毒如未發盡

服導赤散以望重者不以藥但利瘡毒令大小便不通停熱毒於臟腑

攻衝眼鼻咽喉腫塞口舌喉嚨束手受死及有此證只進涼藥或錯呆

帶急其所措既毒瘡已出之後人便溫利則既失其發以爍蝕而為[illegible]

間救療所以時人不能盡其天年又按扁鵲治疹豆之法覺有疹痘之

證先用油秋剤[illegible]四肢極熱如服中了凡又就臥少時服

至三五服大小便利四肢熱退邪毒打解痘疹既出亦輕若曾服合藥

利者亦不必服此藥但服此散有無有未經解利而瘡毒已發者服

解毒以聖散或升麻散發散[illegible]至熟服則瘡疹出

四日已後不發者只急用甘草飲子[illegible]塗[illegible]服目之

凡瘡疹未發前當用黃藥[illegible]

間仍噴酒胡荽酒[illegible]又皆上四肢令速發出也若瘡未出及

出而殊甚者宜服甘草散[illegible]少少利熱毒即住若瘡出遲者[illegible]

當服甘草飲子大人錢兩[illegible]子量閉或炙一錢亦能發出豆至毒氣[illegible]

若已發則不必用之如瘡疹未作熱心肺煩悶不安者服青黛散黑豆

汁[illegible]若瘡毒出盡後宜服當歸散以解餘毒若嘔吐則服

此嘔吐自定若赤口有瘡下部亦有瘡自下利者服黃連散或瘡疹

後咽喉痛小便不利者宜生[illegible]燈心湯[illegible]若瘡疹暗喘甚者即

將寒實[illegible]或咽喉痛並喘則加[illegible]服涼藥太多[illegible]

手足冷厥逆者煎炮乾薑炙甘草各四錢水一升二合煎四合服之其或

下利者[illegible]臍腹及渾身熱當[illegible]

疹痘安使攻動眼生翳膜腫脹者皆用肝明散熱毒留所致切忌用點

者藥唯宜利脾肺解肝熱毒仍於服藥上下點腳心以散毒氣蓋眼[illegible]

疑仁散若生翳障重者黃金蒙散量力服之[illegible]

止也有時氣天行瘡豆者[illegible]服至湯則不發瘡[illegible]或發

而因天行熱氣瘡身又壯熱則當以桂枝及去節麻黃黃芩各半兩

為末量大小一二錢暖水調下覆令汗出又以葛根散解肌出汗[illegible]

[illegible]出來凡身皮壯熱頭痛者不與小千無由表散大便又秘毒氣藏伏

心腹脹滿不安微利無由擇去邪毒切在消息若豆瘡已出者不可疏

表更增瘡爛若發脹滿甚者即用乾淨黃土羅細為末傅之仍數

數食甚若[illegible]氣稍輕者則用[illegible]以豬膽汁調塗瘡上切令勤者

直候瘡痂[illegible]大段瘡發不[illegible]即用參[illegible]以待息[illegible]敷白

贖者其[illegible]在肌肉更皆其毒甚甚者五臟咽喉肉皆有

瘡若[illegible]大便[illegible]出血[illegible]不出[illegible]者死其或瘡

豆未出已前熱毒內逼目睛上竄驚叫目如驚風者此乃瘡欲出之候

若[illegible]語為驚風調白毒[illegible]不世乃死或有疹瘡既出譫語

不止此是忠[illegible]以冷藥解利則使[illegible]瘡疹反[illegible]或用[illegible]藥

過咽喉腫痛猛發鼻血[illegible]當入咽[illegible]作[illegible]

黑黑燥日夜煩悶者[illegible]其毒氣當足手足心出乃痊

此五死一生之候若使無瘡候無限者十死不治候大熱瘡毒頻出

無後依證調理[illegible]毒豆瘡不出者一法以地黃[illegible]令飲水不可太

多太多則反有所損或飲嚥熱乳積於腸臟者當[illegible]

量之性陽[illegible]而陰微滿臟陰陽氣精[illegible]大小便多不順利[illegible]

者公論[illegible]皆可餌者皆先知邪氣陰陽之利[illegible]則病[illegible]

辨毒也

儒門事親書云凡小兒痘疹[illegible]丹[illegible]等疾如遇火運勝[illegible]

或亂行之者不可使用升麻散解之升麻湯味辛性温[illegible]

成熱是謂重火上可以辛涼之劑解之如遇半者可以辛溫[illegible]若無[illegible]

便同水化然而更甚寒而甚者亦可以辛[illegible]散之後使以辛溫[illegible]

如當歸及白虎[illegible]玉露散[illegible]

麻疹痘疹首尾[illegible]不可下[illegible]

行經曰五[illegible]之[illegible]相火之所為也又曰少陽客

氣勝丹疹外發又曰[illegible]屬心火王太熱又謂百端之起皆

自心生豈可便用辛[illegible]

大抵時氣如白虎[illegible]

之神気[illegible]小兒瘡痘疹[illegible]毒[illegible]下血[illegible]經曰少

陽客氣勝則[illegible]毒下血治以

黃連解毒湯白虎湯京膈散臨證選而用之所謂白虎湯難說秋冬勿用皆誤也但有此證便用之蓋其喧萬相大故也大人亦同

[illegible]

一切瘡疹 附論

夫嬰孩患疹痘瘡子者皆是積熱在於臓腑蒸鬱熱毒散於四肢小兒皮肉嫩弱多成此疾凡食乳嬰孩易藥不可與童兒同療則藥過劑必有損也蓋由飲啜熱乳在於臓腑熱極方成此疾所熱生於細密臓腑生於痘瘡若用湯藥宜療於乳母也又絕乳嬰孩患者由積熱伏在於脾肺之間而不早滌湯藥療於病原食熱行於四肢榮衛之中初遣於皮表或臍瘡而乃出於膿水也嬰兒之性自然陽盛而陰微也臓腑陰陽氣逆大小便多秘不通也纔覺是此疾即可使與疎利即輕患也若臍瘡已出即不可疎釋若臍瘡出定却宜利大小腸按扁鵲及倉公論云療於嬰孩服以湯散性有不可過之語宜先和節陰陽調治榮衛方利臓腑即熱氣漸解也○凡絕乳嬰孩生於臍瘡或未出已前是此疾候按扁鵲論云可先以油劑服之行解四肢熱極或臍瘡已出不可以宙可服平和湯藥療於肝臓解於敗熱毒熱毒攻衝於眼目喉舌咽齶等時醫及疾患之家臍瘡未出已前多是誤認疾候皆以他藥解之其間或餌以躁藥或餌以冷藥不無夭傷時醫用藥五候瘡臍子出痘家方覺患者往頗疑醫者拱手已患之後終多苦餌致大小便不

通不能調於湯藥和於臓腑遂停留熱在於臓腑之間攻於肝臓臍瘡纔愈致令衝於眼目成於障翳不為醫治醫人不得損因茲無所見也○凡斷乳嬰孩童子患臍瘡疾候初覺多似傷寒面色與四肢俱赤壯熱頭痛腰脊疼足多厥令眼睛黃色詠息但多共數大不定小便赤少大便多秘纔覺四肢色候及詠息雖是臍瘡疾未伎皮毛究出者便可以服餌勻和臓腑疏之逐下若臍已結在皮毛穴更微但出即不可疏伐也或臍出大盛甚穴水者即可疎利也或未與疎釋即甚急

服紫草飲子方

辨小兒瘡證

呵欠　噴嚏　睡中驚　或耳尖冷　眼澀

辨傷食

口熱　或口中醲氣　好辨不消　或腹中疼痛

如斑痘少異其斑未發乃與升麻湯三五錢帶熱服之待身表溫和瘡已頸服紫乃止如其身涼其斑未出辨得斑證無問服數直候身表溫和斑瘡頸後乃止只時時與桔梗湯寬利咽膈快咽喉

方

嗒風散　治小兒瘡痘風出身體熱煩渴腹脹氣喘大小便澀面赤悶亂及氣腫水腫并治腹肝聞風又治風腫積腫又治風熱痛痹厥痛及豆瘡二三日瘡痂不焦欲死者一服效盡熱氣茯苓皮[illegible]不得焦也宜服此藥一二行後瘡生痂瘡水解之瘡痂即焦其效如神

檳榔　陳皮　甘草炙半　牽牛

右為極細末三二歲湯調下半錢已上一錢食前易老加防風

蔵云與通九相上下一服血也一方用一錢木香煎服風熱易

調下

牛蒡殭蠶散

牛蒡子　白殭蠶

右為末一大錢水六分盞紫草二七寸煎四分連進三服更量兒大

小加減服

薄荷散

家薄荷葉　麻黃　甘草

右爲末入水煎服量兒大小爲數

荊芥湯

荊芥穗　薄荷葉　牛蒡子炒　甘草各等分

右㕮咀白水煎量兒大小爲劑

安癍散

調理瘡疹已發未發皆可服之

川升麻　赤茯苓各錢半　當歸　羌活錢一　人參五分

枳殼三錢　桔梗　甘草

右㕮咀每服二錢水半盞紫草少許薄荷一葉煎至五分去滓通口服之或加木通猪苓同煎量兒大小爲劑

余記台一小兒瘡痘毒氣入心心煩躁頓血口渴子處極是束手無措余自畫一方應手而愈用紫草一錢珠砂半錢研極細參門冬湯煎假温調半錢服過即心神定自此而愈其乃群通活者

余記一婦人十八九歲出六二正出後忽乎伏低喘通道陰行其家甚荒余曰證雖危然痘疹伏乃是血滯而然今既血虛或氣血虛遂用四物湯加人參黃芪四服痘子先壯後只是四物湯此癍危甚而愈

當歸丸

當歸半兩　甘草一錢　黃連　大黃各二錢半

右先將當歸熬膏子入藥末三味爲丸每加服之以利爲度

消毒救苦散　治斑疹悉具消化令不出如已出稀者再不生斑仲冬立此方隨四時加減通造化明者性者能此

麻黃　羌活　防風各五　川芎　藁本

葛根　蒼木　酒黃芩　生黃芩　柴胡各三分

細辛　紅花　蘇木　橘皮　白朮各一分

升麻　生地黃　酒黃柏各五　生甘草一分　當歸身

黃連各三　連翹各五　吳茱萸半分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱服空心食前夫麻疹出者皆因內傷以出斑皆氣血故也大柴胡中已具論升降宜用羌活木大黃益智之類去其八升用瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚噫嗜服驚足出痘也○諸大腹痛滿小水病瘡疹三色皆變表證寒復共表宜以四味升麻湯中加當歸連翹此定法也○如病或腹痛先逝喘或氣高而喘促加人參少黃芩以喘伏火而補元氣○如心膨脹症少先是血滯其外熱肌肉膜以弦洪少加黃連○如命門出瘡疹先小便赤身熱其瘡痛不敢動使少加生地黃黃柏○諸瘡疹皆為陰證瘡痘內傷乳食脾胃不足營氣逆行雖火熱內陰復其外故錢仲陽製四物升麻湯發之如有傳變證依加減服之

紫草飲子　治小兒瘡痘倒靨發隱伏不出不是一定用四

紫草　人參　當歸　蟬蛻　甘草

川山甲

右爲末每服一錢水一盞煎至八分作三四次溫服

手和飲子　治小兒瘡疹

人參　白朮　茯苓　甘草　木香各等分

右爲細末每服一二錢水煎去滓細細飲之量兒大小虛實以意斟之此藥治瘡疹癥之所謂太平處有可服之惟小兒瘡疹危

連翹飲　治一切熱毒治瘡疹痘有神

連翹　防風　梔子　甘草各等

右爲末水煎服治瘡疹熱甚者不厭此少陽藥也

木香散　藥性温平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽治小兒腹脹渴或發熱出五七日之間身熱或腹脹足指冷或渴者或驚悸煩躁脹或瀉頻燥渴流血氣不勻食而不思身溫腹脹咬牙渴飲多吐故多死者要與木香散助其氣故之○若欲痘已出不能發泄渴不止不可與水寧西北不食之藥及痛已發腹脹渴或瀉咬牙宜急服之○如腹脹渴是時全瀉驚作瀉身寒而色白身良急宜服此以溫不已已上九味辨其裏虛寒少也名木香散不宜加丁香以寒宜性緩表裏虛實不可誤用

木香　大腹皮　人參各錢　桂心　赤茯苓各三錢

青皮　前胡　訶子肉　半夏麴　丁香

甘草炙各三分

右剉每服三錢薑三片荊芥湯温服空心量大小以意加減

異功散 能除風寒濕痺調和陰陽扶養氣血使痘瘡易出易靨

不致痒塌○痘瘡欲靨當靨已靨忽不能靨或頭温足指冷或腹脹渴氣

促遲宜服此○痘瘡十日至十一日當靨不靨身不壯熱悶亂不寧不則

硬氣煩渴咬牙急宜服此加木香官桂以救裏陽表實

木香 官桂去皮 當歸 人參去蘆 陳皮去白

赤茯苓去皮 厚朴薑製 丁香 肉豆蔻麪裹煨 白朮各一錢半

半夏薑製 附子炮去皮臍各一錢

右麤末每服三錢水一盞生薑三片棗五枚煎七分去滓空心稍熱

服三歲兒作三度服五歲兒作兩度服一周兩歲兒作三五度與服

病有大小以意加減此藥陳氏家傳五世累經效驗此藥專理瘡痘

瀉寒戰咬牙氣急喘不光澤一方無陳皮半夏

人參羌活散加麻黃

同壽荊芥白煎服湯氏曰汗後尚熱宜服此去麻黃加紫草如已

見三五點加紫草陳皮赤芍藥使熱退瘡出亦輕更調服砂末半

廿二

錢以解胎毒瘡出亦輕

胡荽酒 治瘡疹令速出 一方

用胡荽三兩切先以好酒二盞煎沸入胡荽再煎少時用物蓋定

不令氣出候冷去滓微微從項已下噴背膂及兩足不可噴頭

面仍噴房內床帳等胡荽以辟穢惡楊氏曰以胡荽酒噴身使瘡

出快也若兒虛弱及天氣陰寒則可用之若春夏皆熱湯氣發越之

時及兒壯實加以酒麴動虛以火益火胃中熱毒入血及更發成

黑陷急煎紫草湯入猪尾血和龍腦服之

人參羌活散 治小兒瘡疹頭目昏臉熱燥多發而不透身體頭面兩

目皆腫連日風搐者身硬直

以荊芥薄荷煎湯一服方用天麻防風各減紫草湯同羌活

散調服

消風散 治痘瘡或發或未發忽面青昏吼喘風邪所傷用此主

之豆瘡以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅縷驗之然須見心胸間細點

如粟起則真是

人參 羌活 川芎 白茯苓去皮 桔梗炒

藿香 荊芥穗 防風 甘草炙 蟬退

厚朴去 陳皮去白

右爲末荊芥湯下紫草湯服亦得

紫背荷葉散

紫背荷葉 白殭蠶炒 牛蒡子炒各

右爲末每服以胡荽汁和酒服一錢未效再服

五積散

凡遇冬春天寒之時被風寒襲去麻黃加當歸川芎紫草葱

煎一方加木香杏仁去皮尖煎服

辟穢丹

蒼朮 北細辛 甘松 川芎 乳香

降香

右爲末丸如芡實大燒之

瀉肝散

先用桂枝芍藥大敗等分爲末服一錢棗湯調下如未宣風

散方見前

大功散 治痘瘡未發正發及未發疑者

蒼朮 陳皮 防風 紫草

荊芥穗 赤芍藥 厚朴 柴胡 縮砂仁

川芎 當歸 乾葛 牛蒡子 甘草

黃芩

右咀每服用四錢紫七箇橄欖各七寸葱豆湯浸取

半碗入井水煎去滓取清汁再研黃末一盞同入

鍋內隨日月節下降往中庭自東方起向西北中安倒一盞 將藥

已出發方發熱及未發者服

聖功散 治痘瘡已出未收服此解熱有勻氣血調脾散瘡

聖功散

防風 蒼朮 荊芥穗 陳皮去白 甘草炙

川芎 厚朴 牛蒡子 人參去蘆 川山甲

縮砂仁 柴胡各分 紫草 黄芩 黄耆盐水炙
赤芍藥 當歸酒炙 蟬蛻 枳殼炒 木通
赤茯苓各五分 桔梗各等 肉桂去皮 木香少許
右除製外餘藥不見火晒爲細末先用木草水湯調一服次芙蓉黃塡
豬肉或雞鴨田螺也助增漿易者當心食之無熱者用調勻增服
熱者水淮汁調藥增肉食之如痘不起服用常用痘藥夷藥末等分
已起句增食之漿起痕隹者用藥如前增食如大熱大便秘結加
四順飲增食撒剌即去四順飲如前增食宜心增食聖功散仍食
橰眼神功散以解熱毒

天花散 治痘失音

天花粉 桔梗 白茯苓各七分 呵子肉 石菖蒲
甘草炙
右末水調在碗內用小竹七莖小荊七至縛作一束於火在碗內煎
隨劑服

茯苓湯 治痘瘡瘙癢

白茯苓去皮 桔梗去芦 天花粉 半夏湯泡 甘草
右㕮咀麥門冬煎服

蟬蛻一物散 治瘡疹滿作見熱似傷寒但耳尖脚指冷或
痘瘡者是瘡疹
用蟬蛻二十一個洗去泥土爲末用水一盞煎至七分去滓溫
大小溫服如嘔瘡疹已出更依前服三五次若冷服即有瘡疹若
不是瘡疹候避觸風害

三豆飲 治天行疹痘活血解毒痘癖前有此藥預防之劑不

赤小豆 黑豆 菉豆各一 甘草半兩
右以淨豆入甘草以水煮熟逐日空心任性食豆飲汁已疹者輕解
未染服之七日不發如冬月當服可再服脾中蘊熱

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱咳嗽不止[illegible]痰

白茯苓去皮 細辛去葉 桔梗 瓜蔞根 人參去芦
甘草炙 白朮 川芎各等

右爲末每服一錢水一小盞薄荷三葉同煎四分溫服如要和氣入
生薑煎服不拘時一方無川芎

白虎加人參湯

石膏 知母一兩 甘草炙五 粳米一合 人參五分
右剉水煎米熟爲度溫服

天麻散

天麻 川芎 升麻 半夏薑製各
北細辛 羌活 荊芥 蟬蛻去足翅各 防風
右剉薑棗煎夾寒加桂枝 夾暑加柴胡黄芩 夾濕加茯苓蒼朮

枳殼桔梗湯 治胸膈脹滿

桔梗 枳殼麩炒各等
右剉散每服二錢水二盞煎至一盞分二服

小兒麻豆方

用荊芥少許擂研以新井水浸布帛到透入一滴許麻油打勻令
飲之使不悶亂麻已出用黄蘗煎青黛水飲即安皮膚發熱是也

紫草湯 治純乳嬰兒并童男患斑疹痘疹初覺多似傷寒

面色與四肢俱赤壯熱頭痛腰脊疼及多眠令服有黄色咳嗽多涕淚
至數數大不定小便赤少大便多秘就實四肢已冷及脉息雖是疹痘痰
未攻皮毛先出者便可以服餌句和溫解腑下奪倉公論云可服
而劑不可用涼藥不可用冷藥若疹已結在皮毛先必散出即不可
深泄也或疹出大盛實忙搖者卻可疎利也或未與疎轉即且患眠
此藥

紫草二兩新者細剉先以百沸湯浸便以物合定勿令紫草氣出
放冷如人體溫凡五十日至一百日嬰孩服半藥注子一百五十
日至二百日嬰孩服一注子一歲至二歲兒服半合三歲至四歲
兒服一合並於食前午後服此藥易疹痘難出勢十倍可常服無妨

[illegible]

治小兒未滿百日患瘡疹撮口噤者方

撮口草一兩　益母草三兩

右以水五升煎至三升去滓每兒了更取芫荽菜汁煎每令作

芫荽菜與乳母喫亦佳

浮萍丸　治小兒瘡子不出煩悶驚為悸

浮萍草一兩曬乾為末　白薄荷葉三分

右為末用薄荷打煎汁煮麵糊和為丸如粟子大每服一丸薄荷湯

化下不拘時

龍腦散　治小兒出瘡子不透發出隱焦

龍腦半錢　丹砂　地龍去土　麝香另研

乳香　雄黃各一分　穿山甲五片炙　紫草去苗　甘草一兩

木猴梨五錢

右為散用豬尾上血拌勻入瓷盒內用手勺研由臘月取之後定冷深

坑子內餵掃豬糞之二七日取出淨洗每服一錢半大紅棗水化下

得三服見效

定命散　治小兒瘡疹毒氣不出致黑陷使爛黑色服此藥能出毒氣

瘡子細紅而潤一名定命硃砂散

丹砂細研　龍腦另研　乳香研　麝香研　甘草各炙一錢

右同研勻用十二月豬膽灌汁拌勻同研取畜竹筒長二尺留兩

頭節開一頭作竅用藥裝在內黃蠟塞定以油紙緊裹封勿令透氣埋

地坑中至一百五日取出水洗淨風中四十九日量陰乾取出研為細

散每服半錢新水調下

人參丸　治小兒瘡子黑色

用人參一分為末用牛蒡子十個蒸熟研細和為膏和丸如豌豆大

每服一丸麥門冬湯化下不拘時

神和散　治小兒斑瘡遍身熱燥　一名解毒散

白僵蠶　甘草炙各　雄黃一錢

右為散每服半錢至小兒大小加減每用湯調下

南木散　治小兒斑瘡不退 [illegible]

[illegible] 甘草各半兩

醉熱丸　治小兒口瘡

甘草炙　[illegible]　青黛各一分

右為末每研煉蜜和丸如雞頭大每服一丸熟水化下

治小兒痘瘡及燕成瘡痕血為骨 [illegible]

敗草散　[illegible]

用屋上爛草乃蓋屋多年經霜雪者草不以多少或擇焙為末

乾貼於瘡上瘡疹潰爛不能坐臥衣服黏以篩末可用三二升

散於席上令兒坐臥其上甚神妙蓋此草特得以其草經霜雪而感天地

陰陽之氣善解瘡毒其功不可盡述

又方

用蕎麥麵或菉豆粉搽痘及瘡上亦好

成作瘡痕者宜

用銅錢研黃土得之貳研芒硝末傅於汁塗不能成瘡痕以瘡去葉

貼之

綿繭散　治小兒瘡疹後身體及肢節上生瘡潰爛膿水不絕

用出蛾綿繭不以多少用白礬捶碎實繭內以炭火燒令礬汁盡取出

為末 [illegible] 以敷之

治瘡爛法

瘡瘢散　經驗方

用黃牛糞曬乾燒灰 [illegible] 為末傅之亦得瘡痂之瘡 [illegible] 不

能食者 [illegible] 或生蜜 [illegible] 取汁以之為 [illegible]

[illegible] 之可 [illegible] 血出 [illegible]

[illegible]

瘡痂色脫 [illegible] 不可 [illegible] 大早亦不可少手爪之 [illegible]

患處在所不可無 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

麥湯散　治小兒斑瘡 [illegible]

不避一名 [illegible]

地骨皮 [illegible]　甘草 [illegible]　人參一分　滑石 [illegible]

大黄

右為末每服半錢水一小盞入小麥七粒同煎至十數沸温服

珠方　治水泡瘡疹

苦參　滑石　蚌粉　蛤粉　川白芷各等分

右為末乾糝之立効

治豌豆瘡

用山豆根水研服少許

治小兒患瘡疹瘡畢不落滅瘢著神妙

天麻　甘草炙一　髮灰　黄丹炒　馬牙硝各

右為散空心服一錢令水調服到水

治小兒豌豆瘡方

用臘月兔頭作𦙶食

又方

用粟牙兒毛病瘡疣瘡痘以手摩之良

又方

用雞殼焼灰汁洗之銷瘢奇得痕蹟不可

治小兒發斑豆瘡

用猪膽和朴消塗之

治豌豆瘡

東壁土一塊研為細末傅之

又方

用馬齒莧焼末傅瘡上其瘢須更逐藥出若不出更服良

青黛散　治小兒斑瘡豌豆瘡

青黛研細　鉛粉各一錢

右細研為散溫湯調之一百日兒至二百日兒每服一字已乳前服一歲兒至二歲半錢已食前并後各一服隨兒大小以意加減

治小兒斑瘡豌豆瘡方

取綠豆大豆小研之

又方

用頭髮一兩焼灰為末湯調服一字隨兒大小以意加減

治豌豆瘡

乾蝎　人中白　瓜蔞灰一兩　牙硝一分

右同研令細空心冷水調下半錢以吐為度每服一錢得利三兩行

其瘡自除如神

治發豌豆瘡方

以小兒吾瓜皮水十和水塗之

治小兒豌豆瘡入肚者

用胡荽五七莖空心煎湯下即可救之

羌活散　治小兒斑瘡已出未能透達者及始發未能圓滿

牲皮麥撥　赤散心性并治瘡出如瘡已後多有滅瘢痕

每瘡發時時服之可有功

羌活孩子　荊芥穗　甘草　防風

右為麁末三歲一錢水一小盞煎三分去滓溫服不拘時服以瘥為度

服大利以驅此度疑止吸若冷氣虛服充塞瘡癤者切不宜服每

藏云太陽少陽藥也肯將湯中者丸也　一方添麥冬服

一方

用川大黄微炒水煎去滓服

右時氣發豌豆瘡

治小兒瘡豆方

空心並午時將焼大黄蒼术以辟穢惡之氣不宜使其下埋治豆瘡

自乳四陽下之者

加減異功散

人參　白术　白茯苓　赤芍藥　黄芪

當歸　桔梗　厚朴　紫草　甘草各炙

右各㕮咀初加南木香二錢很細每服每加附子如蠶豆大煎服

加減紫葳散之

豆蔻丸

肉豆蔻麵裹煨　木香　縮砂二錢　白朮　訶子一錢

右為末米糊丸如粟米大量與

玄參升麻湯 治小兒解胃以傳瘡疹未發之前並宜服之

玄參 去蘆 升麻 葛根 芍藥 甘草 炙各等分

右㕮咀每服五錢水一大盞同煎至七分去滓熱服乳母多宜服

升麻湯 治發痘出後一向作熱

山梔子 柴胡 黃芩 赤芍藥 甘草

升麻 乾葛 各等分

右㕮咀薄荷湯同煎

人參散 治瘡痘

麻黃 去節 芍藥 荊芥 白茯苓 人參 甘草 一分

右爲末每服半錢薄荷湯下

栝蔞散 治欲出痘瘡

栝蔞 貝母 荊芥 各等分

右爲末用紫草同煎連三服

治瘡痘不透畜伏痘因者

右用人牙煅研爲末入令當服末乳香湯下酒調亦效

香葛發斑湯 治小兒四時感冒發熱皆可服惟瘡小兒痘瘡尚未透者身發熱頭疼或手心冷耳冷卽痘瘡之首也宜連進此藥取痘瘡發出則必十分穩當此方乃大都夏貴人家傳方云其家數代子孫痘斑雖有比他人自衆雖少得此方本堂屢用效驗貴衛生之良劑也

紫蘇 一兩半 升麻 一兩 乾葛 二兩 香附子 一兩半 陳皮 一兩

甘草 一兩 赤芍藥 一兩 紫草 二兩

右㕮咀每服四錢重水一大盞姜二片葱白一根同煎七分去滓溫服滓再煎服不拘時痘瘡出則不必服如痘瘡已出者不加紫草止服前藥

黃耆六一湯 治疹已服葛根湯豆出尤壯地活色

黃耆 六兩 甘草 一兩

右㕮咀入棗水煎服

治卒發瘡秘驗方

以石灰隨多少和醋漿水調塗隨手卽滅

治一切瘡

以水煮枳殼爲煎以塗之乾則又塗之

治瘡瘍

用苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飮一合日三常服不絕若覺痒卽差取根皮末服之亦良

治一切瘡

以水煮芒消塗之

治癰瘡

以陳皮湯煎浴

瘡疹已出未出 附論

夫瘡疹已出未出之間有翻錯失之症其瘡之證自衆增寒壯熱身體疼痛大便黃稠此乃正病若無它疾不宜服藥但當四平調之亦如已出未出之間或爲渴或腹脹或氣促表虛七十二味木香散主之已出未出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅表虛也十二味異功散主之已出未出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅而又腹脹渴或氣促者表裏俱虛也宜與十二味異功散送下七味肉豆蔻丸

方

如聖湯 治小兒身熱頭痛頰赤面紅呵欠清涕瘡疹已出未出

川升麻 赤芍藥 甘草 各一兩半 紫草 半兩 白朮 二兩

陳皮 一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓服無時一方入生薑二片葱白二根山梔子根三寸同煎熱服壯熱心煩加人參赤茯苓石膏麥門冬去心一方有金銀木通無白朮陳皮

四妙湯 治小兒麻豆瘡欲出渾身壯熱情緒不樂不思飮食此可以內消仍令瘡無瘢痕 一名透肌散

紫草茸 川升麻 糯米 各等分 甘草 半兩

右爲粗末每服三錢水一大盞煎七分去滓溫服或有數點黑陷毒攻內者如鄉村無藥便將紫草二三錢沸湯泡之卽散出紅活

二寶散 治痘瘡未發服之內消已出服之解毒不致太盛 一名刑墨散

生玳瑁　生犀角各磨汁

右二味磨汁二合攪勻分二分每服半合微溫服日四五服為佳

草散各等分

紅花子湯　平調痘疹及治痘瘡已出而不紅潤目赤喘急神志昏悶

紅花子　紫草茸各一兩　麻黃去根節　川升麻各半兩

右為細末每服半錢酒浸荷葉入〔各〕一處溫酒調下

快斑散　平調痘疹

貫眾去土　赤芍藥各一兩　甘草炙　川升麻　枳殼麩炒去穰各半兩

右為細末每服一錢水一盞入竹葉七片煎至五分去滓溫服量兒

大小加減

調中散

白茯苓　人參　桔梗　甘草炙各等分

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎六分溫溫作三兩次服

竹葉湯

石膏四兩　知母二兩　麥門冬去心　甘草炙各一兩

右為粗末每服五錢水二盞竹葉一握煎至七分去滓溫服

犀角飲子

犀角鎊　甘草炙各半兩　防風二兩　黃芩一兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

抱龍丸　治小兒一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多睡咳嗽涎盛面

赤手足冷發溫壯睡中驚搐搖擺不寧欲成癇疾痰涎上小便赤黃

天南星〔illegible〕

朱砂水飛　雄黃水飛各半兩　麝香一錢　牛黃一字

右同研極細滴水和丸雞頭大每二歲兒竹葉或薄荷湯化下一丸

不拘時候

一出控心散　治小兒斑瘡

全蝎四十個　雄黃　麻黃

右為細末用團荽以酒煎令溫調下

羌活散　治小兒風痘作瘡子解熱各等分

羌活　獨活　川芎　桔梗

地骨皮　前胡　甘草　紫蘇　蒺藜根

天麻　薄荷　防風

右為細末每服一錢水三分薄荷二葉煎至五分溫服二分量兒大小

加減服之

奪命散　治痘兒瘡疹已發未透並宜服之

升麻　糯米　紫草　甘草炙　木通各半兩

右為剉散每服一大錢水七分煎四分去滓量兒大小五歲已下量

大小加減服之

黃耆散　治小兒斑瘡

黃耆　柴胡　乾葛　甘草

右為末每服一錢水一盞入薄荷三葉煎至一分放溫三四服空心

治小兒瘡痘已出未出便服此藥即稀

牛蒡子炒　甘草

右為末每服一字或二字用煎荊芥湯一

四聖湯　治身如火頭痛煩赤面紅可見其瘡癢已未出

時宜服

白芍藥　升麻各一兩　甘草　紫草各半兩　乾葛一兩

木通去節各半兩

右剉散每服二錢水一中盞入生薑二片蔥白二根山楂子根三寸

同煎熱服壯熱心煩加人參赤茯苓石膏麥門冬去心

紫草飲　治豆瘡欲發未發或未透者

紫草　北芍藥去蘆　麻黃去節　當歸　甘草各等分

右剉散每服二錢水一盞煎不拘時服

活血散　治豆瘡已出未出煩燥大人同

右用北白芍藥不以多少為末白湯調下大能活血止豆瘡眼當屢

用屢效一方酒調每歲云張和之治四支出不快加防風大效丸正

昀太陰乘也一分剉碎水六分煎四分去租分二服

蟬蛻膏　治風邪時氣透肌肉發痘瘡

蟬蛻去土　當歸　防風　甘草炙　川芎

荊芥穗　升麻　柴胡　紫草　赤芍藥各等分

右爲末煉蜜爲丸每一兩作四十丸木香湯下一丸用紫草湯 荊芥湯下

消毒散 治小兒瘡疹已出未能勻透及毒氣壅遏雖出不快壯熱狂躁咽膈壅塞睡臥不安大便祕澁及治大人小兒一切攻熱咽喉腫痛胃膈不利並宜服之瘡疹初出最不宜服宜利藥恐內虛毒入於裏如五七日不大便亡服宣毒散微得利便卻從服後別無他證不宜服藥一方亦療痘後餘毒未除

牛蒡子（二兩） 甘草（一兩） 荊芥穗（一兩）

右爲粗末每服二錢用水一盞煎至七分去滓溫服食後小兒量力大小與之 一方治瘡疹已大便利者不宜服

人參散 治小兒痘疹瘡出

人參（一兩） 前胡（兩） 林檎（一枚） 木蓮枳（一枚）

右剉碎以水兩盞煎至一盞去滓旋旋溫服時令安

治大人小兒瘡疹已出而復陷或變黑色甚惡藥不效者治之無不效一

紫背荷葉（[illegible]） 白殭蠶（[illegible]）

右等分爲細末每服一錢小兒半錢研胡荽汁和酒下其效亦神

發子升麻湯 治天行麻痘瘡子未出盡快如大渴熱煩悶小便熱渴

升麻 白芍藥 乾葛 山梔子 竹葉

甘草（各等分）

右爲散煎燈心同煎服之

表解散 治天行水疹躁煩未出潮熱麻子等證

白附子 防風 川芎（全蝎） 麻黃（去節）

荊芥 紅花 當歸 蟬退 薄荷

羌活 茯苓 甘草 升麻（去） 殭蠶（炒）

蟬蛻（去足）

右爲末每服半錢至一錢薄荷湯調下

治瘡痘將出

以牛蒡子炒令熟杵爲末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡疹已出更服亦妙

治天行瘡子不出

以紅藍花子吞數顆

治時氣發瘡疹不出者

以菌茵研酒飲之甚妙

痘瘡未見乃可踈利 附論

嘗考聖惠論瘡疹脈候氣逆大小便多祕者覺似此疾可便與踈利而輕患也今看時醫又疾患之家瘡疹未出已前多是誤認疾候皆以它藥治之其間或以涼藥或轉瀉藥不得大腸瘡痘初覺多秘[illegible]錢氏瘡疹未發已見出者便可服解調和氣踈瀉達下而語人書乃云瘡疹與傷寒相類疑似之間只與升麻湯治瘡子已發未發皆可服不可踈轉瘡疹已定卻宜利大小腸此爲大前協實身熱固不可下瘡疹發熱尤不可轉世人乃云初覺以藥利之宜其毒氣謬矣[illegible]

又云瘡疹已出不可轉踈出得已定或膿血太盛卻用踈利者亦非大[illegible]人[illegible]

守藥重發其汗以表處虛實或解欲出多以熱藥[illegible] 又云若爲[illegible]

董氏論瘡疹未出往往疑爲傷寒即以麻黃[illegible]

痲治之用益苦寒藥則熱氣至三四日證候已定方用瘡疹藥所失多矣[illegible]

瘡瘡瘡早出若才出至不可轉利 張氏論云才覺是瘡痘便是踈利熱證易治又云[illegible]

[illegible]錢氏論瘡痘惟用溫涼藥不可妄吐下及攻發 又云未頭疼牙者舌紫讝以百祥丸下之又身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐當利小便不差宜宣利下之及黃寶鑑云疹痘足臟腑俱熱發瘡胃爲之熱在腑爲疹熱在臟爲痘未發同一治未出可下解熱而退既出忌忽不及今藥通之其痘不出在東宮人令考諸經方

論有言之未盡者雖云瘡疹首尾皆不可下或云未出前[illegible]出定者利之疹出
頭剌分證不明至就毒疹論之平日所治大抵瘡疹之病首尾證平下
之者誤首尾有實熱證不下者誤 [illegible] 首尾有虛寒證
不補者誤痘瘡出後全是毒乾紅證平者不可服涼藥實證之[illegible]爲可信
錢氏之用必勝膏治五太[illegible]而愈者人嘗用[illegible]治四惡候出不快
又黑[illegible]乾手內[illegible]以[illegible]輕者水[illegible]服之取下[illegible]推之
藥性寒用而實[illegible]云未發[illegible]治以此觀之俱隨證用藥其明驗也既
官論云形分輕重[illegible]制法云二[illegible]俱發從重者論[illegible]書云二病
俱發從重者治誠良法也[illegible]瘡痘多是[illegible]若[illegible]有非節之氣
毒未發之前常宜服溫藥令大便稀[illegible] [illegible] 則是毒將消
又有四時時行者大小傳染[illegible]瘡毒未發之前亦可服解毒飲油
剂以預防之設有瘡疹心[illegible]頭痛[illegible]
身不汗何由消散[illegible]
[illegible] 凡瘡者手已未發[illegible]
不可疏轉[illegible]或云不可汗下[illegible]只可紫草湯一味散之於此二

說甚善若執其兩端[illegible]治[illegible]大病[illegible]命
合下之證而疑惑不決[illegible]時[illegible]大傷者多矣[illegible]必究
般柱用藥者必審證不可執一也

油劑法 治小兒斑瘡狀熱毒疹痘未盛四肢微冷[illegible]見有飲食
似或頭髮乾燥或發進退

右以生麻油一小盞[illegible]和熱水一小盞[illegible]水入白盞內不住手
以杖子打攪直候水盡更入[illegible]劑如蜜即止夜卧時三歲半
小盞一歲內外者每服二蜆殼量大小加減直候大小便微利熱退
瘡疹不生也百萬全方云可先以油劑服之行解四肢熱極或疹
痘已出不可以油可服平和湯藥疎其肝臟[illegible]熱毒

太盛

胎毒油劑 治預解胎毒如已出及見紅點不可服
右以生甘草末或煎湯入清油用槐柳枝攪如蜜量大小增減與
兒服微利爲度

又方
右以手頭清油摩兒背膂中間亦妙

化毒湯 治小兒斑豆瘡欲出一名紫草散
紫草茸 升麻 甘草炙 陳皮 等分
右剉入糯米五十粒温服劉氏家傳方云嚥此一盞即內消 只二
服有效

黃連散 治小兒熱毒瘡疹[illegible]初起[illegible]覺書宣服此方
右黃連一兩[illegible]為散每服[illegible]一小盞[illegible]至五分去滓
不拘時候量兒大小加減[illegible]

青黛散 治[illegible]發[illegible]和[illegible]服[illegible]不安
右[illegible]以[illegible]入水調[illegible]之[illegible]研[illegible]水調下

[illegible]朱砂散
[illegible]當歸 各 甘草 炙
右為細末每服二錢入[illegible]至[illegible]之服[illegible]大小
服少或[illegible]日[illegible]一歲已下一歲已上如[illegible]服

白[illegible]散 治瘡疹未作驚心熱煩躁不安者
右用黑豆[illegible]汁[illegible]服之亦許

油劑方 治小兒方一二歲服[illegible]瘡疹痘以此止之
生麻油 蔥子小匙 各半
右過旋交和以柳枝頻攪令如蜜每服一蜆殼許服畢令卧少時
三四服大小便利身體熱退即不成瘡痘疹[illegible]已[illegible]

化毒散 治小兒瘡痘毒出有白泡忽陷入內[illegible]紫色黑
服日夜啼哭煩躁 [illegible]
鬱金一兩 甘草 分
右用水半碗同煎令水乾去甘草將鬱金切作片子令乾為末入
生腦子半錢研令勻用生猪血和成[illegible]子大[illegible]荷湯化下一錢
不過二服其毒從手足心出如癰狀乃差此五死一生之候若便
血瘡壞無藥者十死不治一法可用蟬蛻末半錢[illegible]
猪心血三兒子大和作劑子用熱湯[illegible]化下[illegible]服[illegible]上
從大熱痘毒頭出黑陷[illegible]

瘡疹出不快 附論

夫瘡疹出不快者，皆由毒氣壅盛，宜解其熱，以托裏。宜利解散，致令臟腑受冷，榮衛澀滯，則血氣不能充實皮膚，脈中其瘡不起發，不充滿，不結實，不成痂，煩多癢塌，煩渴而死者，皆因宜利解散之過也。[illegible]

凡瘡疹或成血泡，一半尚是紅點，此毒氣發越未透，不能乳食，大便如常者，裏中半虛，表半實也，宜用理中湯、四聖散、紫草木香湯、當歸[illegible]之人皮膚厚肉理密，[illegible]發[illegible]至服大黃、梔子、芍藥之類，不[illegible]。[illegible]者宜服犀角消毒散

方

藍根散 治小兒瘡疹出不快及倒靨

板藍根 一兩 甘草 三分

右為細末，每服半錢或一錢，取雄雞冠血三兩點，同溫酒少許食後調下。無證勿服。

四物湯 治小兒時行瘡疹發熱，已出未出或出不快及消瘡瘢。餘詳婦人方。

大凡瘡豆不透者，為血澀故也，此藥能活血調順，瘡豆無不如此，藥活人書用一味白芍藥為末治瘡豆不快，此知四物湯實瘡豆之仙藥也。一方加甘草尤妙。

白芍藥 川芎 熟地黃 當歸 各等分

右為粗末，三歲一錢，水半盞，煎三分去滓，此本是婦人藥，治血劑入選栗殼同煎甚妙。

紫草茸 治小兒瘡豆未定或出不快

紫草茸 升麻 甘草 各等分

右㕮咀，三歲一錢，水半盞，糯米五十粒同煎三分，去滓，不拘時。劉氏博濟方云：豆欲出，渾身壯熱，不思飲食，若服此藥，即內消；已有一兩顆出，即解其半；若全出，即當日頭焦。只三服，消毒散同服妙。

紅花湯 治小兒瘡豆不出

紅花子 紫草茸 各半 蟬蛻 少許

右㕮咀，酒水中半煎，去滓溫服，大小加減。

駱毒散 治小兒瘡疹豆出不快

白花蛇 [illegible] 麝香 少許

右為末，三歲一字，酒調下，蟬蛻湯亦得，良久便出。

無比散 治小兒瘡疹出不快及黑瘡子，應一切惡候及治豆毒[illegible]咽喉腫痛

朱砂 [illegible] 牛黃 麝香 腦子 膩粉 [illegible]

右為末，三歲一字，水銀少許，用豬尾上血三兩滴，新汲水調服，穿後[illegible]。然後取下如爛魚腸葡萄穗之類涎臭惡物便安，乳汁[illegible]調下。

一方無水銀，大人半錢。

如聖紫草湯 治瘡豆出不快 [illegible]

紫草 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

右㕮咀，白水煎服 [illegible]

麝香膏 治瘡疹不透

右研豬心血，調麝香少許，[illegible]兩手心[illegible]上

無價散 治斑瘡發出不快 [illegible]

訂陷伏倒靨[illegible]

人貓豬狗糞 臘晨燒 少許 蜜水調

百者救生無一死 萬兩黃金也可買

右將前四物，於臘月晨日未出時[illegible]，又能救令煙盡白色為度，但有救瘡以覺有瘡或發不快倒靨黑陷一切惡瘡並皆治之，每遇小童但見瘡發，每用藥一字，用蜜調服，萬無一失，此藥工夫無名可稱，故以無價散呼之，項用人貓豬狗四般乾糞，依上法治用。

救生散 治小兒痘疹出不快倒靨將死者

右用真滴黃五月上旬丙丁日採以銀石內慢火炒令深紫色細研
每服一兩入真麝香一字研勻每服一字至半錢入薄荷汁五點溫
酒調下班疹黑陷昏憤喘滿欲死者二三服神効

萬金散 治豆瘡已出未能勻遍色不紅潤
防風 人參 蟬蛻各二
右為細末每服一錢煎荊芥湯調下如無荊芥亦可服毒瘡了急用芥子末
白湯調塗青金見腳心上即毒傷其毒斬斬復出瘡疹依前紅活

神効散
右用抱雞子殼內白皮不以多少以木炭火燒為灰出火毒研細以
新汲水調下每服半錢日三服

加味四聖散 治瘡出不快及變黑陷倒靨
紫草茸 木通 黃耆 川芎 甘草炙
右剉白水煎服大便秘加枳殼大便如常加糯米百粒或白糯米能
解毒發瘡一方加南木香尤妙
綠豆湯發瘡疹最妙
右用絲瓜連皮燒存性為末湯調服楊氏曰發痘瘡最妙或加甘草
紫草

安斑散
赤茯苓 黃耆 羌活 人參 桔梗
紫草 枳殼
右紫草薄荷煎服熱而實者加升麻或加木通糯米煎

快斑散
紫草茸 陳皮 黃耆 赤芍藥 甘草炙
右剉加糯米百粒煎三歲已上服三錢已下一錢服後瘡稠急服住
後服

犀角消毒飲 治小兒內熱邪熱瘡出不快
惡實 甘草 防風
右為末煎紫草糯米湯或姜子湯調食後服日三服或云痘瘡欲出已
出熱盛服此三四服消毒發瘡神效一方為散水煎服大便實加大
黃

猪苓湯 治黃大甘腑滿汗瘡出不快
猪苓 澤瀉 白朮 赤茯苓
右末加辰砂末煎車前子草生地黃燈心湯下

小柴胡湯
右加生地黃紫草木通煎服

快毒丹 瘡疹痘毒牙割出火毒宜服之
黑牽牛 南木香 肉豆蔻
青皮
右末為丸每服七粒至十粒量大小加減紫草蔥湯
下前賢虛方有妙木香以氣豆蔻青皮補脾又以牽牛寫脾勝默
之胭也

托裏散 小兒痘瘡毒根在裏或氣血虛弱或風邪穢毒沖觸使瘡
毒內陷伏而不出出不勻者快此藥活血勻氣調胃補虛托瘡毒使
之惡出易收易靨
人參 川芎 防風 苦桔梗 川白芷
甘草 當歸 黃耆 厚朴 肉桂
右當歸人參黃耆各二兩餘各一兩為末作勻木香紫草湯調下一
名內托散

又托裏散 補虛活血勻氣發瘡通行血氣活加
黃耆 木香 赤芍藥 川歸退 肉桂各等分
右用白水煎服

紅粉丹 治痘熱瘡疹不勻
龍腦 南星 朱砂
坯子染胭脂 天竺黃
右研勻煉蜜和丸如雞頭大每服一粒人參湯化下

滑石散
滑石 甘草
右為末每服一錢半雞子清調少許調下一方燈心湯調下

脫齒散 治瘡疹不出百藥不中者服此即出

右以人牙齒飲存者不拘多少於瓷瓶內固濟大火煅令通赤候冷
取出為末用薄荷酒調下半錢良久漸平和毒氣散瘡如要水一方
燒存性熱水調服

紫金散　療小兒瘡疹不快倒靨

紫草　蛇退皮炒　牛蒡子炒各等分

右為粗末每服一錢水七分煎至四分去滓溫服

如聖散　療小兒斑瘡不快倒靨黑凹者

右用赤芍藥不以多少杵為細末每服半錢或一錢酒冷調下白湯
服亦可不拘時候

獨聖方　治小兒斑瘡出不快

右用蠶花藥煎汁時時與飲之

王訣酒調散　治發瘡疹不出

牛蒡子炒　紫草　麻黃去根節各　蓄門子

臭橘子不以多少

右以溫酒調下一字或半錢

紫草湯　治三十六種內瘡子候

麻黃去節　人參各一　杏仁去皮尖

右為粗末每用水二盞煎至一盞去滓都分為三四服溫下分作二日
服未可用諸藥

治小兒痘瘡出不快并傷寒不語

乾野人蔓去皮　腦子　麝香少許

右為末每服一二錢新汲水調下

治小兒發斑瘡

大蠍蛇二十一箇去足　甘草一錢半

右用水半盞煎至一盞去與服盡效已用驗

治小兒斑瘡不發

右以乳香研細用猪心血為丸如梧子大水磨下一丸

至聖木星散子　治小兒瘡子不出及不快

硃砂　鬱金各等分

右為細末每用一字或二字量兒大小入龍腦少許以新汲水茶脚

少許同調服後然後刺猪尾血滴三點子入藥中令服不過一二
時瘡子出便紅活兒無他病神效

紫草膏　治疹痘不快

紫草　白附子各一　麻黃去節　甘草炙各　全蝎

殭蠶炒

右為末用蜜一兩酒半盞入紫草煎熬成膏後令旋旋同和前藥丸如
皂角子大每服一粒用紫草湯化下續服黃耆散調治之

治瘡子出未透黑靨者

右用蟬蛻不以多少先淨為末一錢煎水調下立見出透食乳者乳
母亦服一錢神效

紫草木通湯　治瘡疹出不快

紫草　人參　木通　茯苓　糯米炒

甘草炙減半

右剉散每二錢溫服內虛大便利者可入南木香去紫草一方無
糯米用粳米

加味四聖散　治瘡豆出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱不除一
切惡候或被風吹後不見入皮膚內者

紫草茸　木通去節　南木香　黃耆炙　川芎

甘草　人參各等　蟬蛻去足翅

右剉散每服二錢水一盞煎不拘時候溫服大便秘加枳殼少許大
便如常加糯米百粒性解毒能釀而發之

快班散　治痘瘡出不快

紫草　蟬退去足　黃人參　白芍藥各一　木通各

甘草炙半

右剉散每服二錢水一盞溫服

神驗散　治小兒瘡子黑色及出不快

鯪鯉甲火炮黑色全　地龍去土二十片　紫草炒

右為細末每服半錢溫酒調下後用衣蓋即紅色出

四君子湯　痘疹論云胃主肌肉調脾進食活血匀氣其瘡不致痒
塌倍加

川芎　當歸　赤芍藥　木香　紫草
糯米　陳皮　枳殼各等分

右爲末，糯米湯調服

豭猪散　治小兒瘡疹熱毒内攻，紫黑色出不快

右用生豭猪尾尖刺取一合，猪心一箇取中血一皂子大，同研，以紫草濃煎湯調，都作一服

殊聖奪命膏　治小兒瘡疹毒氣不散，出不快及觸犯變色黑

熟牛李子，七月八月内採，於盆内研汁，生絹濾去滓，用銀器或石器慢火熬成膏，瓷器收，常令透風，每服皂子大，煎杏膠湯化下，如人行二十里更進一服，其瘡疹自然紅色，毒氣慢一切瘡疹出不快，並可服。一名牛李膏，又名必聖膏，云至秋結實，累累成穗，或無生者，市肆中賣乾者，爲末水熬，大用。董汲治小兒瘡疹豆瘡惡候，見於皮膚下不出，或出而長不來，紫黑陷伏，亦用此藥，仍云及小年病此，危惡殆極，父母不忍視，遂錢氏下此藥得安，因懇求得其方，遂傳於世，惟於收時不知早晚，故無全功，令并收時載之，九月後取研，濾成膏，每膏二兩，研入好麝香半錢，收貯不津器中。九瘡衛生方同，但用桃膠半兩，牛李子一兩，炒爲末，每服一錢，水七分，煎至四分，去滓溫服，治瘡亦同。一云牛李膏專治小兒瘡豆紫黑色陷，寒顫咬牙，通身黄紫腫，三服不愈即死

紫草四聖散　治小兒瘢疹出不快，或倒靨，毒氣入腹

紫草茸　黃耆　桑白皮　木通　枳殼
白朮各等分

右爲麤末，每服三錢，水一盞，麝香少許同煎

四聖散　治瘡病出不快，倒靨，或小便赤澀，餘熱不除，一切惡候，或被風寒腹，不見入皮膚内

紫草　木通　甘草　枳殼各等分

右㕮咀，每服二錢，水半盞，煎三分，溫服。一方治伏石胃經，身致虚寒，說作渠附心腹脹滿，一切危證，於本方中加當歸等分，名紫草散

節易云：傷寒者表實而裏虛，瘡疹者表虛而裏實。傷寒之邪始當於皮膚，次傳於經絡；瘡疹之毒始當於臟腑，而漸次泄於皮膚。達傷寒之法，宜先解表，然後攻裏；瘡疹之理，當先内毒，然後攻表。切不宜轉瀉，使毒氣轉深，變爲壞瘡，可爲倒靨，其候色黑，此疾亦多因傷寒大于汗下，邪毒内陷，或大行穿癖，長幼相似，當隨證以施治焉

四味散　治小兒瘡疹出不快

大蠍酒炙　豭猪乾血　是實　甘草各等分

右爲散，三歲以下半錢匕，五歲以上一錢匕，煎赤芍藥湯調下，不拘時，日夜各一服

發毒散　治小兒瘡疹出遲

地龍去土　防風各五錢

右爲細末，每服一字，用酒水各少許調下，不拘時候

一方　治時疾發疱豆瘡及黃瘡子未透，心煩狂躁，氣喘妄語，或見神鬼，或已發而陷伏

龍腦一錢

右研細，旋滴猪心血和丸，如雞頭大，每服一丸，心煩躁者，用紫草湯化下；若瘡子陷伏，溫酒化下，少時心神便定，得睡，瘡子發透。已發而不甚快，或變惡候

紫草湯　治瘡疹熱盛而發不透者

紫草茸　紫蘇葉　升麻　甘草各等分

右剉散，水二盞，糯米五十粒，同煎一盞，溫分兩服

藿香散　治斑瘡天瘡疹難出，皮膚溫壯，頭疼腳冷，呵欠悶煩，無時驚悸

炙黃芪　炙紫胡　蘇木　紫草各等分

右㕮咀，白水煎服。大抵瘡痘如見服表藥出，更宜詳細審察，若其色淡白，根窠不紅，經日不起發，以況文中木香散主之；如此後黑陷，十救一二，以文中異功散主之

痘瘡未見乃可表發　附論

大小兒纔覺傷風身熱，未明是與不是痘疹，便宜發散，可服四味升麻葛根湯。如疹痘始出一日至五七日之間，雖身熱腹脹，足稍冷者，不宜服也；或身熱瀉渴，及驚悸腹脹，汗出者，皆不宜服，而以十一味木香散治之

[illegible]

方

惺惺散　治小兒風熱瘡疹，時氣頭痛，壯熱目澀，多睡，咳嗽喘麤

桔梗　真細辛　人參　甘草炙　白茯苓去皮

白朮各一　真川芎

右爲麤散，每服三錢，水一大盞，薄荷五葉，生薑三片，同煎至六分，去滓溫服，不計時候，量大小加減服

四味升麻葛根湯　治小兒熱發作疹，至一日至五日至七日之間，或已發或未發，但身熱肢體痛者，先宜服之

白芍藥　川升麻　甘草　葛根

右爲麤散，每服三錢，水一大盞，煎至六分，去滓溫服，無時，大小以意加減

一方加紫草

羌活散　治小兒寒邪時氣，瘡疹變蒸潮熱，涎盛頭疼，心躁煩悶氣粗

羌活　獨活　柴胡　川芎

甘草　白茯苓　人參　枳殼　細辛

前胡　桔梗　地骨皮　防風　天麻

右爲末，三歲一錢，水半盞，煎三分，大小加減服之，不拘時

麻黃湯　治瘡疹煩渴甚者，用之及痘正出，頂喘渴躁

麻黃　杏仁　桑白皮　甘草

右㕮咀，白水煎，量兒大小爲劑。若肺數有熱未退，入竹瀝一半和水煎。或咽喉疼，并嗽，入麝香少許，須咳數加射干一分，甘……

葛根湯　治天時炎熱，欲發痘瘡，服此解肌發表

乾葛　石膏　赤芍藥　甘草　升麻　黃芩

無汗加麻黃　自汗加桂

右剉，葱白薄荷湯煎，乳後服。一方止用水煎

參蘇飲　治小兒風寒身熱，證似傷寒，但未經發表，宜先與此藥和解之

前胡　人參　紫蘇葉　乾葛　半夏

茯苓　枳殼　陳皮　甘草　桔梗

右剉，薑棗煎，欲熱服。一方加青皮，或曰青皮等藥亦能未催出痘瘡，加木香

紅綿散　治傷風傷寒，麻豆身熱，發搐，疑是痘證

天麻　荊芥穗　甘草　麻黃

全蝎

右末，薄荷三葉，紫草三寸，入酒三五滴，同水煎，熱服。如痘未出即出，一服如二服不出，即非痘證

調解散　治痘瘡外爲風寒所折，榮衛不和，內爲乳食所傷，內氣壅遏，以致水硬

青皮　陳皮　桔梗　枳殼　半夏

川芎　木通　乾葛　柴胡　紫蘇

紫草　甘草　人參

右剉散，每二錢，薑二片，棗一枚，水一盞，煎服。未效加桂枝三寸。一方無柴胡紫草，有當歸

不換金正氣散　治痘瘡外爲風寒所折，榮衛不和，內爲乳食所傷，內氣壅遏，以致水硬

蒼朮　橘紅　半夏　厚朴　甘草

藿香葉

右剉，用川芎薑棗煎。惡寒加官桂紫蘇

人參羌活散　治小兒寒邪溫時瘟疫，發熱頭疼，體痛壯熱，多睡，亦治潮熱煩渴，痰實咳嗽

羌活　獨活　柴胡　人參　川芎

枳殼 甘草 前胡 桔梗 天麻
地骨皮 白茯苓
右為散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去滓溫服不拘時候全
嬰方加防風徐生方如嗽加桑白皮
八寶散 治小兒瘡疹已發大熱狂躁悶亂
白芍藥 羌活 升麻 乾葛 甘草
防風 川芎 山梔子各等
右㕮咀每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服
五補散
右加甘草木香縮砂仁等分煎後服去甚當陳氏木香散異功散
通用

瘡疹壯熱煩渴 附論

夫痘瘡出而身熱大渴者七味人參白朮散治之如不愈只服十一味木香散如腹脹者或瀉而渴或足指冷而渴者驚搐而渴者身溫而渴者
身熱而咳白色而渴實熱而渴或氣急咬牙而渴或飲水轉渴不已皆
非熱乃脾胃虛津液少也宜服十一味木香散如不愈更加丁香官桂
攻發其表裏不致痒塌喘渴而死也○出大盛而面黃大便黑須辨
喘渴或腹脹者此為有瘀血在裏宜犀角地黃湯及治瘡疹中衄血吐
血等藥亦若不解利其害尤甚如抱龍丸至寶丹生犀磨汁
之類皆可選而用之若大便不秘實小便不赤黃止外熱而內實者當
別求治法也

方

葛根麥門冬散 治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶
葛根 麥門冬去心 人參 石膏
川升麻 甘草 茯苓各二 赤芍藥一兩
右為粗末每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服不計時候量大
小增減服
生地黃散 治小兒斑疹瘡身熱口乾咳嗽心煩
生地黃 麥門冬去心 杏子去皮尖 款冬花

陳皮各二 甘草
右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服不計時候量
大小加減服
人參清膈散 治瘡痘壅熱後熱毒不解涕唾稠粘鼻乾身熱咳
嗽痰喘潮熱煩渴咽膈不利大便如常小便黃赤
人參去蘆 柴胡去苗 當歸 芍藥 知母
桑白皮炒 白朮 黃芩 紫菀 地骨皮
茯苓去皮 甘草炙 桔梗 黃芩 石膏
滑石各一
右為粗末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至六分去滓溫服
不拘時量大小加減服
前胡枳殼湯 治瘡痘後痰實壯熱胸中煩悶臥則喘急大便
堅實
前胡 枳殼 赤茯苓 大黃 甘草炙各半兩
右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服不拘時候量
大小加減如身溫脈微并瀉者不可服
人參白朮散 治小兒瘡疹已出身熱不退吐瀉煩渴生津液除煩
止渴
人參 白朮 藿香葉 木香 甘草
白茯苓各
右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服不計時候如
腹脹瀉渴足指冷者只服十一味木香散治之
赤茯苓散 治瘡痘出後咳逆咽痛胸痞食不下
赤茯苓 甘草 大青 升麻 枳殼
梔子仁
右㕮咀每服入竹葉煎量兒大小為劑
犀角飲 治小兒瘡痘瘡及赤瘡子正盛令不入眼
犀角屑 川大黃 桑白皮 鉤藤 甘草
麻黃 龍膽草 石膏 人參 黃芪
右㕮咀白水煎量兒大小為劑錢氏方名調肝散治瘡疹大盛令不

入目也一方瘡子退後明星宰聚羣之更良
山梔子湯　治疵赤及斑毒狀如蚊蚤所螫若毒盛色黑者宜服
宣毒膏
山梔子仁　白鮮皮　赤芍藥　升麻各一兩　寒水石
甘草各半兩
右爲末入紫草薄荷各少許煎服量兒大小爲劑
牛黄丹
牛黄一　川大黄各一　粉霜　硃砂各一分
右爲末同研勻煉蜜丸如黍米大每服人參湯下量兒大小爲劑
通關散　治斑瘡水痘心躁發渴及小便赤色口舌生瘡通心
經
山梔子仁　車前子　大黄　甘草　瞿麥
赤茯苓　人參　滑石各一　大黄一　萹蓄各等分
右爲末入燈心草煎四五沸服量兒大小爲劑
黄芪散　退熱調養
黄芪　柴胡　乾葛　甘草　人參各等分
右㕮咀白水煎量兒大小爲劑一方無人參用薄荷葉三葉煎
黄芩甘草湯　治痘瘡閉熱不出煩燥不得眠
黄芩七分　赤芍藥　甘草各五分
右㕮咀每服三錢水一盞若胃中虛冷其人能食飲水即噦脈浮發
熱口鼻中燥能食者必衄加大棗二枚同煎若嘔者加半夏少許生
薑三片同煎若食少者加參煎量兒大小各去滓加減服
大青四物湯　治熱病汗下後身熱不除斑出如錦紋煩燥不得臥
大青　阿膠　甘草　豆豉各一
右㕮咀每服五錢水一盞半先將大青甘草豆豉煎至七分後入阿
膠再煎令溶量兒大小加減服
白虎湯　治濕熱及中暑煩渴并治小兒豆疱疹斑瘡赤黑出不
快及疹毒餘熱
石膏四兩　知母一兩　人參四兩　甘草炙一兩
右剉糯米煎米熟爲度去滓服但加生薑棗煎渴甚者更加乾

葛春冬秋寒有證亦服但加棗煎小兒減半
楊氏方敗毒散　治小兒痘疹
右倍加甘草生枳殼糯米煎服一方加紫草茸之生地黄煎服
導赤散
生地黄　木通　甘草各等分
右等分水煎服一方爲末每服三錢水一盞入竹葉同煎五分食後
溫服不用乾草用黄芩
神功散　治痘瘡大熱發狂譫語此藥清心涼肌退熱消毒服
此藥解利熱毒免攻頭目咽喉
黄芩　柴胡　桔梗　防風　荊芥穗
陳皮　赤芍藥　牛蒡子　枳殼　木通
紫草　赤茯苓　甘草等分
右剉燈心白附子麥門冬煎大便秘大熱加煨大黄末煎微利即
止後服小熱加竹茹大熱加犀角薄荷山梔子仁天花粉
甘草散　治瘡痘暑出煩渴不止
粉草炙　括蔞根
右爲末煎服一錢甘草追血散發瘡痘
烏梅湯　治瘡痘熱渴
小黑豆　菉豆各一　烏梅二個
右㕮咀新汲水一盞煎取清汁旋服
又方
用羌活散消風散消毒散合和竹葉生地黄土朱煎服
人參麥門冬散　治發渴煩熱及瘡豆身熱
麥門冬一兩　人參　甘草炙　陳皮　白朮
厚朴各等分
右爲麤散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服不計時候
大小加減與服
奪金散　治小兒麻豆瘡疹既出渾身壯熱情緒不樂飲食不
思服此可以內消仍令瘡無瘢痕
透肌散　治溫脾蘊熱毒氣蒸發瘡出不快煩喘昏悶

消毒飲子 治毒氣壅遏，壯熱心煩，瘡大小難出，未能透，咽喉不利

紅花升麻散 治小兒瘡疹豆未出，熱甚，口渴煩躁，發難出者

升麻 芍藥 乾葛 紅花 蘇木

黃芩 麻黃（去節） 甘草（各等分）

右爲散，白水煎服

瘡疹大盛 附論

瘡疹有可下者，以其當出之時，毒氣壅閉而不結者，此是毒氣內外壅實，宜若不透之，毒氣內入攻心爲害。大治法宜下者，乃其有不結膿痂，及能食而喘，頭昏口語譫語，大便閉者，可以承氣湯下之。如熱甚而渴，面赤悶亂，大小便閉或大吐者，合下其小便通利，故主之。或瘡疹已出，定腹汁不乾，而大便不通者，宜牛黃，或有瘡疹證而未見斑點，胃熱潮作，氣粗腹脹，大小便秘，譫語頓渴，胸膈滿而數者，此是毒氣而不得出，亦當用藥下之，則內無留塞，衛升降，其勢得自出，此皆合下證也。

方

牽牛子散 如瘡子已出，熱毒有表熱，急欲氣快，以防已後青乾黑陷

牽牛子（炒） 當歸身 甘草（炙） 紫草 連翹

黃芪 黃芩（微炒） 地骨皮（各二錢）

右同爲粗末，每服二錢，水一小盞，煎至半盞，去滓，食後溫服，乳食[illegible]

一證出大盛，而面青，大便多虛，煩躁喘悶，或腹脹比前，參血在裏，宜犀角地黃湯、小柴胡湯主之。予甞於述方曰：瘡疹半在表半在裏，及熱毒大盛，服此佐以快毒，毋使氣血凝，句則出快，不致倒黶。及狀冬之間，痘瘡發而不起，由胃氣弱，獨留胃熱，移瘡又黑陷，加減用之

小柴胡湯

柴胡（二錢） 人參 黃芩 甘草

半夏[illegible]

右剉，每服三錢，薑三片，棗一枚，服。冬月身寒強脾弱黑陷，如數加五味子二兩

柴胡（三錢） 甘草（一錢） 生薑（二錢）

右加減，前服咳嗽，加五味子

犀角地黃湯 治瘡疹熱甚急，受濕成片，及治傷寒溫病應發汗而不發汗，內有瘀血者，及鼻衄吐血不盡，內有餘瘀，面黃，大便黑者。此方消化瘀血，并小兒瘡疹氣實熱，瘡疹出得太盛，此方解之，如體表弱不宜用。一名解毒散

犀角 生地黃 赤芍藥 牡丹皮

右剉，每服五錢，水一盞半，煎取一盞，溫服。有熱如狂者，加黃芩二兩。其人脉大來遲，腹不滿，自言滿者，爲無熱，更不用黃芩也。

一論毒氣強盛，瘡中吐衄，出大盛之時，不能解利，其害尤重，宜抱龍丸、生犀汁、小柴胡湯

又方

生犀角（磨汁）

右用新水磨汁，食後服

消毒飲

右用甘草、生地黃[illegible]

抱龍丸

天竺黃（一兩） 雄黃（一錢） 辰砂 麝香

牛膽南星[illegible]

右爲細末，甘草水丸，皂角子大，用溫湯化下

瘡痘論甘草散 若痘未出及雖出燥渴者，宜服

右用大甘草不以多少，炙過爲細末，每服一錢或一錢，水一盞，煎至六分，去滓，不拘時候，呷之，以少解利熱毒，即休。若瘡出遲者，服之錢子大人當臍中，酢研，男左女右服之，或灸一壯，亦能發出

瘡痘毒氣已發不必用之

治小兒痘瘡子已出大盛，發膿本結痂，若常不能轉動疼痛，淹淵傳之便，更不成瘢。一方名牛黃散

用牛黃不以多少，曬乾，火煅，取心中白者，研令極細如粉，相似，用絹帛撲於有瘡處，不以時，使瘡乾以速歛潰之。一方用烏牛

黄一方用臘月黄牛糞日乾燒灰存性碾末治痘疹太盛眼中不食臥瞌不
得用灰錢一寸許在杯上令盆之或者大病時用細皮灰或灰豆粉皆
用黄牛糞撚之一方用馬糞作末如前用亦佳一方用兔糞如前用
如嬰孩有此候作細糊灰子飲下强矣妙
治小兒因患瘡疹其聲有音大亦一時失音或咽喉腫痛不可見者
以好生薑不拘多少擦嗶同時飯後入中進服抹空處
紙上焙乾爲末摻瘡痕上仍數次效

調肝散 治瘡疹太盛宜服之令瘡不入眼

生犀（二錢） 龍膽（二錢） 黄耆（半兩） 桑白皮（四錢） 大黄（一錢）
麻黄（去節） 鈎藤子（一錢） 石膏（半兩） 括蔞（一個） 甘草（二錢各）

右爲末每服二錢水煎食後温服仍效

瘡疹大小便不通 附論

瘡疹本因熱而出熱勢甚則其出愈盛且熱則風外衛爲之閉塞
毒氣枝蔓者其瘡者大便不通小便如血表裏熱盛爲瘡身上破裂
既由不得解利之故救之之法宜犀角地黄湯小柴胡加生地黄湯四聖
散牛黄散紫雪之類可選而用之○凡瘡痘出身熱煩躁腹脹而
大小便澁面赤悶亂宜八正散四順飲不通者宣風散

利毒丸 治小兒瘡疹欲出胃熱發温壯熱氣粗腹滿大小便赤
澁睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎實喘咳大滑數便宜服
之

大黄（半兩） 膩粉（一錢） 大青（錢） 龍腦 朱砂（各半）
檳榔 生牽牛（一錢半炒） 黄芩 青黛（各一錢）

右爲細末麪糊爲丸如黄米大每二歲兒服八丸生薑蜜水下不動
再服量兒大小虚實加減

川黄散 治麩瘡及麻病大便不通

川大黄（二錢） 川芎（一錢） 甘草（炙） 黄芩（一錢）
枳殼（去穰麩炒半兩）

右爲末每服一錢水一小盞入紫草少許煎五分去滓温服

散毒牛黄丹 治瘡疹出定大便不通瘡出腹中不乾

真牛黄 川大黄（二錢） 粉霜 真珠（一錢）

右同研勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎人參湯下大小加減

棗變百祥丸 治瘡疹大便秘結

紅芽大戟（一兩去骨） 青州棗（十五個去核）

右用水一碗同煮至水盡爲度去大戟不用將棗焙乾可和作劑旋
丸從少至多以利爲度

治小兒四五日不大便者
用肥豬膽一塊白水煮熟切如豆大與兒食之令腸滑潤大便通
利

燈心散 治瘡疹出後煩躁小便不利者

燈心（一把） 鱉甲（二兩醋炙）

右㕮咀白水煎服量兒大小分劑

五苓散 治小便赤澁
加燈心十莖麥門冬去心車前子各半錢煎湯調又人參湯加枳殼
去穰切少許治大便秘結內煩外熱未效更加四順清涼飲少許

瘡疹倒靨 附論

凡痘瘡內虚不能出者謂之陷伏外感風寒或穢惡之氣衛觸而不得出
者謂之倒靨或自始末程重不同如斑點之始熱毒方達出者有陷伏
亦有倒靨若外感風寒肌竅閉塞血凝不行必身疼四肢微厥斑點不
長或變黑色或青紫瘡疹此爲倒靨也宜温肌發散如紫草茸退人
齒蝎紫背荷葉之類温散寒邪然後熱氣復行而其斑自出
胃虚而不能勝榮衛者出而後陷斑點白色或黑色其人必不能乳食
大便自利或嘔或吐此謂虚而不能出謂之陷伏也宜用温中之劑令其
胃暖榮衛復行則當自出矣宜異中湯丁香煮散之類甚至萬將研
桂亦可用豆疱爲中者是紅斑出齊之後其狀如豆起於肌皮之上乃未
結膿疱而死之前證也血疱七日當結膿窠而死當此或風寒穢氣
而爲倒靨或胃虚吐利而爲陷伏者治之亦如前又有房室等雜氣觸
犯而然者當用揩甲瘡本乳香胡荽等法量解之良方腦子豬血酒治

毒氣入臟而不出○黑陷而耳尻反熱者為逆惟腎無證以其不納
穢故也當其發作之初及血疱之際一身俱熱而尻耳自涼此即腎之
平證也蓋尻耳皆屬於腎今一旦黑陷是變壞歸腎使尻耳亦為熱
其證為大逆錢氏立論用百祥丸瀉膀胱謂腎邪既衰脾土復旺身熱
氣溫欲飲水者可治以脾實腎虛寒去而溫熱也百祥丸之意即活人
書論陰陽寒上敗不敗急用承氣湯皆是不得已而用之境章十救
一二而已○瘡黑有順者大凡黑靨陷伏本是逆證然亦有順者謂
脾強可以勝腎雖黑靨而忽焦成血痂者為順此以猪尾服補脾藥
故令脾氣得不衰毒雖入臟皆瀉出也經云脾病則五臟危今脾土旺
痘化危為安矣黑靨而逆者謂脾虛不能制腎乳食不消水穀雜下脾
虛受毒四臟皆困而危殆矣古人云有無脈者易治在臟者難治黑者乃
變壞入臟雖得脾胃強盛是亦九死一生之證耳黑靨而發寒者虛
黑靨有四證一感風二毒氣大盛毋復入表三因虛無陽氣以衰之四
為室雜氣等觸犯所得之因既不同用藥故當各得不宜絕無風寒則
宜溫散毒氣盛宜利小便解毒而虛宜溫裏觸犯宜辟穢大抵黑陷而發

寒者重不發寒者輕其證乃脾弱為腎所勝錢氏用百祥丸以瀉膀
胱之毒令陽氣復運脾土溫暖所謂瀉膀胱經本必令脾土自勝也

方

大決驗丸　治斑疹倒靨黑陷惡候

辰砂一錢　紫草茸一兩　川升麻　釣藤鉤　赤小豆各半兩
甘草一錢　川地龍三條去土焙

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大朱砂為衣每服一丸石榴湯化下未
用溫水與乳汁化下

治瘡疹倒靨黑陷　一名猪尾膏

用小猪兒尾尖取血三五點研入生龍腦少許新水調下食後

治小兒伏熱在心昏瞶不省或誤服熱藥搐熱冒昧不知人瘡疹倒靨
黑陷時疾發斑豆及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神
用生梅花腦子或一字研半字取新殺猪心一箇用心中血同研
作大丸同新汲水少許上下丸省再服如瘡疹陷伏者溫酒化下
食後一名龍腦膏用紫草湯化下

猪血膏　治小兒瘡豆欲出及陷伏者皆宜速治不爾毒氣入臟
必致危困

臘月猪血瓶盛掛風處陰乾

右取半棗大以龍腦如大豆許溫酒調下或兒方云加菉豆粉半錢許
同研有效有人之甚者發瘡出而黑一家小女病傷寒晚夜搐盛晝
夜現天手足厥令數日漸加昏篤形證危惡是時發豆瘡乎疑其
為瘡以藥伏之先下此藥已沉昏家實生猪血時當盛暑血至已
敗悉無可棄何多以龍腦香溫酒之一服遂得少蘇須臾發身熱瘡點
遂安不爾幾至不救矣

又方

用黑狗糞日乾燒為末用麝香湯調下

百祥丸　治瘡疹倒靨黑陷寒戰咬牙頭溫身昏紫黑二服不
愈死　一名南陽丸

右紅牙大戟不以多少陰乾漿水煮令極軟去骨日中曝乾復內汁中煮
汁盡焙乾為末水丸如粟米大每服一二十丸研赤脂麻湯下吐

利同無毒一方以前藥為細末三歲兒抄半錢研脂麻湯調下壽
常小兒驚中惡遊者是腎經風熱一是驚風入胃一服即效後吳
藥更不再服

宣毒膏　治毒氣盛瘡疹已出不快倒靨而急服此藥皇經大效驗

八日刺損猪尾取血一盃用新瓦盞盛

好珠砂水飛別研　乳香一分別研　甘草末
馬牙硝半兩別研　腦子半分別研　麝香一錢別研

右將事畢同猪尾血拌和用一竟箭竹筒底下留一節入藥在內以紙
數重緊合於筒口塞通一夜以麻索子縛了懸廁屋梁上至清明日
取出曝乾更入腦麝射香一分研細滴水丸如皂子大每服量多少
人參湯化下若毒盛瘡黑倒靨者服之即紅活再長神效

治瘡疹大便不通其豆漸黑而陷即宜服嬰兒乳母同服

人參　白茯苓　白术　肉豆蔻　黃耆各半兩
甘草炙二分

右㕮咀每服一分水半盞生薑一片棗子半枚煎至三分去滓服乳

毋倍之若大為手足厥冷加附子用驗方

治小兒斑疹黑陷方

用臘月兔梟燒存性或一錢或二錢以糯米湯調服若乾者以好酒調

以時化開放上前服亦效

治瘡疹不透乾黑危困神效

用綿櫨子不以多少為細末每服二錢紫草湯調下小兒量大小加減

治瘡疹黑陷

鐵腳威靈仙為末 腦子

右和勻冷酒調下服之取下瘡疹為效

坊經倒靨方

胡桃一箇燒存性 乾胭脂

右研為極細末用胡荽煎酒調下每服一錢無時服之立效

再甦散 治小兒被猪犬糧香氣毒氣入裏瘡變黑色須臾

不救急宜用此藥服之

白殭蠶 地龍

右為末每服半錢用猜猪尾上血如龍眼核大同新水少許調服日

三服效 一方用蘇合香丸用胡荽酒化服或焚熏

人齒散 治小兒倒靨出不快發斑俗名蛇皮及黑大者

又齒一名退陷散

人牙 燒存性 麝香少許

右同研為末分作三服溫酒調下不愈再服亦可 一方細研酒調入

猜猪血三五滴同服之或用麻黃湯皆可小兒尤佳

治瘡子出未透黑倒靨者

用乾猪櫨子為末湯調服微有汗出不妨 後瘡紅卻觧黃

鯽魚食之魚去腸肚不去鱗立紅 若又黑陷口渴以茄秧服立紅活

治瘡疹倒靨不出

牛蒡子 紫草一分

右為細末每服一錢麝香少許溫酒調下不過三服立愈

又方

乾葛 胡荽

又用無灰酒一盞煎濃汁令子母俱飲效

治小兒一切斑瘡倒靨欲死者

右用十二月人角兒糞七箇用人般家人發鼻內吹之用燒

藥快入角兒用石榴灰上的不見空時有處甑兒蓋着燒

又方

遇大有神效

用人中白臘月者最佳通風處以火煅存性冷調三五錢陷者自出

又方

蟬退末 乾胭脂 猪心血

右研為膏用溫紫草化下和時身就立紅

周天散 治瘡黑陷項強目直視腹脹喘急發搐及一切惡候

蟬退 地龍

右為末小者半錢大者一錢研乳香為調服連二服瘡出即愈

神應散 治瘡疹毒氣少大小便利倒伏不出

生乾地黃 地龍

已上搗羅為細末每用

好硃砂

右同拌勻每服一字煎胡荽酒少許同溫湯調下

治金散 療小兒瘡疹倒靨黑色

蟬蛻子 神麯 紅花 山梔子

右為麄末每服一錢水八分入荊芥七穗紫草十根煎至四分去

滓溫服

抵聖丸 治小兒斑瘡不及出而反入者

右取十二月老鴉左翅不計多少風中令乾辰日燒為灰用中猜猪

背上刺血為丸如雞頭大每一丸取猜猪尾上血以許溫水同化

下未效三兩時間更一服

救生散 治小兒瘡疹積毒倒靨黑色

猜猪血 馬牙硝

硃砂 牛黃 腦麝 鵬砂

右同研極細每二歲兒服一錢新汲水調下大便下惡物瘡疱紅色為度不過再服

脫殼散

用鴉抱出殼子於新瓦上焙乾去皮取殼為研為粉遇小兒斑瘡攧不出或黶謬黑凹黑陷瘡脊不起用酒調一字塗兒頭上令兒飯或以酒調塗囟池并上心前或熱水調一字灸

化斑散 治小兒斑瘡

石膏 知母

右等分熟水調一字服之或調塗手亭二去頭文陰香發泄瘡子此名高母化斑散治小兒斑瘡此二方極妙於後方恐太涼

治小兒瘡疹倒黶不出者

人齒 赤小豆

右同作一服薄荷溫酒調下

治小兒斑瘡倒黶并黑色者

用人齒不拘多少炭火燒灰研細猪尾血調下二錢移時再服

又方

赤葛真 白礬

右入甘鍋子內以礬在下用泥固濟牢固用炭火三斤煅以火盡為度候冷取出細研入腦麝各一字再勻十歲已下半錢已十歲已上一錢已薑酒調下更看疾熱加減

治瘡子倒黶方

用臘月中大糞燒灰為末入生龍腦少許細研每服半錢新汲水下

治大人小兒瘡子倒搐方

白花蛇 大丁香

右為末大人每服一大錢小兒半錢以水解灸酒調下如黑搐者服之移時重紅生如聖

治瘡子倒黶方

用獙擴子枝中截取水磨少許服之立發

麻黃湯 治斑瘡倒黶

用麻黃三十寸去節蜜拌炒令香紫色為度水一盞煎六分服

治瘡子倒黶

用溫生雞不計多少焙乾為末酒調下一字

加味宣風散 治胃腫瘡疹變黑

鷄心檳榔 陳皮 青皮 甘草

黑牽牛

右為末每服看調下氣快者加南木香一錢先下黑糞次下稠黃糞後以四君子湯加厚朴木香陳米為服和胃氣又糞黃瘡自微出

又以胡荽煎酒服其身即發起

獨聖散 治疹瘡陷入不發黑色□氣欲絕服此散發紅

用穿山甲湯洗淨炒令焦黃為末每服半錢入麝香少許南木香煎湯調下一方紫草煎湯入紅酒少許服之

一方用麝香當門子少許

靈砂酒 治疹瘡黑陷不起

用靈砂以好酒磨化三五粒服之效

紫雪湯 治小兒瘡疹倒黶

紫草茸 地龍

右為麁末每服二錢用水酒共七分煎至四分去滓溫服

丁香散 治小兒瘡疹倒黶黑色及出不快

丁香 鹿肉 紫草

右為細散每服二錢水一盞入麝香少許煎至半盞放冷産之如人行三二里再服立發紅色

通神散 治小兒瘡疹黶伏黑陷

雄黃 麝香

右同研細只作一劑一歲兒作三服溫酒調下

治小兒瘡子倒黶方

白殭蠶 蟬殼

右為麁末水一盞半煎至半盞去滓分作二服微熱服立出

黑金散 治小兒瘡子黑陷不出

猪懸蹄甲（半兩）　蛇蛻皮（一條）　鯪鯉甲（一分）　得皮（半兩）　蛤粉（一分）

右六味，都入在藏瓶內，用鹽泥固濟，燒一宿，研為細散。一二歲兒每服半錢，猪尾血溫湯調下，不出再服。

〔再生散〕 治小兒瘡痘正出，忽變紫色，或作黑陷，喘急神昏。

人齒（三枚，燒灰）　蝎梢尾（七枚）

右件研勻，每服半錢，溫酒或煎葱白湯調下，不拘時候。

〔治小兒瘡痘作變惡證皆可〕

人參（一兩）　茯苓（一兩）　紫草（一兩）　木香（半兩）　附子（三片）

右為㕮咀，生薑三片，棗一枚，水煎服。

〔神聖丸〕 治小兒瘡疹黑陷倒靨，服之速效。

兔血鹽麵餅（一片，去皮）

右用臘月活兔兒取血，就和麵餅，搗三四百下，丸如梧桐子大。每服三五丸，好酒化下，不拘時候。若藥下咽喉，頃更發瘡疹紅活，大有神效。

〔發斑紫草散〕

紫草　甘草　橘皮（去白，各半兩）　黃芪（等分）

右為末，水煎服者，表熱隱疹先出，麻疹又發，痘瘡黑陷，尤捷服。出此方，愈九云錢氏方，紫草散有枳殼難服。

瘡疹發斑（附論）

夫小兒斑毒之病者，是熱氣入於胃也。而胃主肌肉，其熱氣夾毒蘊積於胃，毒氣熏發於肌肉，狀如蚊蚤所齧，赤斑偏体。此病或是傷寒，或時氣，或溫病，此風熱不得歇散，熱入於胃實，威此毒，是發斑也。凡發赤斑者，五生一死；黑者十死一生也。[illegible]

〔犀角散〕方 治小兒傷毒瘟疫發斑，心躁煩，咽痛。

犀角屑（半兩）　川升麻（半兩）　白鮮皮（半兩）　梔子仁（半兩）　扁蓄（半兩）

寒水石（一兩）　川大黃（半兩，炒）　甘草（半兩）　赤芍藥（半兩）

右為散，每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，不計時，量兒大小加減服之。

〔大青散〕 治小兒熱毒發斑不止，心神煩悶。

大青（半兩）　玄參（半兩）　川升麻（半兩）　梔子仁（半兩）　川大黃（半兩）

甘草（半兩）

右件為散，每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，不計時候，量兒大小加減服之。

〔大黃散〕 治小兒斑瘡，大便壅滯，宜服。

川大黃（銼，炒）　甘草（半兩）　黃芩（半兩）　枳殼（半兩，麩炒）

右件為末，不計時候，以新汲水調下一錢，三歲已下可服半錢。

〔又方〕

犀角屑（一分）　川升麻（一分）　川大黃（半兩，炒）　甘草（炙，半分）

右為散，每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，量兒大小分減服之。

〔葛根橘皮湯〕 治溫毒發斑爛瘡，疹如錦紋，或咳，心悶，但嘔清汁。

知母　甘草　麻黃　杏仁　葛根　橘皮

黃芩（各半兩）

右㕮咀，每服五錢，水一盞，煎至六分，量大小溫服。

〔玄參升麻湯〕 治傷寒毒氣不散，表虛裏實，熱發於外，身斑如錦紋，甚者煩燥譫語，治喉閉腫痛。

玄參　升麻　甘草（各半兩）

右㕮咀，每服五錢，水一盞，煎至七分，量兒大小服之。

〔調胃承氣湯〕 治熱入胃中發斑，及服熱藥過多，亦發斑，此藥亦主之。

大黃　芒硝　甘草（各等分）

右用水煮半兩，先煎大黃、甘草、薑三片，煎六分，後入硝，煎去滓，溫服。

〔紫草散〕 發斑疹

釣藤鈎子 紫草茸各等分

右為細末每服一字或半錢用紫草湯調下不拘時

黑膏 治溫毒發斑

豆豉一合 生地黃八兩

右用豬脂半斤合和露之令一分取二分去滓下雄黃麝香末攪和

量大小服之其毒從皮中出即愈忌蕪荑

治小兒發斑兼惡毒氣

用蕪菁葉取汁少少與服之

治斑瘡

用生上寬葉和研取汁服之

治小兒斑瘡及痘瘡心躁眠臥不安

用升麻不計多少細銼水一盞煎至六分去滓以綿蘸汁拭瘡上

千金散 治小兒發斑瘡

用石榴葉不拘多少為散每服一字或半錢溫水調下

發斑集

用豬子七箇研碎用新水調勻服之

瘡疹攻咽喉 附論

夫瘡疹攻咽喉者心胃有熱上攻於咽乾痛而疼如魚口舌生瘡齒齦腫者宜甘露飲水調水不下者紫雪最妙如犀角湯抱龍丸消毒飲皆可選而用之

方

神仙紫雪 治大人小兒一切熱毒胃熱發狂小豆痘瘡發疹及傷寒熱入胃發斑并小兒驚癇涎厥走馬急疳熱疳黃疸喉痺腫痛及瘡疹毒攻咽喉水漿不下

黃金一百兩 寒水石 石膏各三斤 犀角 羚羊角各十兩

玄參一斤 沉香 木香 丁香各五兩 甘草八兩

升麻六兩

右以水五斗煮黃金至三斗去金不用入諸藥再煎至一斗濾去滓投上好芒硝二斤半微火煎以柳木篦攪勿停手候欲凝入盆中更下研

朱砂 真麝香各三兩急攪勻候冷貯於瓷器中勿令見風每服一字至半錢以冷水化下小兒半錢一字咽喉危急捻少許乾咽之

地黃丸 治小兒瘡疹口瘡咽喉腫痛牙疳臭爛

天門冬 麥門冬 玄參各三兩 甘草 薄荷各一兩

右為細末以生地黃汁和丸如櫻桃大每服一丸溫蜜水化服

甘草桔梗升麻湯 治小兒斑出欲透發齊咽痛不利

甘草半兩 桔梗一兩 升麻五錢

右為細末每服二錢水煎

桔梗甘草防風湯 治小兒瘡疹已出已發熱咳嗽及口舌生瘡咽痛壯熱飲水咳嗽痰涎不利服之無不愈者

桔梗 甘草炙 防風各五錢

右為粗散每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服不拘時候量大小加減服

甘露飲子 治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服之治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搖熱大便秘

甘草炙 山茵陳葉 石斛去苗 枇杷葉去毛

枳殼去瓤炒 黃芩去心 生地乾地黃各

天麥門冬各去心

右各等分為粗末每服二錢水一盞煎至八分食後溫服牙齒動搖牙斷腫熱含漱并服 一方無枇杷葉

如聖湯 治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗 甘草 牛蒡子 麥門冬

右為細末每服二錢沸湯點細細呷服入竹葉煎尤妙 一方加荊芥防風 重者入竹瀝 小兒乳母無孕者亦可服

紫河車散 療小兒瘡疹毒氣不解攻咽喉音聲不出舌頰生瘡

消毒須同犀角飲而求

紫河車 茜草根 貫眾 芍藥 甘草

右為粗末每服一錢水七分生薑二片煎四分去滓溫服之 一方加朱子一兩

鼠粘子湯 治小兒瘡疹收靨者身熱大便堅實口舌生瘡咽喉

腫痛此是餘毒未散又名乃毒攻
鼠粘子 炒 甘草 川升麻 荆芥 防風 各一錢半
右㕮咀每服二錢水一盞煎六分量大小加減服
【解毒防風湯】
防風 一兩 地骨皮 黃耆 芍藥 荆芥
枳殼 鼠粘子 各半兩
右為麁末每服四五錢水煎服
【桔梗湯】 如斑已出只時時與之快咽喉寬利胸膈
桔梗 二兩 生甘草 一兩
右㕮咀作一服水二鍾煎一鍾不拘時候服之如見傷食證又見斑
證先於下能大黃已至一藥紅化見再與升麻湯加又重傷前藥
不能見再與犀大黃已至二藥連之
【牛蒡散】 治小兒斑瘡及瘡豆未出一切毒瘡咽喉腫痛多腸去痰
牛蒡子 炒 荆芥 二兩 白芷 各 金鈴 各 甘草 二兩 防風 半兩
右為末水七分盞煎服如大便自利者不宜服之
【治痘瘡後餘毒上攻咽喉閉塞語聲不出】
用蚯蚓不拘多少麻油塗上燒存性研為細末以砂糖拌和捻作餅
子噙下

○瘡疹吐利 （附論）

凡痘瘡正出吐泄不食思增寒憂瘡者瘡必黑陷喉中必喘盍見先受
風冷血氣虛弱即見此證難治多死宜用益黃散甘若食積不食前
服若吐泄定後思食證手進方可用發瘡痘瘡設有妄者亦必生癰腫
也

一證紅斑方出胃虛吐利或傷涼藥侵損脾胃虛弱不食陷而不出宜用
溫裏之劑理中湯重者善附靈砂大抵用藥或冷或熱隨證輕重以救一時之
急不可拘以常法又不可太過也

方

【理中湯】
人參 去蘆 白朮 白薑 甘草 炙各等

右剉薑棗煎重者加炮附子
或裏受陰濕脾胃虛令大便自利手足厥冷宜理中湯益黃散等可救
裏溫出也
【胃愛散】 調理小兒脾虛吐瀉如斑瘡未出醫人不識形候使將冷藥
水劫瘡子致令內伏不出將此胃愛散調理如身體汗即不用拄心散
發也如無汗出即用拄心發之也後下羌活散與胃愛散
糯米 一合 乾木瓜 三分 甘草 一分 藿香 葉
紫蘇葉 各一分 丁香 三十五粒已上四味 一兩以肉荳蔻煨
右件藥同一處令乾研為細末每服一錢半錢煎紫蘇棗子湯調下
量兒大小為劑
【紫草木香湯】 治瘡出不快大便泄利
紫草 木香 茯苓 白朮 甘草 各等分
右剉散每服二錢水一盞煎糯米三十粒煎至服並紫草能利大便
木香白朮所以佐之也
【肉豆蔻丸】 治痘瘡已出泄瀉發渴水穀不化或瀉或痢或青黃
色者散令瘡豆難出難靨非特豆瘡一證 凡瀉痢泄瀉通宜服之
木香 半兩 縮砂仁 三分 白龍骨 半兩 訶子肉 半兩 赤石脂 七分半
檳榔 肉豆蔻 半兩
右為細末糊為丸如黍米大一週歲兒每服三五十丸三歲兒每
服百丸溫米飲下瀉甚者累功數吞下為止住服不止多服一方或黃
水穀為色淡黃色木香散下
【五味木香丸】 治瘡疹初出一日至七日如瀉一二行者便可服
木香 半兩 白龍骨 訶子肉 赤石脂 各半 肉豆蔻 二分
右為細末麵糊丸如黍米大一週歲服三五十丸三歲兒服百丸溫米飲
湯下日二服不拘時候三服不止者難救如瀉未救者即難治之

○瘡疹入眼 （附論）

凡痘瘡欲出先攻目赤腫不開火出瘡痘不甚紅活有瘥者設有
妄者須損眼目宜以調肝散護目生眼丸并珍珠丸化痰更宜對
證用藥也

一瘡痘盡出熱毒氣攻則斑瘡入眼多食毒物亦爾若覺眼腫或赤
痛多淚時時與開看睛面瘡即不害若有瘡者傳變直到四邊飲每日
食後一服並令微利毒下乎愈不害門

方

胡荊散 治瘡入眼上翳大便二三不入目
犀角 大黃 桑白皮 鉤藤
甘草 天花粉 石膏 黃芩 木通
荊芥 防風 牛蒡子 紫草 陳皮
龍膽草

右剉白水煎食後溫服

鵝翎散 治小兒斑瘡入眼
輕粉 粉霜
右同研地上用炭火三兩塊傾在火上急以碗盛之抑煙燒碗看燒
盡取生那生鵝翎掃取內水銀作一處是一服如人患左眼傾入左耳
內患右眼傾入右耳所患眼使得其瘡自愈

仙靈脾散 治斑瘡入眼
仙靈脾 威靈仙 各等分
右為末食後米飲調下量兒大小用之

黃蘗膏 治小兒疹痘出後即須愛護面目勿令沾染欲用胡
荽酒噴時先用此方塗面上然後方可噴四肢大人亦宜能有此疾患用
黃蘗一兩 綠豆一兩 甘草四兩生用
右為末再研令細後以生麻油調如薄膏從耳前眼眶並厚塗已
二五遍上塗面後可用胡荽酒噴早用此方塗於面上令不生
疹痘如用此方塗遲縱出疹豆亦少諸家方愛護面目者皆用

此方治毒少者用去皆同自疹痘論一科用綠豆粉三斤半

芥子膏 治瘡痘令不入眼
用白芥子為末水調傳足心熱毒停下

淨心散 治痘瘡出盡便宜服之如服斯自退
蛇退一條 甘草 不蛀皂角
右研勻小兒半錢熱水調服

治大人小兒瘡疹出攻眼目
右煎乾柿以燈花少許[illegible]了令先泡汁每服晝夕可三兩度大人亦
消擇燈花火點眼內痛以竹[illegible]子挑之花泥眼即多瘡消三上便即
不妨若不計大人小兒一[illegible]非時眼內有疾者亦宜用以去病

治瘡疹入眼
馬屁勃 皂角子 蛇皮
右入小罐子內鹽泥固濟燒存性研細為末溫酒調下一錢食後服

蛇皮散 治瘡疹入眼成翳一名子肝散
栝蔞根半兩 蛇皮二錢
右為細末羊子肝一個批開入藥末二錢麻線纏定米泔煮熟頻與食
之未能食肝與乳母多食如少小未能食即羊肝令熟研和為丸如
黃米大以米泔下十丸或乳母上與亦可日三服

蟬殼散 治斑瘡入眼半年已後者一月取效
豬懸蹄甲二兩 蟬殼半兩
右為末入羚羊角細末一分令勻每服一字百日外兒半錢三歲已上一二
錢溫水或新水調下日三四夜一二服食後服一年已外難治孝忠傾守
官江南秀買羚羊角輒得山羊角正如石膏與寒水石之相易也羚
羊角細而節蹙極堅而緊多用以為箭鏃是也山羊角
極長又節紋稀疏是京師用為至一方用豬肝湯調下

又方仙靈散 治證與前同
用蟬蛻末水煎羊子肝湯調服二三錢凡豆瘡纔欲着痂用酥或
面香油不住潤之可揭則揭去若不潤及遲揭瘡痂硬即隱成瘢痕

殺蟲芋散 治小兒瘡疹已發眼目翳障[illegible]
而不退者餘毒薰蒸眼目或因喫食煎炒熱物所致

穀精草（兩）　生蛤粉（二兩）

右爲細末，猪肝一葉，用竹刀批作片子，掺藥在內，用草繩縛定，以磁器內煮米泔一碗，煮候熟，令兒食之。一方臨睡細嚼，却用原煮米泔送下，忌一切毒物等。治疮痘疹入眼，疏肉肉眼，却服之。一方用青竹葉十片，同煎熟服。一方用生羊三二錢

決明散　治小兒瘡痘入眼，一名瓜蔞散

決明子　赤芍藥　甘草（炙，各一錢）　瓜蔞根（二錢）

右爲末，二歲半錢，蜜水調下，食後，日進三服，效

撥雲散　治小兒瘡痘入眼生翳，一名撥雲散

同桑、蟬蛻、真香一兩，炙令焦，爲末，麝香少許，和勻，三歲半錢，米泔湯調下，食後

通聖散　治小兒瘡痘入眼及生翳障，一名豆殼散

白菊花　綠豆殼　穀精草（去根，各一兩）

右爲末，三歲一錢，乾柿一箇，生粟米泔一盞，共一處煎，候米泔盡，只將乾柿去核食之，不拘時，一日可三枚，五七日可效，遠者半月餘效。一方有夜明沙一兩，又名白菊花散

浮萍散　治小兒瘡豆入眼疼痛，恐傷目

川羊浮萍陰乾，爲末，三歲一錢，羊肝一片，入盞內，以杖子刺碎，爛入水半盞，絞取汁調下，食後，三兩服立效。一方投水半合，恐者一服差，湯日青十服差。一方用羊子肝，又治陰翳，名如三服，一錢，苟一不

兔肝丸　治小兒斑瘡入眼，雄者白障遮，文服得但得，瞳子不陷者可治

黃蘗（去皮）　石決明（煅）　蒼朮（各半兩）

右爲末，兔肝丸，如小豆大，三歲三十丸，米湯下，食後服

青肝丸

防風（二兩）　人參　赤茯苓（各一兩）　黃芩　茺蔚子

黑參　大黃　知母（各一兩）

右爲末，蜜丸，菉豆大，食後茶下，量兒大小爲劑

秦皮湯

秦皮（二兩）　秦艽　細辛　防風（各一兩）　甘草（半兩）

右白水煎，淋洗

威靈仙散　治小兒斑瘡痘入眼生翳障遮睛

威靈仙　仙靈脾　甘草　赤茯苓　黃芩

青箱子　大青　赤芍藥　大黃（各半兩）

右爲末，半錢，猪肝批葉，蒸蓼葉上研，米泔煮熟，放冷，與兒大小用之。一方用猪肝，猪膽二箇批開，將藥在內

金華散　治痘瘡入眼昏暗翳膜遮障

黃連　菊花　枸杞子（各一兩）　甘草（五分）　牛蒡子（各兩）

右爲末，蜜調，食後，量兒大小用之，明目除昏暗退翳膜，常服大效

治小兒出瘡疹，眼內有雲翳

輕粉　黃丹（各等）

右爲竹筒吹在耳內，左眼有翳吹右耳，右眼有翳吹左耳，即退

透耳藥　右斑疹入眼

硃砂（一分）　粉霜（八分）

右研爲極細末，水調少許，用鵝翎頭傾一兩點於耳內中，後用前退翳散，本門用

治小兒斑瘡入眼

硃砂　腦子　水銀　麝香（各二分）

右爲細末，用水銀調，滴入耳中

治瘡疹入眼

右法候瘡疹安後，以兔屎焙乾爲末，茶清下，頻頻服，即安，仍治瘡疹翳

羌蟬散　治小兒瘡疹後毒氣不散，生翳障睛，并治暴赤眼，疼痛生翳遮障羞明，一名羌菊散

羌活　蟬蛻（去足翼土）　防風　蛇退　菊花

穀精草　木賊　甘草　梔子　白蒺藜

大黃　黃連　沙苑蒺藜（各等分）

右爲末，每服半錢，或一錢，白湯調，或米泔調下

護目膏　治小兒痘瘡不入眼內，及散斑毒，或瘡豆後解毒，瘥翳根目障翳，或瘡豆入眼而生翳者，一名黃蘗膏

黃蘗 一兩　菉豆粉 半兩　甘草 四兩 生用　紅花 二兩

右爲末生芝麻清油調塗兩眼外四畔頻頻塗之面上不生瘡疹若塗此藥瘡痘必少或胭脂傅之亦可若用胡荽酒尤先效可

決明丸　治小兒斑瘡入眼雖赤白翳遮漫黑睛但得童子不陷者皆可治之

石決明 煅　川芎　黃蘗 各一兩　蒼朮 半兩 米泔浸

右爲末同兔肝或無以羯羊肝代之研爛搜和丸如菉豆大每服三十丸食後臨臥米泔下

治豆瘡入眼　用穀精草煮白柿夾仍用菉豆一握燒灰淋濾以上面塗青者洗下面濃青服之

七退散　治痘瘡後眼生翳

雄雞胸蓋 黃皮　抱雞脚 黃皮　抱雞子殼　人指爪

蟬蛻　猪後脚懸爪 以下四味 燒存性　羚羊角

右焙乾或日乾爲細末煎羌活湯調下

羊肝散　治小兒豆瘡入眼及無辜氣入眼

密蒙花 三兩　青葙子　決明子　車前子 各一兩

右爲細末各別收之每服密蒙花末三錢餘藥各一錢拌勻用羊肝一大片薄批摻上濕紙裹煨熟量多少空心食之一名密蒙花散

治瘡入眼　用局方洗心散洗肝散加乾柿菊花穀精草菉豆殼同煎嚼下生薄荷食後服

養生必用　治目暴赤腫痛小兒斑瘡入眼

蕤子 炒香　蔓菁子 以新瓦上慢火炒令黃色　甘草 炙

木賊 去節 各等分

右爲末沸湯點一錢食後服日三

決明丹　治疹豆瘡後毒氣入眼

決明子　密蒙花 各一兩　青葙子　車前子　川黃連 去鬚

羚羊角 屑 半兩

右爲細末煮羊肝一具切破同諸藥搗一二百下丸如黍米大每服十粒荊芥湯下乳食後量兒大小加減

蕤仁散

蕤仁 去皮　黃芩　梔子仁　黃連　秦皮

川朴硝　甘草 炙 各一兩

右爲細末每服二錢用水一盞煎至六分去滓食後溫服量兒大小加減翳障重者兼密蒙花散

密蒙花散　治疹豆瘡毒氣入眼昏暗生翳

密蒙花 三兩　井泉石　青葙子　決明子　車前子 各二兩

右爲細末每服半錢米泔一盞半羊肝一片批開摻藥末在肝內以線紮縛令勻切破摻藥末在肝內量力食之

井泉石散　治小兒風熱攻眼及斑瘡入眼

井泉石　蟬蛻　蛇皮

甘草

右爲末每服半錢至一錢蜜水調下忌油膩

羚羊角丸　治眼昏赤脈侵睛或多或作翳障

羚羊角 屑　黃芩　大黃　芥菜子 各一分

當歸　玄參　甘草 炙　木賊　蟬殼 去足

珍珠 細研　決明子　荊芥穗　川白芷

蒼朮　羌活 各一兩

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食後用荊芥茶湯嚼下小兒斑瘡眼昏量兒大小加減用蟬殼湯化下食後服

治孩子痘瘡入眼

蕤仁　桃仁　杏仁　膩粉

龍腦　硼砂　牙硝 各一錢

右用白沙蜜調末炙三次候之每用一粟米許點之妙

治小兒斑瘡入眼

黃連　菊花　密蒙花　蛇皮 燒存性

甘草

右爲散煉蜜丸如菉豆大冷水下五丸十丸加減用

蛇退散　治小兒斑瘡入眼

蛇蛻皮　馬屁勃　皂角刺　穀精草

右各等分同入瓦罐鹽泥固濟木炭火燒令通赤出於地坑子內
出火毒候冷取出細研爲末每服一字温米泔調下

樺皮散　治小兒班瘡入眼及叢黑睛

樺皮　頭髮　蛇蛻各等

右細剉入瓷器內熟火燒之候煙盡研細每服半錢煎黑豆湯入酒三滴調
下日五服

又方

用蠶沙燒灰爲末每服一錢以米甘研生藥至七粒調下每夜一服
病去即止

治班瘡入眼方

用黃芩爲末臘月內猪八牛膽內就吊於北陰中候乾丸菉豆大如患一二五丸
只一服是歲年者三服至五服三年外者不醫

治小兒瘡疹入眼方

用蛇骨皮　蟬蛻[illegible]

右爲末每服一錢陳粟米飲調下日三服神効

治小兒班瘡入眼

用生薑魚以針刺血斷處內點入眼即愈甚佳

治班瘡入眼方

班瘡入眼莫尋常　熱氣流來刺此方
鶴頂一青能取効　將間病退號醫王

芎芩散　[illegible]

黃芩　山梔子　黃丹各等分

右爲末入牛蒡子葉杵汁調塗在頂門

蟬退散　治班瘡翳障眼不見光明宜服之如精膜破不可醫

蟬蛻去土　蛇皮　川升麻　威靈仙　井泉石
穀精草　大青草　仙靈皮　蒺藜炒去刺　黃連
硃砂研　螺粉

右爲細末每服半錢或一錢蜜水調下大人小兒加減服

甘菊花散　治小兒班瘡

甘菊花　穀精草　石決明各等

右爲末每服二錢水一盞入乾柿一箇同煎至七分去乾柿細嚼服

治小兒目中痘瘡成翳方

大黃煨二錢　水銀五分

右用男子人乳將花水銀爲泥入大黃末子入令水泥上頭上如乾用水塗
之極妙

治痘瘡入眼腫痛不可開翳不出

用斷續即蟬蛻爲細末以薄荷汁調傅一二匕便能開若瘡翳
不出溫熱水調下一二錢即出乳母服亦可凡小兒初患豆瘡先用胭
脂塗眼令瘡不入眼中不得洗面生水入眼即消眼

治諸眼翳昏風痒方

用兵参三三五七粒木賊去皮大細研和津液各五端坐常服杏仁潤
肝去塵津也

加減四物湯　治班瘡入目或痘豆收後

當歸　芍藥　川芎　蒼朮　白菊花　乾葛　羌活各等

右剉散每服水一盞藥末二錢入生地黃少許煎同煎半盞量兒大
小服之乳食服忌一切動風毒物雖愈後忌三二月日方可

蟬菊散　治班瘡入目或病後生翳障

蟬退洗去土　白菊花各等分

右剉散每服二錢水一盞入蜜少許煎乳食後量兒大小與之屢驗

洗方

用黃連去鬚白滑石銅青等分[illegible]包湯浸溫洗

塞耳丹　治疹瘡入眼

用水銀一錢號丹五錢同丸作六丸入鐵銚鍋中用瓦上蓋濕紙糊護
定用香炒鹹灰燒一日後取出以薄綿裹之疹瘡在右則塞右耳在
左則塞左耳立見墜下

瀉青丸　[illegible]

海藏云東垣先生治班後風熱毒翳膜氣暈遮睛以此劑瀉之大効

初覺易治

補肝丸

四物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜為丸是也

瀉肝散 瀉青丸去梔子大黃 治肝虛

治小兒痘疹後眼生翳膜 用淨洗手爪甲刮指甲屑焙令乾研細入麻子大入翳上兩日間自落極妙

秀關散 治小兒斑瘡初作眼患痛澁羞明怕日出淚頻多或已竟新成白翳子宜用神效

用華澄茄不拘多少為細末每以少許吹入鼻中於食後頻頻吹之諸證皆可用之

大勃無明膏 治斑瘡眼患只在百日內者之若易久即氣定難以療理

用搖取土中覆盆根癒熟有生路傍柱高五七尺者淨洗搗取粉澄令細日乾每用蜜和以少許點白丁上令其自消自散日二三次點用驗

治小兒斑瘡入眼 用甚妙蒺藜炙甘草羌活防風等分搗每服二錢新汲水下撥雲見日直到老

柴胡散 治服肥患斑瘡熱衝遶睛中疼痛淚出羞明如眼睛腫澁難開

柴胡　黃芩　芍藥 各半兩　甘草 一分

右剉散每服三錢水一盞煎大人小兒加減服滓以藥洗之

治小兒痘瘡後眼上生膜

威靈仙　仙靈皮　川芎 等分

右為末用不下水豬肝薄批片子撒藥末於上捲之用麻線縛之如丸數捲碗內盛放上蒸熟去線令小兒喫之自然落下

奇犀散 治小兒斑瘡豆毒眼但睛不枯破其翳證候悉治之半月即愈瘡子安後服此藥清肝腸未退無疾證

犀角　蔓荊子　羌活　麻黃 去節

木賊　石決明　赤芍藥　甘草　白蒺藜

瓜蔞根　甘草　人參　羚羊角

右為細末每服一錢或半錢小兒蜜易大人麥門冬湯調下夜臥食後服

大明散 治小兒斑瘡熱毒攻肝上衝目並生翳膜

寒水石　甘草 一兩　坯子胭脂 一分

右為細末每服半錢用生米甘水調下 乳食後

消翳丸 治小兒斑瘡眼生浮翳

硃砂　指甲末

右等分再同研令極細以蒸水浸入如丸如芥子大每用一粒於夜臥時以新筆蘸水點在眼內至中夜更點一粒

撥雲散 治瘡入眼

羌活　防風　甘草　柴胡

右為細末每服二錢水一中盞煎至七分食後臨睡服忌驢馬雞猪麪炙火上炙煿雞風毒等物

蜜蒙花散 治眼前

蜜蒙花　羌活　菊花

石決明　杜蒺藜

木賊

右等分為細末每服一錢臘茶清調下食後日二服

烏豆麥門冬湯 治瘡疹眼目赤腫痛澁疼痛淚出羞明

烏豆　麥門冬

右二味用水三升同煮令烏豆爛熟為度將藥湯放溫時時與兒服乳母喫烏豆麥門冬如三五歲兒可令嚼喫如烏睛突高者難治

蒼朮散 治斑瘡入眼

蒼朮 一兩　桔花　藁本　蛇退　防風

枸杞　白蒺藜　黃芩　川芎

木賊　甘草　白菊花　蟬退　乳香

沒藥　硬石膏　乾葛 一兩

右件為細末用白水煎食後服加穀精草三分半尤妙

菊花散 治豆瘡入眼

白菊花　綠豆殼　蜜蒙花　旋覆花　穀精草

甘草 三分

右爲㕮咀每服一錢乾柿一枚粟米廿一盞煎水乾盡爲度取乾柿食之

後服

〔復明散〕治大人小兒斑瘡入眼或成翳障或眼赤腫睛高出而不枯損書雞年歲深遠並可治之

草龍膽 一兩　　麻黃 三兩

右二味各等分爲細末每服三錢食後又以井香熱湯忌食之已三服服藥五六日後眼內筋與翳膜皆抄紅色眼亮癢並不得揉動亦不可疑此是翳膜將退之候積日漸退去毒氣之病大者日三服小兒患量大小加減服之如不退者將只用第二次藥及未生淚水調下

〔紫貝散〕治斑瘡丁子入眼

紫貝 一個生研細

右生爲末用羊子肝批開摻末一錢線纏米泔煮熟入小口瓶蒸啖乘熱熏眼令熱氣射眼星以下露一宿來日空心喫不過一二服可愈

〔治小兒豆瘡入眼方〕

用蛇蛻伍寸麥芽豆去皮只喫豆神効

○瘡疹便膿血（附論）

夫瘡疹欲安而不自傷食有壯實者是瘡毒大盛氣血熱結腹中不散久必作膿血利宜用四物湯加槐花黃芩大便堅實者或傷食或熱或不乾有壯實者四順飲若爲白膿臭傷食壯實者先益黃散後解毒丸令微利再用益黃散○便血或下黑糞聽不醒者是毒太盛其證甚惡犀角地黃湯抱龍丸小柴胡加生地黃主之

方

〔薤白湯〕治小兒瘡疹其或下痢赤黃膿血及渾身熱甚者

薤白 半兩切　　豆豉 一兩　　山梔子 十枚

右用水五盞同煎薤白爛爲度去滓量大小服之解去惡積

〔牛黃散〕治小兒瘡疹陽毒入胃便血日夜無節度腹痛啼哭

牛黃 一分　　鬱金 一兩

右研爲末每二歲兒服半錢以漿水半盞煎至三分和滓溫服量大小以此增減之日二服

〔黃連阿膠湯〕治小兒狂疹餘毒下痢膿血

黃連 一兩　　黃柏 半兩　　梔子 半兩　　阿膠 炒 半兩

右爲麁末每服二錢水半盞煎至六分去滓溫服量兒大小加減日進二服

〔治小兒瘡疹之後大便膿血〕用山梔子仁煎湯下黃連阿膠丸

○瘡疹後解餘毒（附論）

瘡後解利者觀其當瘡疹後當解利此世俗通論然小兒稟受既實榮衛充壯瘡後有熱者宜與解利其大便難小便赤澀能食而渴大段熱甚者宜大黃散留熱在胃嘔吐而口舌生瘡牙下齒赤者宜甘露散煩渴而小便少者宜五苓散餘熱目赤齒痛或咽喉腫者宜甘露飲咽痛者宜抱龍丸如聖湯肝有熱毒多淚而不得眼者宜瀉肝散大腸下血疾瘡者宜牛蒡散惡熱又腸生癰者宜十全排胡生地黃犀角地黃湯諸者但當避將安養而已或其人所稟素弱瘡痘既出之後榮衛大虛生涎嘔大便不秘小便不赤飲食不甚進者宜四君散異功散變和湯之類以扶持之俟其飲如故起居自得未病者宜微利下劑其虛之人不必解利者見虛怯小兒不應解利而強與解利遂爲中寒爲下利生病多端也○餘毒作嘔吐者有冷熱之不同如心煩作渴食乳甚急聚滿于腸中吐出如射其人面帶赤手足心熱居處喜涼此熱吐也如乳食水穀不隨吐白色青白手足冷大小便自利此冷吐也熱者竹茹湯五苓散竹葉石膏湯加橘皮之類主之冷者益黃散理中湯丸主之要之病後餘毒多是熱邪其間令證十有一二也○病後忽遍身青黑色手足瘈瘲口噤返張如痙者此中風也宜消風散入蟬蛻薄荷生姜薄荷汁酒各數點飲之或小續命湯去桂附加荊芥亦可也○病後非時發搐搦者宜抱龍丸小柴胡加生地黃之類病後胃弱不能勝穀謂之食蒸發搐其人潮熱大便酸臭秘泄不調或嘔吐腸痛宜紫霜丸小承氣湯利之其作瘡痂結痂者前用小柴胡加生地黃爲佳之外麻黃小毒飲犀角地黃湯皆可選而用也病後大小便不通者四順

欽承氣湯五苓散導赤散之類使撮血者牛黃散犀角地黃湯黃連解
毒湯三黃丸等選而用之餘毒咳嗽痰喘者前茯苓湯小柴胡加五味子
桔梗枳殼等作嗽五苓散竹葉石膏湯黃連散瀉心散主之

方

全功散 治痘疹後餘毒解利餘毒

天花粉 防風 黃芩 升麻 羌活
荊芥穗 川芎 牛蒡子 鬱金 蒼朮
甘草 枳殼 木通 桔梗 赤茯苓
黃連 縮砂仁 陳皮 橘紅 當歸
麥門冬

右等分白水煎不拘時或同稍食

連翹散 治痘疹壯熱小便不通餘毒未解

連翹 人參 荊芥 木通 車前子
赤芍藥 當歸 防風 柴胡 滑石
蟬退 甘草 山梔仁 黃芩

右剉散每服二錢加紫草煎溫服

五福化毒丹 治瘡疹餘毒上攻口齒及治瘡積毒熱驚惕狂躁煩
赤咽乾口舌生瘡夜臥不寧譫語咽痛頭面身體多生瘡癤赤腫等
疾一名青黛丸

人參 玄參 茯苓 青黛
桔梗 牙硝 麝香 甘草

右為末蜜丸每兩作十二丸一歲兒一丸分四服用薄荷湯化下瘡疹上
攻口齒涎血臭氣生地黃汁自然汁化一丸用雞翎刷在口內熱疳肌肉
黃疲雀目夜不見物陳粟米泔水化下食後臨臥服一方用生犀
水化下

大和散

生地黃 川當歸 地骨皮 人參
甘草 赤芍藥

右㕮咀每服一錢水半盞煎至二分去滓通口服

柴胡麥冬散 治痘瘡靨後渾身發熱不退者有大熱經日不除 一名二參飲一名勝

柴胡 甘草炙 玄參 龍膽草
麥門冬去心 人參

右㕮咀每服三錢水一大盞煎六分去滓溫服不拘時候量兒大小
加減服

辛夷散 治痘瘡出後有痰瘡生痘鼻中不能臥
用辛夷即木筆花研為細末加麝香少許以葱白蘸藥末入鼻中
數次即通

三黃散又方 治痘瘡正出不利黃赤腹脹身熱大便不通乃毒入大腸宜
解其毒使痘出也

黃芩 黃連 黃柏 熟大黃

右剉水煎或加燈草甘草煎服

四順飲 治痘瘡積熱壅盛心煩躁毒熱氣出本虛者不可服又
治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫痛

當歸 赤芍藥 甘草 大黃

右四味等分煎服一歲兒服一錢重者通加半錢五歲已上服二錢未
通更量加之但要大便通毒氣出即安一方用陳皮等末煎服陳氏
方用薄荷三葉煎服

小承氣湯

大黃 厚朴 枳殼

右剉精末煎服但令大便通潤

大黃散 治小兒痘瘡出後宜服之一名參黃散

川大黃 黃芩 玄參

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小加減
服之

黃芩散 治痘瘡毒出盡後宜服之以解餘毒

黃芩 大黃 山梔子仁 玄參

右為末用水二兩水二升煎至八合去滓量大小服咽喉當先定

槐花散 治嬰孩小兒斑瘡餘熱不退

槐花 赤小豆 麝香

右為細末每服半錢用麥湯調下三四歲一字已上用量調下只進一
服腸中微利即用調胃觀音散補之

牛黃生金散　解利瘡子

兎杖　滑石各一　甘草二分　藿香一分

右為細末每服一平錢水八分煎至三分去滓溫口服兒大增之

射干鼠粘子湯　治瘡痘靨後餘毒有小熱壯熱大便堅實口舌生瘡咽
喉腫痛頰頷結核皆由瘡毒未盡而然

鼠粘子四兩　升麻　甘草　射干各二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分溫服不拘時

消毒加味犀角飲　治毒氣壅盛壯熱心煩瘡疹雖出未能勻透口
舌生瘡不能吮乳

牛蒡子二兩　荊芥穗五錢　甘草二錢　防風
犀角三錢　麥門冬去心　桔梗各五錢　川升麻

右剉散每服二錢水一盞煎去滓令溫時時令呷或與犀角之大便利者不
宜服

雄黃散　治小兒因痘瘡牙齦生疳蝕瘡

雄黃一分　銅綠二分

右同研極細量瘡大小摻其上

解毒丸　治小兒瘡痘毒攻身熱痘疽咳嗽有痰亦瘡痘正
出傷食肚痛及解諸藥毒

雄黃一分　巴豆二十七粒去油　鬱金一分

右為末白麪糊為丸如小豆大三歲三丸薄荷湯下食前如咳嗽痰喘氣
食後服一方加半夏一分

百草霜　治痘風瘡

用羊糞腦乾燒灰香油調塗

五勝湯　治瘡痘將出未能勻遍透肌解毒

用忍冬不拘多少剉乾藏搗篩每服二錢入荊芥二穗水一小盞同
煎至六分去滓放溫分作三服如瘡子已出後與服亦可

茜草散　治瘡毒上盛服黃芩散以解餘毒假此先定高口竅有
瘡下部亦有瘡自下利者

黃連　厚朴　陳皮　杏仁　枳實
麻黃去節　乾葛各等分

右㕮咀白水煎服量兒大小為劑

大承氣湯

厚朴八兩　大黃四兩　枳實五枚

右為麤末每服五錢水二盞煎八分入芒硝一錢已去滓服

比金丸　治瘡痘後餘毒不解

輕粉　滑石　白丑一兩　青黛半分

右為細末糊丸小豆大一歲二丸薄荷湯下

清肌散　治瘡痘後余毒未除瘡痂粘皮膚未平復者

茵陳一兩　烏賊魚骨去殼

右為細末以臘月豬脂調塗患處

瘡疹後瘢痕（附論）

凡痘瘡首尾不可出風宜於屋裏避生冷須避得所忌動風物食白魚野茶類與豬肉易能致愈痘瘡痂才欲着痂即自發癢而猶不住潤之可指則搔破則瘡硬成瘢痕也若發痂疤人多不以疏剔反以剝落早則成瘢痕之根也然既剝之後却不可早見風冷又當更護不剝去或出風致瘢痕喬瘡俗增水調滅之後數處矣白敷馬齒莧汁青金散皆可選而用也

方

韶粉散　治小兒痘瘡纔愈而毒氣尚未全散瘡痂雖落其瘢猶
黯或凹凸肉起當用此藥塗之

韶粉一兩　輕粉一分

右相研和入煉了豬脂拌和如膏薄塗瘡瘢上如痘瘡欲落不落者

瘢痕小兒痘瘡已靨未愈之間五藏未實肌肉尚虛血氣未得正復忽被風邪得於膏膜之間則津液凝滯故成瘡蝕瘡也宜用雄黃散銅綠散等藥治之久而不愈者漬骨傷筋以致殺人一方用羊同骨髓一兩煉入蜜滾三兩入輕粉一錢研成白膏蒜尾合盛之塗瘡上如豆

瘡痒甚誤搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痂落亦
無瘢黑瘢痕神妙

〔蒺藜散〕 滅瘢

白蒺藜子 淡豉 各一兩 山梔子仁 一兩

右爲末用醋漿水調如泥每夜塗之來早以漿水洗去

〔又方〕

鷹屎白 一兩 衣中白魚 二十箇

右研細入白蜜調和塗之

〔又方〕

馬齒莧 一斤 燒成猪脂三兩

右以慢火煎之成膏日夜塗之

〔青金散〕 治瘡疹豆瘢不消

白蒺藜子 一兩 山梔子 一兩 青黛 一兩 膩粉 一分

右研勻生麻油調塗之瘡上

〔治瘡痘瘢〕

用櫻桃仁研細傅之

〔百花膏〕 治痘瘡痒甚誤搔成瘡及瘡痂欲落不落者

用白蜜不以多少塗於瘡上其痂易落且無瘢亦不臭穢故不生

或用羊筒骨髓一兩煉入蜜內滾二三沸入輕粉少許研成膏令

內盛之塗於瘡上

〔治小兒面上瘡痘子瘢〕

用黃明膠慢火炙爲末溫酒調服一錢出者服之無瘢未出服之無

〔治小兒痘瘡瘢痕面〕

以蜜陀僧細研水調夜塗之明日洗去平復矣

〔又方〕

牡蠣 煅爲粉 三兩 土瓜根 一兩

右搗細爲散每夜取二錢同白蜜調塗面及瘡瘢明旦以暖漿水

水洗之

〔又方〕

羊腿 骨髓 半酥 四兩

右入銀銚子內慢火煎三五沸新綿濾入淨器中盛每夜取塗面上

來日用生甘草一兩以漿水二大盞煎七八沸去滓放溫洗面

〔又方〕

猪脂 一斤 天鼠 三枚

右細切入銚子內煎煉令天鼠焦紋濾取膏日夜摩塗瘡瘢上

〔又方〕

用雞屎黃二兩研粉以煉了臘月猪脂二合調攪令勻塗於瘡瘢上効

〔又方〕

豉 一升 羊髓 一合

右相和以水一斗煎十餘沸去滓看令暖洗瘡瘢

〔又方〕

用黃蓍 剉二兩以水二升煎取一升去滓摩拭瘡瘢上

〔又方〕

用赤小豆末一兩以雞子白調如稀餳塗瘡瘢上

〔療病後瘡瘢無瘢〕

以頻揭去痂勿令隱肌乃不成瘢若揭傷有微血但以面膏塗即無

若已瘡痂不可食雞鴨卵即時成黑瘢子如卵白其驗如神不可不戒

〔煉黃膏〕 治小兒瘡痘瘡後成瘢痕

煉黃 杞子

右並拍碎用狗脂鵝脂各四兩同於銅器中以文武火煎二十沸去滓

入在瓷合中候凝塗瘢痕日二度

〔又方〕

用硯子浴者以雀入江水養五日後取出水洗手面日漸生肉乃無瘢

痕一方用黃犍汁洗面無瘢以獺髓代用

治天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即

療數日必死差後瘡瘢黯一歲方滅此惡毒之氣也人云建武中南陽擊

虜所得乃呼爲虜瘡諸醫參詳療之方

〔治丹疹〕

右取好蜜通摩瘡上以蜜和升麻拭之

用蜜調上朱入瓦瓶仍貯之

又方 用梔子仁末以調傅

又方 用蕎麥粉醋調傅

治瘡疥已後滿身瘡瘢臭痕

槐花 黃栢皮 白藥子 等分

右為末瘡濕乾糝之乾處生地黃汁調傅

寺院宮觀常住有人用秦方者皆許秘錄勿得借出恐防失落

本府官僚醫官傳方
對方儒士歐興
寫書劉崙等
刊字匠金聚等

鍼灸門

三人圖
流注經絡井滎圖說
平人氣象論經隧周環圖
十二經絡周六
井滎俞經合部分圖
鍼刺定時圖
十二經脉圖表相配周說
十二身流注五臟六腑明堂

普濟方卷之二百五十八目錄

普濟方卷之一百五十八

鍼灸門

三人圖 附經絡穴圖

夫病之所起本於臟腑之脉並出手足循環腹背無所不至往來出沒難以測量將欲指取其穴非圖莫可預備之要非灸不精故經曰湯藥攻其內鍼灸攻其外則病無所逃矣方知鍼灸之功過半於湯藥矣去聖久遠學徒蒙昧孔穴出入莫測其原此孫思邈臨事多蒙因撫其不逮略集今古名醫明堂以述此篇用補私闕庶依圖知穴按經識分則孔穴親疎居然可見矣舊明堂圖年代久遠傳寫錯誤不足指南今依甄權等所述為定云耳 ○銅人經云黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處雷公問曰禁服之言則刺之理經脉為始願聞經脉之始生[illegible]曰經脉者所以決死生處百病調虛實不可不通矣

流注經絡井滎圖說

夫流注者為刺法之淵源作鍼術之人要是故流者行也注者住也蓋流者要知經脉之行流也注者謂十二經脉各至本時皆有虛實邪正之氣注於所括之穴也夫得時謂之開失時謂之闔夫闔者閉之必除其疾闔者刺之難愈其疾可不明哉二者流年經氣四千三藏外應之鄭鍼刺之道經訣而治若識之以日之行來部分脉之相長血氣多少行之逆順枯是而逆補虛而瀉實本末呈為之經脉之原而不知刺氣之在而下鍼往往病在淺明又攻其實反攻其虛故以太陽遂致賊邪未除本氣受弊以此經之經脉之理不可不通也昔聖人深慮此書恐後人勞而少功也廣開鬪鍼之際是以前經以此傳典錄柯擷撮樣精華以明流注之經絡廣見討論之俾簡不將亂批列圖於後凡我同輩之者見其遺闕改而正之不亦宜乎

平人氣象論經隧周環圖

經脉一周於身內長一十六丈二尺人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸計二百七十息氣可環周於身五十營衛以一萬三千五百息則氣脉都行八百一十丈如是則應天常度脉氣無不及太過氣象平調故曰平人也

凡刺之理經脉為始經脉者所以能決死生處百病調虛實不可不通也

夫經氣者內干五臟而外絡支節其浮氣不循經者為衛氣精專行於經隧者為營氣陰陽相隨外內相貫如環之無端常以平旦為紀始從中焦注手太陰出注於手陽明上行注足陽明下行至跗上注大指間與足太陰合上行抵脾從脾注心中循手少陰出腋下臂注小指合手太陽上行乘腋出䪼內注目內眥上巔下項合足太陽循脊下尻下行注小指之端循足心注足少陰上行注腎從腎注心外散於胸中循心主脉出腋下臂入兩筋之間入掌中出中指之端還注小指次指之端合手少陽上行注膻中散於三焦從三焦注膽出脇注足少陽下行至跗上復從跗注大指間合足厥陰上行至肝從肝上注肺中復出於手太陰此營氣之行也逆順之常營氣之行常循其經周身之度一十六丈二尺一日一夜行八百一十丈計五十度周於身衛氣則不循其經焉晝則行陽夜行於陰行陽者行諸經行陰者行諸藏凡刺之道須審營衛所留從後迎隨以明補瀉此之謂也

黃帝內經曰凡人兩手足各有三陰脉三陽脉以合為十二經脉也手之三陰從藏走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭下走至足足之三陰從足上走入腹絡脉傳注周流不息故經脉者行血氣通陰陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復注太陰其氣常以平旦為紀以漏水下百刻晝夜行流與天同度終而復始也

手太陰肺之經

手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而瞀此為臂厥是主肺所生病者咳上氣喘渴煩心胸滿臑臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變……盛者寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散於魚際其病實則手銳掌熱虛則欠㰦小便遺數取之去腕半寸別走陽明也

手太陰之筋起於大指之上循指上行結於魚際之後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩前髃上結缺盆下結胸裏散貫賁合賁下抵季脇其病當所過者支轉筋痛甚則成息賁脇急吐血治在燔鍼劫刺以知為數以痛為腧名曰仲冬痹也

肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨胻足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經太陰足太陽之外厥陰內血者

肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘欬痛走胸膺背不得大息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已

手太陰肺經從胸走手長三尺五寸左右共七尺凡二十二穴

中府二穴　雲門二穴

天府二穴　俠白二穴

尺澤二穴　孔最二穴

列缺二穴　經渠二穴

太淵二穴　魚際二穴

少商二穴

手陽明大腸經

大腸脈起於大指之端入扶於鼻孔注胃經



手陽明大腸穴

手陽明之脉起於大指次指之端，循指上廉，出合谷兩骨之間，上入兩筋之中，循臂上廉，入肘外廉，上臑外前廉，上肩，出髃骨之前廉，上出於柱骨之會上，下入缺盆絡肺，下膈屬大腸。其支者從缺盆上頸貫頰，入下齒中，還出挾口交人中，左之右，右之左，上挾鼻孔。是動則病齒痛頸腫。是主津液所生病者，目黃口乾，鼽衄喉痹，肩前臑痛，大指次指痛不用。氣有餘則當脉所過者熱腫，虛則寒慄不復。為此諸病，盛者人迎大三倍於寸口，虛者人迎反小於寸口也。

手陽明之別名曰偏歷，去腕三寸，別入太陰；其別者上循臂，乘肩髃，上曲頰偏齒；其別者入耳，合於宗脉。實則齲聾，虛則齒寒痹隔，取所別也。

手陽明之筋，起於大指次指之端，結於腕，上循臂，上結於肘外，上臑，結於髃；其支者繞肩胛，挾脊；直者從肩髃上頸；其支者上頰，結於頄；直者上出手太陽之前，上左角，絡頭，下右頷。其病當所過者支痛及轉筋，肩不舉，頸不可左右視。治在燔鍼劫刺，以知為數，以痛為輸，名曰孟夏痺也。

邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支胠，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一痏，左取右，右取左，如食頃已。

邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一痏，立聞；不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞。其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。手陽明不已，刺其通脉出耳前者。

熱病如手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。

手陽明大腸經，從手走頭，長五尺，左右共一丈，凡四十穴。

商陽二穴　三間二穴　陽谿二穴　溫溜二穴　手三里二穴　肘髎二穴　臂臑二穴　巨骨二穴　扶突二穴　迎香二穴

二間二穴　合谷二穴　偏歷二穴　手下廉二穴　曲池二穴　五里二穴　肩髃二穴　天鼎二穴　禾髎二穴　手上廉二穴

足陽明

胃之經

胃脈起於鼻交入大指間出其端注脾經



足陽明胃經

足陽明之脈起於鼻交頞中旁約太陽之脈下循鼻外入上齒中還出挾口環脣下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起於胃口下循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下膝臏中下循脛外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端是動則病

振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為骭厥是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎脣胗頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿

盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痺瘁瘖實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也

足陽明之筋起於中三指結於跗上邪外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上循脅屬脊其直者上循骭結於膝其支者結於外輔骨合少陽其直者上循伏兔上結於髀聚於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上挾口合於頄下結於鼻上合於太陽太陽為目上網陽明為目下網其支者從頰結於耳前其病足中指支脛轉筋腳跳堅伏兔轉筋髀前腫㿉疝腹筋急引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤鉤之即以生桑炭置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒噉美炙肉不飲酒者自強也為之三拊而已治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季春痹也

邪客於足陽明之絡，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上與肉交者各一痏，左刺右，右刺左。

繆傳引上齒，齒脣寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一痏，手大指次指爪甲上各一痏，立已，左取右，右取左。

胃之大絡名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。

足陽明胃之經，從頭走足，長八尺，左右共一丈六尺，凡九十穴。

頭維二穴　下關二穴　頰車二穴
承泣二穴　四白二穴　巨髎二穴
地倉二穴　大迎二穴　人迎二穴
水突二穴　氣舍二穴　缺盆二穴
氣戶二穴　庫房二穴　屋翳二穴
膺窗二穴　乳中二穴　乳根二穴
不容二穴　承滿二穴　梁門二穴
關門二穴　太一二穴　滑肉門二穴
天樞二穴　外陵二穴　大巨二穴
水道二穴　歸來二穴　氣衝二穴
髀關二穴　伏兔二穴　陰市二穴
梁丘二穴　犢鼻二穴　三里二穴
上巨虛二穴　條口二穴　下巨虛二穴
豐隆二穴　解谿二穴　衝陽二穴
陷谷二穴　內庭二穴　厲兌二穴

足太陰脾之經

脾脈起於大指之端注於心中注心經

足太陰脾經

足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上踹內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛[illegible]黃疸不能臥[illegible]足大指不用[illegible]盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂[illegible]取之所別也

足太陰之筋起於大指之端內側上結於內踝其直者上絡於膝內輔骨上循陰股結於髀聚於陰器上腹結於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引髀而痛陰器紐痛上引臍兩脇痛引膺中脊內痛治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸命曰孟秋痹也

邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰息刺腰尻之解兩胂之上是腰俞以月死生為痏數發鍼立已左刺右右刺左

脾病者身重善肌肉痿足不收行善瘈脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛[illegible]

[illegible]

足太陰脾經從足走胸中長六尺五寸左右共一丈三尺凡四十二穴

隱白二穴　大都二穴　太白二穴
公孫二穴　商丘二穴　三陰交二穴
漏谷二穴　地機二穴　陰陵泉二穴
血海二穴　箕門二穴　府舍二穴
腹結二穴　大橫二穴　腹哀二穴
食竇二穴　天谿二穴　胸鄉二穴
周榮二穴　大包二穴　衝門二穴

手少陰

心之經

心脈起於心中入掌內循小指注小腸經

手少陰之經

手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽喉目系其直者復從心系卻上肺下出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後銳骨之端入掌內後廉循小指之內出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是謂臂厥是主心所生病者目黃脅痛臑臂內後廉痛厥掌中熱盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手少陰之別名曰通里去腕一寸別而上行循經入於心中繫舌本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後一寸別走太陽也

手少陰之筋起於小指之內側結於銳骨上結肘內廉上入腋交太陰挾乳裏結於胸中循賁下繫於臍其病內急心承伏梁下為肘網其病當所過者支轉筋痛治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死不治經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焠刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔鍼名曰季冬痹也

心病者胸中痛脅支滿脅下痛膺背肩胛間痛兩臂內痛虛則胸腹大脅下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中出血

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽手少陰心經從腋走手長三尺五寸左右共七尺凡一十八穴

極泉二穴　青靈二穴　少海二穴

靈道二穴　通里二穴　陰郄二穴

神門二穴　少府二穴　少衝二穴

手太陽

小腸經

小腸脈起於小指之端循臂絡於目眥注睛明經

太陽小腸經

手太陽之脈起於小指之端[illegible]循手外側[illegible]上腕[illegible]出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間[illegible]上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆向腋絡心[illegible]循咽下膈抵胃屬小腸[illegible]其支者從缺盆貫頸上頰至目銳眥[illegible]卻入耳中其支者別頰上頻抵鼻至目內眥[illegible]斜絡於顴[illegible]是動則病[illegible]嗌痛頷腫不可回顧肩似拔臑似折是主液所生病者[illegible]耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘臂外後廉痛[illegible]盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則節弛肘廢虛則生疣小者如指痂疥取之所別也

手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內銳骨之後彈之應小指之上入結於腋下其支者後走腋後廉上繞肩胛循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於頷上屬目外眥其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下腋下痛腋後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視頸筋急則為筋瘻頸腫寒熱在頸者治在燔針劫刺其為腫者復而銳之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上頷結於角其病當所過者支轉筋治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰仲夏痺也

小腸病者小腹痛腰脊控睪而痛時窘之後耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指之間熱若脈陷者此其候也

邪在小腸者連睪系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於臍故取之肓原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

手太陽之經從手走頭長五尺左右共一丈凡三十八穴

少澤二穴　前谷二穴　後谿二穴

腕骨二穴　陽谷二穴　養老二穴

支正二穴　小海二穴　臑俞二穴

天宗二穴　秉風二穴　曲垣二穴

肩外俞二穴　肩中俞二穴　天窗二穴

天容二穴　顴髎二穴　聽宮二穴

肩貞二穴

足太陽膀胱經



足太陽膀胱經

足太陽之脈起於目內眥上額交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下貫臀入膕中其支者從髆內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合膕中以下貫踹內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結踹如裂是為踝厥是主筋所生病者……盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足太陽之別名曰飛陽去踝七寸別走少陰實則鼽窒頭背痛虛則鼽衄取之所別也

足太陽之筋起於足小指上結於踝邪上結於膝其下循足外踝結於踵上循跟結於膕其別者結於踹外上膕中內廉與膕中并上結於臀上挾脊上項其支者別入結於舌本其直者結於枕骨上頭下顏結於鼻其支者為目上網下結於頄其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆邪上出於頄其病小指支跟腫痛膕攣脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰仲春痹也

邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指爪甲上與肉交者各一痏立已不已刺外踝下三痏左取右右取左如食頃已邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引脇而痛刺之從項始數脊椎俠脊疾按之應手如痛刺之傍三痏立已

足太陽膀胱經……左右共……一百二十六穴

睛明二穴	攢竹二穴	曲差二穴
五處二穴	承光二穴	通天二穴
絡却二穴	玉枕二穴	天柱二穴
大杼二穴	風門二穴	肺俞二穴
厥陰俞二穴	心俞二穴	膈腧二穴
肝俞二穴	膽俞二穴	脾腧二穴
胃腧二穴	三焦俞二穴	腎腧二穴
大腸腧二穴	小腸腧二穴	膀胱腧二穴
中膂內腧二穴	白環腧二穴	上髎二穴
次髎二穴	中髎二穴	下髎二穴
會陽二穴	附分二穴	魄戶二穴
膏肓二穴	神堂二穴	譩譆二穴
膈關二穴	魂門二穴	陽綱二穴
意舍二穴	胃倉二穴	肓門二穴
志室二穴	胞肓二穴	秩邊二穴
承扶二穴	殷門二穴	浮郄二穴
委陽二穴	委中二穴	合陽二穴
承筋二穴	承山二穴	飛揚二穴
付陽二穴	崑崙二穴	僕參二穴
中脈二穴	金門二穴	京骨二穴
束骨二穴	通谷二穴	至陰二穴

足少陰腎之經

腎脉起於小指之下注肓中注心包

足少陰之經

從少陰之脈起於小指之下斜趨足心出於然谷之下循內踝之後別入跟中以上踹內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中

是動則病飢不欲食面黑如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目𥆧𥆧如無所見心如懸若飢狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是為骨厥

是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛

灸則強食生肉緩帶披髮大杖重履而步盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其別者并經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別也

足少陰之筋起於小指之下並太陰之筋斜走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內挾膂上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主癇瘛及痙在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸在內者熨引飲藥此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痹也

邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無積者刺足下中央之脈各三痏凡六刺立已左刺右右刺左嗌中腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左右互刺

脊痛者……不可以俛仰取足少陰……血者

下熱不欲言其逆則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽腎熱病者頤先赤故熱病先身重骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚為五十九刺足少陰腎經從足走胸中長六尺五寸左右共一丈三尺凡五十四穴

湧泉二穴	然谷二穴	太谿二穴
大鍾二穴	照海二穴	水泉二穴
復溜二穴	交信二穴	築賓二穴
陰谷二穴	橫骨二穴	大赫二穴
氣穴二穴	四滿二穴	中注二穴
肓俞二穴	商曲二穴	石關二穴
陰都二穴	通谷二穴	幽門二穴
步郎二穴	神封二穴	靈墟二穴
神藏二穴	彧中二穴	俞府二穴

手厥陰

心包經

心包脉起於胷中循小指次指出其端注三焦經



手厥陰心包經

手厥陰心主之脉起於胷中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胷出脇下腋三寸上抵腋下下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胷脇支滿心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋之間循經以上繫於心包絡心系實則心痛虛則為煩取之兩筋間也

手心主之筋起於中指與太陰之筋並行結於肘內廉上臂陰結腋下下散前後挾脇其支者入腋散胷中結於賁其病當所過者支轉筋前及胷痛息賁治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰孟冬痺也

手厥陰心包脉從胸走手長三尺五寸左右共七尺七一十八穴

天池二穴　天泉二穴
曲澤二穴　郄門二穴
間使二穴　內關二穴
中衝二穴　勞宮二穴
大陵二穴

手少陽

手火陽三焦經
手火陽之脉起於小指次指之端[illegible]上出兩指之間[illegible]
循手表腕[illegible]出臂外兩骨之間[illegible]上貫肘[illegible]循
臑外上肩而交出足火陽之後入缺盆交膻
中[illegible]散給心包[illegible]下膈
循屬三焦[illegible]其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後
直上出耳上角以屈下頰至䪼其支者從耳後入耳中出走耳前過客
主人前交頰至目銳眥[illegible]是動則病[illegible]
耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者[illegible]
汗出■銳眥痛耳
後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虛者人
迎反小於寸口也
手火陽之別名曰外關去腕二寸外繞臂注胷中合心主病實則肘攣
虛則不收取之所別也

三焦經

三焦脉起小指次指之端至目兊眥注膻經

手少陽之脉起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉
上肩走頸合手太陽其支者當曲頰入繫舌本其支者上曲牙循耳前
屬目外眥上乘頷結於角其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔鍼劫
刺以知為數以痛為輸名曰季夏痺也
邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺
手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痏壯者立已老者有頃已左取
右右取左凡新病數日已
手少陽三焦經從手走頭長五尺左右共一丈凡四十六穴

關衝二穴　液門二穴
中渚二穴　陽池二穴
外關二穴　支溝二穴
會宗二穴　三陽絡二穴
四瀆二穴　絲竹空二穴
天井二穴　清冷淵二穴
消濼二穴　和髎二穴
臑會二穴　肩髎二穴
天髎二穴　耳門二穴
天牖二穴　翳風二穴
瘈脈二穴　顱息二穴
角孫二穴

足少陽膽之經



膽脉起於目兑眥入大指傍岐骨内出於端注肝經

足少陽膽之經

足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支者別銳眥下大迎合於手少陽抵於䪼下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛是動則病口苦 [illegible]

[illegible] 不能轉側 [illegible]

[illegible] 小指次指不用爲此諸病 [illegible] 盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也

足少陽之筋起於小指次指之上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起於外輔骨上走髀前者結於伏兔之上後者結於尻其直者上乘䏚季脇上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頷上結於頄支者結於目眥爲外維其病小指次指 [illegible]

髀後引尻上眇季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急從左之右右目不開上過右角並蹻脈而行左絡於右故傷右角右足不用命曰維筋相交治在燔鍼刼刺以知為數以痛為輸名曰孟春痺

邪客於足少陽之絡令人脅痛不得息咳而汗出刺足小指次指爪甲上與肉交者各一痏不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右右刺左病立已不已復刺如法

邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀不可舉刺樞中以毫鍼寒則久留鍼以月死生為數立已

熱病先肩背痛手足厥刺足少陽補足太陰病甚者為五十九刺熱病先眩冒而熱胸脅滿刺足少陰少陽

足少陽膽脈從頭走足長八尺左右共一丈六尺凡八十六穴

瞳子髎二穴　聽會二穴　客主人二穴
頷厭二穴　懸顱二穴　懸釐二穴
曲鬢二穴　率谷二穴　天衝二穴
浮白二穴　竅陰二穴　完骨二穴
本神二穴　陽白二穴　臨泣二穴
目窗二穴　正營二穴　承靈二穴
腦空二穴　風池二穴　肩井二穴
淵腋二穴　輒筋二穴　日月二穴
京門二穴　帶脈二穴　五樞二穴
維道二穴　居髎二穴　環跳二穴
中瀆二穴　陽關二穴　陽陵泉二穴
陽交二穴　外丘二穴　光明二穴
陽輔二穴　懸鍾二穴　丘墟二穴
臨泣二穴　地五會二穴　俠谿二穴
竅陰二穴

足厥陰肝之經

肝脈起於大指聚毛之際上注肺中

足厥陰肝經

足厥陰之脉起於大指叢毛之際[illegible]上循足跗上廉[illegible]去内踝一寸[illegible]上踝八寸交出太陰之後[illegible]上膕内廉[illegible]循股陰入毛中環陰器抵少腹挾胃屬肝絡膽[illegible]上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頏顙[illegible]連目系上出額與督脉會於巔其支者從目系下頰裏環脣内其支者復從肝別貫膈上注肺中[illegible]是動則病腰痛不可以俛仰丈夫㿗疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色[illegible]是主肝所生病者[illegible]

[illegible]盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠡溝去内踝五寸別走少陽其別者[illegible]上睪結於莖其病氣逆則睪腫卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別也

[illegible]

經於陰器[illegible]筋其病足大指支内踝之前痛内輔痛[illegible]

轉筋者[illegible]不用傷於内則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則[illegible]

縱挺不收[illegible]其病轉筋者治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季秋痺也

邪客足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者各一痏男子立已女子有頃已左取右右取左

肝病者兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽

取四者肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得安臥[illegible]刺足厥陰少陽

肝主[illegible]在足厥陰[illegible]左右共二十六穴

大敦二穴　行間二穴　太衝二穴　中封二穴　蠡溝二穴

中都二穴　膝關二穴　曲泉二穴　陰包二穴　五里二穴

陰廉二穴　羊矢二穴　章門二穴　期門二穴

井滎俞經合部分圖

[illegible]

[illegible]井滎[illegible]井者[illegible]

[illegible]

[illegible]所入為合也[illegible]

又刺俞穴[illegible]刺經合者聖人所謂因其時而取之以瀉邪[illegible]也

井滎所為陰井木陽井金陰滎火陽滎水陰俞土陽俞木陰經金陽

經火陰合水陽合土昔聖人先立井滎俞經合配五行以十二經

中各有子母故刺之云虛則補其母實則瀉其子[illegible]

補之氣屬火[illegible]十[illegible]合[illegible]

[illegible]偏勝則先補其不足後瀉其有餘[illegible]

則為上工者也

足[illegible]下三[illegible]

[illegible]有[illegible]如其[illegible]

[illegible]五行[illegible]井滎俞經合[illegible]

[illegible]

[illegible]合者[illegible]

[illegible]六十首[illegible]

[illegible]陰中有陽陽中有陰[illegible]

[illegible]陰[illegible]陽[illegible]

[illegible]

如是可得聞之[illegible]

[illegible]

但取其原亦得

晝夜周環六十首

量字為十經所注白字為三焦包絡二經所注



鍼刺定時圖

剛柔相配

內行注穴之圖

十二經脉

各至本時

十經血氣皆出於井入於合各主井滎俞經合無以異或曰脈有十二
經又問何只言十經其餘二經不言者何答曰其二經者三焦是陽氣
之父心包絡是陰血之母也此二經尊重不系五行所攝主受納十經
血氣養育故只言十經合陰陽二脈各逐日各主井滎俞經合五行更畢
而歸其本二經亦各主井滎俞經合五穴方知十二經遍行也

三焦經

關衝井 液門滎 中渚俞 陽池原

支溝經 天井合

每日遇陽干合處注此六穴 如甲日甲戌時至甲申時為陽
干合也

心包絡經

中衝井 勞宮滎 大陵俞 間使經

曲澤合

每日遇陰干合處注此五穴 假令甲日甲戌時膽氣初出至
井己巳時脾出血為井陰陽並行陽日氣先血後陰日氣後
血先己巳時血乙酉時血會甲子合己余上日餘皆依此
通前共六十六合成六十首每一穴分一時一刻以十分六十六穴
六還六欲此是一大之數六十六合成百刻每一時辰相生養子五度
各主井滎俞經合五穴盡在十二時辰氣血行遍六十六穴也欲知人
氣所在用五子元遁日時觀前圖可見六十首是活法依此井滎刺病
甚效

五子元遁日時訣

甲己之日丙作首 乙庚之辰戊爲頭
丙辛便從戊上起 丁壬壬寅順行流
戊癸甲寅定時候 六十首法助醫流

足少陽膽之經

甲日 甲與己合 陽干注府 陰干注藏

膽引氣行 木原在寅

甲日甲戌時膽為井木
丙子時小腸為滎火
戊寅時胃為俞土
并過本原丘墟穴木原在寅
庚辰時大腸為經金
壬午時膀胱為合水
甲申時氣納三焦 謂甲合還化本

膽 小腸 胃 膽原 大腸 膀胱

竅陰為井膽中行 脇痛煩熱及頭疼
俠谿口乾并臂痛 一鍼難步却須行
前谷為滎屬小腸 喉痺頷腫嗌喉乾
頸項臂痛汗不出 目生翳膜并除康
陷谷胃俞節後邊 腹痛腸鳴痎瘧纏
面目浮腫汗不出 三分鍼入得瘥痊
丘墟為膽是為原 胃腸滿痛癃妄纏
腋腫髀樞腿酸痛 目生翳膜并除痊
陽谿為經表腕邊 顛狂舌失鬼神言
心煩目赤頭風盲 熱病心驚鍼下痊
委中合穴膕紋中 腰脊沉沉弱大傾
髀樞痛及膝難伸 取其經血保能平

足厥陰肝之經

乙日

乙與庚合

肝引血行
乙日乙酉時肝為井 水
丁亥時心為荥 火
己丑時脾為俞 土
辛卯時肺為經 金
癸巳時腎為合 水
乙未時血納包絡

肝　心　脾　肺　腎

大敦為井注肝家
中熱口厥如死狀
火者心荥本節中
心痛狂顛實讝語
太白脾俞骨下分
吐逆霍乱胃中痛
經渠肺經熱在胸
熱瘧喘欬心吐逆
陰谷腎合膝後分
小腹急痛并漏下

心疼腹脹實汗多
血崩臍痛用鍼加
火氣悲憂在心
寒熱胃中便下鍼
身熱腹脹血便賤
下鍼一刺得安寧
掌後寸口脉陷中
禁灸神鍼有大功
脚痛難移好用鍼
小便黃赤速時尋

手太陽小腸經

丙日

丙與辛合

小腸引氣出行
火原在子火入水鄉
丙日丙申時小腸為井 火
戊戌時胃為滎 土
庚子時大腸為俞 金
并過本原腕骨穴故火原在子
壬寅持膀胱為經 水
甲辰時膽為合 木
丙午時氣納三焦

小腸　胃　大腸　小腸　膀胱　膽

少澤元本手太陽
臂痛咳嗽連項急
內庭胃荥本陽中
口喎牙痛依穴用
三間為俞本節後
胃滿腸鳴洞泄煩
腕骨為原手踝中
目中淚出熱生翳
崑崙為經外後跟
頭疼吐瀉并腰振
陽陵泉之膽合習
半身不遂依鍼刺

井注喉痺舌生瘡
目生翳膜一綫康
四肢厥逆滿腹疼
使下神鍼便去根
喉痺咽捷齒齲疼
唇焦氣喘鍼時定
熱病相連汗出頻
偏枯臂擧只神鍼
腰疼腰重更難行
小兒癎搐一齊鍼
腰中不擧脅風痛
膝勞冷痺下鍼安

手少陰心之經

丁日　丁與壬合　心引血行

丁日丁未時心為井火
己酉時脾為滎土
辛亥時肺為俞金
癸丑時腎為經水
己卯時肝為合木
丁巳時血納包絡

心　脾　肺　腎　肝

少衝為井是心家　熱病煩滿上氣多
虛則悲驚實喜笑　手攣臂痛用鍼加
大都脾滎本節中　熱病相連足逆行
腹滿煩悶并吐逆　神鍼一刺即時寧
太淵肺俞掌後尋　嘔吐咳嗽腹脇膨
眼目赤筋白翳膜　心疼氣上一般鍼
腰濕腎經魚肚中　面目朦朧無怨停
腹內雷鳴并脹滿　四肢腫痛刺時靈
曲泉肝合附骨中　女人血瘕腹腫疼
身熱喘中風勞病　足疼洩利又便膿

足陽明胃之經

戊日　戊與癸合　胃引氣出行

上原在戍

戊日戊午時胃為井土
庚申時大腸為滎金
壬戌時膀胱為俞水
并過本原衝陽穴故上原在戍
甲子時膽為經木
丙寅時小腸為合火
戊辰時氣納三焦

胃　大腸　膀胱　胃　膽　小腸

厲兌為井主胃家　瘋口喎腹脹腸滑
汗病不出如瘧狀　齒痛喉痺鍼刺佳
二間庚滎本節中　喉痺鼻衄在心驚
肩臂疼時依此用　下鍼牙痛更無根
束骨壬俞本節中　耳聾項急本穴尋
惡風目眩并背痛　鍼之必定有神功
衝陽為原動脈中　偏風口眼注牙疼
寒熱往來如瘧狀　建時取效有同神
陽輔膽經四寸間　筋攣骨痛足腫寒
風痺不仁依此用　神鍼一刺不須難
小海為合肘上中　寒熱風腫項頭疼
四肢無力難舉步　建時鍼刺有神靈

足太陰脾之經

己日 甲與己合 脾引血行

己巳時脾為井土
辛未時肺為滎金
癸酉時腎為俞水
乙亥時肝為經木
丁丑時心為合火
己卯時血納包絡

脾 肺 腎 肝 心

隱白為井足太陰
鼻衄滑腸食不化
魚際為滎熱汗風
目眩大氣咽乾燥
太谿腎俞內踝下
咳嗽上氣并脉短
中封為經內踝前
臍腹痛時寒足冷
少海心合曲節間
頭項痛時汗與笑

腹脹喘滿吐交横
月經不止血山崩
咳嗽頭痛并主胃
嘔吐同鍼有大功
足厥心疼嘔吐逆
神鍼到後病伏潜
振寒瘦瘁色蒼蒼
寒症相纏鍼下康
齒疼嘔逆滿胸心
用鍼一刻管驚人

手陽明大腸之經

庚日 庚與乙合 大腸引氣出行



金氣在申
庚日庚辰時大腸為井金
壬午時膀胱為滎水
甲申時膽為俞木
并過本原合谷也金氣在申也
丙戌時小腸為經火
戊子時胃為合土
庚寅時氣納三焦

大腸 膀胱 膽 大腸 小腸 胃

商陽為井大腸中
為逆熱病并牙痛
通谷為滎本節邊
目視䀮䀮胃脹滿
臨泣膽俞節後逆
月事不明依此用
合谷為原岐骨中
目視不明并瘡痛
陽谷為經側腕中
熱病過時汗不出
三里胃合膝下分
須去日上忍時一下

次指指上氣注胸
耳聾牙疼目赤紅
頭重身如項前枝
食飲不化即時休
中滿噎益腫項咽
氣喘如痞當時安
痹痒瘙下熱生風
耳閉口禁一鍼功
癲疾狂走妄言驚
耳聾齒痛目昏鍼
諸般疾病一般鍼
方知世上有名人

手太陰肺之經

辛日 丙與辛合 肺引血出行

辛日辛卯時肺爲井金
癸巳時腎爲榮水
乙未時肝爲俞木
丁酉時心爲經火
己亥時脾爲合土
辛丑時血納包絡

肺

少商肺井注心中
寒熱欬逆喘脹衝
飲食不下咽喉痛
三稜鍼刺血爲功

腎

然谷腎榮內踝中
喘呼少氣足難行
小兒臍風并口噤
神鍼並灸得安寧

肝

太衝肝俞本節後
腰引少腹小便脹
淋瀝足寒并嘔血
漏下女子本中痛

心

靈道爲經掌後真
心痛肘攣悲恐驚
暴瘖卽便難言語
逢時刺後卽宜鍼

脾

陰陵泉穴脾之合
腹堅喘逆身難卧
霍亂瘧疾及腰疼
小便不利鍼時過

足太陽膀胱經



壬日 丁與壬合 膀胱引氣出行

水原在午水入火鄉
壬日壬寅時膀胱爲井水
甲辰時膽爲榮木
丙午時爲俞火
并過本原京骨水原在午水入
火鄉故壬丙子午相交也
戊申時爲經土
庚戌時爲合金
壬子時氣納三焦

膀胱

至陰爲井是膀胱
目生翳膜頭風柱
留腸痛時依法用
小便不利熱中傷

膽

俠谿膽榮小趾中
留腸脹滿足難行
寒熱目赤頸項痛
耳聾三刺便聞聲

小腸

後谿爲俞節縫中
寒熱氣瘧目生翳
耳聾鼻衄并喉痺
肘臂筋攣同用鍼

膀胱

京骨爲原內踝間
筋痠膝痛屈伸難
目眥內赤項頸強
寒疝腹痛鍼下安

胃

解谿穴是胃之經
腹脹癲腫脚轉筋
頭痛霍亂面浮腫
大便下重也同鍼

大腸

曲池爲合肘外邊
半身不遂語難言
肘中痛患穿無力
喉痺鍼下也痊然

手少陽三焦之經 三焦者[illegible]
三焦與包絡合爲表裏

壬子時三焦關衝爲井 金
甲寅時爲滎 水
丙辰時爲俞 木
并過本原陽池
戊午時爲經 火
庚申時爲合 土
壬戌時氣入行

金 水 木 三焦原 火 土

三焦之井號關衝
臂肘痛攻不能舉
液門爲滎刺陷中
目赤齒血出不定
中渚爲俞即後尋
目生翳膜咽喉痛
陽池爲原腕表中
臂痛身沉難舉步
支溝爲經腕後真
霍亂吐瀉并口噤
天井爲合肘外尋
咳嗽不食并驚悸

目生翳膜注頭疼
喉痺鍼刺取其靈
驚悸病熱共頭疼
三稜鍼刺即時靈
熱病頭疼耳不聞
鍼入三分時下明
寒熱如瘧積心胸
一鍼當面有神功
熱病臂肘腫痛疼
下鍼得氣便醒醒
風痺筋攣及骨疼
心胸氣上即時鍼

手厥陰心主包絡
心主與三焦爲表裏

癸丑時包絡爲井 木
乙卯時爲滎 火
丁巳時爲俞 土
己未時爲經 金
辛酉時爲合 水

木 火 土 金 水

中衝爲井厥陰心
熱病煩悶汗不出
勞宮心滎手掌中
狂笑顛疾同日用
太陵心腧腕後尋
目赤小便如赤色
間使心經掌後間
熱時咽痛并驚悸
曲澤爲合肘裏存
肘臂筋攣多嘔血

掌中煩熱及頭疼
舌強鍼時得自平
中風攣痺口中腥
氣麁喘逆也須寧
喜笑悲哀氣上衝
狂言頭痛達時中
心痛嘔逆惡風寒
神鍼邪忤也須安
心疼煩悶口乾中
呼吸陰陽去病根

足少陰腎之經

癸日 戊與癸合 腎引血行



癸日癸亥時腎為井 水
乙丑時肝為榮 木
丁卯時心為俞 火
己巳時脾為經 土
辛未時肺為合 金
癸酉時血納包絡

腎 肝 心 脾 肺

湧泉為井腎中尋 大便秘結與心疼
身熱喘時同日刺 足寒逆冷也安平
行間肝榮大指間 欬逆嘔血更咽乾
腰痛心疼如死狀 溺難寒疝下鍼安
神門心俞掌後尋 惡寒心痛不食中
身熱嘔血多痛病 下鍼得刺有神功
商丘脾經踝下尋 腹脹腸鳴痛作聲
身寒逆氣并絕子 血氣輪流此處存
尺澤肺合在肘中 手攣風痺氣衝胸
咳嗽口舌乾喉痛 五子元運注中尋

五行造化歌

甲循章木芽初出 乙屈知同雄土生
原同壬癸為胎氣 疑成十干五行身

十二經井滎注石俞大腑明堂
肺[illegible]一十八穴

甲乙經
肺出于少商少商者木也 [illegible]
溜于魚際魚際者火也 [illegible]
注于大淵大淵者土也 [illegible]
行于經渠經渠者金也 [illegible]
入于尺澤尺澤者水也 [illegible]

[illegible]

甲乙經
大腸上合手陽明之所出也而[illegible]以十二穴[illegible]

[illegible]

大腸出于商陽商陽者金也 [illegible]

溜于二間二間者水也 [illegible]

注于三間三間者木也 [illegible]

過于合谷合谷 [illegible]

行于陽谿陽谿者火也 [illegible]

入于曲池曲池者土也 [illegible]

商陽 [illegible]

二間 [illegible]

合谷 [illegible]

[illegible]

肝入肝者[illegible]也兩傍二十穴 [illegible]

甲乙經

肝出于大敦大敦者木也 [illegible]

溜于行間行間者火也 [illegible]

注于太衝太衝者土也 [illegible]

行于中封中封者金也 [illegible]

入于曲泉曲泉者水也 [illegible]

行間 [illegible]

太衝 [illegible]

[illegible]

膽入膽者[illegible]也兩傍一百四穴

甲乙經

膀胱出於至陰至陰者金也 [illegible]

流于俠谿俠谿者水也

注于臨泣臨泣者木也

過于丘墟

行于陽輔陽輔者火也

入于陽陵泉陽陵泉者土也

竅陰

……

人脾者散也……四十八穴

甲乙經

脾出于隱白隱白者木也 [illegible]

溜于大都大都者火也 [illegible]

注于太白太白者土也 [illegible]

行于商丘商丘者金也 [illegible]

入于陰陵泉陰陵泉者水也 [illegible]

[illegible]

三陰交 [illegible]

血海 [illegible]

箕門 [illegible]

期門 [illegible]

大横 [illegible]

府舍 [illegible]

衝門 [illegible]

[illegible]

胃出于厲兌厲兌者金也 [illegible]

溜于内庭内庭者水也 [illegible]

注于陷谷陷谷者木也 [illegible]

過于衝陽 [illegible]

行于解谿解谿者火也 [illegible]

入于三里三里者土也 [illegible]

[illegible]

[illegible]

心

[illegible]

出于少衝少衝者木也

流于少府少府者火也

注于神門神門者土也

過于通里通里[illegible]

行于靈道靈道者金也

入于少海少海者水也

[illegible]

乙經

人心拔也

乙經

[illegible]

三焦入三焦者腑也此穿五十六穴 [illegible]

甲乙經

三焦出于關衝關衝者金也 [illegible]

流于腋門腋門者水也 [illegible]

注于中渚中渚者木也 [illegible]

過于陽池 [illegible]

行于支溝支溝者火也 [illegible]

入于天井天井者土也 [illegible]

[illegible]

外關 [illegible]

三陽絡 [illegible]

會宗 [illegible]

天井 [illegible]

清冷淵 [illegible]

[illegible]

角孫 [illegible]

天牖 [illegible]

[illegible]

天髎 [illegible]

肩貞 [illegible]

肩外俞 [illegible]

曲垣 [illegible]

肩中俞 [illegible]

[illegible]

普濟方卷之一百五十八

考論官修撰余孝綸

對讀官承事郎屬吏部

纂修兒山等

刪字丘張奐等

普濟方卷之一百五十九目錄

鍼灸門

腧穴門

頭部中行
神庭　上星　顖會　前頂　百會　神聰
明堂　後頂　強間　腦戶　風府　瘂門

頭部二行
曲差　五處　承光　通天　絡却　玉枕
天柱　眉衝

頭部三行
臨泣　目窗　正營　承靈　腦空　風池

側頭部
頷厭　懸顱　懸釐　天衝　率谷　曲鬢
角孫　竅陰　浮白　顱息　瘈脈　完骨
翳風

正面部
素髎　水溝　兌端　齦交　承漿　廉泉

面部二
攢竹　睛明　巨髎　迎香　禾髎

面部三
陽白　承泣　四白　地倉　大迎

面部四
本神　絲竹空　瞳子髎　顴髎　頰車

側面部
上關　下關　前關　和髎　聽會　耳門
聽宮　頰車

肩膊部
肩井　天髎　巨骨　臑會　肩髃　肩髎
肩貞　天宗　秉風　臑俞　曲垣　肩外俞
肩中俞

背俞部
大椎　陶道　身柱　神道　靈臺　至陽
筋縮　脊中 [illegible]　懸樞　命門　陽關
長強

背俞部二
大杼　風門　肺俞　厥陰俞　心俞　督俞
膈俞　肝俞　膽俞　脾俞　胃俞　三焦俞
腎俞　氣海俞　關元俞　大腸俞　小腸俞　膀胱俞
中膂內俞　白環俞　上髎　次髎　中髎
下髎　會陽

背俞部三
附分　魄戶　膏肓　神堂　譩譆　膈關
魂門　陽綱　意舍　胃倉　肓門　志室
胞肓　秩邊

側頸項部
天容　天牖　天窗　天鼎　扶突　缺盆
人迎　水突　氣舍

膺俞部
天突　璇璣　華蓋　紫宮　玉堂　膻中
中庭

膺俞部二
俞府　彧中　神藏　靈墟　神封　步廊

膺俞部三
氣戶　庫房　屋翳　膺窗　乳中　乳根

膺俞部四
雲門　中府　周榮　胸鄉　天谿　食竇

側腋部

周榮　輒筋　天池　大包

腹部

鳩尾　巨闕　上脘　中脘　建里　下脘

水分　神闕　陰交　氣海　石門　關元

中極　曲骨　會陰

腹部二

幽門　通谷　陰都　石關　商曲　肓腧

中注　四滿　氣穴　大赫　橫骨

腹部三

不容　承滿　梁門　關門　太一　滑肉門

天樞　外陵　大巨　水道　歸來　氣衝

腹部四

期門　日月　腹哀　大橫　腹結　府舍

衝門

側脅部

章門　京門　帶脈　五樞　維道　居髎

脇堂

普濟方卷之一百五十九目錄　畢

普濟方卷之一百五十九

鍼灸門

腧穴圖

頭部中行十穴

神庭一穴在鼻直入髮際五分灸二七壯止七七壯岐伯曰凡欲療風勿令灸多緣風性輕多則傷惟宜灸七壯止三七壯禁針針即發狂忌生冷雞豬酒麪動風等物○明堂云專灸之特忌熱食不宜熱衣亦云灸三壯○銅人經云在髮際直鼻上脊脈入髮際一寸灸二七壯至百壯治膽風癲疾風癇戴目上不識人羊鳴吐舌角弓反張素衣而走披髮而上歌下哭多學人言語驚悸不得安寢頭痛喘渴目不可視目淚出鼻清涕不止○又云足太陽陽明三脈之會主頭風目眩

上星一穴在鼻直上入髮際一寸陷中明堂云以細三稜針刺之即宣洩諸陽熱氣無令上衝頭目可灸七壯不宜多若頻灸即拔氣上令目不明忌如前○甲乙經熱病汗不出主之刺三分○銅人經云在額顱上直鼻中央入髮際一寸陷者中治頭風面赤腫皮虛腫鼻塞不聞香臭頭痛目眩痰瘧振寒熱病汗不出目睛痛不能遠視○又云針入三分留十呼瀉五吸針下氣盡更停針引之得氣即瀉灸亦得然不及針日灸三壯至百五十壯罷須停十餘日然後更灸故不用相

然後灸百會上訖次第三陵針刺頭上以泄熱氣令頭目清爽
顖會一穴在上星後一寸陷中可灸二七壯至七七壯初灸即不
痛病去即痛亦灸至百壯至可即罷灸針之分留三呼得氣即瀉
若八歲以下不得針緣顖門未合刺之不幸令人夭矣銅人云針
四分○銅人云在上星後一寸陷中可容豆督脈氣所發治目眩面
腫鼻塞不聞香臭驚癇戴目上不識人皆是灸至三四日漸退
七日頓愈頭風生白屑多睡針之彌佳也灸訖以末拈塞瘡和麻油和揩
髮根下頭風即不生惡熱退者患灸更甚○明堂云主頭皮腫
面赤暴腫生經云鼻塞不聞香臭一年灸壯則鼻塞或鼽衄多則腦疼
破後風邪入非特此不復令目自清靜證亦不瘳矣凡灸顖會者宜
前頂一穴在顖會後一寸五分骨間陷中亦云在顖會上一寸五分作後
銅人云針一分灸之壯止七七壯素問注云刺四分○銅人云
云督脈所發治頭風目眩面赤腫小兒驚癇風癇瘈瘲發即
無時鼻多清涕頂腫痛○明堂云針入三分留七呼灸五壯太極經云
以三棱針刺之出血一寸泄熱氣頭痛瘥後以鹽末生麻油
揩髮際下灸亦得也○明堂經云在顖會後一寸五分
陷者中治頭風
百會一穴一名三陽五會在前頂後一寸五分頂中央旋毛中可容豆灸七壯
止七七壯凡灸頭頂不得過七壯緣頭頂皮薄灸不宜多針二分得氣即
瀉○素問注云刺四分○銅人經云督脈足太陽之會於巔上○又小兒
脫肛久不差風癇中風角弓反張羊鳴多哭言語不擇
發即無時盛即吐沫心煩驚悸健忘痴中恍惚忘前失後
耳鳴耳聾鼻塞不聞香臭○又云唇頰風頭痛目眩多睡無
心力無食味頭重飲酒面赤腦疼欲死百日血三五日發噴吐呷
以三棱針刺令出血以井花水淋之三兩日後避不得以火灸恐其氣上
心眼睛昏目翳遂致勞瘵
唐秦鳴鶴針高宗頭風目眩刺百會及腦戶出血之理也
而刺之頭出血頭痛立止目明如是此說能治頭風
灸明堂必令中氣言當灸此則不先於百會

北人始生子則灸此穴以防他日驚風也○王氏云予舊患心氣
偶觀陰陽書有云人身有四穴最急應四百四病皆能治之百會
蓋其一也因灸此穴而心氣愈後閱灸經此穴果主心煩驚悸健
忘無心力自是灸之百病皆主不特治此數疾而已也
神聰四穴在百會四面各相去同身寸一寸理頭風目眩狂亂風癇左
主如花右主如果針三分
明堂有此四穴而銅人無之其穴治頭風目眩狂亂風癇亦所不
可廢者故附入于此
明堂一穴在鼻直上入髮際一寸理頭風多鼻涕鼻塞灸三日一報針二
分銅人註云針入三分
拔○銅人明堂及諸家針灸經鼻直上入髮際一寸名上星穴明
堂經於此復云明堂穴不知何所據且附入于此所謂疑以傳疑
也
後頂一穴一名交衝在百會後一寸五分枕骨上陷者中灸五壯針二分
明堂經云二分○銅人經云針入四分灸五壯主風眩目眩頭偏痛
素問注云針入三分灸五壯主頭項
明堂云灸三壯主目不明頭目眩重○西方子云主諸陽之熱逆嘔吐
瘛瘲
強間一穴一名大羽在後頂後一寸五分灸七壯針二分亦云五壯○銅人經云
督脈氣所發主頭痛針之可以動項痛如拔不可左右顧視○
又云治腦旋目運頭痛不可忍煩心嘔吐涎沫發即無時頸項強○明
堂云灸五壯○岐伯云兼治風癇瘈瘲○西方子云主癲疾癲發狂走
不得臥
腦戶一穴一名合顱在枕骨上強間後一寸五分禁針針令人瘂可灸七壯
亦不可妄灸令人失音○明堂云灸令人失音針三分○素問註云
刺四分○甲乙云不可灸○銅人云一名匝風一名會額足太陽
之會主目睛痛不能遠視面赤頭腫目黃
銅人經云禁針素問明堂乃云針入三分四分亦可疑矣不如不
針為穩○素問註云刺腦戶入腦立死故也
風府一穴一名舌本在項後入髮際上一寸大筋內宛宛中疾言其肉立起

起言木立下禁灸使人失音針三分留三呼銅人經云一名舌本督脉陽維之會治頭項強痛不得回顧目眩鼻衄喉咽痛狂走目妄視又云主頭項急不可傾側鼻不得息咽喑僵仆不仁○明堂云主暴瘖不得言身熱恐悸狂走目反視○又云四分留三呼又云禁針

風府

資生經云岐伯對黃帝傷寒之明曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故為諸陽主氣也然則風寒者傷寒所自起也北人皆以毛裹之南人怯弱者亦以帛護其項俗謂之護風也王氏云予少怯弱今灸須數灸患痛目閉物覺其熱北惡寒凡怯弱者須護項後可也

瘂門一穴一名舌橫一名舌厭在項中央入髮際五分宛宛中督脉陽維之會日入繫舌本仰頭取之禁灸灸令人瘂針三分素問註不在項後髮際宛中去風府一寸○明堂云舌急不言如何治之曰舌急針瘂門舌緩針風府得氣即寫可小繞針入八分留三呼寫五吸寫盡更留針取之得氣即寫○銅人經云治頸項強舌緩不能言諸陽熱氣盛鼻衄血不止頭痛項強汗不出寒熱風痙脊強反折瘈瘲癲疾頭重針二分

偃伏第二行左右十四穴

曲差二穴在神庭兩旁各寸半入髮際針三分灸三壯○銅人經云足太陽脉氣所發治目不明頭痛項痛汗不出煩滿鼽衄身體煩熱目視不明鼽衄

二分灸三壯

五處二穴在上星兩旁寸半針三分留七呼灸三壯明堂云灸五壯○銅人經云足太陽脉氣所發治目不明頭風目眩瘈瘲戴目上不識人○四寸子云在頭上去上星傍寸主脊強反折瘈瘲癲疾頭痛○又六在卻上去目旁寸半星三寸中千主風痹

承光二穴在五處後寸半針三分禁灸○明堂云在五處後二寸○素問注云二寸銅人經云足太陽脉氣所發治鼻塞不聞香臭口喎鼻多清涕風眩頭痛惡風目生白膜忘咽痛法

通天二穴在承光後寸半針三分留七呼灸三壯○銅人經云足太陽脉氣所發治頸項轉側難鼻塞悶偏風口喎鼻多清涕衄血頭重○又云主頭痛重暫起僵仆癭瘤常恐不利戴目有搖

絡卻二穴一名強陽又名腦蓋在通天後寸半灸三壯○素問註云刺三分留五呼○四寸子云主癲疾狂吐沫是疾恍惚不樂腹脹青盲不得息暫起僵仆○銅人經云足太陽脉氣所發治青風內障目無所見頭旋耳鳴

玉枕二穴在絡卻後寸半○明堂云在絡卻後七分半俠腦戶旁一寸三分起肉枕骨入髮際上三寸灸三壯主頭風痛不可忍者○又云主目痛如脫不能遠視○銅人經云足太陽脉氣所發治目痛如脫不能遠視子云失枕頭重項痛風眩頭寒手足熱汗不出起僵仆惡見風寒汗不出悽厥惡寒嘔吐目○素問又云針三分○素注云留三呼甲乙經云二分

資生經云銅人云玉枕在絡卻後寸半明堂上下經皆云七分半者以銅人為誤則足太陽穴亦同若以明堂為誤不應上下經皆誤也今本明堂亦同○王氏按素問註云玉枕在絡卻後七分半與明堂之七分半相去不遠矣因當從素問云穴既夾腦戶矣不應上七分則上于腦蓋也銅人之一寸半蓋兩訛焉讀者當以新之

天柱二穴在夾項後髮際大筋外廉陷中〇[illegible]針五分得氣即瀉明堂云二分留三呼瀉五吸灸不及針日七壯至百五壯下云二壯素問註云刺二分銅人經云足太陽脉氣所發針二分主頭風目如脫項如拔項疾急重[illegible]痛而後補之灸亦得然不及針[illegible]如前法〇明堂經云主項痛急強左右不可顧頭痛目不明目淚出鼻不知香臭風眩卒暴痛[illegible]狂言不休目上插肩汗不出足不任身肩背痛欲折頭旋腦痛

肩衝二穴一名小竹當兩肩頭直上入髮際是療目五般[illegible]頭痛惡寒不得通針三分〇明堂上經有肩衝穴而銅人經無之理因五般癎頭痛惡寒等疾所不可無[illegible]相近故附于此

偃伏第三行左右十二穴 外當陽二穴

臨泣二穴在目上皆直入髮際五分陷中針三分留七呼得氣即瀉忌灸〇素問註云灸五壯〇銅人云足太陽少陽之會主卒中風不識人風眩鼻塞目生白翳多淚目[illegible]〇西方子云主腋下腫頰痛引心痛不得反側癰日西發[illegible]下痛

奇生經云足少陽陽維之穴只[illegible]有之[illegible]泣也

目窗二穴在臨泣後一寸針三分灸五壯令[illegible]三度刺目大明〇銅人云足少陽陽維之會〇[illegible]頭面浮腫痛引目外眥赤痛忽頭旋目䀮䀮遠視不明〇西方子云主諸陽之熱頭痛寒熱無汗出[illegible]目[illegible]瞳[illegible]

頭上[illegible]頭痛

正營二穴在目窗後一寸針三分灸五壯〇銅人云足少陽陽維之會治牙齒痛唇吻急強齒齲痛頭項偏痛〇西方子云主諸陽之熱

承靈二穴在正營後寸半灸三壯〇素問主云刺三分〇銅人云足少陽陽維之會治腦風頭痛惡風寒鼻衄鼻塞息不利　西方子云主鼻衄窒喘息不通

腦空二穴一名顳顬在承靈後寸半夾玉枕骨下陷中針五分得氣即瀉灸三壯〇銅人云足少陽陽維之會治腦風頭痛不可忍目瞑心悸發即為癲風引目眇勞瘵羸瘦體熱頸項強不得回顧[illegible]頭風發即心悶亂目眩[illegible]立命〇西方子云主鼻衄[illegible]偏痛[illegible]不止耳風鳴聾〇素問註云按腦空在[illegible]骨後枕骨上甲乙經作玉枕骨下[illegible]如前法〇明堂云灸七壯主狂病身寒熱

風池二穴在腦空後髮際陷中針七分留七呼灸三壯〇明堂云在項後髮際陷中甲乙經云腦空後髮際陷腦中針一寸二分大患風者先補後瀉少可患者以經取之留五呼瀉七吸灸不及針日七壯至百五丈[illegible]不用大忌同〇西方子云主[illegible]不[illegible]腰[illegible]〇銅人經云足少陽陽維之會治洒淅寒熱溫病汗不出目眩苦頭痛痎瘧頸項痛不得回顧淚出欠氣多鼻鼽衄[illegible]氣發耳塞目不明腰背俱痛伛僂引項筋無力不收針入七分可灸七壯〇又云主[illegible]

問曰如後髮際亦有項[illegible]長者其毛直至項骨亦有無毛脚者[illegible]室天[illegible]即無毛根何而取穴也答曰[illegible]不可概定大約如此者

的的定中庭正相當即是側相去各二寸此法定穴

當陽二穴當瞳人直上入髮際一寸療卒不識人風眩鼻塞針三分

資生經云銅人無當陽穴而明堂下經有之理卒不識人風眩鼻

塞序疾亦不可廢者其穴與臨泣相近故附于此

側頭部左右二十六穴

顱顖二穴在囟到下 灸三壯針七分留七呼

同○明堂云二分(素問注云在曲角下顳顬之上上廉)針七分若

𥨍令人耳無所聞○銅人云手足少陽陽明之交會治頭風眩目無

所見偏頭痛引目外眥急耳鳴好嚏頸痛○又云二穴主曲鬢額

懸顱 上廣

懸顱二穴在曲周上顳顬中 灸三壯針三分留三呼○明

堂云二分素問注云在曲角上顳顬下廉 針經云按後手少陽中

云角上此云角下必有一誤 銅人云足少陽脈氣所發

治熱病頭痛汗不出頭偏痛引目外眥赤身熱齒痛面膚赤痛○西

方子云主熱病引目內眥心如前

懸釐二穴在曲周上顳顬下廉 針三分灸三壯○銅人云手

足少陽陽明之交會治熱病汗不出頭偏痛煩心不欲食目兌(作內)

眥赤痛○西方子云二穴在曲周顳顬下廉主面皮赤痛癲疾互引

善驚羊鳴

天衝二穴在耳上如前三寸 灸七壯針三分○銅人云二穴在

耳上如前三分治頭痛癲疾風痙牙齗腫善驚恐 灸七壯針三分

○西方子云亦作天衢

率谷二穴在耳上入髮際寸半陷者宛宛中灸三壯針三分明下云嚼

而取之○銅人云足太陽少陽之會治膈胃寒痰傷酒風發兩目

眩痛腦兩角強痛不能飲食煩滿嘔吐不止

曲鬢二穴在耳上髮際曲隅陷中鼓頷有空 針入三分灸七壯

明下云曲鬢灸三壯 ○銅人經云足太陽少陽之會

治頰頷腫引牙車不得開急痛口噤不能言灸亦良明堂云主頸項

急強不得顧引牙痛○西方子云主暴瘂不能言齒齲痛○銅人云

曲鬢足少陽穴而素問亦同○明堂下經云曲鬢尾鬢 也

角孫

角孫二穴在耳郭中間上開口有空 治目生膚翳齒齦腫灸三壯

明堂引與 齒痛○明堂云主齦牙不能嚼物齲痛腫針八分○銅人

云手足少陽之會○又云手足少陽手太陽之會○西方子云主頭

腫項痛不可回顧

資生經云按明堂云角孫主牙不能嚼物齲齒腫則有孫絡宜灸之
入分六明堂別無療病法當後會當之耶所謂當此穴因謂之
無療病法數

竅陰二穴在枕骨下搖動有空針三分灸七壯明下云五壯
針四分在完骨上枕骨下銅人云足太陽少陽之
會治勞疸發為頸痛引頭目痛○又云主骨疽○西方子云主項痛
如錐刀刺不可以動主頸痛引耳嘈嘈耳鳴無所聞舌本出血又
主舌本口乾心煩臂外附節痒不及頭難言管疽發為癰骨瘡頭痛
又四肢轉筋癰疽頭痛風惡引頭目

浮白二穴在耳後入髮際一寸針五分灸七壯○明云三壯針三分○銅
人云足太陽少陽之會治發寒熱喉痺欬逆疼痛不得喘胸滿中
滿不得喘息耳鳴嘈嘈無所聞頸項癰腫及癧氣肩背不舉足不收
白吉又云主痲痹不能言○西方子云主牙齒痛手足緩不收

顱息二穴在耳後間青絡脈灸七壯不宜針○明云顱息在耳後青脈
間灸三壯針一分不得多出血出血多殺人○銅人云足少陽脈氣
所發治身熱頭重脅痛不得轉側風痙耳聾小兒發癇瘛瘲嘔吐不得
息嘔吐涎沫驚恐失精瞻視不明不宜出血即可灸七壯○只云主耳
痛塞喘胸脅相引不得轉側及治目眩

瘈脈一穴一名資脈在耳本後雞足青絡脈刺出血如豆汁不宜出血
多灸三壯針一分明云在耳內雞足青脈○銅人云治頭風耳鳴小
兒驚癇瘛瘲嘔吐泄痢無時驚恐眵瞢目睛不明耳後痛○西方
子云不

完骨二穴在耳後入髮際四分灸七壯針三分○明堂云二分灸依年
壯○銅人云足太陽少陽之會治頭痛煩心癲疾頭面虛腫齲齒偏
風口眼喎斜頸項痛不得回顧小便赤黃喉痺頰腫針入五分○又
云主風眩項痛頭強寒熱針三分○西方子云主目腫足痿失履不收
風頭耳後痛煩心及足不收癱仆狂痛項瘻急痛

翳風二穴在耳後陷中按之引耳中針七分灸七壯○明下云三壯在
耳後尖角陷中○銅人云手足少陽之會治耳聾口眼喎斜失欠脫
頷口噤不開不能言頰腫牙車急痛○西方子云主耳聵口吻不開

引鼻中尖尺下牙齒痛○明堂云主耳鳴聾嘈暴瘖

正面部中行六穴

素髎一穴一名面正在鼻柱之端外臺云不宜灸針一分○銅人云督脈所
發此穴諸方闕治療法千金治鼻塞瘜肉不消多涕生瘡

水溝一穴一名人中在鼻柱下宛宛中針四分留五呼得氣即瀉灸不及針
日三壯若灸可艾炷如小雀糞風水面腫針此一穴出水盡頓愈○
明堂云日灸三壯至二百罷若是水氣唯得針此穴若針餘穴水盡
即死下云灸五壯○銅人云水溝在鼻柱下一名人中督脈手陽明
之會治消渴飲水無度水氣遍身腫失笑無時癲癇語不識尊卑
言不笑牙關不開面腫唇動葉葉然風狀如蟲行卒中惡鬼擊此一穴出
水盡即頓愈又云針入四分徐徐出之○西方子云主寒熱頭痛喘
渴目不可視鼻不聞香臭口喎僻不能開水漿禁者不能言
中惡風水面腫悉如前法

兌端一穴在唇上端針二分灸三壯炷如大麥明下云在頤前下唇下
宛宛中開口取之○銅人云治癲疾吐沫小便黃舌乾消渴衄血不
止唇吻強齒齗痛針入二分可灸三壯○明堂云主口噤鼓頷

齗交一穴在唇內齒上齗縫筋中針三分灸三壯銅人云治面赤心煩

痛頸項急不得回顧小兒面瘡癬久不瘥暴瘖不利月水
射汁目眥赤及偏風口喎牙車中風面腫○西方子云在唇下宛宛中
徒灸三壯主鼻窒喘息不利鼻喎僻多涕鼽衄有瘡頭痛頸項強
能禁水漿喎僻口噤不開項如拔不可左右顧面赤頰中痛心煩痛
承漿一穴一名懸漿在頤前唇下宛宛中日灸七壯止七七壯灸即血脈通
宣其風立愈炷不必大如小筯頭作針三分得氣即瀉○明堂經云頤前下
唇之下針一分半得氣即瀉盡更留三呼徐徐引氣而出日灸七
壯過七七停四五日後灸七七若一向灸恐足陽明脈斷令風不差
停息復灸令血脈通宣其風立愈下云下唇稜下宛中○銅人經云
足陽明任脈之會主消渴嗜飲口喎面腫齒痛銅針主療
可灸七壯至七七壯止炷不用大一依小筯頭作炷
狀如細線又佳炷由但令當脈灸量其大亦能愈疾凡灸膝下久冷
痛疼痺癖氣塊伏梁積聚宜令炷大故小品諸方云腹背宜灸五百
壯四肢則但去風邪不宜多灸七壯至七七壯止不得過隨年數如
巨闕鳩尾雖是胸腹之穴灸亦不過七七壯炷不須大以竹筯頭作
炷正當脈上灸之若灸胸腹艾炷大灸多令人永無心力如頭項穴
若灸多令人失精神若背腳穴灸多令人血脈枯竭四肢細瘦無力既
復失精神又加於細瘦即脫人真氣是如前法○明堂經云療消渴
飲水不休口噤不開及暴瘖不能言也○西方子云主面風目眩頭小
便黃赤不禁

廉泉一穴一名本池在頷下結喉上舌本間 灸三壯針三分得氣即瀉○明
云二分 千金云一名舌本○銅人經云陰維任脈之會治舌下腫難言
舌縱涎出欬嗽上氣喘息嘔沫口噤舌根急縮下食難

面部二行左右十穴

攢竹二穴一名始光一名光明一名員柱在兩眉頭少陷宛宛中不宜
灸針一分留三呼瀉三吸徐徐出針宜以細三稜針刺之宣洩熱氣
三度刺目大明明云宜細三稜針針三分出血不云灸穴一壯○銅人
經云足太陽脈氣所發治目䀮䀮視物不明眼中赤痛及瞼瞤動
明堂經云主頭目風熱眉頭痛鼻鼽衄但是口眼歪斜癲狂癇疾
皆主之忌如前法

睛明二穴一名淚孔在目內眥針一寸半留三呼雀目者可久留針然
速出禁灸○明云目內眥頭外畔陷宛宛中針一分半留三呼 不宜
灸一云目內眥外一分○銅人經云手足太陽少陽陽明五脈之會
治攀睛翳膜覆瞳子惡風淚出目內眥癢痛小兒雀目疳眼
大人氣眼冷淚目視物不明大眥努肉侵睛入一寸五分留三呼不
可灸

資生經云按明堂針一分半銅人乃云入一寸半二者必有一誤
王氏云今觀面部所針淺者入一分深者四分爾而素問氣府注
云刺入一分則是銅人誤為一分為一寸也

巨髎二穴夾鼻孔旁八分直目瞳子蹻脉足陽明之會針三分得氣即
寫灸七壯○明云巨窌在鼻孔下夾水溝旁八分蹻脉足陽明之會
針三分灸七七壯○銅人經云治青盲目無所見遠視䀮䀮淫膚白翳覆
瞳子面風寒鼻𩑛頰上腫癰痛瘛瘲口喎僻鍼入三分灸亦良○西
方子云主瘛瘲搖視瞻目淚出多眵赤痛癢

迎香二穴在禾髎上一寸鼻下孔旁五分針三分留三呼不宜灸○銅
人經云手足陽明之會治鼻有瘜肉不聞香臭衄血偏風口喎面癢
浮腫風動葉落狀如虫行刺或在唇動或浮腫痛急如前法

禾髎二穴在鼻孔下夾水溝旁五分針三分又手陽明穴云禾髎一名
長頻直鼻孔夾水溝旁五分○明堂云灸三壯○銅人經云手陽明
脉氣所發治鼻衄不止鼻瘡有瘜生瘡口噤不開及尸厥也○西方
子云主鼻窒口僻
資生經云銅人經禾髎二穴在鼻孔下夾水溝旁五分明堂下經
作禾窌卽髎也上經乃作和窌皆云在鼻孔下夾水溝旁五分
則是一穴也而銅人手少陽穴復有和窌二穴在耳前兌髮[illegible]
陷中其穴相去甚遠明堂上經誤寫禾字作和字也[illegible]

點者
而等三行左右十穴

陽白二穴在眉上一寸直目瞳子[illegible]
[illegible]
目瞳子[illegible]
[illegible]
壯炷如大麥○明云針入四分半得氣即瀉特不宜灸若灸無問多
少目後[illegible]十九如拳息肉日加長如桃大至三十日定不見物或
如五升許大○銅人經云足陽明脉任脉足陽明之會治口眼喎斜目
瞤面葉葉牽動眼口目視䀮䀮冷淚眼眥赤痛耳鳴不宜針可灸三壯
○西方子云不灸
資生經云銅人經也[illegible]
云針入四分半時不宜灸[illegible]
知此動者不針不灸可也
四白二穴在目下一寸灸七壯針三分凡用針穩當方得下針若刺令
人目烏色○銅人經云足陽明脉氣所發治目痛目眩生白翳淚出風
目瞤動不息○西方子云主目眥淚出多眵內眥赤痛癢

地倉二穴夾口吻旁四分外如近下有脉微微動是也針三分
留五呼得氣即瀉日可灸二七壯重者七七壯炷如粗釵股大炷若大
口轉喎却灸承漿七七壯○銅人經云蹻脉手陽明之交會治偏
中風其[illegible]口喎目不得閉失音不語飲食不收
水漿漏落眼瞤動不止病左治右病右治左宜頻針灸以除風
[illegible]
大迎二穴在曲頷前一寸二分骨陷中動脉又以口下當兩肩針三分
留七呼灸三壯○銅人經云足陽明脉氣所發治寒熱頸痛瘰癧口
喎齒齲痛數欠氣風痙口噤牙疼頰腫惡寒舌強不能言風壅面
浮腫目不得閉唇吻瞤動不止當針之頑愈○西方子云治口噤不開
引鼻中[illegible]

西第四行左右十穴

本神二穴在曲差傍一寸半一云直耳上入髮際四分針三分灸七壯 ○銅人經云足少陽陽維之會治目眩頸項強急痛胷脇相引不得轉側癲疾嘔吐涎沫針入三分可灸三壯

○西方子云療小兒驚癇

絲竹空二穴一名目髎在眉後陷中針三分留三呼宜瀉不宜補禁灸使人目小又令目無所見 ○銅人經云足少陽脉氣所發禁不可灸治目眩頭痛目赤視物𥆧𥆧風癇目戴上不識人眼睫毛倒發狂吐涎沫發即無時

瞳子髎二穴在目外眥五分灸三壯針三分 ○素問注云在目外去眥五分 銅人經云手太陽手足少陽之會治青盲目無所見遠視䀮䀮目中膚翳白膜頭痛目外眥赤痛又云可灸三壯

西方子云不可灸

顴髎二穴在面頄骨下廉銳骨端陷中針二分 ○銅人經云手少陽太陽之會治口喎面赤目黃眼瞤動不止頰腫齒痛針入二分 ○西方子云主口喎僻不能言及口僻痛惡風寒不可以嚼齒痛

頭維二穴在額角入髮際本神傍一寸半針三分禁不可灸 ○銅人經云足少陽陽明脉之交會治頭偏痛目視物不明亦治微風眼瞼瞤動不止風淚出

側面部左右十四穴

上關二穴一名客主人在耳前起骨上廉開口有空動脉宛宛中灸七
壯艾炷不用大箸頭作炷若針必須側卧張口取之乃得禁針深問
曰何以不得針深答曰上關若刺深令人欠而不得故下關久留
針即故而不得欠牙關急是故上關不得刺深下關不得久留針也
○明云客主人二穴針入一分留之得氣即瀉日灸七壯至二百壯下
明灸莫針灸之忌宜側卧張口取之可得見也明下云灸一壯○銅
人經云足陽明少陽之會治唇吻強耳聾瘈瘲口沫出目眩牙車不
開口噤不嚼食物偏風口眼喎斜耳中狀如蟬聲○素問云主[illegible]
主青盲目無所見耳痛口喎僻不能言○明堂經云主耳聾齒[illegible]痛
資生經云按素問刺禁曰刺上關客主人內陷中為聾[illegible]
言刺太深則欠[illegible]耳內之病[illegible]則氣不[illegible]
若是之不止令人欠而不能[illegible]云云用針者所當知也
下關二穴在上關下耳前動脉下廉合口有空開口則閉針入四分得
氣即瀉禁灸又云下關不得久留針側卧閉口取之○銅人經云足
陽明少陽之會療聾耳有膿汁出偏風口目喎牙車脫臼其穴側
卧閉口取之[illegible]不得灸[illegible]
○西方子云主三般聾主耳鳴耳痛[illegible]
建關二穴在耳後手寸名太陽之穴理風赤[illegible]
三分
資生經云銅人有上關下關合二穴素問亦曰但明言上下位有
上關而無下關惟上經有前關穴又不與下關穴同在上關之下
恐別自是前關穴名太陽穴理風赤眼頭痛[illegible]不
可灸故附入于下關之後
[illegible]二穴在耳前[illegible]下橫動脉針七分灸三壯○[illegible]有耳[illegible]
下頰動脉○銅人經云手太陽脉氣所發治牙車引急頭頷痛耳
中[illegible]痛[illegible]
和髎二穴在耳前銳髮[illegible]手[illegible]
在耳孔下[illegible]
明堂上[illegible]
之

聽會二穴在耳微前陷中上關下一寸動脉宛宛中張口得之針七分
留三呼得氣即瀉不須補日灸五壯止三七壯十日後依前報灸
明云針三分忌冷食呵○下云灸三壯[illegible]一名聽呵
銅人經云手少陽脉氣所發治耳聾耳中狀如蟬聲通耳閉痛不得
嚼食牙車脫臼相離一寸[illegible]其穴側卧張口取之灸亦良○明堂
經云主耳[illegible]聾[illegible]西方子云主齒痛惡食[illegible]
骨[illegible]資生經云[illegible]口[illegible]手[illegible]動風生[illegible]
耳門二穴在耳前起肉當耳缺者陷中針三分留三呼灸三壯明下云
禁灸有病不過三壯○銅人經云治耳有膿汁出生瘡聤耳耳鳴
如蟬聲重聽無所聞齒齲[illegible]○明堂經云宜灸有病不過三壯也
聽宮二穴在耳中珠子大明如赤小豆針三分灸三壯○明云針一分銅
西方子云主[illegible]
人經云手太陽手足少陽三脉之會治耳聾如物填塞無所聞耳中
[illegible]心腹滿臂痛失聲○西方子云主耳若蟬鳴[illegible]
癲疾口噤[illegible]
頰車二穴在耳下曲頰端陷中針四分得氣即瀉日灸七壯止七七壯
[illegible]下云在耳下二韭葉[illegible]中灸三壯又云耳下曲頰骨後○
千金云[illegible]通[illegible]○銅人經云足陽明脉氣所發治[illegible]其
[illegible]口噤不[illegible]失音牙車痛頷頰腫[illegible]
[illegible]側卧開口取之[illegible]
[illegible]不可[illegible]

肩膊部左右二十六穴



肩井二穴一名膊井在肩上陷解中缺盆上大骨前寸半以三指按取之當中指下陷中甲乙經云只可針五分此手足少陽足陽明之會乃連入五藏氣若刺深則令人悶倒不識人即速須三里下氣先補不瀉須臾平復如故凡針肩井皆以三里下其氣大良灸七壯明堂云針四分先補而後瀉特不宜灸針不得深深即令人悶若婦人胎落後微損手足弱者針肩井立愈灸乃勝針日灸七壯止一百若針肩井必三里下氣如不灸三里即使氣上○銅人經云手足少陽陽維之會主五勞七傷頸項不得回顧背髆悶兩手不得向頭或因撲傷腰髖疼脚氣上攻○又云若有所懷妊針著不可過針灸乃勝針針深使引入五藏之氣乃令人壽短大況人亦可倍之○西方子云主婦人墮胎後手足厥逆欲死寒熱凄凄氣不得卧

資生經云明堂既云特不宜灸又云灸乃勝針日灸七壯至百壯銅人是又可灸矣不知何自聞其說也或者肩井不可灸惟胎落後手足弱者可灸耶

天髎二穴在肩缺盆中上毖骨之際陷中央針八分灸三壯○銅人經云手少陽陽維之會治肩肘痛引頸項急寒熱缺盆中痛汗不出胸中煩滿○西方子云主臂痛不舉

巨骨二穴在肩端上行兩叉骨間陷中灸五壯針寸半明堂云巨骨一穴在肩髃骨頭日灸三壯至七壯禁針針則倒懸一食頃乃得下針針入四分瀉之勿補針出始得正卧下云巨骨二穴在肩端上兩行骨間中央一壯

明堂經云主肩中痛不能動搖也○銅人經云手陽明蹻脈之會治背膊痛胸中有瘀血肩臂不得屈伸而痛灸五壯針入寸○云主驚癇破心吐血臂痛食噎忌生冷物

資生經云銅人云巨骨一穴在肩端上兩叉骨間明堂下經亦同但明堂上經云巨骨一穴在心膈骨頭不特穴名不同而穴在心膈骨頭亦異豈上經謂一穴在心膈頭者是巨骨耶不知即是鳩尾一名一字傳寫之誤也

臑會二穴一名臑髎在肩前廉去肩頭三寸宛宛中針七分留三呼得氣即瀉灸七壯○銅人經云手陽明之絡治項瘿氣瘤臂痛不能舉氣腫痠痛針三分留十呼○西方子云主肘腫臂寒熱痠疼肘氣射腕重腋急痛肘難屈伸

肩貞二穴在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷中取之灸七壯以差為度凡灸偏風不遂可七七壯不宜多灸恐手臂細若風病筋骨無力久不差灸不畏細也刺則淺深不得過分

肩髃二穴在膊骨頭肩端上兩骨間陷者宛宛中舉臂取之灸七壯至二七壯以差為度若灸偏風不遂可灸七七壯不宜多灸恐手臂細若刺風痺手臂不得舉針之如灸○明堂云針八分留三呼瀉五吸灸不及針以平手取其穴灸七壯增至二七若灸偏風不遂至二百若更多灸恐手臂細若刺風痺風痺痛不瀉不畏細也○銅人經云手陽明蹻脈之會偏風半身不遂熱風癮疹手臂攣急不得擧臂細無力筋骨痠疼○又云臂痛不可舉理傷寒熱不已為風或為痿也

肩髎二穴在肩端臑上陷中舉臂取之針七分灸三壯明堂云五壯○西方子云肩中熱頭不可以顧及肩

銅人經云治肩重不可擧臂肘痛

肩貞二穴在肩胛下兩骨解間肩髃後陷中針五分○銅人經云治風痺手臂不擧肩中熱痛○西方子云主頷痛引耳中嘈嘈耳鳴無所聞頭不可以顧 針八分灸三壯

天宗二穴在秉風後大骨下陷中灸三壯針五分留六呼○銅人經云手太陽脈氣所發治肩胛痛臂肘外後廉痛頰頷腫痛○西方子云主肩重臂痛

臑俞二穴在肩髎後大骨下胛上廉陷中針八分灸三壯○素問云在肩髃後擧臂取之○銅人經云手足太陽陽維蹻脈之會治臂酸無力肩痛引胛中痛臂疼痛

秉風二穴在肩上小髃骨後擧臂有空灸五壯針五分○銅人經云在小髃骨後手太陽陽明手足少陽之會治肩痛不能擧○西方子云使天髎外灸三壯

曲垣二穴在肩中央曲胛陷中按之應手痛灸三壯針五分○明堂云九分○銅人經云主治肩痛周痺氣注肩胛拘急疼悶○西方子云灸十壯

肩外俞二穴在肩胛上廉去脊三寸陷中針六分灸三壯○銅人經云治肩胛痛熱而寒至肘○西方子云主寒熱引項強左右不顧

肩中俞二穴在肩胛內廉去脊二寸陷中針三分留七呼灸十壯○銅人經云治寒熱目視不明咳嗽上氣唾血○西方子云主小兒目不明灸三壯

背俞部中行十三穴 外接脊骨 脊中九穴

大椎一穴在第一椎上陷者宛宛中針五分留三呼瀉五吸灸以年爲壯○甲乙經云大椎下至尾骶骨二十一椎長三尺折量取俞穴○銅人經云手足三陽督脈之會療五勞七傷溫瘧痎瘧氣疰背膊拘急頸項強不得回顧風勞食氣○度周身孔穴遠近分寸以男左女右取中指內文爲一寸素問云同身寸是也又多用繩度量孔穴繩多出縮取穴不準今以薄竹片點量分寸療病准的○西方子云灸一壯至四十九壯止主傷寒熱盛煩嘔○明堂經云背膊中悶痛不愈 針五分灸隨年壯

資生經云既曰大椎又曰在第一椎上陷中豈是二穴并二穴則不言在第一椎上矣此大椎第一椎所以異也但銅人云大椎在第一椎上陷中諸經皆同惟明堂下經云在第一椎下陶道穴既在第一椎下不應大椎亦在第一椎下皆是下經誤寫上字作下字也考之下經亦言陶道穴在大椎節下與銅人合是見其誤寫上字作下無疑矣

陶道一穴在大椎節下間俛而取之陷者中灸五壯針五分銅人云督

疾走太息之實者[illegible]顛風瘈狂病以取千不出○西方子

云主頭痛項如拔不可左右顧目不明女眺ㄙ

身柱一穴在三椎節下間俛而取之針五分灸七七壯明云五壯下云三

壯○銅人云督脈氣所發治癲疾瘈瘲怒欲殺人身熱狂走讝言見

鬼○西方子云主洩氣不能言口乾煩心喘息頭痛吐而下出灸百

壯○明堂云主小兒驚癎ㄙ

神道一穴在五椎節下間俛而取之灸七七壯止百壯小兒風癎

瘈瘲可灸七壯○明云針五分灸三壯下云五壯○銅人經云督脈

氣所發○西方子云主腰脊急強[illegible]傷寒發熱頭痛進退往來痎瘧恍惚悲愁健忘驚悸

頭疼進退往來[illegible]目[illegible]不明ㄙ

靈臺一穴在六椎節下間俛而取之○銅人經云督脈氣所發○西方

子云主氣病喘不能臥汗不出[illegible]ㄙ

至陽一穴在七椎節下間俛而取之針五分灸三壯○明下云七壯

○銅人經云督脈氣所發治寒熱解[illegible]淫濼脛酸四肢重痛少氣難

言○明堂云灸七壯主胃中寒氣不能食胸脅支滿[illegible]

[illegible]寒熱氣上下行腰脊強痛也ㄙ人

筋縮一穴在九椎節下間俛而取之針五分灸三壯明下云七壯○明堂經

[illegible]督脈氣所發治驚癎狂走癲疾脊急強目轉上垂○明堂經

云灸五壯主驚癎病多言[illegible]目[illegible]也ㄙ人

脊中一穴一名神宗在十一椎節下間俛而取之禁不可灸令人腰背傴

僂針五分得氣即瀉明堂作脊俞一名脊中在十一椎中央推脊在

十二椎下[illegible]○銅人經云一名脊俞督脈氣所發治風

癎癲邪黃疸腹滿積聚下利○明分上不可灸ㄙ

懸樞一穴在十三椎節下間伏而取之針三分灸三壯○明堂經云在

十二椎下節間下云十一椎下○銅人經云督脈氣所發治積氣上

下行水穀不化下利腰脊強不得屈伸腹中留積○明堂經云[illegible]腹

中積氣上下腹中尽疼ㄙ人

資生經云銅人明堂懸樞在十三椎節下間明堂上經作十二椎

節間下經作十一椎下脊中既在十一椎下不應懸樞又在十

一椎下固知其[illegible]當以銅人為正明堂

上經亦誤三字作二字也要之懸樞在十三椎節下審

命門一穴一名屬累在十四椎節下間伏而取之[illegible]針五分灸三

壯○銅人經云督脈氣所發治頭痛如破身熱如火汗不出

瘛瘲裏急腰腹相引痛○明堂經云主寒熱痎瘧ㄙ

陽關一穴在十六椎節下間伏而取之針五分灸三壯○西方子云主膝

外不仁○銅人經闕此穴ㄙ

腰俞一穴一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰戶在二十一椎節下

間宛宛中[illegible]以挺腹地舒身兩手相重支額縱四體後乃取其穴

針八分留三呼瀉五吸灸七壯至七七壯○甲乙經云針二寸留七呼灸七七

壯又云針下分灸三壯○明堂經云三壯下云五壯○素問注云針

一分○甲乙經作二寸大是誤也主亦可二分○氣府論注亦云

作一分一名髓空○銅人經云督脈氣所發治腰髖疼腰脊強不得

回轉溫瘧痎瘧○明堂經云灸五壯主腰痛不能久立腰已下至足

冷不仁[illegible]可[illegible]灸重如石難舉動也[illegible]

長強一穴一名氣之陰郄督脈別絡在脊骶端○甲乙經云在脊

骶端[illegible]三分伏地取之[illegible]

十壯止三百壯[illegible]○甲乙經云針[illegible]

壯○銅人經云足少陰少陽所結會[illegible]

下部[illegible]○又云[illegible]

腸風[illegible]下血[illegible]

[illegible]

云主大小便難五痔[illegible]○又云[illegible]

小兒囟陷[illegible]ㄙ人

資生經云[illegible]

[illegible]

[illegible]之[illegible]

背俞第二行四十四穴

[illegible]



大杼二穴在項後第一椎下兩傍相去各寸半陷中針五分可灸七壯
甲乙明言禁灸下經云灸五壯資生同明堂仍禁灸○銅人經云甲
乙經足太陽手少陽之會療膝痛不可俛仰左右不顧頭痛
振寒瘈瘲氣實脇滿傷寒汗不出脊強喉痺煩滿風勞氣急
欬嗽胸中鬱鬱身熱目眩腹痛臥不安席○西方子云又名本神不
灸 粘疏
資生經云明堂經禁灸而銅人云可灸七壯必有説也 量其大急
不可多灸
風門二穴一名熱府在二椎下兩傍相去各寸半針五分留七呼若頻
刺泄諸陽熱氣背永不發癰疽灸五壯○銅人經云督脈足太陽之
會治傷寒頸項強目瞑多嚏鼻鼽出清涕風勞嘔逆上氣胸背痛喘
氣臥不安○西方子云療風眩頭痛鼻衄窒喘息不通欬逆
肺俞二穴在三椎下兩傍各寸半針三分留七呼得氣即瀉[illegible]○甄
權針經云在三椎下兩傍以搭手左取右右取左當中指末是穴針
三分留七呼灸百壯明下云三壯[illegible]○銅人經云足
太陽脉氣所發治上氣喘也又食不下食汗不出腰背痛寒熱結
癉逆頸項傳尸骨蒸勞瘵肺痿欬嗽[illegible]胸中氣滿背僂如龜頸
目眩令人失顏色○又云理積痛[illegible]勞熱[illegible]○明堂經云在第三椎
下兩傍各一寸半主肺寒熱[illegible]唾血○西方子云主吐逆脊強
熱狂火氣胸中痛及百病
厥陰俞二穴在四椎下兩傍各寸半針三分灸七壯[illegible]○銅人
經云治逆氣嘔吐心痛留結胸中煩悶牙痛○西方子云灸五壯
心俞二穴在五椎下兩傍各寸半針三分留七呼得氣即瀉不可灸明
下云灸五壯[illegible]○銅人經云治中風偃臥不得傾側汗不出狂走發癲亂語
悲泣心胸悶亂汗不出結積寒熱嘔逆不下食[illegible]
目昏○明堂[illegible]心痛背相引欬[illegible]不得息煩心多涎胃中弱[illegible]
[illegible]發狂[illegible]傷也
資生經云銅人載心俞不可灸可針入三分世醫因此乃謂心俞
禁灸但可針爾然不知刺中心一日死乃素問之所戒豈可妄針
[illegible]
千金[illegible]心[illegible]灸[illegible]其後忌可七
是可灸不可灸之說明堂[illegible]禁都
督俞二穴一名高益在六椎下兩傍各寸半禁針可灸○銅人經云主
理寒熱腹中痛雷鳴氣逆心痛灸三壯
資生經云銅人經缺此穴明堂經有之今依明堂入在此恐銅人
本不全也
膈俞二穴在七椎下兩傍各寸半針三分留七呼灸三壯明下云五壯
[illegible]○銅人經云治欬而嘔逆膈胃寒痰食飲不下胸滿
[illegible]熱病汗不出[illegible]腹脹[illegible]
四肢怠惰不欲動身常濕不能食食則心痛周痺身皆痛○又云治
大腹兩脇脹滿胃脘暴痛[illegible]
寒熱骨痛虛脹支滿痰瘧痃癖氣塊翳上痛○西方子云主背脇相
引不得俛仰胃寒痰飲逆[illegible]噎[illegible]不得消食飲不下
主食○明堂經云治胃弱食少
資生經云八椎下兩傍銅人明堂並缺俞穴
肝俞二穴在九椎下兩傍各寸半針三分留六呼灸三壯明下

云七壯素問云刺中肝五日死○又云主欬逆兩脇滿悶脇中痛目
中暗羸氣短唾血目上視多怒狂衂目眩無遠視也○銅人經一云
主欬引兩脇急痛不得息轉側難欲脇下與脊相引而反折目眩循
眉頭痛鼽衄驚狂寒疝少腹痛○又云理口乾中風支滿短氣不
食食不消吐血目不明閉塞頭痛有痰○千金方云主熱病差後食
五辛多患眼闇如雀目熏中咳唾血嘔血筋急手相引寒熱痓
膽俞二穴在十推下兩傍各寸半正坐取之灸三壯針五分明堂云三分下
經云灸五壯素問云刺中膽一日半死○銅人經云治心腹脹滿
舌口則目無所出口苦舌乾咽中痛食不下目黃胸脇不能轉側
側頭痛振寒汗不出腋下腫○又云足太陽脈氣所發主理心脹滿
吐逆短氣乾嘔○灸不消針入二分
脾俞二穴在十一推下兩傍各寸半留者中針三分留七呼灸三壯明
堂下經云五壯素問云刺中脾十日死○銅人經云治腹脹引胸背
痛食飲多身羸瘦黃疸善欠脇下滿欲吐身重四肢不收痃瘕
積聚腹痛不嗜食痰瘧寒熱○又云理肺身黃腹
千金方云主腹脹胸背痛食不生肌膚欬黃身重不欲動○
明堂經云主飲食多身羸瘦背痛
胃俞二穴在十二推下兩傍各一寸半針三分留七呼灸隨年為壯明
堂云三壯下經云七壯○銅人經云治胃中寒脹不嗜食羸瘦腸
鳴腹痛胃脘痛又腹脅痛筋攣急○又云理胃痛吐食針三分灸三壯
○西方子云主食多而吐食不下
三焦俞二穴在十三推下兩傍各一寸半針五分留七呼灸三壯明堂
云針三分下經云灸五壯○銅人經云治腸鳴腹脹水穀不化
腹中痛欲泄注目眩頭痛吐逆飲食不下肩背拘急腰脊強不得
俛仰○又云足太陽脈氣所發○西方子云主腹積聚如石灸三壯○
明堂經云正坐取陷中灸五壯主背痛身熱
腎俞二穴在十四推下兩傍各寸半與臍平針三分留七呼灸以年為
壯明堂云三壯下經五壯○又云主腰疼不可俛仰轉側
雖身寒熱飲食倍多身羸瘦面黃黑目䀮䀮赤主丈夫婦人久積冷
氣○又勞瘵○銅人經云治虛勞耳聾腎虛水藏久冷心腹䐜滿兩
脇滿引少腹急痛少氣溺血小便濁出精陰中疼五勞七傷虛憊腳
膝拘急足寒如冰頭重身熱振慄胃中熱腹逆冷洞泄食不化身腫
如水○又云主冷腰臥○西方子云主腰痛小腹痛嘔吐寒中
洞泄小便難赤濁骨寒熱兩脇引滿不明更風寒面赤熱心痛如懸
灸勞痛法
氣海俞二穴在十五推下兩傍各寸半通灸○銅人云理腰痛痔病瀉
白灸三壯
資生經云按明堂有氣海俞而銅人無之恐銅人本不全故依明
堂附入于此
大腸俞二穴在十六推下兩傍各寸半針三分留六呼灸三壯○銅人
經云治腰痛腸鳴腹脹繞臍切痛大小便不利或有洞泄食不化
脊背強不得俛仰針入三分灸三壯○西方子云主大小便不利腹䐜
暴泄食不下喜飢忌生冷酒麪毒物
關元俞二穴在十七推下兩傍寸半針三分○銅人經云理風勞腰
痛泄利虛脹小便難婦人瘕聚諸疾
資生經云按明堂有關元俞而銅人無之恐銅人本不全故依明
堂附入于此
小腸俞二穴在十八推下兩傍各寸半針三分留六呼灸三壯○銅人經
云治小便赤澀淋瀝煩熱少腹疞痛脚腫短氣不嗜食大便膿血
出五痔疼痛婦人帶下○西方子云主大小便難淋癃小便黃赤泄
痢膿血五色赤痢下重腫腰脊疝痛及腰脊急強
膀胱俞二穴在十九推下兩傍各一寸半針三分留六呼灸三壯明堂下
經云七壯又云主腰脊急強腰下腫重勞損不仁腹中痛大便難
也○銅人經云足太陽脈氣所發治風勞腰脊痛泄利大便難小便赤
澀遺溺陰生瘡少氣足胻寒拘急不得屈伸女子瘕聚脚膝無力
○西方子云主泄利腸痛頭項汗不出小便赤黃堅結積足清不仁
主熱痓引背痛○明堂經云各二寸半陷者中
中膂內俞二穴在二十椎下兩傍各一寸俠脊起肉針三分
留十呼灸三壯明堂下經云主腰痛挾脊膂痛上下按之應者
從項後至此穴痛皆灸之立愈○銅人經云少陰脈治腸冷赤白痢

背煩消渴汗不出腰脊不得俛仰腹脹脇痛○四方子云主骨病寒
熱瘧反折

白環俞二穴在二十一椎下兩旁各一寸半○甲乙經云針如腰俞法
病者腹挾脊兩手相重支額縱息令皮膚俱緩乃取其穴針八分
得氣則瀉訖多補之不宜灸○明堂下經云灸三壯又云主腰脊急
強痛不能俯仰起坐難手足不仁小便黃腰尻重不舉○銅人經
云足太陽脉氣所發治大小便不利及治腰髖疼痛脚膝不遂溫瘧
腰脊冷疼不得安卧勞損虛風不宜灸忌房勞不得舉重

上髎二穴在第一空腰髁下挾脊陷中針三分灸七壯千金云腰髁下
一寸○銅人經云足太陽少陽之絡治腰膝冷痛嘔逆鼻衄寒熱瘧婦人
絕嗣陰挺出不禁白瀝○四方子云在腰髁下一寸挾脊兩傍是
三壯主腰痛瘧反折大小便利

次髎二穴一名次峁在第二空挾脊陷中可灸七壯針三分○銅人經
云治疝氣下墜腰脊痛不得轉搖急引陰器痛不可忍腰已下至
足不仁背腠寒小便赤心下堅脹○四方子云主腰足以下
[illegible]
惡寒婦人赤白帶下腰痛不可俛仰足膚不仁大小便利

中髎二穴在第三空挾脊陷中針二分留十呼灸三壯○銅人經云厥
陰少陽所結治丈夫五勞七傷六極腰痛大便難腹脹下利小便淋
澀飧泄婦人絕子帶下月事不調○四方子云主婦人赤淫時白氣
癃月事少大小便利

下髎二穴在第四空挾脊陷中針二分留十呼灸三壯○銅人經云足
太陰厥陰少陽所結腸鳴注瀉不得臥女子下蒼汁不禁中痛引小腹急
痛大便下血寒濕內傷腹痛陰中痒痛引小腹控胁不可俛仰大小
便利腸鳴膿血泄注

會陽二穴一名利機在陰尾骨兩旁針八分灸五壯○銅人經云督脉
氣所發治腹中冷氣泄利不止又虛損氣虛之陰汗濕○四方子云
主腹中有寒泄注腸辟便血

千金八髎在腰目下三寸挾脊相去四寸兩邊各四穴其四穴在第四
寸是俠脊各寸半也凡大杼下穴皆當除脊各一寸半

背俞第三行左右二十八穴



附分二穴在第二椎下附項內廉兩旁相去俠脊各三寸灸五壯針三
分○銅人經云手足太陽之會正坐取之治肩背拘急風冷客於腠理
頸項強痛不得回顧風勞臂肘不仁○西方子云主背痛引頸

魄戶二穴在三椎下兩傍各三寸正坐取之針五分得氣即瀉又宜灸留
針日灸七壯止百壯○明堂云日七壯至二百壯下經云魄戶在
三椎下兩旁各三寸灸三壯又云魄戶在三椎下兩傍各三寸灸五
壯○明堂云主肩膊間急痛背氣不能引頸喉噎逆上喘○西方子云
魄戶上直附分○銅人經云穴中正坐取之足太陽脉所發治背
膊痛欬逆上氣嘔吐煩滿虛勞肺痿五尸走疰項強肩背不得回
顧○西方子云主胸寒熱呼吸不得引臑不嗽氣相追逐背胛悶
無力勞損萎黃忌猪魚酒麪生冷物等

資生經云銅人有魄戶穴明堂上經亦同而下經既有魄戶又
有魂戶穴皆云在三椎下兩旁誤寫魄字作魂本經兩出魄戶穴
也攷之下經既有魂戶又有魄戶既有天窗又有天吳小兒 又
有天吳息者魂戶即魄戶之誤作魂而兩出之不然何其穴皆在三

椎背取

膏肓俞二穴在四椎下一分五椎上一分兩傍各三寸主無所不療羸瘦虛損夢

中失精上氣欬逆發狂健忘取穴之法令人正坐曲脊伸兩

手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得

動搖從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛

骨之裏去胛骨容側指許摩膂肉之表肋間空處按之自覺牽引

胸戶中灸兩胛中各一處至百壯多至五百壯當覺氣下礱礱然如流

水狀亦當有所下出若無停痰宿疾則無所下也若病人已困不

能正坐當令側臥挽上臂令前求取穴灸之也求穴大較以右手從右肩上住

指頭表所不及者是穴也左取亦然乃以前法灸之若不能久正坐當

伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不爾胛骨

覆穴不可得也所伏衣襆當令大小常定不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣康盛當消息

以自補養取身體平復

膏肓之上肓之下針藥所不及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿痾難遣

若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

西方子云其取穴之法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令端直

銅人經或坐或臥或立或伸或屈或坐而低頭或立而

或低頭或高下或量心或量臍

然未明大法以手平按

按其穴頂得病人中指麻木則是灸之不取

第五椎上各去脊三寸是穴中

資生經云灸膏肓功効諸經例能言之而取穴則未也千金等方

之外莊綽論之最詳然繁而無統不能使人曉王氏云予嘗以意

取之令病人兩手交在兩膊上則胛骨開其穴立見以手揣摸

脊骨第四椎下兩傍各三寸四肋三間之中間按之酸疼是穴灸

之千百壯少亦七七壯當依千金立點立灸坐點坐灸臥點臥灸

云頭中...穴...只宜...人...

神堂二穴在五椎下兩傍各三寸陷中正坐取之針三分灸五壯明堂

下經云三壯素問註云上直魄戶○銅人經云足太陽脉氣所發

治肩痛胸腹滿灑淅脊背急強不能俛仰○明堂經

云主喜悲上氣時復喘也

譩譆二穴在肩膊內廉挾六椎下兩傍各三寸陷者中正坐取之

以手痛按之病者言譩譆針六分留三呼瀉五吸灸二七壯止百壯○

明堂下經云五壯又云主瘧久不愈若...胸中氣...勞損

虛乏不得睡也○銅人經云足太陽脉氣所發主大風汗不出勞損

肩膊痛...溫瘧...小兒...腰背...肩膊內廉痛

背不得俛仰○又云其穴抱肘取之主肩背寒痓風痹○西方子云

治小兒食晦頭痛及五心熱...上氣...

膈關二穴在七椎下兩傍各三寸陷中正坐取之針五分灸五壯○銅

人經云足太陽脉氣所發治背痛惡寒脊強俛仰難食飲不下

嘔噦多涎唾胸中噎悶

魂門二穴在九椎下兩傍各三寸陷中正坐取之灸三壯針五分○銅

人經云足太陽脉氣所發治食飲不下腹中雷鳴大便不節小便黃

赤人治尸厥走疰多汗

陽綱二穴在十椎下兩傍各三寸陷中正坐闊肩取之針五分

灸三壯○明堂下經云七壯主食不下腹中雷鳴腸脹大便

泄消渴身熱目黃不嗜食惡寒也○銅人經云足太陽脉氣所發治

小便赤澀○西方子云主大小便不節黃赤腸鳴泄注

意舍二穴在十一椎下兩傍各三寸陷中正坐取之針五分灸五十壯

至百壯○明堂云五十壯至百二十壯甲乙經云三壯針五分下經

云灸七壯○明堂經云在第九椎下兩傍各三寸主背脹滿背痛

惡寒飲食不下嘔吐不留住也○素問云灸二壯○銅人經云足太

陽脉氣所發治腹滿虛脹大便滑泄消渴面目黃赤嗜飲

胃倉二穴在十二椎下兩傍各三寸針五分灸五十壯明堂云五十壯

甲乙經云三壯○銅人經云足太陽脉氣所發治腹內虛脹水腫食

飲不下惡寒脊背不得俛仰針三分灸五壯○西方子云治水腫臌

脹水食不消

肓門二穴在十三椎下兩傍各三寸又肋間與鳩尾相直

灸三十壯針五分○銅人經云治心下大堅婦人乳有餘疾

志室二穴在十四椎下兩傍各三寸陷中正坐取之針五分灸三壯○

明堂下經云兩傍各三寸半灸七壯又云微俛而取之主腰痛脊急兩脇滿大便難食飲不下背痛俛仰不得也○銅人經云足太陽脉氣所發治腰脊痛而食飲不消腹堅急腸鳴下腫失精小便淋瀝

資生經云明堂上經作兩傍各三寸與銅人經同而下經乃作三寸半此是分八半字也

胞肓二穴在十九椎下兩傍各三寸半中伏而取之灸五七壯針五分明堂云灸五七壯至五十壯甲乙經云三壯下經云五壯主腰痛不可忍俛仰難惡寒小便澁也○銅人經云足太陽脉氣所發治少腹堅急癃閉重不得小便○又云治腰脊痛惡寒不滿腹中堅急痛淋下腫痛惡寒

秩邊二穴在二十椎下兩傍各三寸陷中伏而取之灸三壯針五分忌同○明堂經云在二十一椎下兩傍各三寸灸三壯針五分○銅人經云足太陽脉氣所發治腰痛不能俛仰小便赤澀腰尻重不能舉五痔發腫 [illegible]

資生經云素問氣府論注曰秩邊在二十一椎下兩傍上直胞肓與銅人明堂經二十椎下不同未知其孰是姑兩存之

以上二十八穴當背中寸除脊各三寸取穴

側頸項部左右十八穴

天容二穴在耳下曲頰後灸三壯○銅人經云手太陽脉氣所發主頸項癰不能言胸滿項痛不可顧耳聾嘈嘈若蟬鳴欬逆噎沫上氣喘息齒噤喉痺寒熱咽如鯁○又云鍼入一寸○西方子云又名天容

天牖二穴在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上鍼一寸留七呼不宜補亦不宜灸若灸面腫眼先取譩譆後針天牖風池即差若不先針譩譆即難療○明堂經云鍼五分得氣即瀉瀉盡更留三呼瀉三吸下經云灸三壯又西方子云髮際上一寸不灸○又云髮際完完中主療瘰歷瘧寒熱頸有積氣肩中痛頸風目眩鼻塞不聞香臭○銅人經云手少陽脉氣所發治頭風面腫項強不得回顧夜夢顛倒面青黃無顏色鍼入五分不宜灸

資生經云銅人明堂上經皆云不宜灸下經乃云灸三壯恐是案冗許灸一壯至三壯也

天窓二穴一名窓籠在頸大筋前曲頰下扶突後動脉應手陷中灸三壯鍼三分○明堂經云主耳聾無所聞頰腫喉中痛暴瘖不能言及肩痛引項不得顧○銅人經云手太陽脉氣所發○西方子云治

玉堂炙療屬頸痛又

天鼎二穴在頸缺盆直扶突後一寸灸三壯鍼三分忌同○明堂

下經云在頸缺盆上直扶突氣舍後一寸五分中灸七壯素問氣府註云

在頸缺盆上直扶突氣舍後半寸之半按甲乙經作寸半○銅人經

云手陽明脈氣所發治暴瘖氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下喉中

鳴○西方子云在曲頰下一寸人迎後 大腸

扶突二穴一名水穴在人迎後寸半灸三壯鍼三分素問註云在頸當曲

頰下一寸人迎後仰而取之銅人經云在氣舍後一寸半灸三壯主舌

本出血欬逆上氣咽中鳴喘多唾喘欲侵中如水雞鳴○又云手陽

明脈氣所發 又

缺盆二穴一名天蓋在肩下橫骨陷中灸三壯鍼三分不宜刺太深

深使人逆息也○明堂經云肩上橫骨陷中陷者肩上是穴○銅人

經云治寒熱瘰癧缺盆中腫外潰則生胸中熱滿腹大水氣缺

盆中痛汗出喉痺欬嗽○西方子云主寒熱瘰癧息賁脅下氣

上衝胸人迎○明堂乃云在肩上橫骨陷中又云肩上

是穴恐銅人經下字也

人迎二穴一名五會在頸大脈動應手俠結喉旁仰而取之以候五藏

氣足陽明脈氣所發禁灸灸之不幸傷人鍼四分○銅人經云治喘逆

霍亂胸滿喘呼不得息項氣閉食不下 人

水突二穴一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上灸三壯鍼三分○銅人

經云足陽明脈氣所發治欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短

氣喘息不得臥 大

氣舍二穴在頸直人迎俠天突陷中鍼三分灸三壯○銅人經云足

陽明脈氣所發治欬逆上氣瘤癭喉痺咽腫頸項強不得回顧

○西方子云主肩腫咽食不下 又

膺腧部中行七穴



天突在結喉下天突宛宛中一云鍼五分留三呼得氣即瀉灸亦得

即不及鍼其下鍼直橫下不得低手即五藏之氣傷人短壽明堂五

經云穴在頸結喉下五分中央宛宛中灸五壯素問氣穴註云在

頸結喉下四寸中央宛宛中刺一寸灸三壯甲乙經云在結喉下五

寸明堂下經灸小兒云結喉下三寸兩骨間

○明堂經云主欬逆氣喘暴瘖不能言身寒頸腫喉中鳴翕翕

中氣哽哽○西方子云主頰舌縱脈有膿怖氣哽喉痺咽乾欬逆喘

肩背痛及漏頸痛○銅人經云陰維任脈之會治欬嗽氣閉中氣

噎喉中狀如水雞聲肺壅咯唾膿血氣噎不通咽乾舌上急喉中生

熱瘡不得下食慎如藥法及辛酸物等 任

璇璣一穴在天突下一寸陷中仰頭取之灸五壯鍼入三分○明堂經

云灸三壯主胸脇支滿欬逆上喘喉中鳴也○銅人經云任脈氣所

發治胸支滿痛喉痺咽腫水漿不下○又云主咽癰

華蓋一穴在璇璣下一寸陷中仰頭取之鍼三分灸五壯○明堂下經

云三壯一本云五壯○又云主胸脇支滿欬逆上氣喘不能言○

銅人經云任脈氣所發治胸脇支滿痛引胸中

紫宮一穴在華蓋下一寸六分陷中仰頭取之灸五壯鍼三分○明堂下經云在華蓋下一寸灸七壯○銅人經云任脈氣所發治胸脇支滿痛胸膺骨痛疾飲食不下嘔逆上氣煩心吐血唾如白膠

玉堂一穴一名玉英在紫宮下一寸六分陷中灸五壯鍼三分○銅人經云任脈氣所發主胸滿不得喘息舌痛胸膺骨疼嘔逆上氣煩心吐寒痰○又云可灸三壯

膻中一穴一名元兒在玉堂下一寸六分橫直兩乳間陷中仰臥取之灸七七壯禁鍼不幸令人夭明堂經云日灸七壯止七七壯禁鍼不幸令人死甲乙經云鍼三分下經云灸三壯千金云鳩尾上一寸○銅人經云任脈氣所發治肺氣欬嗽上氣唾膿不得下食胸中氣滿如塞可灸二七壯及療婦人乳汁少乳不○又云主肺癰○明堂經云主胸痺風氣短喉中鳴灸五壯[illegible]積氣[illegible]

[illegible]

靈樞經云膻中者臣使之官喜樂出焉[illegible]膻中命名氣之海也心主為君以[illegible]陰陽[illegible]則喜[illegible]生[illegible]則[illegible]中者乃十二藏之一[illegible]氣上[illegible]不得下食[illegible]中[illegible]宜[illegible]

[illegible]在膻中下一寸灸三壯○又云膻中下一寸[illegible]銅人經云任脈[illegible]之所發[illegible]胸脇支[illegible]

[illegible]

兪府一名輸府二穴在巨骨下璇璣旁各二寸陷中仰而取之 甲乙經云仰而取之 鍼三分灸五壯○明堂下經云灸三壯○又云主欬逆上氣喘急嘔逆不下食欬胸中痛○銅人經云足少陰脈氣所發 甲乙經云足少陰脈氣所發 主喘嘔吐胸滿不得食 背

彧中二穴在兪府下一寸六分陷中仰而取之 明堂云仰而取之 鍼四分灸五壯○明堂下經云兪府下一寸灸三壯○又云主欬嗽上喘不能食也○銅人經云足少陰脈氣所發治胸脇支滿欬逆喘息○氣逆出多唾呼吸喘悸坐不安席 甲乙經云足少陰脈氣所發

神藏二穴在彧中下一寸六分陷中仰而取之灸五壯鍼入三分○銅人經云足少陰脈氣所發治胸脇支滿欬嗽喘逆不得息嘔吐胸滿不嗜食 甲乙經云足少陰脈氣所發

靈墟二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之鍼三分灸五壯○銅人經云足少陰脈氣所發治胸脇支滿痛引胸不得息欬逆嘔吐胸滿不嗜食○又云足少陽孫絡所發

神封二穴在靈墟下一寸六分仰而取之灸五壯鍼三分○銅人經云

膺腧第二行左右十二穴



足少陰脈氣所發治胸滿不得食飲逆孔咳而欬西方子云主胸滿不得息

步廊二穴在神封下一寸六分陷中仰而取之鍼入三分灸五壯銅人經云足少陰脈氣所發治胸脇支滿鼻塞不通呼吸少氣喘息不得舉臂

膺腧第三行左右十二穴

氣戶二穴在巨骨下俞府兩旁各二寸陷中仰而取之鍼三分灸五壯○銅人經云足陽明脈氣所發治胸脇支滿喘逆上氣呼吸胸背痛不得息不知食味

庫房二穴在氣戶下一寸六分陷中仰而取之灸五壯鍼三分○明堂經云在陷者宛宛中主胸脇支滿欬逆上氣呼吸不至息又肺寒欬致多唾濁血膿沫○銅人經云足陽明脈氣所發

屋翳二穴在庫房下一寸六分陷中仰而取之灸五壯鍼三分○銅人經云足陽明脈氣所發治欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身腫皮膚痛不可近衣淫濼瘈瘲不仁

膺窗二穴在屋翳下一寸六分陷中灸五壯鍼四分○銅人經云足陽明脈氣所發治胸滿短氣唇腫乳癰寒熱臥不安西方子云主腸鳴泄注

乳中二穴當乳是足陽明脈氣所發禁灸灸不幸生蝕瘡瘡中有清汁膿血可治瘡中有息肉若蝕瘡者死鍼刺三分○西方子云禁不灸

乳根二穴在乳下一寸六分陷中仰而取之灸五壯鍼三分○明堂經云主胸下滿悶胸痛膈氣乳痛○明堂經云主膈氣不下食噎病○銅人經云足陽明脈氣所發又治乳癰凄惏寒熱痛不可按抑○西方子云主胸中滿痛

以上十二穴去膺中行各四寸相去一寸六分

膺腧第四行左右十二穴

雲門二穴左目 氣戶旁各二寸陷中灸五壯針三分刺深使人氣逆不宜深刺○明堂經云雲門在巨骨下氣戶兩旁各二寸陷中動脈應手舉臂取之出甲乙經云在人迎下第二骨間相去二寸三分通灸 甲乙經云灸五壯針七分若深令人氣逆○西方子云主咳逆上氣胸脇徹背痛主喉痺胸中煩滿欬喘不得息不得舉臂脇短氣氣上衝心肩痛○銅人經云手太陰脈氣所發鍼入三分○又云足太陰脈氣所發理肺司藥療之

中府二穴一名膺中俞肺之募在雲門下一寸六分乳上三肋間針三分留五呼灸五壯[illegible]在胸中行兩旁相去六寸雲門下一寸乳上三肋間動脈應手陷中仰而取之○明堂經云主肺急胸中滿喘逆喉痺善噎支膺痛也○銅人經云主喉痺肩背寒熱胸中滿肩息腹脹及飲食不下嘔逆[illegible]

周榮二穴在中府下一寸六分陷中仰而取之鍼四分○明堂經云灸五壯主胸脇支滿不得俛仰欬唾穢膿也○銅人經云足太陰脈氣所發主[illegible]逆上氣呼吸多唾濁沫膿血飲食不下

胸鄉二穴在周榮下一寸六分陷者宛宛中仰而取之鍼四分灸五壯○銅人經云足太陰脈氣所發治胸脇支滿引胸背痛臥不得轉側

天谿二穴在胸鄉下一寸六分陷中仰而取之針四分灸五壯○銅人經云足太陰脈氣所發治胸中滿痛欬逆上氣喉中作聲主乳腫癰潰貫膺

食竇二穴在天谿下一寸六分陷中舉臂取之鍼四分灸五○銅人經云足太陰脈氣所發治胸脇支滿膈間雷鳴漉漉常有水聲

以上十二穴去膺中行各六寸六分

側腋左右凡八穴

淵腋二穴在腋下三寸宛宛中舉臂得之禁灸灸之不幸令人生腫蝕馬瘍內潰者死寒熱生馬瘍可治鍼三分○銅人經云治胸滿無力臂不舉○西方子云又名泉液 腋

輒筋二穴在腋下三寸復前一寸㫄脇灸三壯針六分○銅人經云足少陽脉氣所發治胸中暴滿不得卧喘息也

天池二穴一名天會在乳後一寸腋下三寸著脇直掖撅肋 乙 鍼三分○銅人經云手心主足少陽脉之會治寒熱胸膈煩滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣欬逆胸中有聲喉中鳴○明堂經云主寒熱瘖瘧熱病汗不出 乙

大包二穴在淵腋下三寸脾之大絡布胸脇中出九肋間灸三壯鍼三分○銅人經云治腹有大氣氣不得息胸脇中痛內實則其身盡寒虛則百節皆縱 甲

腹部中行十五穴





鳩尾一穴一名尾翳一名髑骭在臆前蔽骨下五分不可灸令人畢世少心力此穴大難針大好手方可下針不然取氣多令人夭針三分留三呼瀉五吸肥人倍之○明堂經云在蔽骨下五分脇者中灸三壯主心驚悸神氣耗散癲病狂不擇言也素問註云不可灸刺人無蔽骨者從歧骨際下行一寸○銅人經云治心風驚癇發癇狀如鳥鳴破心吐血心中氣悶不喜聞人語心腹脹滿胸中滿欬逆數噫喘息喉痹咽腫水漿不下忌同前治○西方子云禁灸 作

巨闕一穴心之募在鳩尾下一寸鳩尾拒者少令強一寸中人有鳩尾拒之針六分留七呼得氣即瀉可灸七壯止七七壯○明堂經云在鳩尾穴下一寸脇者中主心痛不可忍噎血煩心腸中不利腸支滿霍亂吐痢不止困頓不知人○銅人經云任脉氣所發治心中煩滿蠱病胸中痰飲腹脹暴痛恍惚不知人息賁時唾血蛔蟲痛蠱毒霍亂發狂無所識少氣○又云主熱風風癇○西方子云主風癲浪言或作鳥鳴聲不能食無心力心痛有數種冷痛蛔蟲心痛蠱毒霍亂不識人及腹中痛暴痛汗出及手清臂不舉忌同

上脘 一穴，在巨闕下一寸，當一寸五分，去蔽骨三寸。[illegible] 鍼
入八分，先補後瀉，神驗。如風癇熱病，宜先瀉後補，立愈。日灸二七壯至
百壯，未愈倍之。忌同。明堂下經云三壯。[illegible] 一。銅人經云任
脈足陽明手太陽之會。治心中熱煩，賁豚氣脹，滿不能食，霍亂吐利，
身熱汗不出，三焦多涎，心風驚悸，心痛不可忍，伏梁氣狀如覆杯。
又云主霍亂心痛，不可臥，心中悶發癲。 西方子云去蔽骨三寸。
明堂經云主嘔吐，食飲不下，腹脹氣滿，心忪驚悸，時嘔血，腹內
疞刺痛。

中脘 一穴，一名太倉，胃之募，在上脘下一寸。上紀者，中脘也。鍼八分，留七
呼，瀉五吸，疾出鍼。灸二七壯，止百壯。忌同。 明堂經云日灸二七壯，
止一百壯。[illegible] 銅人經云手太陽足陽明所生，任
脈之會。治心下脹滿，傷飽食不化，[illegible]
寒，飲水過多，腹脹氣喘，因讀書得奔豚，上下伏，言心下周伏如
覆杯，寒癖結氣，忌猪魚生冷。 西方子云主心脹不能食，反
胃，霍亂，心痛，熱，溫瘧，痰，天行傷寒，腹中熱，喜寒，[illegible]
[illegible]
腹脹[illegible]
飽食欲不化，[illegible]
食生[illegible]云中脘居心蔽骨與臍之中，[illegible]
對入一寸二分，與銅人經異，宜從銅人為是。其胃之募，無飲食
著積[illegible]也。[illegible]
後[illegible]自後頻灸此穴，每及人灸此穴，脾疼不可
忍，飲食全不進者，皆宜灸之。○[illegible]

建里 一穴，在中脘下一寸。針五分，留十呼，灸五壯。○銅人經云治心下
痛不欲食，嘔逆上氣，腹脹身腫。○又云治腸中疼痛，針入一寸二分，
灸亦良。○西方子云在中脘下一寸二分，不可灸。

下脘 一穴，在建里下一寸。鍼八分，留三呼，瀉五吸，灸二七壯，止二百壯。
銅人經云在足太陰之脈之會。治腹痛，六腑之氣寒，穀食不轉，
不消，[illegible]小便赤，腹堅硬，癖塊，脈上厥，氣動，日漸羸瘦。鍼八分，
灸亦良。○又云主腹痛不調，食不能食，腸堅腹痛，胃脹。

水分 一穴，在下脘下一寸，鍼八分，留三呼，瀉五吸。主水病，灸
大良，可灸七壯，止百壯。鍼，主水人，當斃。明堂經云分水
穴，治水病，灸大良，日灸七壯至四百。[illegible]
又云主水病，[illegible]鳴，如雷聲，
時上衝心，日灸三壯，四日止。○銅人經云治水氣之病，[illegible]
熱，水腫，腸鳴，胃虛脹，不嗜食，繞臍痛，衝胸不得息。又云若水
主[illegible]腹痛，不能食，腸堅，[illegible]
資生經云明堂云若是水病，灸之大良，鍼入五分，而銅人云若是
水病，灸之大良，禁不可鍼，針水盡即斃，是又不可針也。恐人但知
明堂，只可針，不知銅人不可針也。[illegible]

神闕 一穴，一名氣舍，當臍中。[illegible]
[illegible]灸三壯。○銅人經云治泄利不止，小
兒奶利不絕，腹大，繞臍痛，水腫，鼓脹，腸中鳴，狀如流水聲，久冷傷憊，
可灸百壯，禁不可針。[illegible]灸五壯至百壯。
資生經[illegible]
世名[illegible]
為灸[illegible]
為灸五百壯[illegible]灸至三五百壯，安知其
[illegible]

陰交 一穴，一名橫戶，在臍下一寸。針八分，[illegible]灸百壯。
明堂云灸不及鍼，日三七壯，止百壯。○西方子明堂經云日灸三
七壯至七百壯止。主臍下[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
又針

氣海 一穴，一名脖胦，一名下肓，在臍下一寸半宛宛中。針八分，得氣即
[illegible]
[illegible]明堂經云灸七壯，[illegible]

瘕堅脹羸瘦四肢力弱小腹氣瘕奔豚積聚氣滿不知人、
五臟氣逆上攻也○西方子云主少腹疝氣遊行五藏腹中切痛又
驚不得臥主冷氣衝心婦人惡露不止繞臍痛氣結成塊狀如覆杯
小便赤澀○銅人經云任脈衝脈所發治臍下冷氣及婦人月事不調
帶下崩中灸加常法
資生經云此經以氣海為生氣之海[illegible]以為元氣之海則氣
海者蓋人之元氣所生也故柳公度曰吾養生無他術但不使元
氣佐喜怒使氣海常溫爾今人既不能不以元氣佐喜怒但使氣
特灸氣海使[illegible]其次也王氏曰予舊多病常苦氣短醫者教灸
氣海氣遂不促自是每歲一二次灸之以氣怯故也

石門一穴一名利機一名精露在臍下二寸灸亦良可灸二七壯止百
壯婦人不可灸[illegible]之絕孕甄權云一名利機一名精露一名丹田一名
命門婦人[illegible]三寸[illegible]千金云灸絕孕灸五
分○明堂云在臍下二寸[illegible]小便[illegible]
數逆上氣嘔血帶下氣淋[illegible]婦人因產惡露
不止○[illegible]子云主[illegible]婦人[illegible]
小腹堅痛[illegible]下引陰中不得小便[illegible]
氣淋[illegible]小腹[illegible]陰中不得小便[illegible]
[illegible]水腫[illegible]
[illegible]
甲乙經云[illegible]名丹田千金[illegible]
亦謂丹田在臍下二寸[illegible]
明堂[illegible]
銅人經[illegible]

關元一穴一名次門在臍下三寸小腸之募足太陰少陰厥陰三陰任
脈之會下紀者關元也鍼八分留三呼瀉五吸灸百壯止三百壯明
堂云若懷胎不針若針而落胎胎多不出而針外崑崙立出灸亦
良然不及針日三十壯下經云五壯[illegible]是謂婦人[illegible]宜灸

○明堂經云在臍下三寸臍中主貫臍奔豚氣入小腹時欲嘔溺血
小便黃腹泄不止卒疝小腹痛轉胞不得小便○西方子云主臍下
疞痛小便赤澀不覺遺瀝小便處痛狀如散火溺血色臍下結血
狀如覆杯婦人帶下因產惡露不止斷緒產道冷[illegible]臍下小腹熱
而偏痛寒氣入腹[illegible]臍下三十六疾不得小便及腸中尿血閉
轉胞氣淋又主小便數[illegible]泄利不止小腹滿石水及賁豚氣入小腹暴
疝痛身熱頭痛進退往來○銅人經云又治婦人帶下瘕聚月經
[illegible]下經云[illegible]常法
資生經云關元乃丹田也諸經不言惟難經疏云丹田在臍下三
寸方圓四寸著脊梁兩腎間中央赤是也左青右白上黃下黑三
寸法三光四寸法四時五色法五行兩腎間名大海而貯其血氣
亦名大中極言人身之上下四向最為中也今醫家欲令人灸者皆從
此穴多者千餘壯少亦三二百壯不知全活者幾何人然亦宜頻
灸故曰若要安丹田三里不曾乾

中極一穴一名玉泉一名氣原在關元下一寸鍼八分留十呼得氣即
瀉灸百壯至三百壯○明堂經云主婦人斷緒四度針即有子[illegible]
有子故[illegible]針[illegible]不可[illegible]日三七壯下經云五壯○又云在臍
下四寸[illegible]中灸五壯主尸厥不知人[illegible]積聚時上衝心[illegible]
食小腹痛堅硬如石小便不利失精絕子面黑也○西方子云
主五淋小便赤[illegible]臍下結塊如覆杯婦人因產惡露不止遂成
疝瘕或月事不調血結成塊[illegible]尿不下乳餘疾絕子陰
癢[illegible]子門不端小腹苦寒陰癢而痛[illegible]經閉不通不得[illegible]便不
利[illegible]銅人經云膀胱之募足三陰任脈
之會[illegible]

曲骨一穴在橫骨上毛際陷中灸七壯至七七壯鍼二寸明堂下經云
橫骨主中極下一寸[illegible]千金云臍下五寸○明堂經云主五
淋小便黃水病[illegible]小便澀[illegible]不足
虛乏冷極者皆宜灸之○西方子云又名屈骨主小便脹痛難小便
難主癲疝小腹痛婦人赤白帶下○銅人經云動脈在毛際足厥陰
之會[illegible]小便淋澀不通灸同鍼一二寸

會陰一穴一名屏翳在兩陰間任脈別絡俠督脈衝脈之會灸三壯○
两方子云在大便前小便後兩陰間主陰頭寒主痔與陰相通者死
陰中諸病前後相引痛不得大小便女子經不通男子陰端寒衝心
很很○銅人經云治小便難竅中熱皮疼痛穀道搔痒

腹第二行左右二十二穴

幽門二穴俠巨闕兩旁各五分灸五壯鍼五分明堂云在巨闕旁各
一寸半前中千金翼云俠巨闕各一寸○明堂經云一名上門○
銅人經云衝脈足少陰之會治胸中引痛心下煩悶逆氣裏急支滿
不嗜食數欬健忘泄利膿血目赤痛女子心痛
逆氣善吐食飲不下兆氣○西方子云在巨闕旁半寸陷中
資生經云銅人載幽門夾巨闕兩旁各五分相去一寸明
堂乃云幽門在巨闕旁一寸半屯夾上管旁相去二寸按千金
四滿以下諸穴在丹田兩旁之分一寸至是明堂分始知銅人誤
云
通谷二穴在幽門下一寸鍼五分灸五壯○明堂經云夾上管兩旁相
去三寸下經云灸三壯○又云在幽門下一寸陷者中灸三壯主失
欠口喎食暴啞不能言也○西方子云主頸痛寒熱汗出不思寒
主項知强不可左右顧目眩䀮䀮不明風寒鼻衄病鼻出又結積留
飲胸滿食不化善嘔心中憒憒數欠心下悸咽中澹澹恐怯
食飲善嘔○銅人經云衝脈足少陰之會主乾嘔又無所出又治暴瘖
食數嘔結
陰都二穴一名食宮在通谷下一寸灸三壯鍼三分○銅人經云衝脈
足少陰之會治身寒熱瘧病心下煩滿氣逆○西方子云主多唾嘔
吐大便難及婦人無子藏有惡血腹厥痛絞刺不可忍及腸鳴○明
堂經云在通谷下一寸陷者中主瘖瘂病心煩悶
石關二穴在陰都下一寸灸三壯鍼一寸○明堂經云在陰都下一寸
完完中主多唾嘔沫大便難婦人無子藏有惡血腹厥肉痛
絞刺不可忍者○西方子云又名石門灸五壯主脊強不開大便閉塞
氣結心堅滿及脊痛反折○銅人經云衝脈足少陰之會療婦人惡血
上衝腹中刺痛不可忍灸三壯鍼一分
商曲二穴在石關下一寸灸五壯鍼一寸○銅人經云衝脈足少陰之
會治腹中積聚腹中切痛不嗜食
肓兪二穴在商曲下一寸臍旁各五分灸五壯鍼一寸○銅人經云衝
脈足少陰之會治大便乾燥腹中切痛又寒疝腹痛熱可灸五壯針入一寸
中注二穴在肓兪下一寸灸五壯鍼一寸○銅人經云衝脈足少陰之

會，治小腹有熱，大便堅燥不利。○西方子云：在肓俞下五分。

四滿二穴，一名髓府，在中注下一寸，針三分，灸三壯。[illegible] 銅人經云：衝脈足少陰之會，治臍下積聚疝瘕，腸澼切痛，積聚大腹石水，腹切切痛，[illegible]上下。○西方子云：主婦人藏中惡血，內逆滿痛，疝及諸血病痛。

氣穴二穴，一名胞門，一名子戶，在四滿下一寸，灸五壯，針三分。○銅人經云：衝脈足少陰之會，治月事不調，泄利不止，奔豚氣上下引腰脊痛。○西方子云：在關元左邊二寸是，右二寸名子戶，主月水不通。

大赫二穴，一名陰維，一名陰關，在氣穴下一寸，灸五壯，針三分。○銅人經云：衝脈足少陰之會，治男子虛勞失精，陰上縮，莖中痛，灸三十五壯，女子赤[illegible]。

橫骨二穴，在大赫下一寸，灸三壯。[illegible] ○西方子云：一名曲骨，主失精，五藏虛竭，腹脹，小便難。[illegible] ○銅人經云：此穴諸經闕療病法。

以上二十二穴去腹中行當開一寸半，見幽門。

不容二穴，在幽門兩旁各一寸半，灸五壯，針五分。○明堂經云：在上管兩旁各一寸，灸三壯。[illegible] ○又云：主腹內弦急，不得食，腹痛如刀刺，兩脇積氣膨膨然。○西方子云：去任脈二寸，直兩肋端，併去血寸，主嘔吐，背相引痛，唾吐喘，欬，口乾，痰癖，脇下痛重，肋疝瘕。○銅人經云：足陽明脈氣所發，治腹滿痃癖，不嗜食，腹滿鳴。[illegible] ○甲乙經云：[illegible]

承滿二穴，在不容下一寸，針三分，灸五壯。明堂經云：三壯。千金云：夾巨闕兩旁各一寸半。○銅人經云：足陽明脈氣所發，治腸鳴腹脹，上喘氣逆，飲食不下，肩息唾血，可灸五壯，針三分。○西方子云：主脇下堅痛。

梁門二穴，在承滿下一寸，灸五壯，針三分。[illegible]

關門二穴，在梁門下一寸，針八分，灸五壯。○銅人經云：足陽明脈氣所發，治身腫，善滿積氣，腸鳴卒痛，泄利，不欲食，腹中氣遊走，挾臍急，痃瘧振寒。

太乙二穴，在關門下一寸，灸五壯，針八分。○銅人經云：足陽明脈氣所發，治癲疾狂走，心煩悶，吐舌。

滑肉門二穴，在太乙下一寸，灸五壯，針八分。[illegible] ○銅人經云：足陽明脈氣所發，治癲疾狂，嘔吐，舌強。

天樞二穴，一名長谿，一名谷門，大腸之募，云在肓俞旁一寸半，又云夾臍旁各二寸。[illegible] 灸五壯，針五分，留十呼。[illegible] ○銅人經云：足陽明脈氣所發，治奔豚泄利，繞臍切痛，時上衝心，煩滿嘔吐，霍亂，冬月感寒泄利[illegible]血，留七呼。○西方子云：一名長谿，主久積冷氣，繞臍切痛，女子漏下赤白，月水不通，及面色黃，主冬月重感於寒則泄，臍腹腸胃間遊氣，面浮腫，唾血吐血，熱甚狂言語。

外陵二穴在天樞下一寸灸五壯鍼三分〇西方子云在天樞下半寸
灸五壯主腹中盡痛心如懸下引臍腹痛〇銅人經云足陽明脉氣
所發
大巨二穴在長溪下二寸灸五壯鍼五分[illegible]〇銅
人經云足陽明脉氣所發治少腹脹滿煩渴[illegible]偏枯四肢不舉〇
西方子云主小便難[illegible]下[illegible]善驚
水道二穴在大巨下三寸灸五壯鍼三寸半〇西方子云主三焦結熱
大小便不利腎[illegible]痛小腹脹滿背強急[illegible]〇銅人經
云足陽明脉氣所發[illegible]寸五分
歸來二穴在水道下二寸灸五壯鍼八分[illegible]
〇銅人經云治小腹賁豚卵縮上入引莖中痛婦人血藏積冷
氣衝二穴一名氣街在歸來下一寸[illegible]鼠鼷上一寸動脉應手宛宛中灸
七壯[illegible]
[illegible]鼠鼷上一寸[illegible]明堂經云[illegible]
三壯主腹滿大氣[illegible]
〇西方子云[illegible]
不可[illegible]
[illegible]心[illegible]腹脹[illegible]
[illegible]不出[illegible]
云足陽明脉氣[illegible]腸中大熱[illegible]
熨腹中痛
以上二十四穴在腹中行[illegible]各三寸

腹第四行左右十四穴



期門二穴肝之募在不容旁一寸半直兩乳第二肋端針四分灸五壯
千金云直兩乳下第二肋端旁一寸半又云乳直下一寸半〇銅人經云足太陰厥陰陰維之
會治胸中煩熱賁豚上下目青而嘔霍亂洩利腸堅硬大喘不得安
臥脇下積氣女子産餘疾食飲不下胸脇支滿心中切痛善噫若傷
寒過經不解當鍼期門使經不傳〇西方子云主脇下腹心痛氣短
善噫酸腹大堅不得息脹痺滿少腹尤大及小腹滿小便難陰下縱
傷食腹滿

日月

日月二穴膽之募在期門下五分陷中灸五壯鍼五分 千金一名神光〇
明堂經云主悲不樂欲走多唾言語不正及四肢不收〇銅人經云
足太陰少陽陽維之會治太息善悲小腹熱可灸五壯鍼入七分

腹哀

腹哀二穴在日月下一寸半鍼三分〇銅人經云在日月下一寸三分
足太陰陰維之會治大便膿血寒中食不化腹中痛〇西方子云
此穴不灸

大橫

大橫二穴在腹哀下三寸半直臍旁灸三壯針七分〇銅人經云足太
陰陰維之會治大風[illegible]逆氣多寒善悲可灸五壯〇西方子云在腹哀

下二寸主腹熱欲走太息四肢不可動多汗洞利
資生經云肓俞去臍旁各一寸半天樞去臍旁各一寸大横去臍旁
四寸半其去章門合為六寸雖經無文乃石章門在臍上二寸兩旁
九寸為可疑焉耳

腹結二穴一名腸窟又名腸結在大横下三分針七分灸五壯　銅人經
云治繞臍痛上衝搶心欬逆泄利救逆○四方手云在大横下二寸
三分

府舍二穴在腹結下三寸足太陰厥陰陰維之交會此三脈上下三入
腹絡肝脾結心肺從脅上至肩此太陰郄三陰陽明之別鍼七分灸
五壯○銅人經云治疝瘕髀中急疼循脅上下搶心腹滿積聚厥氣
霍亂

衝門二穴一名慈宮上去大横五寸府舍下横骨兩端約中動脈鍼七
分灸五壯○銅人經云足太陰厥陰之會治腹寒氣滿積聚疼痛淫
濼陰疝難乳子上衝心不得息
[illegible]四[illegible]去腹中行各寸為四寸半

側脅左右十二穴



章門二穴一名長平一名脅髎脾之募在大横外直臍季肋端側臥屈
上足伸下足舉臂取之針六分灸百壯明堂云日七壯止五百壯
[illegible]○銅人經云足厥陰少陰之會
治腸鳴盈盈然食不化脅痛不得臥煩熱口乾不嗜食胸脅支滿
喘息心痛腰不得轉側傷飽身黃羸瘦賁豚腹腫脊強四肢懈惰善
恐少氣厥逆肩臂不舉忌如常法○又云一名脇髎主腸鳴氣痞右
積氣膀胱氣病寒當臍痛聚氣針入六分灸亦良○明堂經云灸
七壯主腰背冷痛腹中腸鳴兩脇積氣如卵石也○西方子云主
欬逆吐食咽嗜食入腹還出熱中苦吞而聞食臭中洞泄不化灼
為[illegible]

京門二穴一名氣俞一名氣府腎之募在監骨腰中季脇本俠脊灸三
壯針三分留七呼○銅人經云治腰痛不得俛仰寒熱䐜脹引背不
得息水道不利溺黃小腹急腫腸鳴洞泄髀樞引痛○西方子云
主肩背寒痓肩甲內廉痛脊強

帶脈二穴在季脇下一寸八分陷中鍼六分灸五壯○明堂下
經云七壯[illegible]○又云主兩脇下氣轉運[illegible]
[illegible]
忍也○銅人經云治婦人少腹堅痛月脈不調帶下赤白裏急瘈瘲

五樞二穴在帶脈下三寸一云在水道旁一寸五分陷中針一寸灸五
壯明堂下經云三壯○銅人經云治男子寒疝陰卵上入小腹痛○
明堂經云在帶脈下三寸又主膀胱氣攻兩脇也○西方子云在水
道下一寸半主婦人赤白裏急瘈瘲

維道二穴在章門下五寸三分針八分灸三壯○銅人經云足少陽帶脈之會
治嘔逆不止三焦不調水腫不嗜食及欬逆不止

居髎二穴在章門下八寸三分監骨上陷中灸三壯針八分○銅人經
云在章門下一寸三分陽蹻足少陽之會治腰引少腹痛肩引胸臂
攣急手臂不得舉而至肩

腋堂二穴在腋下二寸三寸陷中舉臂取之灸五壯○明堂下經有腋堂
穴主胸脇氣滿喘息咳嗽逆目黃遠視[illegible]

普濟方卷之二百五十九

普濟方卷之四百十二目録

鍼灸門

腧穴圖

手太陰
少商　魚際　太淵　經渠　列缺
孔最　尺澤　俠白　天府

手陽明
商陽　二間　三間　合谷　陽谿
偏歷　溫溜　下廉　上廉　三里
曲池　肘髎　五里　臂臑一名頭衝

手少陰
少衝　少府　神門　陰郄　通里
靈道　少海　青靈　極泉

手太陽
少澤　前谷　後谿　腕骨　陽谷
養老　支正　小海

手厥陰
中衝　勞宮　大陵　內關　間使
郄門　曲澤　天泉

手少陽
關衝　液門　中渚　陽池　外關
支溝　會宗　三陽絡　四瀆　天井
清冷淵　消濼

足厥陰
大敦　行間　太衝　中封　蠡溝
中都　膝關　曲泉　陰包　五里
陰廉

足少陽
竅陰　俠谿　地五會　臨泣　丘墟
懸鍾　陽輔　光明　外丘　陽交
陽陵泉　陽關　中瀆　風市

足太陰
隱白　大都　太白　公孫　商丘
三陰交　漏谷　地機　陰陵泉　血海
箕門

足陽明
厲兌　內庭　陷谷　衝陽
解谿　豐隆　下廉　條口　上廉
三里　犢鼻　梁丘　陰市　伏兎
髀關

足少陰
湧泉　然谷　太谿　大鍾　水泉
照海　復溜　交信　築賓　陰谷

足太陽
至陰　通谷　束骨　京骨　申脈
金門　僕參　崑崙　付陽　飛陽
承山　承筋　合陽　委中　委陽
浮郄　殷門　扶承　呂細

崔丞相灸骨蒸腧穴法

量同身寸法第一
騎竹馬法　竹馬法　伸指量寸法圖
量伸臂法第二
揣顯骨定穴高下法第三
量臍心法　量命門至上天柱法
定穴相去遠近法第四
又註大小樣式

鉤臥痰火取手法第五
象陰穴法第六
坐點坐灸法第七
石用之取穴引法第八
葉春亭取穴別法第九
葉元善取穴法圖　葉其上鉤手曲肘取穴法
僧仲聞取穴前法圖　僧仲聞取穴後法圖
灸說補瀉法第十

○明堂應驗小兒灸穴圖　論一道

正人形第一
頂上旋毛中　髮際　人中　手大指次指間
臍上臍下　中脘
正人形第二
囟門　巨闕　屈肘横文中　勞宮
手少陰　曲泉
正人形第三
鼻上入髮際三分　兩乳前　合谷　臍下
尾翳　分水　手中指節　肺俞　心俞
正人形第四
臨命　胸對臍骨節間
正人形第五
前頂　率谷　中庭　中脘
手大指內廉横文頭　足大指次指端
正人形第六
顖會　天突　鳩尾上　鳩尾　僕參
內踝後
背人形第一
百會　承漿　頰車　譩譆　九椎上
背人形第二
心俞　接脊　鄣尾骨　龜尾
背人形第二
大杼　脊中俞　九椎下節間　陽關
囊後十字文
全嬰方灸法

普濟方卷之四百六十目錄終

普濟方卷之一百六十

鍼灸門

腧穴圖

手太陰肺經左右十八穴

少商二穴木也在手大指端内側去爪甲角如韭葉[illegible]以三稜針刺之微出血洩諸臟熱湊不宜灸昔成君綽忽腮頷腫大如升喉中閉塞水粒不下甄權針之立愈○明堂經云針一分留三呼瀉五吸宜針不宜灸以三稜針刺之令血出勝氣針所以勝其針者此脉胝腿之候腹中有氣人不能食故刺出血以宣諸臟脉也忌冷熱食下經云灸三壯(甲乙經作一壯)○銅人經云手太陽之脉所出也為井治煩心善噦心下滿汗出而寒欬逆痎瘧振寒腹滿唾沫唇乾引飲不下膨膨手攣指痛寒慄鼓頷喉中鳴○又云主不能食腹中氣滿喫食無味○西方子云主嘔吐手不仁振慄欬逆噦及主臍下脹耳前痛

魚際二穴火也在手大指本節後内側散脉中針一分留二呼素問註二分灸三壯○銅人經云手太陰脉之所流也為滎治酒病惡風寒虛熱舌上黄身熱頭痛欬嗽汗不出痺走胸背痛不得息目眩煩心少氣腹痛不下食肘攣支滿喉中乾燥寒慄鼓頷欬引尻痛溺出嘔血心痺悲恐針入二分留三呼○又云主虛熱洒洒毛竪惡風寒喘

痺少氣不足以息欬痺喉中乾燥上氣熱病振慄[illegible]色不變肘心痛滿中虛食飲嘔身熱汗出上氣吐血目眩短氣遺溺傷胃氣逆也　西方子云主胃逆霍亂嘔吐血又主痓逆寒失瘖不能言及狂言

太淵二穴土也在手掌後陷中灸三壯針一分素問云主二分○明堂下經云太泉在手中掌後横文頭陷中灸五壯[illegible]○又云主胸中滿痛不得卧肺脹滿膨膨然目中白翳掌中熱胃氣上逆唾血及狂言掛中痛○銅人經云主胸痺逆氣寒厥善噦嘔飲水欬嗽煩悶不得眠肺脹滿膨膨臂内廉痛目生白翳眼赤筋缺盆中引痛掌中熱數欠喘不得息噫氣上逆心痛唾血振寒咽乾狂言口噼○又云手太陰脉之所注也

銅人曰太淵明堂太泉穴是二穴也千金方註云太泉即太淵避唐祖名改之於是書之以示世醫云[illegible]

經渠二穴金也在寸口陷中針二分留三呼禁灸灸傷神

銅人經云手太陰脉之所行也為經治瘧寒熱胸背拘急胸滿膨膨臂痛喉痺掌中熱欬逆上氣數欠及熱病汗不出暴痺喘逆心痛欬嘔吐鍼三分○西方子云此穴不可灸

列缺二穴在腕側上一寸半[illegible]以手交叉頭指末兩筋兩骨罅中鍼二分留三呼瀉五吸灸七壯明堂經云針三分日灸七壯若患偏風灸至百壯若患腕勞灸七七壯下經云三壯素問云腕上一寸半○明堂經云在腕上一寸兩骨罅間宛宛中灸三壯主偏風半身不遂口喎眼斜肘臂痛及瘧寒面色不定○銅人經云手太陰絡別走陽明療偏風口喎手腕無力半身不遂欬嗽掌中熱口噤不開寒瘧嘔沫善笑縱唇口健忘針二分留三呼瀉五吸可灸七壯慎風熱生冷物事　西方子云主汗出四肢腫小便熱痛主手臂身熱肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀實則肩背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息口張欬善笑身濕瀉時時寒主熱癇驚妄有所見主熱病煩心心悶先手臂身熱瘈瘲唇口聚沫張目汗出如珠實熱掌中熱主瘧寒熱欬及復腫脈欬不止及瘧甚熱口噤不開

孔最二穴在腕上七寸 手太陰郄 主熱病汗不出此穴可灸
三壯汗即出 主欬逆臂厥痛 針三分灸五壯 又云灸三壯 明堂經云
主肘臂厥痛屈伸難手不及頭不握也 銅人經云手太陰郄治吐
血失音咽腫痛惡血

尺澤二穴水也在肘中約上動脈中針三分灸五壯 明堂經云肘中
約上兩筋動脈中 甄權云在臂屈伸橫文中筋骨罅陷中不宜灸
主瘈瘲病不可向手臂不得上頭 素問刺禁云刺肘中内陷氣歸之爲
不屈伸 注云肘中謂肘屈折之中尺澤穴中也 刺過陷脉惡氣歸之
氣固關節故不屈伸也 ○銅人經云手
太陰脉之所入也爲合 治風痺肘攣手臂不得舉 喉痺上氣口
乾 欬嗽唾濁 四肢暴腫 臂寒短氣 西方子云灸三壯 小兒慢驚灸
一壯 又治乾嘔 主心煩 脹滿 主上氣 下上出兩脇下痛 主
欬逆上氣 咳多唾濁沫 嘔血 主脊痛手不可伸 主肘臂痛 寒肩背
寒瘧 肩中内廉痛 喜悲 不得手類 心身痛 四肢暴腫
銅人經云灸五壯 明堂乃云不宜灸三壯 不可向手臂不得上
頭 甄權曰不宜灸 灸力曰主瘈瘲病是又可灸也 此必有說 且從銅人
灸五壯 明堂亦云 禁穴許灸一壯至三壯故也

俠白二穴在天府下去肘五寸動脉中針三分灸五壯 西方子云主
欬乾嘔煩滿 主心痛氣短

天府二穴在腋下三寸動脉中 以鼻取之 禁灸 使人逆氣 今
附刺鼻衄血不止 針四分留三呼 又云針四分留七呼 灸二七壯 不
除至百壯 出明堂經 甲乙經禁灸 銅人經云治逆氣喘不得息
目眩遠視睆睆 卒中惡鬼疰 不得安臥 禁不可灸 ○又云手太陰脉
氣所發 主頭眩目瞑 西方子云灸五壯 主身脹逆息不得臥 風汗
身腫 喘息多唾 主上氣喘不得息 主喘逆上氣呼吸多唾不知食味
卒中惡風邪氣 飛尸惡疰 鬼語遁尸 瘻病 瘤癭 風腫 泣出 喜忘
甲乙經銅人經皆云禁灸 明堂乃云灸一七壯至百壯 亦非
不用灸 要非大急不可灸

手陽明大腸經左右二十八穴

商陽二穴金也 一名絶陽 在手大指次指内側去爪甲角如韭葉 灸三
壯 針一分留一呼 ○銅人經云手陽明脉之所出也爲井 治胸中氣
滿 喘欬支腫 熱病汗不出 耳鳴耳聾 寒熱痎瘧 口乾 頤頷腫 齒痛
惡寒 肩背急相引缺盆痛 目青盲 可灸三壯 右取左 左取右 如頃
食立已 ○西方子云及主胸中滿

二間二穴水也 一名間谷 在手大指次指本節前内側陷中 針三分灸
三壯 ○銅人經云手陽明脉之所流也爲滎 治喉痺 頷腫 肩背痛 振
寒 鼻鼽衄血 多驚 口喎 ○又云主多臥善睡 肩髃痛 喉痺咽如哽物
傷寒振寒及傷寒寒熱

三間二穴木也 一名少谷 在手大指次指本節後内側陷中 針三分留
三呼 灸三壯 銅人經云手陽明脉之所注也爲俞 主喉痺咽如哽
齒齲痛 多臥善睡 胸滿腸鳴 洞泄 寒熱 唇焦口乾 身熱喘息 目眥急
痛 腸鳴洞泄 又云針入三分 西方子云主目上插 頭熱 鼻鼽
衄血 吐舌戾頸 善驚 氣熱 瘧病

合谷二穴 一名虎口 在手大指次指岐骨間陷中 手陽明脉之所過也 手大指兩骨罅中 針

三分留三呼灸三壯今附若婦人姙娠不可刺之損胎氣針
□□明堂經云主痎瘧寒熱頸病汗不出目不明生
白膚皮膚搔痛偏身風疹○銅人經云手陽少脉之所過也爲
原臍鼻衄齲頸痛齒齲喉痺疼臂面腫唇吻不收瘖不能言
口噤不開○西方子云主風頭熱鼻鼽衄出

陽谿一穴火也一名中魁在腕中上側兩筋間陷中針三分留七
呼灸三壯○銅人經云手陽明脉之所行也爲經治狂言喜笑
見鬼熱病煩心目風赤爛有翳厥逆頭痛胸滿不得息寒熱
瘧疾喉痺耳鳴齒痛驚掣肘臂不舉痂疥可灸三壯□如前
法○西方子明堂經云主目痛耳痛高聾而如鼓吐舌戾頸妄
言心悶汗不出掌中熱心痛身熱浸淫煩滿及主舌本痛

温溜二穴一名逆注一名池頭在腕後大士三寸小士六寸針三分
灸三壯○明堂經云在腕後五寸六寸間動脉中是穴主腸鳴
頭疼善歎如癲不暴癲癇病吐舌鼓頷狂言及喉痺不能言
○銅人經云一名蛇頭在腕後大士五寸小士六寸手陽明郄治口□
腸鳴頭痛傷寒身熱喉痛氣逆肩不得舉癲疾吐舌狂言見
鬼喉痺面虛腫○西方子云在腕後小士五寸大士六寸主狂仆
瘡面赤腫

下廉二穴在輔骨下去上廉一寸輔兌肉其分外斜針五分留二呼
灸三壯○銅人經云治頭風臂肘痛溺黃針入五分留五呼○
西方子云主腸鳴相追逐灸五壯
資生經云此有下廉是陽明亦有下廉蓋在足者乃下巨
虛也

上廉二穴在三里下一寸其分獨抵陽明之會外斜針五分灸五壯○
銅人經云治風頭痛小便難黃赤腸鳴氣走疰痛此有上廉
足陽明亦有上廉蓋在足者乃上巨虛也

三里二穴在曲池下三寸□□□按之肉起兌肉之端灸三壯針□
分○明堂經云一名手三里在曲池下二寸主肘臂痠重屈伸難
○資生經云主五勞虛乏四肢羸瘦○銅人經云主手臂不仁肘攣
不伸齒痛頰頷腫瘰癧
資生經云三里有二有手三里有足三里此手三里也故明堂云
一名手三里是也銅人云三里在曲池下三寸明堂乃云二
寸在手陽明穴亦云二寸恐銅人本誤二字作三字也

偏歷二穴手陽明絡在腕後三寸別走太陰針三分留七呼灸三壯明
堂下□五壯○銅人經云治寒熱瘧風汗不出目視𥉂𥉂瘨
疾多言耳鳴口喎齒齲喉痺嗌乾鼻衄□血針入三分○明
堂經云在腕後三寸留者中灸五壯主瘧久不愈多不天頭
臂髆肘腕疼痛難屈伸

曲池二穴土也在肘外輔骨屈肘曲骨中以手拱胸取之針七分
得氣先瀉後補之灸大良可三壯明堂云曲也木也在肘外輔骨
肉肘橫文頭陷中注云屈肘之日灸七壯至二百壯且停十餘日更下
火至二百壯罷忌同下經云在肘外輔屈肘曲骨中紋頭盡
間注肘外輔屈肘兩骨中千金云肘外曲頭陷中○
明堂經云主肘中痛屈伸難手不得舉偏風半身不遂捉物不
得提手不開肘臂偏細□衣組明堂云主大人小兒遍身風疹皮
膚痂疥也○銅人經云手陽明脉之所入也爲合治傷寒
不發言胸中煩滿筋緩肘風瘡疥痛及傷寒餘熱不盡皮
膚乾燥○□□□□□□□□□西方子云主耳痛風臂
肘細而無力及耳痛手不可舉重腕急○肘節痺痠重腋急痛
外側痛腕如拔肩重痛不舉兼瘧時時寒瘧寒熱身

肘髎二穴在肘大骨外廉陷中灸三壯針三分○明堂經云一作肘聊
主肘臂痠重麻痺不仁灸五壯○銅人經云主肘節風痺臂痛
不可舉屈伸攣急灸三壯○西方子云灸三壯

五里二穴在肘上三寸行向裏大脉中央灸十壯禁針素問氣穴論
云大禁二十五在天府下五寸注云謂五里穴也謂之大禁者禁不
可刺也又曰五里者尺澤之後五里與此定同○銅人經云治風勞
驚恐吐血肘臂痛嗜臥四肢不得動搖寒熱瘰癧欬嗽目視𥉂𥉂
痎瘧心下脹滿而痛上氣
資生經云五里有二其一在足厥陰肝經部與此穴爲二此當爲
手五里也素問所謂在天府下者指此五里也注云尺澤

之後五里猶亦猶此五里也尺澤穴在手太陰是也

臂臑二穴在肘上七寸䐃肉端手陽明絡灸三壯針三分明堂云在肩髃下一夫兩筋間兩骨罅陷宛宛中平手取之不得拏手令急其穴即閉宜灸不宜針日七壯至百壯若針不得過三五過多恐忌同千金名頭衝一作頸衝〇銅人經云治寒熱頸項拘急瘰癧肩背痛不得舉〇又云療勞瘵臂細無力手不得向頭

手少陰心經左右十八穴

少衝二穴木也一名經始在小指內廉端去爪甲角如韭葉針一分灸三壯明堂云灸一壯）又云灸三壯主煩心上氣卒心痛悲恐畏人善驚善言手攣不得伸掌中熱痛也千金承扶明堂云熱主驚病吐舌涕出也千金揚女孫同）銅人經云手少陰脈之所出也為井治熱病煩滿上氣少氣胸中痛口中熱咽中酸乍寒乍熱手攣不伸掌痛引肘腋痛〇西方子云主熱病心悶而汗不出及主身熱如火浸漬煩滿舌本痛咽酸太息

少府二穴火也在手小指本節後陷中直勞宮針二分灸七壯明云三壯〇銅人經云手少陰脈之所溜也為榮治煩滿少氣悲恐畏人臂痠掌中熱肘腋攣急胸中痛手攣不得伸〇西方子云在手小指次節後陷者中直勞宮主嗌中有氣如息肉狀主小便不利癃主數噫恐悸氣不足主陰挺實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴[illegible]〕明堂云主[illegible]久不息

神門二穴土也一名兌衝在掌後兌骨端陷中灸七壯炷如小麥針三分留七呼〇銅人經云手少陰脈之所注也為腧治瘧心煩甚欲得飲冷惡寒則欲處溫中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸少氣不足手臂寒喘逆身熱狂悲笑嘔血吐血上氣遺溺大人小兒五癇〇西方子云主[illegible]手攣掌中主喉痺

陰郄二穴在掌後脈中去腕五分針三分灸七壯〇銅人經云治失瘖不能言洒淅振寒厥逆心痛霍亂胸中滿衄血驚恐心〕〇西方子云在手後動脈中主鼻衄驚

通里二穴在腕後一寸陷中針三分灸三壯〕明堂云灸七壯主頭目眩痛熱病先不樂人肘腕痠重及暴瘖不能言語〕銅人經云主熱病卒心中懊憹數欠頻伸悲恐目眩頭痛面赤而熱心悸肘臂臑痛實則支滿虛則不能言苦嘔喉痺少氣遺溺〕西方子云主熱病先不樂數日煩心

靈道二穴金也去掌後一寸半或一寸灸三壯針三分〕銅人經云手少陰脈之所行也為經治心痛悲恐相引瘈瘲肘攣暴瘖不能言

少海二穴水也一名曲節在肘內廉節後又云肘內大骨外去肘端五

分屈肘得之針三分灸三壯甄權云屈手向頭取之治齒痛腦風頭
痛不宜灸針五分○明云在肘内橫紋頭屈手向頭取之治耆死咒
中○甲乙經云穴在肘内廉節後陷中動脈手針二分留三呼瀉五
吸不宜灸下經云灸五壯素註云五壯○銅人經云手少陰脉之所
入也爲合治寒熱齒齲痛目眩發狂嘔吐涎沫項不得回顧肘攣腋
脇下痛四肢不得舉○又云麻腹下廉虛痺痛屈伸不得風痺床痛
痛○西方子云主頸痛寒出寒熱不惡寒又主肩臂不舉不能帶衣
項強痛不可以顧氣逆呼吸噫喘癲疾口中吐舌沫出羊
鳴戾頸主手青主虛振寒項痛引肘腋痛引少腹中及目黃脇痛
銅人經云灸三壯明堂下經素問註皆云灸五壯上經甄權皆云
不宜灸亦可鍼矣非大急亦不必灸

青靈二穴在肘上三寸伸肘舉臂取之灸七壯○明堂下經云灸三
壯○銅人經云目黃脅臂不舉不能帶衣頭痛振寒目脇痛

極泉二穴在腋下筋間動脉入胸灸七壯針三分○銅人經云治心
痛乾嘔四肢不收咽乾煩渴臂肘厥冷目黃脇下滿痛

手太陽小腸經左右十六穴

少澤二穴金也一名小吉在手小指端外側去爪甲下一分陷中灸一
壯針一分○銅人經云一名少吉手太陽脉之所出爲井也主瘧寒
熱汗不出喉痺舌強口乾心煩臂痛瘈瘲頸項急不可顧
目生膚翳覆瞳子○西方子云主口熱口乾咽中乾口中熱唾如膠
主振寒小指不用

前谷二穴水也在手小指外側本節前陷中針一分灸一壯明堂云灸
三壯○銅人經云手太陽脉之所流也爲滎治熱病汗不出痎瘧癲疾
耳鳴目翳鼻塞喉痺頰腫項痛臂不舉不可俯仰臂不得舉○
又云主目眩淫濼臂中小指痛○西方子云主目泣出急痛及咽偏
腫不可以回頭臂重痛肘攣痂疥寒熱目上臂小便赤

後谿二穴木也在手小指外側本節後陷中灸一壯針一分○明堂經
云在手外側腕前起骨下陷中灸三壯主瘧寒熱目生白膜肘臂
腕重難屈伸五指盡痛不可掌○銅人經云手太陽脉之所注也
爲輸治目赤生翳耳聾胸滿頸項強不得回顧癲疾臂肘攣急○
西方子云主目爲出淚有耳鳴鼻塞喘息不通肩臑痛臂

肘掌上風身寒足出而驚熱病汗不出身熱目足

腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中灸三壯針二分留三呼銅人經
云手太陽脉之所過也爲原治熱病汗不出脇下痛不得息頸頷腫
寒熱耳鳴目冷淚生翳狂惕偏枯臂肘不得屈伸痎瘧頭痛煩悶驚風
瘈瘲五指掣不可屈伸○西方子云主狂項痛不可顧目泣出頸痛
引耳耳嘈嘈無所聞肘節痺臂痠重腋急脅腋急外側痛如拔頸痛
狂言胸痛痎瘧寒熱

陽谷二穴火也在手外側腕中兌骨下陷中灸三壯針二分留二
呼○銅人經云手太陽脉之所行爲經也主癲疾狂走熱病汗不出
脇痛頸頷腫寒熱耳聾耳鳴上下牙齒齲痛臂腕外側痛不舉及
頸痛舌強口不得左右顧戾項目眩痛○西方子云主項強急
痛目痛亦頸痛引耳嘈嘈無所聞目肘痛時寒熱病頷
臑痛腰痿不覺寒瘧熱瘧主笑若狂痔痛腋下腫

養老二穴在手踝骨上空一寸陷中灸三壯針三分○銅人經云手太
陽郄主肩欲折臂如拔手不能自上下目視不明

支正二穴在腕後五寸別走少陰灸三壯針三分○明堂云在手太
陽腕後五寸去爪也入可寸陷中灸五壯主驚心悲怒肘臂攣難
屈伸手不握十指盡痛也秦承祖云義治五勞四肢力弱虛乏等病
○銅人經云治風熱頸腫肘攣頭痛目眩風虛驚恐狂惕生疣
目○西方子云主頭腫項痛不可顧狂言熱病先振慄度喜渴飲欲
食身熱頭痛而強振寒寒熱
小海二穴土也在肘內大骨外去肘端五分陷中甄權云屈手向頭取
之灸三壯針二分○銅人經云手太陽脈之所入也為合治寒熱齒齦
腫風眩頸項痛瘍腫振寒肘腋腫痛四肢不舉○西方
子云灸五壯主頸腫急首不可以顧肩髃發癎羊癎狂走不得臥心中煩
癲疾耳聾肩背痛振寒又風疾痛熱不得寒

手厥陰心主脈左右十六穴

中衝二穴木也在手中指端去爪甲如韭葉陷中針一分○明堂云灸
一壯主熱病煩心心悶而汗不出身熱如火頭痛如破項痛舌本痛
秦承祖云義主神氣不足失志也○銅人經云手厥陰心主脈
之所出也為井○西方子云主肘中痛掌中熱心痛漫
勞宮二穴火也一名五里在掌中央橫文動脈中屈無名指著
處是灸三壯○明堂經云針二分得氣即瀉只一度針過兩度
令人虛不得灸灸令人息肉日加忌同素注云灸三壯
人經云手厥陰脈之所流也為滎治中風善悲笑不休手
痺熱病三日汗不出怵惕胸脇痛不可轉側大小便血衄血不
止氣逆嘔噦煩渴食飲不下大小人口中腥臭[illegible]胸脇支滿黃疸
目黃○又云主手掌皮痺手痺向前起○西方子云主
喉痹[illegible]主嘔吐主風熱心中悲喜思慕歔欷喜笑不止及口中
[illegible]舌中熱主熱痔欬[illegible]衄血
黃帝經云越支肆孟子云無名之指手第四指也今日屈無名
指著處是穴蓋為第四指也

大陵二穴土也在掌後兩筋間陷中針五分灸三壯○銅人經云手
厥陰脈之所注也為俞治熱病汗不出肘臂攣腋腫善笑不休心
懸若飢喜悲泣驚恐目赤小便如血嘔逆狂言不樂喉痺口乾身熱
頭痛短氣胸脇痛○西方子云主心痛數驚寒熱發手攣手掌及主
風熱善怒心中悲喜歔欷○喜笑不止主心下澹澹主掌中熱
身熱如火浸淫煩滿舌本痛[illegible]寒熱主欬喘主嘔血主胃
中痛主瘍疥
內關二穴在掌後去腕二寸別走少陽針五分灸三壯○西方子云
主面赤熱主目昏眩暗無所見主目黃支滿中風肘攣實心暴痛
虛則心煩惕惕
間使二穴金也在掌後三寸兩筋間陷中針三分灸五壯○明堂下經云
七壯[illegible]又云主卒狂驚悸胃中腥痛嘔吐
主思神邪也○銅人經云手厥陰脈之所行也為經治心懸如飢卒
狂胸中澹澹惡風寒嘔吐怵惕寒中少氣掌中熱腋腫肘攣卒心
痛多驚瘖不得語咽中如鯁○西方子云灸七壯主心背痛相引

主益中如挽主肘臂痛主肢痛煩心善動兩肢

郄門二穴去腕五寸手厥陰郄針三分灸五壯〇銅人經云治心痛衄血嘔噦驚恐畏人神氣不足又嘔血〇西方子云在掌後去腕五寸

曲澤二穴水也在肘內廉陷中屈肘取之灸三壯針三分留七呼〇素問註云肘廉下〇銅人經手厥陰心主脈之所入也爲合治心痛善驚身熱煩渴口乾逆氣嘔血風疹臂肘手腕善動搖〇又云主心下澹澹肘瘛善搖頭顏清汗出不過肩傷寒病溫身熱〇西方子云主嘔涎或血手痛手不可伸

天泉二穴一名天溫在曲腋下二寸舉臂取針六分灸三壯〇銅人經云治心病胸脇支滿欬逆膺背胛間臂內廉痛

二百八十五

手少陽三焦經左右二十四穴



關衝二穴金也在手小指次指端去爪甲角如韭葉針一分灸一壯忌同素問註云三壯〇銅人經云手少陽脈之所出也爲井治喉痺舌卷口乾頭痛霍亂胸中氣噎不嗜食臂肘痛不可舉目生翳膜視物不明攢指與面題生令之物〇西方子云在手小指端主風眩心煩臂外廉手不及頭左取左右取右主肘痛不能自帶衣主肩臂痠痛手臂風熱病不心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛尺熱上不得卧掌中熱頭不可以顧

液門二穴水也在手小指次指間陷中針二分灸三壯〇明堂經云主肘痛不能上下〇百本熱目眩〇銅人經云手少陽脈之所溜也爲滎治驚悸妄言咽外腫寒厥手臂痛不能自上下痎瘧寒熱同眩頭痛暴得耳聾目赤齒齦痛〇西方子云主呼吸短氣咽中如息肉狀目赤熱病先不樂而熱無汗風寒熱耳痛鳴聾

中渚二穴木也在手小指次指本節後間陷中針三分灸三壯明堂經云灸二壯主目眩頭痛耳聾所以肘臂痛手五指不得屈伸〇銅人經云手少陽脈之所注也爲輸治熱病汗不出耳聾頭痛耳鳴目生翳膜久瘧咽腫〇西方子云主頭重頷頰痛面赤目不明惡風寒嗌痛熱病耳聾嘈嘈目手五指不得屈伸

陽池二穴一名別陽在手表腕上陷中針三分留三呼不可灸忌同素問註云灸三壯〇銅人經云手少陽脈之所過也爲原治寒熱瘧或因折傷手腕捉物不得肩臂痛不得舉〇令物等〇西方子云主熱病汗不出

外關二穴正少陽絡在腕後二寸陷中針三分留七呼灸二壯明堂經云三壯又云在腕後二寸陷者宛宛中主肘攣重屈伸臂手十指盡痛不得握〇主耳焞焞渾渾無所聞也銅人經云手少陽絡〇西方子云主臂痿不仁臂不及頭

支溝二穴火也在腕後三寸兩骨間陷中針二分灸二壯忌同〇明堂經云五壯素問註云二壯〇千金云支溝臂外三寸〇明堂經云主熱病汗不出肩臂痠重脇腋急痛四肢不舉口噤不開暴瘂不

能言也　銅人經云手少陽脈之所行也為經治霍亂嘔吐煩悶通
生命諸物〕西方子云主心痛咽腫肘甚者手足寒至節不息
者死主欬而赤而瘈肘節痺瘧熱而力腫疼主痛主病亦女人含息
目赤澀痛
會宗二穴在腕後三寸空中一寸針三分灸三壯〕銅人經云治肌膚
痛耳聾風癇〕西方子云主耳渾渾淳淳聾無所聞
三陽絡二穴在臂上大交脈支溝上一寸禁針灸七壯〕
明堂經云五壯〕銅人經云治暴卧身體不欲動耳卒聾齒齲
暴瘂不能言
天井二穴土也在肘外大骨後肘上一寸兩筋間陷中屈肘取之
甄權云曲肘後一寸叉手按膝頭取之兩筋骨罅針三分灸三壯心
悶〕明堂云五壯素問註肘一寸〕千金云肘後兩筋間〇明堂經
云主肘痛引肩不可屈伸頭項及肩背痛背瘁不仁驚悸悲傷瘈
病羊癇吐舌也〇銅人經云手少陽脈之所入也為合治心胸痛欬
嗽上氣唾膿不嗜食驚悸瘈瘲風痺臂肘痛捉物不得嗔如帶法
〇西方子云主大風默默不知所痛悲傷不樂恍惚驚懼食時
發心痛主癲疾驚悸手臂瘈瘲及頭痛頸痛
四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中灸三壯針六分留七呼〕銅人經云
治暴氣耳聾下齒齲痛〕西方子云主呼吸短氣咽中如息肉狀
清冷淵二穴在肘上二寸伸肘舉臂取之灸三壯針三分〇西方子云
一名清昊泉在肘後三寸又名青靈主肩臂不舉不能帶衣頭痛
振寒目黃脇痛
消濼二穴在肩下臂外腋斜肘分下行針一分灸二壯〇明堂云在肩
下外開腋斜肘分下行針六分灸三壯素問註云肩下臂外開腋〇
銅人經云治寒熱風痺項痛肩背急〕西方子云主頭痛項如拔不可
左右顧頭有大氣

足厥陰肝經左右二十二穴

大敦二穴木也在足大指端去爪甲韭葉及三毛中灸三壯針三分
留六呼千金云足大指聚毛中銅人經云足厥陰脈之所出也為井
治卒疝小便數遺溺陰頭中痛心汗出陰跳上入腹陰偏大腹臍
中痛悒悒不樂病左取右右取左腹臍腫痛少痛中熱不寐尸厥
狀如死及婦人血崩不止西方子云一名大訓主目不欲視太息五
淋不得尿喘噫
行間二穴火也在足大指間動脈應手陷中灸三壯針六分留十呼〇
銅人經云足厥陰脈之流也為滎治溺難又白蜀寒疝少腹腫欬
逆嘔血腰痛不可俛仰腹中脹心痛面色蒼蒼如死狀終日不得息
口喎四肢逆冷嗌乾煩渴瞑不欲視目中淚出太息癲疾短氣不明
〇西方子云主莖中痛胸背痛心悲不樂欬及主婦人月事不利
見赤白而有身反敗陰寒振寒溲白尿難痛
大衝二穴土也在足大指本節後二寸或一寸半陷中令俯凡診大衝
脈可決男子病死生針三分留十呼灸三壯〇明堂云在足大指本
節後二寸骨罅間陷中灸五壯素問註云在足大指間本節後二寸

動脈應手到陽實又云在大指本節後内間二寸〇明堂經云主卒
疝小腹痛小便不利如淋狀又不通〇銅人經云足厥陰脉之
所注也爲輸治腰引少腹痛兩丸騫縮溏泄遺溺陰痛面目蒼色胸脇
支滿足寒大便難嘔血女子漏血不止小兒卒疝嘔逆發寒嗌乾善渴肘
腫内踝前痛淫濼胻酸腋下馬刀瘍瘻唇腫〇西方子云主黄
喉中鳴不得尿陰上痛溏泄也面目浮腫

中封二穴金也在足内踝前一寸仰足取之陷中伸足乃得之針四分
留七呼灸三壯素問註云内踝前一寸半甲乙經云一寸又云内踝
前一寸斜行小脉上一名懸泉〇銅人經云足厥陰脉之所行也爲
經治痎瘧色蒼蒼振寒少腹腫食怏怏繞臍痛足逆冷不嗜食身體
不仁寒疝引腰中痛或身微熱〇西方子云主小腹痛振寒嗌白
便難痛痿厥身黄有微熱少氣身重濕内踝前痛膝腫痿厥身
體不仁痛癃疝暴痛痿厥嗌腫不可以咽

蠡溝二穴在足内踝上五寸别走少陽針二分留三呼灸三壯〇銅人經云足厥陰絡治卒疝少
腹腫時少腹暴痛小便不利如癃閉數噫恐懼少氣不足腹中痛悒
悒不樂咽中悶如有息肉狀背拘急不可俛仰〇西方子云主女子
赤白淫下時多時少暴腹痛𤸇〇明堂云治卒疝小腹痛又婦人漏
下赤白月水不調臍下積氣如卵石足寒脛痠屈伸難也又云灸七
壯

中都二穴一名中郄在内踝上七寸䯒骨中與少陰相直針三分灸五
壯〇銅人經云治腸澼㿉疝少腹痛婦人崩中因產惡露不絶〇西
方子云治足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

膝關二穴在犢鼻下二寸陷中針四分灸五壯〇銅人經治風痺膝内痛
引臏不可屈伸咽中痛〇銅人經

曲泉二穴水也在膝内輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝取之又云正
膝屈内外兩筋間宛宛中又在膕曲横紋頭針六分灸三壯〇銅人
經云足厥陰脉之所入也爲合治女子血瘕按之如湯浸股内少腹
腫陰挺出丈夫㿉疝陰股痛小便難腹脇支滿癃閉少氣泄利四肢
不舉實則身熱目眩痛汗不出目䀮䀮膝痛筋攣不可屈伸發狂衄
血喘呼少腹痛引喉咽及治風勞失精身體極濡泄水下利膿血陰
腫衄痛鍼入六分留十呼

陰包二穴在膝上四寸股内廉兩筋間足厥陰别走治腰尻引少腹痛
遺溺不禁針六分灸三壯〇明堂云七壯主腰痛連小腹腫不便不
利月水不調

五里二穴在氣衝下三寸陰股中動脈灸五壯針六分治腸中滿熱閉
不得溺〇西方子云主嗜卧四肢不得動搖
王氏云五里有二其一在手陽明肘上三寸其一在此當爲足五
里也

陰廉二穴在羊矢下去氣衝二寸動脉中灸三壯針八分留七呼
〇銅人經云治婦人絶產若未經生產者灸即有子

足少陽膽經左右三十穴

竅陰二穴金也在足小指次指端去爪甲如韭葉灸三壯針一分○
銅人經云足少陽脉之所出也為井治脇痛欬逆不得息手足煩熱
汗不出轉筋癰疽頭痛心煩喉痺舌強口乾肘不可舉卒聾不
聞人語
王氏云竅陰有二其一在此其一在頭項即此當為足竅陰也
俠谿二穴水也在足小指次指岐骨間本節前陷中灸三壯針三分明
堂云眩人去俠谿一寸半○銅人經云足少陽脉之所流也為滎治
胸脇支滿寒熱汗不出目外眥赤目眩頰頷腫耳聾胸中痛不可轉
側痛無常處○西方子云主目系急目上插胸脇痛逆寒熱出目寒頷
痛引耳嘈嘈無所聞足痛膝下腫馬刀瘻婦人小腹堅痛月水不
通乳腫潰胃中寒如風狀頭眩兩頰痛○明堂經云主耳聾鳴
地五會二穴在足小指次指本節後陷中去俠谿一寸針一分不可灸
灸使人羸瘦不出三年卒○銅人經云治內傷吐血足外皮膚不澤
乳腫針三分
臨泣二穴木也在足小指次指本節後間陷中去俠谿一寸半灸三壯
針二分○明堂經云主胸脇痛因腋下腫[illegible]而發
者○銅人經云足少陽脉之所注也為腧治胸中滿缺盆中及腋下
腫馬刀瘻善齧頰天牖中腫淫濼胻痠目眩枕骨合顱痛洒淅振寒婦人
月事不利季脇支滿乳癰心痛周痺痛無常處厥逆氣喘不能行○
西方子云主枕骨頷厥逆足痛大風目痛瞳中痛不能行足外皮痛
身痺洒淅振寒及小兒驚癇反視
王氏云臨泣第三行既有臨泣穴矣此亦有臨泣穴盖足臨泣也
丘墟二穴在外踝下如前陷中去臨泣三寸灸三壯針五分留七呼○
銅人經云足少陽脉之所過也為原治胸脇滿痛不得息久瘧振寒
腋下腫痿厥坐不能起髀樞中痛目生翳膜腿胻痠轉筋卒疝小腹
堅寒熱頸腫○西方子云主瘧振寒腋不收目不明○明堂經云主
胸脇痛善太息[illegible]足經偏細
懸鍾二穴在足外踝上三寸動脉中一名絶骨針六分留七呼灸五
壯千金云一名絶骨[illegible]明堂經云主心腹脹滿胃中熱不
嗜食脚脛足經痛筋急足收復主不能起○銅人經云足三陽
之大絡按之陽明脉絶乃取之○西方子云主五淋痃癖虛勞筋急
疼痛經筋小兒腹滿不能食飲四肢不收風勞身重○明堂云主腹
滿中焦客熱不嗜食并鼻衄濕痺脛痺麻屈伸難也
陽輔二穴火也在足外踝上四寸輔骨前絶骨端如前三分去丘墟七
寸灸三壯針五分留七呼千金云外踝上輔骨前○銅人經云足少
陽脉之所行也為經治腰溶溶如坐水中膝下膚腫筋攣諸節盡痛
痛無常處腋下腫痿馬刀喉痺髀膝脛痠風痺不仁○西方子云主腰
痛不可以顧膝痛如錐居中腫痛不可以欬則筋縮急諸節痠折脇痛
光明二穴在足外踝上五寸陷中針六分留七呼灸五壯○明堂下經云
七壯治熱病不能久立與陽輔療病同○又云在膝脛痿痺不仁手
足偏小坐不能起○銅人經云別走厥陰足少陽絡治身解寒淫濼
及熱病汗不出卒狂膝痛則足胻熱膝痛身體不
仁善齧頰○西方子云主脛痠不能久立腹足清寒膝痛身體不能
行手足偏小
外丘二穴在足外踝上七寸針三分灸三壯○銅人經云少陽所注治
胸脹滿膚痛痿痺頸項痛惡風寒猘犬所傷毒不出發
寒熱速以三壯人可灸所嚙之處立愈
陽交二穴一名別陽在外踝上七寸斜屬三陽分肉之間灸三壯針六
分留七呼○千金云一名足髎在外踝上七寸　銅人經云陽維
郄治寒厥驚狂喉痺胸滿面腫寒痺膝胻不收寒熱
陽陵泉二穴土也在膝下一寸外廉陷中針六分得氣即瀉又宜灸留
針灸七壯至七七壯即止明堂下經云一壯素問注云三壯○千金
云膝下外尖骨前雖跳理骨中從側少許筋會陽陵泉筋病治○
銅人經云足少陽脉之所入也為合治膝伸不得屈冷痺脚不仁偏
風半身不遂脚冷無血色又以轉上取之灸亦良可灸七壯至七七
壯即止○西方子云在外踝上七寸主頭痛寒熱口苦嗌中介介頭
面腫胸脇痛心中怵惕恐如人將捕○明堂經云主髀樞膝外
廉痛不仁屈伸難及脛中
陽關二穴在陽陵泉上三寸犢鼻外陷中針五分不可灸千金云關陽
針　銅人經云[illegible]膝外痛不可屈伸風痺不仁

中瀆二穴在髀骨外膝上五寸分肉間陷中灸五壯針五分留七呼○銅人經云足少陽絡治寒氣入於分肉之間痛攻上下筋痺不仁○○西方子云不可灸

環跳二穴在髀樞中側臥伸下足屈上足取之灸五十壯針一寸留十呼已同明堂下經云在硯子骨宛宛中灸三壯甲乙云五壯○明堂經云主冷痺風濕偏風半身不遂腰胯疼痛不得轉側甲乙云主髀臥伸縮可轉不得也○西方子云治風濕痺風疹及脚膝痛無常處膝腰相引急痛髀樞中痛不可舉脛痺不仁髀不仁○銅人經云忌熱麵豬魚生冷物等

風市二穴在膝外兩筋間立舒下兩手著腿當中指頭陷中療冷痺腳脛麻腿膝痠痛腰尻重起坐難○明堂經云治腎虛死亦中灸三壯王氏云予冬月當風市處多冷痺急痛熱手溫之止日或兩三痺偶謬刺以溫針遂愈信乎能治冷痺也亦屢灸此不特治冷痺亦治風之要穴銅人乃不載豈名或不同耶其本不全耶

足太陰脾經左右二十二穴

隱白二穴木也在足大指端內側去爪甲角如韭葉宛宛中針三分留三呼灸三壯○銅人經云婦人月事過時不止刺立愈○明堂云針一分留三呼灸三壯○銅人經云足太陰脈之所出為井治腹脹喘滿不得安臥嘔吐食不下暴泄衄不止足寒不能溫又云治腹中寒氣脹滿喘急熱身熱衄痛○西方子云主腹滿及腹中寒冷氣主壅中寒熱主卒尸厥不知人脈動如故又胸中痛

大都二穴火也在足大指本節後陷中灸三壯針三分○千金翼云本節內側白肉際○明堂經云主熱病汗不出手足逆冷腹滿善嘔目眩煩心四肢腫痛○銅人經云足太陰脈之所溜也為滎治熱悶吐逆○西方子云主目眩暴心痛腹脹胸滿病汗不出厥逆霍亂目

上押

太白二穴土也在足內側核骨下陷中灸三壯針三分千金云足大指內側○銅人經云足太陰脈之所注也為俞治身熱煩滿腹脹食不化氣嘔吐泄有膿血腰痛大便難氣逆霍亂腹中切痛○西方子云主頭痛寒熱汗出不惡寒胸脅脹滿痛不可俛仰熱病頭重頭痛項痛身熱煩滿

公孫二穴在足大指本節後一寸灸三壯針四分○銅人經云別走陽明太陰絡治寒瘧不嗜食面腫煩心狂言霍亂腹如鼓○西方子云主頭面腫腹內氣大痛

商丘二穴金也在足內踝下微前陷中灸三壯針三分○銅人經云足太陰脈之所行也為經治腹中脹腸中鳴不便脾虛令人不樂身寒善太息心悲氣逆痔疾骨疽蝕絕子厥逆○西方子云主心下有寒脾疼脾熱脾虛腹脹痛不得息善嘔心痛骨痺癇疾痛病寒瘧痛黃疸主痺血也後重陰股內痛氣癰狐疝走上下引小腹痛不可俛仰小腹堅痛下引陰中

三陰交二穴在內踝上三寸骨下陷中明堂經云內踝上八寸陷中千金方云內踝上八寸骨下灸三壯針三分○銅人經云足太陰厥陰之交會治痃癖腹中寒膝股內痛氣逆小便不利脾病身重四肢不舉腹脹腸鳴溏泄食不化女子漏下不止○西方子云主膝內廉痛足痿不能行

資生經云昔宋太子善醫術出苑逢一姙婦太子診曰女令徐文
伯診曰一男一女針之瀉三陰交補合谷應針而落果如文伯言
故姙娠不可刺

漏谷二穴亦名太陰絡在內踝上六寸骨下陷中針三分明堂云灸三
壯〇又云在足外踝上六寸陷者中主足熱痛腿冷疼不能久立也
〇銅人經云治瘧癖冷氣心腹脹滿食飲不為肌膚濕痺〇西方
子云主腸鳴強欠心悲氣逆腹脹滿急小便不利失精久濕痺不能
行痲痺不仁

地機二穴一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸灸三壯針
三分明堂云在膝下側骨下陷中伸足取之主腰疼不可俛仰足痺
痛屈伸難也〇銅人經云治女子血瘕按之如湯沃股內至膝骨痛
丈夫溏泄腹脇氣脹水腫腹堅不嗜食小便不利〇西方子云治唐
瘕腹中痛藏痺虛精不足

陰陵泉二穴水也在膝下內側輔骨下陷中伸足取之針五分留七呼灸
取之〇銅人經云足太陰脈之所入也為合治腹中寒不嗜食脇下
滿水腫腹堅喘逆不得卧腰痛不得俛仰霍亂疝瘕小便不利氣淋
膝痛熱不節〇西方子云灸三壯主心下滿寒中腸下膚腹中盛足
痹痛失禁遺尿腸中熱暴泄腹滿不得息腎病氣癃疝瘕婦人疝瘕
按之如以湯沃股內陰痛小腹堅急重下濕不嗜食陰痛

血海二穴在膝臏上內廉白肉際二寸中一作一寸中灸三壯針五分
千金云白肉際二寸半生云一作三寸〇銅人經云治女子漏下惡
血月事不調逆氣腹脹〇西方子云灸五壯主漏下若血閉不通月
水不調

箕門二穴在魚腹上越筋間動脈應手在陰股內一云股上起筋間灸
三壯〇銅人經云治淋遺溺鼠鼷腫痛小便不通〇西方子云主陰
跳

足陽明胃經左右三十二穴

厲兌二穴金也在足大指次指端去爪甲如韭葉針一分灸一壯〇明
堂經云主尸厥如死不知人多臥善驚面上浮腫也銅人經云足陽
明脈之所出也為井治尸厥口噤氣絕狀如中惡心腹脹滿熱病汗
不出寒熱瘧不嗜食面腫足胻寒喉痺齒齲惡風鼻不利〇西方子
云主鼻不利涕黃噎咽不得卧惡寒心痛脹滿不得息吐舌戾頸

內庭二穴水也在足大指次指外間陷中灸三壯針三分〇銅人經云
足陽明脈之所流也為滎治四肢厥逆腹脹滿數欠惡聞人聲振寒
咽中引痛口喎齒齲瘧不嗜食〇西方子云主厥逆胻寒腹滿
不得息善振伸數欠

陷谷二穴木也在足大指次指外間本節後陷中去內庭二寸針三分
留七呼灸三壯〇明堂云一名陷骨主卒疝小腹痛頭面浮腫及痎
瘧發寒熱也〇銅人經云足陽明脈之所注也為腧治面目浮腫及
水病善噫腸鳴腹痛汗不出振寒瘧疾〇西方子云主胸脇支滿
腸大滿善噫癰腫

衝陽二穴在足跗上去陷谷三寸針五分灸三壯〇素問注跗上五寸

骨間動脉刺三分○千金云在膝上五寸骨間去陷谷三寸一作○銅人
經云足陽明脉之所過也為原治偏風口眼喎斜針膝臏腫痛寒
熱腹堅大不嗜食振寒欠伸狂妄登高而歌棄衣而走足緩履不收○西
方子云穴在足跗上五寸骨間去陷谷一寸主面浮腫足緩足痛痛
手不出振寒而戰足先見先指甚又而熱熱去乃去之癮痛提足起

腹大

解谿二穴在衝陽後一寸半腕上陷中明堂下經云在繫鞋處針五
分灸三壯○素問註在衝陽後二寸半銅人經註作三寸半二註不同
當從甲乙經作寸半○明堂云主氣逆發噎心下腹中滿氣上下
行灸日壹壯主手也○銅人經云足陽明脉之所行也為經治風面
手腫以上衝頭腫大便不通足胕腫股膝脛痛頭痛
疼面腫並生產後風頭風面目赤○西方子云治口噤痛胕腫轉筋
尿黃腹大下腫風水面胕腫刺痛[illegible]
豐隆二穴在外踝上八寸下廉胻外廉陷中針三分灸三壯明堂下經
云七壯○明堂經云主四肢不收身體怠惰腰痠疲不能行難○
入經云刺足太陰治厥逆胸痛如刺腹中切痛大小便難涕厥頭痛
面浮腫風逆四肢腫身濕喉痺不能言○西方子云主頭痛寒熱汗
出不惡寒大小便澀難不能食狂妄言登高而歌棄衣而走厥逆手
足青痛如刺頭心狂見鬼好笑
下巨虛二穴一名巨虛下廉在上廉下三寸當舉足取之針八分灸三壯○
明堂云上廉下三寸兩筋兩骨罅陷宛宛中蹲地坐取之針六分得
氣即瀉甲乙云針三分灸三壯主小腸氣不足面無顏色偏風熱風
冷痺不遂風濕痺灸亦良日七七壯不及針灸痛處令痺則已○素
問註云足陽明與小腸合在上廉下三寸針三分○銅人經云治少
腹痛飧泄次指間痛唇乾涎出不覺不得汗出毛髮焦肉脫少氣胃
中熱不嗜飲食泄膿血胸脇少腹痛暴驚狂言非常女子乳癰喉痺
胻腫痛足跗不收腨入八分可灸三壯○西方子云治寒濕下注小
便難黃
資生經云手陽明亦有下廉此乃足下廉也
條口二穴在下廉上一寸舉足取之針五分○明堂云在上廉下一寸

針八分灸三壯○銅人經云治膝胻寒酸痛足緩失履不收濕痺針
五分又云脛腫腨痛股熱所發○資生經云不可以足下於不能久立
上巨虛二穴一名上巨虛在三里下三寸舉足取之灸二壯針三分銅
人曰胻腫不足偏風腳腿手足不仁灸隨年為壯明堂云巨虛上廉
在三里下三寸兩筋兩骨罅陷宛宛中針八分得氣即瀉灸大良日
七壯明堂下經云灸三壯素問註在三里下三寸又云在膝犢鼻下
胻外廉六寸明堂云三里穴下三寸胻骨外大筋內筋骨之間主腳
脛疼痠屈伸難不能久立○銅人經云治臟氣不足偏風腳氣走注痿厥
風食不化泄腸灸可灸[illegible]針入三分又云足陽明與大腸合
主入腸氣不足偏風腰腿不遂腳不得履地腳氣刺風痺風腳冷寒
痿灸之大良○西方子云主小便難黃風水膝腫
資生經云手陽明亦有上廉此乃足上廉也
三里二穴在膝下三寸胻外廉兩筋肉間[illegible]
舉足取之○千金翼云諸病皆治食氣水氣蠱毒痃癖四肢腫滿膝胻
痠痛目不明產後血暈○秦承祖云主五勞羸瘦七傷虛乏胸中瘀血乳癰[illegible]小人
秋後灸三里外臺明堂云人年三十已上若不灸三里令氣上衝目
所以三里下氣也○灸三壯針五分○明堂云刺腹胃脹滿皆灸三里
穴針八分留十呼瀉七吸日灸七壯止百壯○素問註刺一寸在膝
下三寸胻骨外廉兩筋肉分間[illegible]明堂云主
臟腑久積冷氣心腹脹滿胃氣不足聞食臭腸鳴腹痛灸三壯○銅
人經云足陽明脉之所入也為合主胃中寒心腹脹滿胃管痛不能食反胃
胸脇積聚腳弱針入八分灸亦良又云主胸中瘀血不足○西方子云
灸三壯主喉痺不能言腸中寒逆不得息咳嗽多唾主腑痛時寒膝
痛不可以顧足痿失履不收足趾不能久立主虛少氣腸鳴腹痛
胸滿中氣血水腹脹陰氣不足小便不利痺病寒不出善噫口苦惡
熱身反折口噤鼓頷腰痛不可以顧而有所見善悲上下求之口僻乳腫目
不明久泄利食不化脇下支滿膝痿熱寒中消谷不飢腹熱身煩狂
言乳癰狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒頭眩小
便不利凡此等疾皆灸之多至五百壯少至二三百壯
資生經云手有三里此亦曰三里蓋足三里也○銅人云在膝下

三十明堂秦承祖云寸人多不能求其穴每以大拇指次指圈其膝蓋以中指注之為穴或以病人小指住處為穴皆不得其穴所在也又按明堂犢鼻根四穴在膝頭骨下兩旁陷中也又按銅人等經有犢鼻穴在膝臏下骭俠解大筋中也又按銅人膝眼二穴在犢鼻下一寸分中也素問注云三里上亦云三里在犢鼻下三寸是犢鼻之下三寸方是三里不可便從膝頭下去三寸為三里穴也若如今人之取穴恐失之太高矣

犢鼻二穴在膝臏下骭俠解大筋中治膝中痛不仁難跪起膝臏腫潰者不可治不潰者可療若犢鼻堅硬勿便攻先以洗熨即微刺之愈明堂云針三分灸三壯○銅人經云治膝中痛不仁難跪起膝臏癰腫潰者不可治不潰者可療若犢鼻堅硬勿便攻先以洗熨即微刺之愈又云足陽明脈氣所發主犢鼻腫洗熨去之其久堅勿攻攻者死

資生經云按素問刺禁云刺膝臏出液為跛犢鼻在膝臏下骭開針者不可輕也

梁丘二穴在膝上二寸兩筋間灸三壯針三分明堂云五分○明堂作三寸○銅人千金皆作二寸千金注謂或云三寸○銅人經云治大驚膝痛寒痺膝不能屈伸又云足陽明郄治脛膝痛○西方子云灸三壯主筋攣膝不得屈伸不可以行

陰市二穴一名陰鼎在膝上三寸伏兔下陷中拜而取之針三分不可灸○明堂下經云灸三壯千金注二十卷云在膝上當伏兔下行二寸臨膝取之明堂經云灸五壯主卒疝小腹痛力痿氣少伏兔中寒腰如冷水○銅人經云足陽明脈氣所發主寒疝下至腰腳冷如水小腹諸疝按之在膝上伏兔下針入三分灸三壯○西方子云主腹中脹滿痿厥少氣腰痛不可以顧主膝上伏兔中寒

資生經云銅人云不可灸明堂乃云灸三壯豈以氣穴許灸一壯至三壯耶

伏兔二穴在膝上六寸起肉正跪坐取之一云膝蓋上七寸針五分不可灸○明堂云婦人八部諸病通針三分○銅人經云治勞氣逆膝冷不得溫針入五分又云足陽明脈氣所發治風勞痺逆狂邪手節攣縮身癮疹腹脹少氣婦人八部諸病○西方子云不灸

髀關二穴在膝上伏兔後交分中針六分○明堂云灸三壯○銅人經云治膝寒不仁痿厥股內筋絡急不能屈伸又云針入三分○西方子云主黃疸

膝眼四穴在膝頭骨下兩旁陷中銅人云宛宛中主膝冷疼痛不已針五分留三呼瀉五吸禁灸

資生經云銅人無此四穴明堂有之故附入于此

足少陰腎經左右二十六穴

湧泉　二木也一名地衝在足心陷中屈足捲指宛宛中灸三壯針五
分無令出血素注云灸難比王冰至足下熱仍痛謂熱徹也
當針足心上動足心立愈○明堂經云灸不及針若灸廢人行動明
堂下經云在腳心底宛中白肉際灸三壯○素問注針三分千金注
在腳心大指下大筋 [illegible]
[illegible] 主心痛不嗜食婦人無子欬嗽氣短閉身
熱喉咽痛頭痛目眩男子如蠱女人如妊娠五指足指盡痛不得踐地
也銅人經云足少陰脉之所出也為井治腰痛大便難風疹又云主
小便不利心中結熱風疹風癇不得履地○西
方子云治足五指端痛引入腹中痛咳嗽喉咽惡熱咽中痛不可食
喜腸相引忽喜忘衄血不止

然谷　二穴火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷中灸三壯針三分
不宜見血○素問注刺三分刺此多見血令人立飢欲食千金注
入方云在內踝前直下一寸○銅人經云足少陰脉之所溜也為滎
治咽內腫心恐懼如人將捕之涎出喘呼少氣足跗腫不得履地寒疝
少腹脹上搶胸脇欬唾血喉痺淋瀝白濁女子不孕男子精溢脛痠不能
久立足一寒一熱舌縱煩滿消渴初生小兒臍風口噤痿厥洞泄○
西方子云主胸中寒脉代時不至寒疝汗出痓上縱內時有喘滿而
不能言舌下腫難言不嗜食

太谿　二穴土也在內踝後跟骨上動脉陷中灸三壯針三分○明堂經
云主痎瘧欬逆心痛不得臥小便黃腹寒唾血及衄血不止也○銅
人經云足少陰脉之所注也為腧治心痛如錐刺其心手足寒至節
喘息者死嘔吐口中如膠善噫寒疝熱病汗不出默默嗜臥溺黃消
癉大便難咽腫衄血痃癖寒熱欬嗽不嗜食腹脇痛瘦脊手足厥冷
○西方子云治大病瘕積聚寒疝相通及足清不仁熱病多汗黃癉
多熱少寒腹中腫脹

大鍾　二穴在足跟後衝中灸三壯針二分留七呼○銅人經云足太陽
足少陰絡別走太陽小便淋閉洒洒腰脊強痛大便秘澀嗜臥口中熱
多寒欲閉戶而處少氣不足胸脹喘息舌乾咽中食噎不
得下善驚恐不樂喉中鳴欬唾血○西方子云主腹滿便難多寒

少熱

水泉　二穴去太谿下一寸在內踝下灸五壯針四分○銅人經云少陰
郄治月事不來來即多心下悶痛目䀮䀮不能遠視陰挺出小便淋
瀝腹中痛

照海　二穴陰蹻脉所生在內踝下針三分灸七壯銅人注明堂上
經云陰蹻二穴在內踝下陷宛中針三分灸三壯○明堂下經云陰
蹻二穴在內踝下陷中灸三壯一作外踝下千金云內踝下容爪甲
○銅人經云治嗌乾四肢懈惰善悲不樂久瘧卒疝少腹痛嘔吐嗜
臥悲憶情大風偏枯半身不遂不能行步小便難又女子淋瀝陰挺出
又云主卒疝小腹熱而偏痛病者左取右右取左立已女子月水不調
如見鬼汗出面塵病飢不欲食四肢淫濼心悶恐懼多諸淋目痛大
風暴不知人臥驚視如見星承如黃水小腹熱咽乾也○西方子云
治大風默默不治所痛視如不明
資生經云明堂上下經有陰蹻穴而銅人無之惟有照海穴亦在
內踝下其症候與陰蹻同而不知其故予皆謂照海穴本陰陽穴來內
踝下足跟照海陰蹻所生則與銅人照海穴合是照海是陰蹻即照
海也故附陰蹻于照海之末

復溜　二穴金也一名昌陽一名伏白在內踝上二寸動脉陷中針三分
留三呼灸五壯○明堂云灸七壯主女子赤白漏下○銅人經云足少
陰脉之所行也為經治腰脊內引痛不得俛仰起坐目視䀮䀮善怒多
言舌乾胃熱自出足痿不收履脛寒不自溫腹中雷鳴腹脹如鼓四肢
腫十水病溺青赤黃白黑青取井赤取滎黃取腧白取經黑取合血
痔泄後腫五淋小便如散火骨寒熱汗注不止○西方子云主腰脊
十分痛目視不明腳後廉急不可前卻足跗上痛風逆四肢腫

交信　二穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉前筋骨間腸灸三壯針四
分留五呼○明堂下經云內踝上二寸筋骨間陷中素問氣穴論
踝上橫二穴注云內踝上者交信穴也又云主氣淋卒疝大小便難
股膝脛內廉痛也○銅人經云足陰蹻之郄治氣淋㿉疝陰急股引
腨內廉骨痛又足漏赤白女子漏血不止
資生經云按素問氣府論陰蹻穴注云謂交信也在內踝上二寸少

陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄穴意陰蹻即交信也至氣穴論陰
陽蹻穴註乃云陰蹻穴在内踝下是謂照海陰蹻所生則是陰蹻
乃照海非交信矣及明堂下經既有交信穴在内踝上又出陰蹻
穴在内踝下上下不同蓋二穴也但不知素問之注何故前後自異
學者毋信其一注而不考其又有一注也

築賓二穴在内踝上腨分中灸五壯針三分○明堂云在内踝上灸三
壯○又云主小兒胎癲病吐舌叉嘔吐不利也○銅人經云治小兒
胎疝痛不得乳癲疾狂言吐沫足腨痛○明堂云在足外踝上

陰谷二穴水也在膝内輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝乃取之
灸三壯針四分留七呼○銅人經云少陰脉之所入也爲合治膝痛
如錐不得屈伸久立舌縱涎下煩逆溺難少腹引急陰痛股内廉痛
婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃男子如蠱女子如姙娠○西
方子云寒熱腹偏腫陰痿



足太陽膀胱經左右三十六穴

至陰二穴金也在足小指外側去爪甲角如韭葉一云完穴中針二分
灸三壯○明堂云主瘧發寒熱頭重心煩目翳鼻塞不通小便
淋瀝失精○銅人經云足太陽脉之所出也爲井治目生翳鼻塞頭
重風寒從足小指起脉痺上下帶胸脇痛無常轉筋寒瘧汗不出
煩心足下熱小便不利失精針入二分可灸三壯○西方子云主鼻
衄清涕出及主耳聾腸腰脇相引急痛

通谷二穴水也在足小指外側本節前陷中灸二壯針二分○銅人經
云足太陽脉之所流也爲滎治頭重目眩善驚引鼽衄項痛目䀮䀮
○明堂云結積留飲胸滿食不化○西方子云主頭痛寒熱汗出不
惡寒項如拔不可左右顧目不明惡風寒鼻衄[illegible]中積[illegible]數欠
痛心下悸咽中澹澹恐主心痛鼻鼽清涕

束骨二穴木也在足小指外側本節後陷中灸三壯針三分○明堂云
主驚癇狂癲身寒熱頭痛目眩泰永祖云主風赤兩目皆爛○
銅人經云足太陽脉之所注也爲腧治腰如折腨如結耳聾惡風寒
目眩項不可回顧目内眥赤爛又云主身熱肌肉動○西方子云主
腸澼泄痢疾互引善[illegible]頭痛狂易多言不休疰從[illegible]背起
中癢不可灸

京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中按而得之針三分灸七壯
○明堂云五壯素問註三壯○明堂云灸五壯主寒瘧苦熱頸項不
卻食脹滿寒慄不得伸癲病狂走瘈瘲痛及腰膝寒○銅人
經云足太陽脉之所過也爲原治膝痛不得屈伸目内眥赤爛發瘧
寒熱善驚脛頸強痛掌足腕痛背不可俛仰鼽衄血不止目眩○
西方子云主目中白翳目反白從内眥始主頭熱鼻不利涕黃淋紫
自[illegible]痛背惡寒痛脚攣中足寒食瘈反折狂仆

申脉二穴陽蹻所出在外踝下陷中容爪甲白肉際針三分千金云
申脉在外踝下陷中○明堂云陽蹻二穴在外踝前一寸陷宛中針
三分○素問氣穴注陽蹻穴是謂申脉陽蹻所出在外踝下陷中按
之腰痛溜注在外踝下五分腠刺論注外踝下半寸容爪甲○銅人
經云主腰痛不能舉體足胻寒不能久立坐若下舟車中癲疾又云
治脚氣膝腫婦人血氣○西方子云主目反上視若赤痛從内眥始

腹中寒熱勝氣衂血不止

資生經云明堂上經有陽蹻穴而銅人無此穴惟申脈二穴陽蹻脈所出在外踝下陷中與陽蹻穴同而未知其故予按素問氣穴論注陽蹻穴注云陽蹻是謂申脈陽蹻所出在外踝下陷中則與銅人申脈穴合是則陽蹻即申脈也故附明堂陽蹻于申脈之後

金門二穴一名關梁在足外踝下一寸○云灸三壯炷如小麥針一分○銅人經云足太陽郄陽維所別屬也治霍亂轉筋尸厥癲疾身戰不能久立癲癇尸厥暴疝小兒發癇張口搖頭身反折○西方子云主馬癇及暴死

僕參二穴一名安邪在跟骨下陷中拱足得之針二分灸七壯明堂云三壯○銅人經云治足跟痛不得履地霍亂轉筋尸厥如中惡狀霍亂吐逆癲癇狂言見鬼針入三分○明堂云主腰痛不可舉足承山下重○西方子云主足跟下跟後痛足痿失履不收癲疾馬癇吐舌鼓頷狂癇項痛小兒馬癇張口搖頭身反折馬鳴

崑崙二穴火也在外踝後跟骨上陷中細脈動應手灸三壯炷如小麥針三分明堂云上崑崙針五分下崑崙外踝下一寸大筋下一云在大筋後內陷宛宛中踏地旁引取之○又云也寒熱癲疾目眩鼽衄多渴腰尻重不欲起傴僂陰腫人暈女子絕產也銅人經云足太陽脈之所行也爲經治腰尻痛足踹腫不得履地鼽衄腳如結踝如裂頭痛肩背拘急欬喘暴滿陰腫痛小兒發癇瘛瘲○又云上崑崙治惡血風氣腫痛腳腫○又云下崑崙主刺風疼風熱風冷痺腰疼偏風半身不遂腳重不履地針四分灸亦良百壯止○西方子云灸十壯主目眩不明目如脫目眥赤不明惡風寒目急痛赤腫頭熱鼽衄腹痛滿暴喘腹脹滿不得息不得大便洞泄體痛霍亂尻腰腫踹跟腫狂易大風癇瘛口閉不得開瘧多汗瘧寒小兒陰腫頭眩痛腳痿轉筋尸厥中惡吐逆欬喘暴痛

資生經云明堂有上崑崙又有下崑崙銅人只云崑崙而不載下崑崙豈銅人不全耶抑名不同未可知也但上經云內崑崙在外踝下一寸下經云內崑崙在內踝後五分未知其孰是予謂既云內崑崙則當在內踝後更下經之穴爲通上崑崙在外踝故也

付陽二穴在外踝上三寸千金作二寸陽蹻郄太陽前少陽後筋骨間陽蹻之郄灸三壯針五分留七呼明下云付陽在外踝上二寸當作三寸後筋骨間宛宛中灸五壯素問氣府論注陽蹻各一注云陽蹻謂附陽穴在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間陽蹻之郄○明堂云陽者中主痿厥不能久立坐膝脛瘦重筋急屈伸難不能起坐四肢不舉○銅人經云治痿厥風痺頭重頞痛髀樞股胻痛痠痺風痺不仁時有寒熱一作熱○西方子云踹外廉痛

資生經云按素問氣府論陽蹻穴注云謂附陽穴也在外踝上三寸爲足太陽蹻即付陽也予考氣穴論陰陽蹻四穴注云陽蹻穴是謂申脈陽蹻所出則是陽蹻乃申脈非附陽矣故明堂下經既有附陽在外踝上二寸上經又有陽蹻在外踝前一寸一寸二寸既異是附陽陽蹻各是一穴也但不知素問之註何故前後相背耶

飛陽二穴一名厥陽在外踝上九寸明堂十寸一云七寸針三分灸三壯明堂云五壯○又云外踝上七寸陽者中主體重起坐不能步失履不收腳腨痠重戰慄不能久立○銅人經云一名厥陽足太陽絡別走少陰在外踝上七寸治野雞痔痿歷節風足指不得屈伸頭目眩逆氣鼽衄癲疾寒瘧○又云主頸眩目痛○西方子云主頸項痛汗出腰痛挾脇中痛吐舌下部寒熱汗不出體重狂瘧痿脅反折痔傷寒逆氣頭熱足痺

承山二穴一名魚腹一名肉柱一名傷山兌腨腸下分肉間陷中灸一壯針七分明堂云八分得氣即瀉速出針灸不及針止七七壯明堂下經云五壯下一寸又五腹內陷○銅人經云治腰背痛脫脛重戰慄不能立腳氣膝下腫霍亂轉筋大便難久痔腫痛○又云足腨取之主腳弱無力腳重痛氣不遂○西方子云主頭熱鼽衄大便難腳攣腳脛痠腳急跟痛腳筋急痛兢兢足下熱不能久立寒熱癲疾腳腨痠痛膝臏腫重起坐難小腹疝氣游行五臟腹內切痛○明堂云主筋攣急不可屈伸

承筋二穴一名腨腸一名直腸在腨腸中央陷中灸三壯禁針明堂云在脛後從腳跟後上七寸腨中央陷中針一分千金云從腳跟上

七寸腨中央不對銅人經云治寒痺轉筋支腫大便難脚腨痠重引少腹痛鼻鼽衄腰背拘急霍亂〇又云足太陽脉氣所發台風勞熱足煩腫痛轉筋急痛身癒疹大小便不止西方子云主頭痛寒熱汗不出惡寒支腫大便難脚攣脚脛痠脚急跟痛脚筋急痛戰戰足下熱不能久立脛痺不仁痠痺脚痠脚痛如折脚腨痠痛重引小腹及腰脊痛惡寒痔痛指下腫寒氣衄

資生經云銅人千金皆云禁針明堂乃云針三分亦何疑更不針可也

合陽二穴在膝約中央下三寸針六分灸五壯〇銅人經云治腰脊強引腹痛陰股熱胻痠重履步難寒疝癩疾陰偏痛女子崩中西方子云主膝股熱脛痠重陰下痛腸澼陰偏腫痛

委中二穴土也在膕中央約文中動脉令附委中者血郄也熱病汗不出足熱厥逆滿膝不得屈伸取其經血立愈〇明堂云鼽積云在曲脷內兩筋兩骨中宛宛是令人面挺伏地臥取之針八分留三呼灸五壯甲乙云針五分留七呼灸三壯素問註在足膝後屈處膕中央約文中又素問註云在膝解後曲脚中背面取之〇明堂經云令病人合面臥舒擴兩脚取之灸三壯主脚弱無力腰尻重曲脷中筋急半身不遂〇銅人經云足太陽脉之所入也為合治腰俠脊沉沉遺溺腰重不能舉體風痺髀樞痛可出血痼疹皆愈〇西方子云凡風痺痛腫脚重痛於此刺血又痛痛者亦皆立已主小腹熱而偏腫癃遺小便難衄血不止腰痛俠脊至頭皆痛筋急身熱痔痛腋下痛膝少腹堅腫脊背尻折瘈瘲癲疾頭痛熱病汗不出足熱厥逆滿膝不得屈伸

委陽二穴三焦下輔俞也在足太陽後出於膕中外廉兩筋間屈伸取之扶承下六寸灸三壯針七分素問主在足膕中外廉兩筋間〇千金云足太陽前少陽後〇銅人經云足太陽脉之中台治下腹痛胸滿腑虛筋急身熱風痺不仁小便熱〇西方子云主陰跳及小便難小腹堅痛引陰中不得小便腰痛不可俛仰脊強反折瘈瘲癲疾頭痛筋急腋腫飛尸遁注痿厥不仁

浮郄二穴在委陽上一寸展膝得之灸三壯針五分〇西方子云主小腹熱大便堅太陽膀胱經大強結瘕外廉筋急髀樞之

殷門二穴在肉郄下六寸針七分〇西方子云主腰脊不可俛仰舉重惡血注之股外腫

扶承二穴一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰衝上文中針七分〇明堂經云灸三壯千金云在尻臀下股陰下文中（一云股陰衝上文中）又云主腰脊尻臀股陰寒痛五痔疾瀉膿血尻推中腫大便難小便不利〇西方子云主小便不利失精腋下腫尻下腫大便直出及陰胞有寒脛脊相引如解尻脈腫大便難

資生經云以上諸穴皆依銅人經次第而編明堂上下經有穴而銅人不載亦必附入惟有其穴而無其名者無慮數十穴不編者各收本經所載穴定之不可是此經之無穴名而不針灸也〇又云鬼哭鬼邪穴十三穴與銅人明堂同而其名却異故不編入許希針經之穴所與諸經不同其名又異與難穴之類是已亦不附入者不欲以一人之私名亂諸經之舊穴以滋後學者惑也

又云右諸穴以銅人為本凡三百六十其明堂上下千金等方有穴銅人不載者又附入之其未附入更數十穴如肩[illegible]一名[illegible]明堂[illegible]百陽[illegible]頭[illegible]亦名氣堂以口注市在兩乳邊郄下[illegible]身交在臍下横文中胞門在關元左邊二寸子戶在關元右二寸[illegible]穴[illegible]水原[illegible]衛門[illegible]九曲[illegible]中郄[illegible]合陽[illegible]臍天[illegible]百勞穴[illegible]姑載之卷末其為膏肓灸患門十餘穴不載云

呂細穴足太陽膀胱經見資生事經不載出扁生陸贄方及飛生通玄指要賦（在手曲踝）

灸膏肓俞穴法

莊季裕編灸膏肓俞穴法

按千金方論曰膏肓俞無所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣咳逆狂惑忘誤取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大

指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角摸索至胛骨下頭
其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空處去胛骨容側指許
摩膂肉之表肋間空處按之自覺牽引胸戶中灸兩胛中各一處至六
百壯多至千壯當覺氣下礱礱然如流水狀亦當有所下出若無停痰
宿疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令前取
穴灸之也求穴大較以右手從右肩上住指頭表所不及者是也左手
亦然乃以前法灸之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩
臂令人挽兩胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大
小常定不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣康盛當消息以自補養
取身體平復其穴近第五椎相准望取之 [illegible]
論曰昔秦緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下鍼藥所不及
即此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿痾難遣若能用心方便求得灸
之無疾不愈矣

王惟一明堂銅人灸經云膏肓俞二穴在第四椎下兩傍相去各三寸
主無所不療羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆發狂健忘痰病

人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘
勿令臂得動搖也從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中
間依胛骨之裏去胛骨容側指許摩膂肉之表肋間空處按之自覺牽引胸戶
肩中灸兩胛中一處至百壯多至五百壯當覺氣下礱礱然如流水之狀亦
當有所下出若得痰疾則無所不下也如病人已困不能正坐當令側
臥挽上臂令前取穴灸之又以右手從左肩上住指頭所不及者是穴
也左手亦然乃以前法灸之若不能久坐當伸兩臂令人挽兩胛骨使
相離不爾胛骨覆其穴灸之無驗此穴灸訖後令人陽氣康盛當消息
以自補養

論曰昔秦緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下鍼藥不能及即此
穴是也人不能求得此穴所以宿痾難遣若能用心以方便求得灸之
無疾不愈 出千金外臺方

量同身寸法第二

千金方云凡孔穴之法依古者八寸為尺仍取病者男左女右手中指上
第一節為一寸亦有長短不定者即取手大拇指第一節橫度為一寸

以意消息巧拙在人外臺方亦同上法又一云三寸者盡一中指也聖
惠方云今取男左女右手中指第二節內度兩橫文相去為一寸自依
此去療病多奇今以為定穴取寸石藏用[illegible]方為准以據然
條子或手足長患人男左女右手中指中節橫文上下相去長短為一
寸謂之同身寸 [illegible]
指紋長與同身寸相等為之寸逐寸以墨界之勿令長短有所出入不
同截斷收之以使比量參取自脊中第四椎下傍分兩傍各三寸為膏
肓論及太陽膀胱經脉系之所發也

蠟紙樣

竹篾樣



屈指量寸法圖



伸指量寸法圖

正坐伸臂法第二

令患人用醫椅正坐兩足平蹋至地膝與髀骰高下俱平兩足相並足指前齊盡脫去上體衣服 [illegible] 曲脊伸臂以兩手接膝上令中指當膝蓋中兩大指緊相並指頭與膝蓋骨前齊微用力直舉跣中勿令斜屈動搖 [illegible]

正坐伸臂法



揣顱骨定穴高下法第三

令患人正坐曲脊伸臂以指揣項後脊骨自第一顱至第五顱 [illegible] 逐顱以墨點記之令上下端有分明 [illegible] 自第四顱至第五顱更以墨點識或甚比量兩顱上下相去遠近指為三分亦以墨界脊上顱間取第四顱下二分微多第五顱上一分微少用墨圈定此是灸穴相去六寸之中以為兩穴高下遠近之准 [illegible] 更量兩顱相去則同身一寸三分七釐微有短長不同以參合甲乙經自大顱至脊骶骨二十一顱共長三尺之法若顱骨分明然有不同亦以顱數為定 [illegible]

揣顱骨定穴高下法

量臍心法

量命門穴上尺寸法

定穴相去遠近法第四

用先截量下同身六寸線紙或篾横置脊骨第五顀上中央墨圈定處令寸數界截當墨圈中心兩頭平直各三寸勿使展縮於紙篾兩頭盡處以墨圈之令圈大小直徑三分[illegible]紙[illegible]一半在[illegible]一半在紙篾頭外令與脊中第五顀上墨圈定高下處三圈用筆以為兩穴相去遠近之准

艾炷大小樣式

定穴相去遠近之圖

鉤股按穴取平法第五

又用前量同身寸法從脊中第五顀上中央墨所圈處循脊骨端直而下比量四寸至第七顀上以墨點記之仍將墨量都兩邊何上斜量取灸穴圈中心使各恰當同身寸之五寸以爲兩穴鉤股平直之准

鉤股取穴之圖



鉤股按穴取平之圖

鉤股按穴取平法圖

參驗求穴法第六

令患人平身正坐以右手從右肩上住附項伸指直搭背上以墨記其中指指頭所及處左手亦然記之又從胛骨上角搜揣至胛骨下頭其間當有四肋三間 [illegible] 灸穴當三間之中依胛骨下容側指許摩膂肉之表筋間空處穴上按之自覺牽引胸戶中 [illegible] 及照所圖灸穴在先記患人指所及處之下或傍側指不可及處以驗穴之是非然指有短長實有豊瘦若相合固善如不合節不可以此一端遂廢於法亦有人胛骨去脊骨相遠過同身寸三寸以上者如難用脊領兩傍各三寸之去但於四肋三間之中依胛骨下容側指許爲穴可也

參驗求穴法



坐點坐灸法第七

坐筵下人將令患人一休息亢待正坐伸背頭須存背手足腕膝不得少有欹側伸縮改易及隨中舉按用力輕重亦宜令匀若一事殊異於前則骨使類相近遠斷灸亦灸迁則在骨上或則骨間亦相遠動爭于針人氣不入穴中從從灸是無所益也若不失其穴灸至數壯覺脚骨中連鐵而不甚痛意則然陽氣中至堅觜已乞至數十壯使或苦眠中疼辛若以几支或用輕帛於射上眠中連束二臂令緩急得所亦能少助蓋手欲按而背欲舉故眠中費力或少休頃刻亦無害但要安頓身體四肢一如前耳如日灸五十壯累至數百為佳千金方云灸大百壯至千壯當貴氣下龍譚然如流水狀亦當有脈下其治疾之効甚最且敏速已上至在上而最能下氣非他穴藥石之比而又無所不治有疾者宜留意焉

坐點坐灸法



四五

石用之取穴別法第八

石藏用字用之京師人精也其治病方術一從古法亦多為人灸此穴其取穴法令患人休榻上竪脊正坐隨人之肥瘠大小置搘縛或墊枕之類以負累背之令兩臂相交手伏其上餘亦相同但用千金方不能又坐伸背使伏衣襟上之意也其用望物云欲大小高下常定勝於夜復但臂之伸屈與古異耳其意皆効益齋者意也隨事增損初無定方然真人其本意之在不能手得此穴但知鍼藥之不及不知大氣之能微則寸之浸巧是不為過也

紹興己未歲余守武昌時以傳聞郎戶部王云少得病瘵得襄州僧為灸膏肓令灸法搘拷上傳以指兩旋力按尋其穴令病者覺中指麻乃是穴若指病麻或雖麻而非中指者皆不也已而求得之遂一灸而愈壬戌四月增記於此

石藏用取穴別法圖

四六

葉善甫取穴別法第九

葉餘慶字元善平江人自云嘗病瘵疾其居對桥而行不能受有僧爲之灸膏肓穴得百壯後二日即能行數里登降皆不倦何是康強其取穴法但並足垂手正身直立勿令俯仰取第四椎下兩旁同身寸各三寸灸時以軟物枕頭覆面以兩手附身或臨時置身取安便而已其聆爲人灸亦用此法云皆有功然今昔人取穴之法甚異又與千金方立點則立灸之説不合歐陽興世行之陳了翁謂中醫也了翁得與爲張渙鐵衍其求穴尤詳審爲行之灸者甚衆故可見以葉所言較之葉穴微下至脊骨曲處之殊不和無少異也又常與同鄕醫二者琪云承傳之於鄕取穴之法正坐垂足而仰兩手令大指與膝頭齊肘官離服上亦自是其説雖與千金方伸臂令正直一法不同然比立點則近古矣又衢州開化縣普照院僧伸附得取穴二法其一法正坐豎立兩膝當孔以兩臂環抱兩手向膝以左手頭指捏左膝眼右手指亦然於背上數椎骨量穴伏此坐灸又法正坐立膝同上以臂貼膝外直指向足豎兩手相背以二頭指向身手捏兩足大指頭啟開餘亦如上其比同身寸只用伸指法似亦可用今俱存之不特以備見聞之博且使後人較其短長知所適從不爲異端之所惑也

葉元善取穴法圖

葉元善臥灸法圖



潘琪仰手曲肘取穴法



灸記補養法第十

孫真人云此穴灸訖令人陽氣康盛當消息以自保養取身體平復其補養之道且食溫軟毋傾毋令太飽又飲啖生冷油膩黏滑鵝豬魚蝦芦蔵其他動氣發風之物并觸冒風寒暑濕勿以陽氣乍盛輒犯房室如覺氣壅可灸臍下氣海丹田關元中極四穴中一穴又當灸足三里引火氣以實下隨病深淺加以歲月將息則可保平復不然是猶倚一木以支大廈之傾又發而去之其亦從晉候之歸非穴之罪也

余自許昌遭金狄之難憂勞艱危衝冒寒暑避地東下丁未八月抵泗濱感疫癘既至琴川為醫妄治榮衛耗耗明年春末尚苦胸脇腹脹氣促不能食而大便利身重足痿杖而後起得陳了翁家專為灸膏肓俞自丁亥至癸巳積三百壯灸之次日即覺氣■■平腫脹俱損利止而食進甲午已能肩輿出謁後再報之仍得百壯自是疾證浸減以至康寧時親舊間見此殊功灸者數人宿疴皆除孫真人謂若能用心方便求得其穴而灸之無疾不愈信不虛也因考醫經同異參以諸家之說及所親試自量寸以至補養之法分為上下篇并繪身指屈伸坐立之像圖於逐篇之後令覽之者易解而無徒冤之失亦使真人求穴濟眾之仁益廣於天下也建炎二年二月十二日莊綽記

○明堂應驗小兒灸穴圖 附論

夫小兒之患詳悉幽玄默而抱疾付不能言也或即胎中受病或是生後傷風動發寒熱寒溫各異且據諸家方論醫藥多門藥既無差金灸灸為散在諸經文繁至甚其說不同既點穴以差訛則治病全然效謬撮諸家明堂之內精選到小兒應驗七十餘穴並是曾經使用累驗神功今錄于後

正人形第一

頂上旋毛中及耳後青絡脉灸各三壯炷如小麥大治小兒驚癇先驚
啼叫後乃發也
鼻柱上髮際宛宛中灸三壯炷如小麥大治小兒風癇先屈手指如數物
乃發也
尺澤二穴在中横文約上動脉中灸各一炷如小麥大治小兒瘈驚風
手大指次指間後一寸五分陷者中灸各三壯如小麥大治小兒三
歲忽發兩眼大小眥俱赤
臍上臍下各五分二穴灸各三壯炷如小麥大治小兒顖門不合灸諸
未發顖門先合
中衝在中指甲後一分灸一壯炷如小麥治小兒夜啼上燈啼鷄鳴
止者

正人形第二

璇璣一穴在天突下一寸陷者中灸三壯炷如小麥大治小兒喉中鳴
咽乳不利
巨闕穴在鳩尾下一寸陷者中灸三壯炷如小麥大治小兒猪癇病如
尸厥口噤吐沫癇病者小兒惡疾也呼吸之間不及求師致困者不
少鍼灸固無良醫枉死者半
屈肘横文中上三分各灸一壯炷如小麥大治小兒睡中驚目不合
勞宮二穴在手心中以名指屈指頭所着處是也各灸一壯炷如小
麥大治小兒口有瘡蝕齦爛臭穢氣衝人
手少陰在掌後去腕半寸陷者中灸三壯炷如小麥大治小兒雞癇善
驚反掣自搖
內庭穴在足大指次指外間陷者中灸各一壯炷如小麥大治小兒痞
冬愈

正人形第三

鼻上入髮際三分灸三壯炷如小麥大治小兒身强角弓反張大灸大
推下節間三壯
兩乳前各一寸半上兩行三骨罅間六處灸各三壯炷如小麥大治小
兒龜胸緣肺熱脹滿攻胃膈所生又緣乳母食熱麵五辛轉更胸起
高也凡灸是從下灸上秋冬從上灸下若不依此法則十患不愈一
二也
合谷二穴在手大指次指兩骨間陷者中各灸一壯炷如小麥大治小
兒痄腮
臍下二寸三寸間動脉中灸三壯炷如小麥大治小兒秋深冷痢不止

正人形第四

鬼祿穴在上唇內中央弦上灸一壯炷如小麥大治小兒驚癇用鋼刀
決斷更佳
分水穴在臍上一寸灸三壯炷如小麥大治小兒水氣盡腫及腹大
手中指本節頭名拳尖灸三壯炷如小麥大治小兒熱毒風盛眼睛疼
肺俞二穴在三推下兩傍各一寸半灸各三壯炷如小麥大治小兒龜
背生時被客風拍着脊骨風達於髓也所致如是
心俞二穴在五推下兩傍各一寸半灸各三壯炷如小麥大治小兒龜背
生時被客風拍着脊骨風達於髓也所致如是
膈俞二穴在七推下兩傍各一寸灸各三壯炷如小麥大治小兒龜背
生時被客風拍着脊骨風達於髓也所致如是
腰對臍骨節間灸三壯炷如小麥大治小兒臍腫

正人形第五

前頂一穴在百會前一寸灸三壯炷如小麥大治小兒急驚風若不愈須灸兩眉頭及鼻下人中穴

率谷穴在耳上入髮際一寸五分嚼而取之灸小兒但是風癇病諸般驚治不差者

中庭一穴在膻中穴下一寸陷者中灸一壯炷如小麥大治小兒嘔吐沫汁

中渚二穴在手小指次指本節後陷者中灸各一壯炷如小麥大治小兒目澁怕明狀如青盲

手大指甲後一寸內廉橫文頭白肉際灸各一壯炷如小麥大治小兒雀目夜不見物

足大指次指之端去爪甲如韮葉灸各一壯炷如小麥大治小兒睡中驚掣

正人形第六

顖會一穴在上星一寸直鼻灸二壯炷如小麥大治小兒多涕是顖門被風抽着及肺寒也

天突穴在項結喉下三寸兩骨間灸一壯炷如小麥大治小兒急喉痺

鳩尾上五分灸三壯炷如小麥大治小兒食癇者先寒熱洒淅乃發也

鳩尾一穴在臆前蔽骨下五分陷者中灸三壯炷如小麥大治小兒牛癇目睛直視腹脹乃發也

僕參二穴在足跟骨下白肉際陷者中拱足取之灸各三壯炷如小麥大治小兒馬癇張口搖頭身反折馬鳴也

內崑崙二穴在內踝後五分筋骨陷者中灸各三壯炷如小麥大治小兒陰腫

背人形第一



顖會一穴在顖中心陷者是也灸三壯炷如小麥大治小兒脫肛瀉血
每廁臟腑撮痛不可忍者
承漿一穴在下唇稜下宛宛中是也灸七壯炷如雀屎大治小兒初生
三四日二七日內者噤不吮妳多啼者是客風中於臍循至心脾
二經遂使舌強唇腫瘂瘲噤妳得斯疾前施方藥百有一全大抵不去
風無過灸此穴次灸頰車
頰車二穴在耳下曲頰骨後灸各七壯炷如雀屎大合證同前
譩譆二穴在第六椎下兩傍各三寸宛宛中灸各一壯炷如小麥大
治小兒食晦頭痛及五心熱者
九椎上灸一壯炷如小麥大治小兒二五歲兩眼每至春秋忽生白瞖
遮瞳子疼痛不可忍者

背人形第二

心俞穴在五椎下兩傍各一寸半陷者灸三壯炷如小麥大治小兒
五六歲不語者心氣不足舌本無力發轉難
脊俞穴在十二椎下節間灸一壯炷如小麥大治小兒痢下赤白秋末脫
肛每廁肛疼不可忍者
翠尾骨上三寸骨陷間灸三壯炷如小麥大療小兒痱痢脫肛體瘦渴
飲形容瘦瘁諸般醫治不差者岐伯云灸三伏內用桃柳水浴孩子
午正時當灸之後用清帛子拭來有以見疳蟲子隨汗出也此法
神效不可量
龜尾即脊端窮骨也灸一壯炷如小麥大治小兒脫肛瀉血秋深不效

背人形第三



大抒二穴在項後第一推下兩傍各一寸半陷者中灸各一壯炷如小麥大治小兒頸瘡入服

肩中俞二穴在肩甲內廉去脊二寸陷者中灸各一壯炷如小麥大治小兒欬嗽目不明

第九推下節間灸三壯炷如小麥大治小兒羊癇目瞪吐舌羊鳴也

陽剛二穴在十四推下兩傍各一寸陷者中灸各一壯炷如小麥大治小兒飲水不歇面目黃者

囊後縫十字文當上灸三壯炷如小麥大治小兒胎產疝卵偏腫者春灸夏劾夏灸秋劾灸冬劾冬灸春劾

胃俞二穴在十二推下兩傍各一寸半陷者中灸各一壯炷如小麥大治小兒羸瘦食飲少生飢瘦

全嬰方灸法

凡點灸法皆須平直四肢無使傾側灸時孔穴不正無益於事若臥點則臥灸立點則立灸坐點則坐灸反此則不得其穴矣○凡灸若遇陰霧風雪猛雨炎暑雷電虹霓暫時且停候待晴明再灸時不可大飢大飽乳一切不祥之事○凡新生男女七日已上可灸已過不過七壯如雀屎大頭面手足背前諸穴不可灸有疾不過七壯背不過二七壯○又云小兒灸炷如小麥大詳但三五壯而止○又云夫病至極藥所不能者可以救療之寸之法古者以人中指第二節內度兩横紋為一寸其間有身長手短身長者是以不可一槩論也今人不辨長短但以灸之多不應效通真子云身手千等當以中指第二節為一寸身長手短者大拇指第一節為一寸宜依此行敢志者男左女右手為一寸即無疑殿矣○又云大人小兒男左手女右手以量中指第一節為一寸千金翼云灸節指撮

普濟方卷之一百六十

考論官律讀金字䭾

材方醫士孫志宇

寫書金義等

刻字匠殷撲增

普濟方卷之一百六十一目錄

鍼灸門

諸風

中風　中風大法　偏風
風痱　風痙　風懿
風痹　風癇　頭眩
諸痓　筋攣　風顛狂
癱瘓　諸賊風　風入
歷節風

傷寒

傷寒　傷寒頭痛　傷寒寒熱
寒熱　腹脹熱　傷寒熱痒
自汗　汗不出　傷寒無汗
傷寒嘔噦　瘧　黃疸

普濟方卷之一百六十一目錄畢

普濟方卷之一百六十一

鍼灸門

諸風 附論

凡諸百邪之病原起多途其有種種形相示表癲邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾說或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊走或嗔罵無度或是蜚蠱精靈手亂目急如斯種類癲狂之人今針灸與方藥並主治之凡占風之家亦以風為鬼邪之病凡百邪所病者針有十三穴也凡針之體先從鬼宮起次針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言說論其由來往驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起針女從右起針若數處不言便遍穴針也依訣而行針灸等處並備主之仍須依掌訣捻目治之萬不失一黃帝掌訣別是術家秘要縛鬼禁劫五嶽四瀆山精鬼魅並悉禁之有目在人兩手中十指節間第一針人中名鬼宮從左邊下針右邊出第二針手大指爪甲下名鬼信入肉三分第三針足大趾爪甲下名鬼壘入肉二分第四針掌後橫文名鬼心入半寸即太淵穴也第五針外踝下白肉際足太陽明鬼路火針七鋥鋥三下即申脈穴也第六針大椎上入髮際一寸名鬼枕火針七鋥鋥三下第七針耳前髮際宛宛中耳垂下五分名鬼牀火針七鋥鋥三下第八針承漿名鬼市從左出右第九針手橫文上三寸兩筋間名鬼路即勞宮穴也第十針直鼻上入髮際一寸名鬼堂火針七鋥鋥三下即上星穴也第十一針陰下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏第十二針尺澤橫文外頭接白肉際名鬼臣火針七鋥鋥三下此即曲池穴第十三針舌頭一寸當舌下縫刺貫出舌上名鬼封仍以一板橫口吻安針頭令舌不得動也前若是手足皆相對針兩穴若是孤穴即單針之○岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依俞穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也○經驗方云凡覺心中憒亂神思不怡或手足麻木此是風狀之候不問是風與氣宜速灸百會風池大椎肩井曲池間使足三里七穴兩邊依次

手目上及下灸之如灸稍覺氣壅延上或失音將欲絶者便可依此次
第灸之艾炷如蒼耳大各灸三壯足三里灸五壯輪日以次灸之至隨
年壯乃止又凡每遇春秋二時可於此七穴時復灸之以泄風氣如體
中素有風氣者尤須留意此灸法可保無虞此法能灸卒死○醫書云凡
人風發強忍怕痛不肯灸忽然卒死者是何病謂入臟故也有風病者
不可不知此灸法○又云凡覺論曰風中脈則口眼喎斜風中腑則肢
體廢風中臟則性命危凡治中風古方雖用續命防風等湯然此只可
扶助實在要救危急必全功必須大艾灼灸為良○又云凡喎向左
者謂左邊脈中風而緩也宜灸左凡喎向右者謂右邊脈中風而緩也
宜灸右其艾炷大如麥粒各灸二七壯宜頻灸二七壯宜頻灸之以取
盡風氣口眼正為度○又云凡覺手足或麻或痛良久乃已者是風將
中臟之候宜灸百會等七穴病在右即灸右病在左即灸左如
因循失灸手足已廢者春較秋灸秋較春灸以取盡風氣手足
輕安為度○凡風多從背五臟俞入諸臟受病肺病最急肺主氣息又
冒諸臟故也

○中風

治肺中風者其人偃臥而胸滿氣短冒悶汗出者肺風之證視目下鼻
上兩邊下行至口色白者尚可治
肺俞急灸百壯服續命湯小兒減之
詩曰
肺風喘促滿胸堂　偃臥難煩熱異常
口鼻之間須要白　尋衣肺壞色變黄
資生經王氏云若急黄者此為肺已傷化為血不可復治若為急風
邪所中便迷漠恍惚妄言狂語或少氣惙惙不能復言若不求師即
治宿夕而死即覺便灸肺俞及膈俞肝俞數十壯急服續命湯可救
若涎唾出不收者即灸當立效湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺
病相似然若緩可經久而死
治肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩耳連額上色微有青者肝風
之證若唇色青面黄尚可治

肝俞急灸百壯服續命湯
詩曰
肝家踞坐不低頭　左脇偏疼筋急攣
額目唇青為可療　目黄目白使人愁
治心中風者其人但得偃臥不得傾側悶亂冒絶汗出者心風之證若
唇正赤尚可治
心俞急灸百壯服續命湯
詩曰
心風偃臥熱而瘖　唇赤其身有汗青
白黑青黄為上見　停停時候扁醫箴
治脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黄吐鹹汁出者尚可治
脾俞急灸百壯服續命湯
詩曰
脾中風兮肌肉瞤　踞而腹滿吐鹹酸
唇并肢體通黄瘥　手足胖青療已難

治腎中風者其人踞坐而腰痛視脅左右未有黄色如餅粢大者尚可治
腎俞急灸百壯服續命湯
詩曰
腎中踞而腰脊疼　面浮耳黑賊風生
脇無黄點勝瘥愈　直髮泥容旦暮傾
治胃中風者腹滿填脹滿塞不通張口喘息頸上多汗孫思邈所謂新
食竟取風為胃風是也或曰風中諸臟不關諸府是亦一說然胃為水穀
之海五臟皆取氣於胃故並存之
胃俞
詩曰
胃病根原飲食來　擡肩喘息氣難開
口張頸汗腹中滿　浮診雙關脈大哉
治大腸中風者臥而腸鳴不止
大腸俞灸百壯可服續命湯
治中風眼戴上及不能語者

第二椎上及第五椎上炙各七壯,齊下火炷,如半棗核大,立瘥。

治中風半身不遂。資生經云:黃帝問岐伯曰:中風半身不遂如何炙?答曰:凡人未中風一兩月前,或三五月前,非時足脛上忽酸重頑痺,良久方解,此將中風之候。急炙三里、絕骨四處各三壯,後用葱、薄荷、桃柳葉四味煎湯淋洗,以驅逐風氣於瘡口出。炙瘡春較秋炙,秋較春炙,常令兩脚有瘡為妙。

治飲食不節,酒色過度,忽中風,口語蹇澀,半身不遂,宜七處齊下火,各三壯,風在左炙右,右炙左。

穴百會　耳前髮際　肩井　風市

三里　絕骨　曲池　七穴神效,不能具錄,依法炙,無不愈。

治風中府,手足不遂,其狀覺手足或麻或痛,良久乃已,此將中府之候。病左炙右,病右炙左,因循失炙,便著炙瘡,春較秋炙,秋較春炙,取盡風氣。集効

穴百會　曲鬢一作髮際　肩顒　曲池　風市

足三里　絕骨

治風中藏,氣塞涎上,不語,極危者,下火立效,其狀覺心中憤亂,神思不怡,或手足麻,此將中藏之候,不問風與氣,但依次自上及下各炙五壯,日別炙,隨年壯,凡遇春秋常炙,以泄風氣,素有風人可保無虞,此能炙暴卒。

穴百會　風池　大椎　肩井　曲池

間使　足三里

集効方云:治風莫如續命、防風、排風湯之類,此可扶助疾病,若救倉急,必火艾為良,此論亦當。

資生經云:范子默自壬午年五月間口眼喎斜,炙聽會等三穴即正。右手足麻無力,炙百會、髮際等七穴得愈。癸未年八月間,氣塞涎上,不能語,金虎丹加膩粉服至四丸半,氣不通,涎不下,藥從鼻中出,魂魄飛揚,如墜江湖中,頃欲絕,炙百會、風池等左右共十二穴,氣遂通,吐涎一碗許,繼又下十餘行,伏枕半月餘,遂平,爾後不覺意思少異於常,心中憤亂,即便炙百會、風池等穴,立效。本事方云:十二穴者,謂聽會、頰車、地倉、百會、肩顒、曲池、風市、足三里、絕骨、髮際、大椎、風池也。依而用之,立効。

凡氣塞涎上,不能語,心中風候也,巢氏病源常論之,古方雖謂但得涎卧,閉絕,汗出者,心中風之候,恐未盡也,范公炙得氣通,蓋炙百會之力,其吐幾一碗,下十行者,豈服金虎丹加膩粉所致耶。

治大患風者,先待後,得少可,遂以煙取之。　穴風池

治中風支節短氣,不食,食下,肉吐血,目不明,閉塞。　穴肝俞

治偏枯不能行,大風,氣下,不知人,卧,視如見星。　穴陰蹻

治卒中風不識人。　穴臨泣

治風,面浮腫,頭黑,欬氣上逆,復脹,大便下重,痿黃,股痛轉筋,目眩,頭痛。　穴解谿

治中風善怒,悲笑不休,手痺。　穴勞宮

治中風肘攣,實則心暴痛,虛則心煩,惕惕,風頭耳後痛,煩心,足不收,失履,口喎僻,頭項痛,牙車急。　穴內關　完骨

治心中風語悲泣。　穴心俞

治風痫,中風角弓反張,或多哭,言語不擇,發即無時,盛即吐沫,心熱煩健忘。　穴百會

治狂者風。　穴崑崙

治風眼腿脚不遂。　炙巨虛上廉,二穴各炙三壯。

治大風默默不知所痛,視如見星。　穴照海

治大風默默不知所痛,悲傷不樂。　穴天井

治青風心風。　穴百會

治偏風熱風。　穴肩顒

治肝風占候,其口不能言。　穴鼻下人中　大椎　肝俞炙五十壯,餘處隨年壯。睛明

入刻之深明　二三百壯良

治心風寒。　穴心俞炙各五十壯

治心風。　穴心俞兩邊各一寸二分,炙各五七壯

治心風,腹脹滿,食不消化,吐血,酸痛,四肢羸露,不欲食飲,鼻血,目䀮䀮,脘不明,肩頭脇下痛,小便急

穴肝俞二穴灸二三百壯差肥止一云灸心俞

治卒中惡風心悶煩毒欲死

穴足大指下横文急灸隨年壯立愈

內踝筋急不能行者　內踝上急灸四十壯

外踝筋急不能行者　外踝上急灸三十壯立愈

眼戴精上插　目兩眥後灸二七壯

不能語　第三椎上灸百壯

不識人　季肋頭灸七壯

眼反口噤腹中切痛　灸囊下第一横理灸十四壯灸卒死亦良

治大風卒或緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不隨

或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉身冷直或煩悶恍惚喜怒無節

或唇青口白戴眼角弓反張始覺發動

穴神庭灸七壯　次曲差　次上關　次下關　次頰車

次廉泉　次顖會　次百會　次本神　次天柱

次陶道　次風門　次心俞　次肝俞　次腎俞

次膀胱俞　次曲池　次肩髃　次支溝　次合谷

次胃俞　次陽陵泉　次陽輔　次崑崙已上各七壯

治風

穴上星灸二百壯　前頂二百四十壯

百會二百壯　腦戶　風　各三百壯

治大風　穴百會灸七百壯

治百種風

腦後項大椎平處兩箱量二寸三分頁病人指寸量兩箱各灸

百壯得瘥

治風耳鳴

從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得差耳鳴者亦差兩耳門前

後各百壯

治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人

第五椎名曰藏輸灸百五十壯二百壯便愈

治風腹中雷鳴腸澼泄利食不消化小腹絞痛腰脊疼強或大小便難

不能飲食　穴大腸俞灸百壯三日一報

治風　穴扶門灸五十壯

治風身重心煩足脛疼　穴絕骨灸百壯

治惡風邪氣泣出喜忘　穴百會　天府　曲池　列缺

治風入腹中　穴湧泉

治耳中風生　穴商陽

治大風目痛及目外眥痛　穴臨泣

治面黑黑風　穴[illegible]衝

治從頭至足面目赤　穴解谿

治風寒熱　穴掖門

治手中風熱　穴内關

治頭身風熱　穴間使

治風身寒　穴後谿

治胃中寒如風狀及治頭肢兩頰痛　穴俠谿

治肺寒　穴肺俞灸百壯

治胃寒　穴胃俞灸百壯

治大風逆氣多寒　穴大横

王氏云鄉里有人勿覺心腹中熱甚急投與鋪說其狀鋪家以為此
中風之候與治風藥而風不作予中心疑之至義陵見一大守中夏
忽患熱甚不免以水洒地設簟臥其上令人扇之次日忽中風數日
而殂人皆咎其卧水簟而用扇也暨到澧陽見一老婦人夏中亦患
熱夜出卧廳上次日中風湯其子預合得小續命湯服更召醫調理
數日愈始知人之中風心腹中多大熱而後作而小續命湯不可不
服也王令患風醫以青州白丸子排風湯續命湯四物湯黃耆建中
湯朮附湯爲末散各爲一處同和分數服每服水一碗棗三枚生薑
五片同煎至七分去滓温服日後與人服皆效司戶傳三湯四散子
用四君子排風續命湯爲本云風正氣勻氣散一切風疾無不差〇
又云凡中風用續命排風等湯神精丹菖蒲酒更加灸必愈

治熱風

兩乳頭各灸一七壯　足外踝後一寸各灸三壯
頂中旋毛灸一七壯
治風頭耳後痛煩心及足不收失履口喎僻頭項搖瘲痛牙車急
穴完骨
治風身熱　穴後谿
治風十指筋攣不得屈伸　兩手踝骨上各灸一七壯
治大風羅眶缺成松猪痛風眼舉半月後
兩腰眼各灸七壯
治中風手足不遂
穴百會　肩髃　聽會　曲池　三里
懸鍾　風市等七穴左治右右治左以取盡風氣輕
安為度
治繞踝風
剌曲池二穴如繞外踝痛兼剌絲絡一穴如繞內踝痛兼剌大
都二穴針入三分如腋前痛兼剌行間二穴針入六分

◎中風不語

治脾風占候聲不出或上下手
當灸手十指頭次灸人中次大推次兩耳門前脉去耳門上下
行一寸是次兩大指節上下各七壯
治脾風
穴脾俞脊兩邊灸各五十壯凡人脾俞無定所隨四季月應病
即灸藏俞是脾穴此法甚妙
治脾風者總忽為八風猥腿風半身不遂失音不語者
穴百會灸五百壯　次本神　次承漿　次風府
次肩髃　次心俞　次手五輸　次手髓孔　次手少陽
次足五輸　次足髓孔　次足陽明各灸五百壯
治中風失瘖不能言語緩縱不隨及風痱不能語手足不遂卒病欲死
不能語肺中風不能言口
穴天窓先灸五十壯息火　百會　移灸五十壯畢天窓還灸五十

壯若發先灸百會則風氣不得出內攻五藏喜閉伏仍失音也
所以先灸天窓次百會佳一灸五十壯卷泄火勢復灸之視病
輕重重者一處三百壯大較凡中風服藥益剌者但是風穴悉
皆灸三壯無不愈神良決定勿疑不至心者勿浪為火
巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉繫舌本心脾受
風邪故舌強不語三陽之筋並絡入頷頰夾於口諸陽為風寒所客
則筋急故口噤不開
治卒中風口噤不得開
機關名頰車二穴各灸五壯即得語又灸速年壯僻者逐僻左
右灸
治卒中風口喎
葦筒長五寸以一頭剌耳孔中四畔以麵密塞勿令泄氣一頭
內大豆一顆并艾燒令然灸七壯差右灸左左灸右千金不傳
耳病亦灸之
治中風口喎
手交脉灸三壯左灸右右灸左炷如鼠屎形横安兩頭下火
治口喎　穴剌承泣
治風中脉口眼喎斜 若久不治者入藏腹內可治
穴聽會　頰車　地倉
經驗方云自崇寧五年五月間忽口眼喎斜灸聽會等三穴即
正後右手足麻無力灸百會髮際等七穴得愈癸未年八月間氣塞
涎上不能語取金虎丹加腻粉服至四兩半氣不通涎不下藥從鼻
中出魂魄飛揚如墜江湖中頃刻欲絶灸百會風池等左右共十二
穴氣遂通吐涎幾一碗許繼又下十餘行伏枕半月餘遂平復方覺
意思惺快每遇心中憤亂即灸百會風池等穴無不立効　知灸
有神聖之功非藥所能及也甲申十月既望王思誠
治風口喎
穴列缺二穴列走陽明者灸三壯患左灸右患右灸左
治風失音不語　穴合谷各灸三壯
治不能言　穴通理

治中風口喎僻
口吻口横紋間灸覺火熱便去艾即愈勿盡艾則太過若
口左僻灸右吻右僻灸左吻又手中指節上灸一炷
治口喎斜
耳垂下麥粒大艾灸三壯左灸右右灸左
治風寒之氣客於厭間濡而不能發故瘖不能言又喉痺失聲皆風邪
所為也入臟皆能殺人
穴百會灸百壯鍼入三分補一
治中風卒失聲瘖啞不出
穴大椎旁一寸五分　又刺其下停針之
治風痱不能語手足不遂
度病者手小指內歧間至指端為度以置臍上直望心下以丹
注度上端畢又作兩度續所注上合其下開其上取其本度橫
置其開上令三合其狀如倒作厶字形男度左女度右手嬾不
分了故上丹注三處同時起火灸之各一百壯愈

治中風口噤牙關不開
刺水溝鍼入四分　次針頰車令人側臥張口取之針入四
分得氣即瀉
治中風不能語　第二顀或第五顀上灸五十壯
治風入臟使人瘖啞卒口眼相引牙車急舌不轉喎僻者
口吻邊橫文赤白際逐左右灸隨年壯報之至三日不差更報之
治中風氣塞涎上不語昏危者
穴百會　風池　大顀　肩井　曲池
間使　三里等七穴左治右右治左以取盡風氣神精為度
其病並依穴針灸或有不愈者一則不中穴二則雖中穴刺之不
及其分三則雖及其分氣不至出針四則雖氣至不明補瀉故其
病成有隨針而痊者一則不知刺禁假令刺中心即死之類是也
二則不明脉候假令下病其脉忽大者死不可刺之凡針灸者先
須審詳脉候觀察病證然後知其刺禁辨其經絡穴道遠近氣候
息數深淺分寸其病刺之獲時而愈者矣不可一途而取不可

治中風失音　一理而推之
刺任脉天突一穴在結喉下一寸宛宛中陰維之會針入五分次
針手少陰經神門二穴在掌後兌骨之端陷中針入三分次針手
少陽經支溝二穴在腕後三寸兩骨之間陷中針入三分次針足
少陰經湧泉二穴在足心屈足卷指宛宛中針入五分如舌急不
語刺瘖門一穴在項中央入髮際五分宛宛中仰頭取之針入二
分如舌緩不語刺風門一穴在項髮際上一寸大筋內宛宛中針入二分

偏風

治偏風口喎手腕無力半身不遂欬嗽掌中熱口噤不開
穴列缺
治偏風口目喎牙車脫臼　穴下關
治偏風口眼喎耳中如蟬聲　穴上關
治偏風口面喎頭項痛不得顧小便赤黃喉痺頰腫　穴完骨
治偏風口喎面腫　穴承漿　治偏風口喎　穴衝陽　地倉
治偏風口喎面痒浮腫風動葉葉狀如蟲行或目瞤痛　穴迎香
治冷風濕痺風疼偏風半身不遂腰胯痛不得轉　穴環跳
治偏風半身不遂熱風癮疹手臂攣急捉物不得挽弓不開臂細無力
筋骨酸疼又治手不得向頭　穴肩髃若灸偏風不遂可七壯不宜多
治偏風半身不遂刺風疼痛令纔捉物不得挽弓不開屈身難還脉
風臂肘細無力　穴曲池
治偏風半身不遂　穴陽陵泉　環跳　曲池
治大風偏枯半身不遂　穴照海
治偏風腿䏶手足不仁　穴上廉
治半身不遂　穴下崑崙　委中
治偏風　穴地倉　承山　上廉　下廉
治手足偏枯　穴陰蹻
治猥腿風半身不遂失音　穴灸百會
半身不遂男女皆有此患但男尤忌左女尤忌右若得此疾後風

藥不宜暫闕當令身上有灸瘡可也最忌房室或能如道釋修養方
能守其無它苦矣則當先百會顖會次風池肩髃曲池合谷環跳風
市三里絶骨不必拘舊經病左灸右病右灸左之說但按發疼處灸
之若兩邊灸亦佳但當自上而下灸之

治偏枯手足不能伸

穴刺委中

試效方云淡郭巨翁病偏枯二指著足底不能伸迎先師于京師
治之至則以長鍼刺委中深至骨而不知痛出血一二升其色如墨
又且繆刺之如是者六七次服藥三月病良愈

治偏風宜針下項七處灸亦得

穴風池　肩髃　曲池　支溝　五樞
陽陵泉　巨虛下廉

治風腰脚不遂不能踐起　穴上髎　環跳　陽陵泉　巨虛下廉

○風勞

治風勞氣欬嗽胸中煩熱身熱目眩　穴大杼

治風勞食氣　穴大椎

治風勞嘔逆上氣胸背痛喘氣卧不安　穴風門

治風勞腰脊痛　穴膀胱俞　治風勞臂肘不仁　穴肘分

治風驚恐吐血肘臂痛嗜卧四肢不得動　穴五里

治風勞失精身體極痛泄水下利膿血少腹腫痛　穴曲泉

治風勞腰痛　穴膀胱俞　關元俞

治風勞痺逆狂邪膝冷手節攣縮身癮疹腹脹少氣頭重風勞

穴伏兎　灸腦戶五壯針三分補之

治風勞發背癰疽

用麻繩一條蠟過從手中指第二節量至心坎骨截斷須直伸臂折
過自前項下取中繩至後心相對令病人閉口量兩吻闊狹以此爲則
對灸七壯神效

○風痓

治風痓　穴顱顖

治風痓口噤牙疼頸項強急舌強不能言　穴大迎

治寒熱頭痛痓脊強反折瘈瘲　穴瘂門

治瘛瘲風痓牙齗腫善驚　穴天衝

治熱痓引骨痛　穴脾俞　膀胱俞

治瘈瘲不出寒熱痓引肩痛　穴上關

治寒熱痓反折　穴腎俞　中膂俞　長強

治筋寒熱痓筋急手相引　穴肝俞

治痓上氣失瘖不能言　穴魚際　治反折　穴腰俞

治角弓反張　穴百會

治脊強反折　穴上窌　腰俞

風眩

治風眩頭痛項強寒熱　穴完骨

治卒不識人風眩鼻塞　穴當陽　臨泣

治風眩　穴後頂　玉枕　頷厭

治風眩驚手掉手臂泄風汗出腰項急

治風眩頭痛嘔吐心煩　穴承光

治坐如在舟車中　穴曲差

治風頭眩　穴神庭　上星　顖會

治風眩　穴天牖　前頂

治頭目風眩　穴攢竹

王氏云千金方載徐嗣伯之言曰風眩之病起於心氣不足胸上蓄熱
實痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癲小
兒曰癇則是風眩癲癇本一疾也不知後人何爲析而二之乎因分
爲三門且從爲之辭以釋世醫之疑云

治醉酒風發兩目疼痛及治不能飲頭痛嘔吐　穴率谷

治風眩　穴天柱

治風眩心中恍惚不足
以繩橫度口至兩吻既得口寸數便以其繩一頭度鼻盡其兩邊兩

孔間得寸數中屈之取半合於口之全度中屈之先覓頭上回髮
當回髮灸之以度度回髮左右前後當度端灸之前以面為正並依
年壯多少一年凡三灸皆須療差又灸壯數如前若髮有兩回則灸
其近當鼻者若兩回髮近額亦宜

治諸風眩暈 穴顖會灸七壯頂頭痛者是顖上穿風府陷入于泥丸宮不可以
未灸多後宜死是熱灸死蓋囟中人之根根氣先絕也

風痹

治驚悸瘛瘲風痹臂肘痛捉物不得 穴天井

治風痹手臂不舉肩中熱痛 穴肩貞

治風痹肘攣手臂不舉 穴尺澤

治寒熱風痹項痛肩背急頭痛 穴肩髃

治風痹腋內痛引膺不可屈伸喉咽痛 穴臑會

治痿厥風痹頭重頞痛髀樞股脛痛痿痹風痹不仁時有寒熱四肢

不舉 穴付陽

治風痹不仁 穴陽輔 陽關

治風痹 穴委中 治風痹 穴少海

治風濕痹 穴委中 下廉

治冷風濕痹及治痹病肉痹不知人 穴環跳

岐伯曰中風大法有四四曰風痹巢氏曰風寒濕三氣合而為痹風
多者為風痹風痹之狀肌膚盡痛而得手足不痛也皆治當以此求
之逮與續命湯依前穴灸之云

治通身痹大風 穴臑腧二穴各灸五壯

風癇

治癇風不識人羊鳴 穴神庭

治風癇青風心風角弓反張羊鳴多哭言語不擇發時即死吐沫心熱
悶頭風多睡心煩驚悸無心力忘前失後食無味兼重欲眠面赤鼻塞
及痹惡高歌棄衣而走角弓反張羊癇吐舌 穴百會

治風癇中風[illegible]多哭[illegible]吐沫[illegible]驚
悸 穴百會

治風癇目戴上不識人 [illegible]

治心中煩悶狂風風癇[illegible] 穴[illegible]

治肌膚痛並驚風癇 穴[illegible]

治風癇 穴脊中 [illegible] 穴前頂

治風癇如痛可灸灸俞 [illegible]

治風癇瘛瘲 穴[illegible]

治風癇 穴身柱 [illegible]

治癇病羊鳴吐舌 穴天井 [illegible]

治馬癇張口搖頭馬鳴欲反折 穴項風府 臍中灸三壯

治牛癇目正直視腹脹 穴鳩尾 大椎灸各三壯

治羊癇喜驚目吐舌 穴大椎灸三壯

治豬癇喜吐沫 穴完骨兩旁各一寸灸七壯

治犬癇手屈拳攣 穴兩手心 足太陽 肋戶灸各一壯

治雞癇善驚反折手掣自搖 穴足諸陽灸各三壯

治風癇 穴神庭 顖會

徐嗣伯風眩之病起於心氣不定胸上蓄實故有高風面熱相感而動風
風心相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癲小兒為癇此方為萬
無不愈因忽時但度灸穴使大針灸之無不差者初得針者便灸最
良余業之以來三十餘年所救者數千百人病此而死不逮得救故
也[illegible]
[illegible]
弦癇[illegible]有理故併其方附于此[illegible]但小兒癇非心氣不
足爾千金[illegible]三種本事有[illegible]風二[illegible]
象古方有三癇元台小兒百二十種癇[illegible]可也
[illegible]

治癲疾馬癇 穴金門 僕參

治目五般癇面痛鼻塞 穴肝俞

治風癇熱病心風驚癇[illegible]吐舌[illegible]如瘧症

穴上脘一穴 三里二穴

凡灸癇疾當先下定乃乘虛而灸之未嘗有因而灸者氣逼項後不通殺人若身體不甚熱心腹不脹滿便可灸之若壯熱甚者須先下後灸

癲癇

治卒暴癇鼓足不任身 穴天柱

治癇發瘛瘲狂走不得臥心中煩 穴攢竹 小海 後頂 強間

治風癇癲疾涎沫狂煩滿 穴絲竹空 通谷

治癲癇 陰囊下縫道正兩當中內灸隨年壯

治癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸 穴天井 小海

治癲疾互引善驚羊鳴 穴瘛脈 束骨

治癲癇狂走瘛瘲 穴筋縮 曲骨 陰谷 行間

治癲癇驚恐狂有所見 穴列缺

治失笑無時癲癇語不擇尊卑乍喜乍哭牙關不開 穴水溝

治驚癇狂悲泣 穴心俞

治驚癇狂走癲疾脊急強目轉上插 穴筋縮

治癲癇 穴僕參 金門 治風癇癲邪 穴脊中

治大人小兒五癇 穴神門 治風癇癲邪 穴脊俞

治腹氣滿癇癲風不識人羊鳴角弓反張披髮而上歌下哭多妄人語

驚悸不安寢 穴神庭

治癲癇吐舌沫出羊鳴 穴少海

治癲癇 穴肝俞 僕參

治狂癇風癇吐舌 穴胃管灸百壯不針

治狂癇不識人癲病眩亂 穴百會灸九壯

難經云狂病之發不安臥不饑飲食自言賢智歌樂行走此是陽氣盛之所為故經言重陽者狂今世以此為癲病誤矣癲病發則僵仆倒地故有陰氣之言陰氣大盛故不得行立而倒也今世以為癇病者誤也其舍於癲狂之病殊然如此而人或不信豈亦傳習之誤難以改歟

凡發狂則欲走或自高貴稱神聖皆須備諸火灸之乃得永差若悲泣呻吟此則為邪非狂也自依邪方法治

治驚風癇瘛瘲發搐神昏不語 穴百會灸七壯至七七壯量輕重加減艾壯數○又內足外踝下赤白肉際陷中金門穴灸七壯至七七壯

癲疾

治癲疾煩心悲泣 穴解谿 治癲疾頭重 穴瘂門

治癲疾頭面浮腫驚狂 穴完骨

治頭痛癲疾風痙牙齗腫善驚 穴天衝

治癲疾脊強 穴筋縮

治癲疾 穴申脈 後谿 前谷

治癲疾嘔沫吐舌 穴滑肉門

治癲疾吐沫 穴本神 兌端

治癲疾寒痛 穴飛揚 崑崙

治寒熱癲疾 穴承山

治癲疾不可向手臂不得上頭 穴尺澤

治癲疾 穴解谿 陽谿

治癲疾 穴神庭 上星 百會 聽會 顖會 偏歷 攢竹 本神 築賓 陽谿 後頂 強間 腦戶 絡却

治癲疾嘔沫寒熱痙互引 穴兌端 齗交 承漿 大迎 絲竹空 玉枕 顖會 天柱 商丘

治寒熱悸癲疾發痙瘛瘲口噤 穴承漿 大迎

治癲疾嘔沫 穴顱會 申脈

治癲疾手臂不得上頭 穴尺澤 然谷

治癲疾多言耳鳴口僻　穴偏歷

治癲疾大瘦頭痛　穴腦空　束骨

治癲疾互引善驚羊鳴　穴懸釐　束骨

治頭痛癲疾互引數驚　穴天衝

治心中懽懽數欠癲心下悸恐咽中否

治寒氣癲疾僵仆　穴風池　聽會　復留

治癲疾僵仆狂瘧　穴完骨　治癲疾　穴曲池

治狂癲　穴灸胃倉　或灸巨陽

王氏云有人患癲疾發則僵仆在地久之方蘇予意其用心所致爲灸百會又疑是痰厥致僵仆爲灸中管其疾稍減未除根也後閱脉訣後通真子有愛養小兒謹護風池之說人來覓灸癇疾必爲之按風池穴皆應手痛便灸之而愈

治卒癲疾

兩乳頭炙三壯　足大指本叢毛中炙七壯　足小指本節炙七壯

治狂癲癇疾

穴足少陽炙隨年壯

治癲

背第二椎及下窮骨兩處以繩度中折繩端一處是脊骨上也凡三處畢復斷繩作三折令各等而參合如厶字以一角庄中央灸下二角俠脊兩邊凡五處各百壯削竹皮爲度勝於繩

足大指上聚毛中又灸七壯　陰囊下縫又灸二七壯

兩乳頭又灸三壯　督脉又灸三十壯三報

天窓又灸至三百壯炷惟小作　百會又灸至三百壯

耳上髮際又灸各五壯

驚癇

治驚癇戴目上不識人　穴顱會

治驚癇破心吐血　穴巨闕

治心驚癇發狀如鳥鳴破心吐血心中氣悶不喜聞人語心痛瞋脹　穴鳩尾

治驚癇吐舌未出　穴少衝

治驚癇癇狂身寒熱頭痛目眩　穴束骨

治驚癇狂走癲病多言背強兩目轉上及目瞼　穴筋縮

治狂邪驚癇及驚狂走　穴承命灸三十壯

治狂癲風驚厥逆心煩　穴巨陽灸五十壯

治驚癇　穴行間　治驚風　穴完骨

風癲狂　附論

黃帝問曰人生而病癲疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母有所數大驚也氣上而不下精氣并居故令子發爲癲疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已止病癲初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癲疾刺諸分其脉尤寒者以鍼補之病已止癲疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而止癲疾始發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而止癲疾始作而引口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左強者攻其右右強者攻其左血變而止治癲疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者即瀉之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者尾骶也筋癲疾者身卷攣急脉大刺項大經之大杼脉嘔多沃沫氣下泄不治脉癲疾者暴仆四肢之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血不滿灸之俠項太陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本輸嘔多沃沫氣下泄不治

法

治癲狂吐舌　穴飛揚　太一　滑肉門

治風狂

先以鍼五枚內頭髻中以器盛之水漸而灌之指大口於上乃發聲呼視其人其人必欲起走慎勿聽因取水一噴之一呵視三次乃與拭去水指彈額上近髮際問欲愈乎其人必不肯答如此二七彈乃答仕鍼刺鼻下人中近孔内側空停針兩耳根前宛宛動中停針又刺鼻直上入髮際一寸橫刺又刺鼻直上醒悟乃止

治狂易多言不休　穴風府　崑崙　束骨

治風癲　兩乳頭灸各三壯　足大指甲後聚毛中灸各七壯

治狂仆　穴温留　液門　京骨
治笑若狂　穴神門　陽谷
治風熱善怒心中悲喜思慕歔欷喜笑不止　穴勞宮　大陵
治癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼　穴温留　僕參
治癲發如狂面皮厚敦者不治及療癲狂　穴長強
治狂走欲自殺及目妄視　穴風府　肺俞　行間
治驚癇狂走癲疾　穴筋縮　曲骨　陰谷
治狂走喜怒恍惚不樂　穴絡却　聽會　身柱
治癇發瘈瘲狂走不得卧
穴攢竹　小海　後頂　強間
治狂妄行登高而歌棄衣而走　穴衝陽　豐隆
治狂易多言不休目上反　穴天柱　臨泣
治狂言　穴支正　魚際　合谷　少海　曲池　腕骨
治狂言非常　穴下廉　丘墟
治狂易妄言怒罵　穴巨闕　築賓

治吐舌戾頸妄言　穴陽谿　陽谷
治驚狂善悲面赤目黃瘖不言　穴間使
治驚癇狂走瘈瘲脊急強目轉上垂　穴筋縮
治癲疾狂走　穴陽谷　身柱　腦空　京骨
治狂走欲自殺目反妄視　穴風府
治癲狂　穴束骨　治尸厥癲邪神狂鬼魅　穴攢竹
治久狂登高而歌棄衣而走　穴衝陽
治卒狂　穴光明
治卒強胃中澹澹惡風寒嘔吐怵惕寒中少氣掌熱腋腫肘攣及
療卒狂驚悸　穴間使
治小腸熱欲走　穴日月　治發狂咪吐涎沫　穴絲竹空
治癲疾狂走心煩吐舌　穴太一　治癲疾狂走　穴陽谷
治心中風狂走發癇語悲泣心胃悶亂煩滿汗不出結積寒熱嘔吐不
下食欬唾血　穴心俞　治狂陽　穴完骨
治發狂不識人驚悸少氣　穴巨闕

治發狂　穴曲泉　豐隆
治身熱狂悲哭　穴神門　治寒厥驚狂　穴陽交
治目眩發狂嘔吐涎沫項不得顧　穴少海
治風虛狂惕　穴支正　治狂言不樂　穴太陵
治妄言左右顧瘈瘲目眩　穴陽谷
治狂言喜笑見鬼　穴陽谿　治癲癇狂言見鬼　穴僕參
治癲疾多言　穴偏歷
治癲疾吐涎狂言見鬼又治癲疾吐舌鼓頷狂言　穴温留
治狂言　穴下廉
治癲疾狂言又治小兒癲癇吐舌　穴築賓
治卒面腫煩心狂言　穴公孫　治狂言口噤　穴太淵
治驚悸妄言　穴液門
治吐舌戾頸妄言不得左右顧并飛頭痛目痛　穴陽谷
治癇疾多言　穴筋縮
治癲癇狂歌不擇言　穴鳩尾

治鬼邪魅及癲狂語不擇尊卑
灸上唇裏面中央肉絃上一壯炷如小麥又用鋼刀決斷更佳
治語不識尊卑　穴水溝
治妄言　穴液門　治狂言恍惚　穴天樞灸百壯
治狂邪發無常披頭大叫欲殺人不避水火及狂言妄語驚恐歌哭
穴間使灸三十壯
治狂癇鬼語　穴足太陽灸四十壯
治狂癇驚走風恍惚嗔喜罵笑歌哭鬼語
穴腦戶　風池　手陽明　太陽　太陰
足陽明　陽蹻　少陽　少陰　陰蹻
足跟灸灸背隨年壯
治狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語
灸口吻頭赤白際一壯　又兩肘內屈中五壯
又背胛中間三壯報灸之倉公法神效
治卒狂言鬼語

以繳帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩處火俱起各
七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手
治卒狂鬼語　針其足大拇指爪甲下入少許即止
治邪病語不止及諸雜候　穴人中凡人中惡先押鼻下是也
治邪鬼妄語　穴懸命灸十四壯穴用口唇裏中央弦用鋼刀決斷佳
治肺中風狂言狂邪鬼語　穴灸天窻　伏兔
治悲泣鬼語　穴灸天府　慈門
王氏云有士人妄語異常且欲打人病數月人以意其是心疾爲灸
百會百會治心疾故也又疑是鬼邪用秦承祖灸鬼邪法併兩手大
拇指用軟帛縛急灸之當兩甲相接處灸七壯四處皆著火而後愈
更有二貴人子亦有此患有驗亦爲灸此穴愈
治狂走掣瘲　穴玉枕上三寸灸百壯　一法頂後一寸灸百壯
治狂走癲疾　穴頂後二寸灸十二壯
治狂走驚癇　穴河口灸五十壯
治狂走癲疾　穴大幽灸百壯

治狂走癲癇　穴季肋端灸三十壯
治狂走喜怒悲泣　穴巨覺灸隨年壯
治狂走驚恍惚　穴足陽明灸三十壯
治狂走易罵　穴八會灸隨年壯
治狂走　穴筋縮　治邪病大喚罵走遠　穴三里
治狂走癲厥如死人　穴足大指三毛中灸九壯
治狂走易氣　穴灸絕骨
凡鬼語狂走當依法灸之若傷寒鬼語癲狂惟宜用四物易加黃
耆粟分七八錢重作一服水一碗煎七分服滓即用水一碗煎半碗
連服常屢用之神效附著于此
治卒發癲狂病
陰莖上宛宛中灸三壯得小便通即愈
陰囊下縫灸二七壯
治狂風罵詈撾斫人名爲熱陽風
灸口兩吻邊燕口處赤白際名一壯　又陰囊縫二十壯仍勿近

前中邪根恐害陽氣也

癲邪

治神邪鬼魅　穴灸間使　治神邪鬼魅　穴攢竹
治狐魅神邪及癲狂病諸治不瘥者
併兩手大指用軟絲繩急縛灸三壯艾炷著四處半在甲上半
在肉上四處盡燒一處不燒其疾不愈神效小兒胎癇灸癇依
此灸一壯炷如麥
治狂言見鬼　穴陽谿　僕參　溫留
治狂邪鬼語　穴天窻灸九壯　或伏兔百壯
治悲泣鬼語　穴天府灸五十壯
治悲泣邪語鬼忙歌哭　穴慈門灸五十壯
治卒中邪魅恍惚振噤
灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本瓣令艾丸半在爪上半在
肉上各七壯不止十四壯炷如雀屎

治風邪　穴間使灸隨年壯　承漿又灸七壯　心俞又灸七壯
三里又灸七壯
治鬼魅　灸入髮一寸百壯　間使手心又各灸五十壯
治狐魅　合手大指縛指灸合間三七壯當狐鳴即差
治邪病臥瞑不自知　穴風府
治邪病鬼癲四肢重　穴囟上
治邪病四肢腫痛諸雜候　穴尺澤
治狂癲哭泣　穴手逆注灸三十壯

癲癇瘈瘲

治瘈瘲重急心腰強相引痛　穴命門
治瘈瘲寒熱脇痛　穴大杼　治瘈瘲不仁　穴屋翳
治瘈瘲　穴陽谷　治肘痛瘈瘲　穴四瀆
治瘈瘲　穴小海　治瘈瘲腳酸　穴承筋
治瘈瘲癲疾　穴小海　曲池

治癲疾狂疾怒欲殺人身熱狂走譫言見鬼　穴身柱

治癇疾　穴商丘

治癇發狂疾狂走　穴攢竹　小海　後頂　強間

治癇疾口噤不開　穴崑崙

治驚疾　穴陽谿　天井　治狂癇而驚　穴解谿

治狂疾沫出寒熱痓引骨痛　穴上關

治狂疾引臍腹短氣　穴巨闕　時每

治骨發狂狂疾口噤喉鳴沫出癇不能言　風府　翳風

治脊強反折狂疾癲疾頭痛　穴聽戶　聽會　聽宮

治狂走癲疾恍惚不樂　穴五處　身柱　委中　委陽　崑崙

治寒熱風痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重　穴腦戶　聽宮　身柱　穴瘂門

治頭風目眩狂疾目戴上不識人　穴五處

治狂疾口喎　穴巨髎

治癲疾口沫出目眩牙車不開口噤　穴上關

治臂痛癲疾瘈瘲頸項急不可顧　穴少海

治狂疾　穴付陽　天井

治驚風癲疾五指掣　穴腕骨

治癲病狂疾身熱目眩頭痛心煩不安　穴大椎

治癲癇狂疾　穴陽蹻晝發者灸二七壯　陰蹻夜發者灸二七壯

風疹

治風疹臂肘腕善動搖　穴曲澤

治熱風癮疹支刺風風瘙　穴肩髃

治風癮疹疥癬瘙痒如虫行搔之成瘡　穴曲池隨年壯灸

治風疹　穴涌泉　環跳

治刺風疹熱風搔痒　穴下崑崙

治癮風疹疼痛　穴曲池　治癮疹　穴伏兔

治大小人偏身風疹　穴合谷　曲池

資生經云人有風疹多必眼暗先攻其風其暗自差秋間人之目暗

亦有因風疹而得者故不可不先治乎

治風熱赤疹瘙癢搔之逐手作瘡

以一條艾蒿長者以兩手極意尋之着肘立一頭手并蒿竿拓着壁

伸十指當中指頭以大艾炷灸蒿竿上令蒿竿斷即止灸十十着艾

後重發更依法灸永差

治癮疹　穴曲池灸隨年壯　治頭痛癮疹　穴天窗灸七壯

治大風麻痛　穴曲池二穴各灸隨年壯發即灸之神良○又兩手

約指中理左右　又手足指兩虎口中各灸隨年壯一云各灸三壯

治歷節汗出　穴後頂　長強　涌泉　領厭

治歷節風足指不得屈伸頭目眩逆氣　穴飛揚

資生經云麝香丸亡治白虎歷節諸風疹痛游走無定狀如虫行晝

靜夜劇許叔微在歙川有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發

如蟲齧其痛多作鬼邪治王氏曰此正歷節病也三服愈

治髖痛指如大蟲齧搔之皮便脫作瘡　穴曲池灸七壯又云隨年壯

王氏云良方服治痛藥半月兩膝邊灸二七壯坐相長安公曾人無

數麻風惡疾千金諸方藥甚多或效或不効惟自縹藥細末地黃水

糊丸梧子大日二三服每服四五十丸茶湯下調攝不服効尤速只

難服不病去後亦宜服參耆與人神効若更灸曲池合谷三里絕骨

等穴七壯予與人按此等穴皆瘥疾故也

治白虎病凡丈夫婦人皆有此病婦人因產犯之丈夫眠卧犯之其病

口噤手拳氣不出　灸臍中七壯

鍼灸門

傷寒

治熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛顛顛然
先取涌泉及太陽井滎熱中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取俠谿
治温病身熱五日以上汗不出
刺大泉留鍼一時取鍼若未滿五日者禁鍼
凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰
即取公孫井俞實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

治熱病煩心足寒清多汗
先取然谷 後取太谿踝動脈
資生經云凡温病可針刺五十九穴又身之穴六百五十有五耳三十六穴灸之有害七十九穴刺之爲災
治温病 穴顱顖
灸陰毒傷寒法 其狀不躁不渴唇青臉背重咽喉及目睛痛心腹煩疼舌縮面青乞嘹氣喘嘔逆冷汗向暗不語
以生葱約十餘莖去根麁皮顛倒紙卷徑闊二寸勿令緊欲直齊以快刀切每一餅子高半寸安在臍心用熨斗火熨葱餅之不過十餘次患人即甦後服正氣藥
灸結胸傷寒法 其狀胸滿短氣按之即痛或吐逆滿悶或大便不通譫語不能救者
以巴豆七粒和皮肥黃連七寸去鬚同搗爛作一丸要在臍心上以手按下稍實於艾炷丁大於其上灸之 昔不過二五壯立愈緒用復
壯數一二月者病半月後有灸者癒

治氣虛陽脫體冷無脈氣息欲絶不省人事及傷寒陰厥百方不效者
熨法
以葱白紮縛如盞許大切去根及葉惟存白長二寸許如大餅餤先以火熁一面令通熱又勿令灼人及以熱處搭病人臍連臍下其上以熨斗滿貯火熨之令葱餅中熱氣鬱入肌肉中須預作三四餅一餅壞不可熨又易一餅良久病人當漸醒手足温有汗則差更服四逆湯輩温其內萬萬無失王氏云尹伯先病傷寒冥冥不知人八日四體堅冷如石藥不復可入用此遂差集驗校理胡全夫用此拯人之危不可勝救
初得病或先頭痛身寒熱或濇濇欲守火或腰背強直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但烈火灸心下三處
穴巨闕 上管 胃管
各灸五十壯大人可五十壯小兒可三壯亦隨其年灸之大小以意斟量
治傷寒已病者三四日以上
宜先灸胷上二十壯 又灸顖顖二穴 又灸風池二穴
又灸太衝三十壯神驗 又灸肝俞百壯餘處各二十壯
又以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰

資生經云凡治傷寒唯陰證可灸餘皆當鍼故千金方惟云刺取之
明堂云病甚者爲五十九刺所以瀉諸陽之熱逆也胷中四肢五藏之熱也若溫病身熱五日以上汗不出可刺太泉未滿五日禁鍼小而汗
金於頭痛身寒熱病乃灸巨闕上中管三處灸亦是陰證耶其壯蓋云或濇濇欲守火是也醫者當審之
治熱病手心中燠煩欠頻伸悲恐目眩頭痛面赤而熱心悸肘臂腫痛實則支腫虛則不能言舌強喉痺少氣遺溺 穴通里
療天行傷寒 穴中管
治傷寒背肉患憤不欲動搖身首濕不能食 穴腸俞
治熱病煩滿上氣心痛腹冷少氣悲心恐善一作驚及身熱胃痛口熱悶
酸下三下熱手攣不伸引腋痛 穴少衝

治傷寒餘疾交膚乾燥　穴曲池
治熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變　穴魚際
治熱病先不樂數日　陽谷　穴通里
治瘧傷寒咳嗽頷不得汗　穴尺澤
治頭身熱赤振慄腰中四肢注滿咳喘　穴腎俞
治氣熱身熱滿寒熱口乾身軟偏見目忘痛善悲　穴三間
治熱病寒慄鼓頷腹滿陰痿色不變　穴魚際
治熱病煩心心悶汗不出掌中熱心痛身熱如火舌本痛
穴中衝　少衝　關衝　勞宮　大陵　陽谿
天府　間使
治煩心善嘔　穴巨闕
治熱病煩心善嘔胸中澹澹善動而熱　穴間使
治傷寒溫病身熱煩心口乾　穴曲澤
治熱病先腰脛酸善渴數飲食身熱項強痛振寒寒熱頸項腰背則痛
掣頭強痛虛則生疣小者如疥　穴支正　少海
治振寒頸項痛　穴天井
治熱病肩背痛　穴委中
治傷寒頸項強目瞑多嚏鼻鼽出清涕　穴風門
王氏云陰毒況困危篤者灸臍中三百壯艾以半棗子之不
瘥不可治也或心逆耳聾勞可熨因灸後得宜者乎一理中湯救
人更名傳湯則蔥五苓散與服或剪人參湯服皆効又云傷寒多從
風寒得之始表中風寒入裏則不消笑未有溫服而不消也
治傷寒結胸　穴支溝　間使　行間
治傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸俱浮　穴合谷
治傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍　穴中脘　氣海
治傷寒少腹上有氣衝者　穴天樞　氣衝　三里　三陰交
治傷寒手足逆冷　穴大都　內庭　太谿　行間
治傷寒發汗不出　穴風池　俠谿　魚際　經渠
治傷寒胸中熱不已　穴大椎　風門　中府　缺盆
內庭
治傷寒胃中熱不已　穴中脘　三里　上廉　下廉
氣衝

治傷寒四肢熱不已　穴雲門　肩髃　委中　髀腧
治急食不通并傷寒水結　穴三間　合谷　承山
治陰毒傷寒四肢厥冷腹痛吐利身發紅斑自汗脉沉細或面赤九三
陰中寒皆灸之
穴陷谷穴灸二三七壯隨溫脉通汗出翊不爾再灸加艾倍之
治卒得食病似傷寒其人但欲臥七日不療殺人
右按其脊兩邊當有陷處正灸陷處及頭各七壯則愈
治傷寒始得一二日
右便可灸頂三壯又灸大椎三壯各加至五炷益良用之驗大椎平
肩斜齊高大者是也仍不得灸項分取之則非也上接項骨下肩齊
在椎骨節上是餘穴盡在脊下凡灸則不得失之毫釐今庄氏不定
高下是以言之出黃帝賦灸經
治斷溫病令不相染著及斷時氣瘴疫
右用艾灸病人床四角各一壯不得令知之佳也
治陰毒傷寒灸法
用乾艾葉搗熟去灰作艾炷灸臍下一寸三分名氣海二寸丹田三
寸關元五十壯至二三百壯以手足漸溫人事精爽爲可治
治陰證傷寒灸法
於臍下一寸半氣海穴二七壯小作艾炷於臍心以鹽填實灸七壯
立効二寸丹田三寸關元皆可灸
治熱病後發豌豆瘡
灸兩手腕研子骨尖上三壯男左女右
治傷寒熱盛煩嘔　穴大椎
治熱病偏頭痛引目外眥　穴懸釐　鳩尾
治時氣病起諸復當灸法
男初覺便灸陰三七壯若已盡甚至百壯即愈眼無妨陰道瘡復常
治傷寒熱甚五十九刺〇五十九刺者為頭上五行以越諸陽之熱也
穴大杼　膺俞　缺盆　背俞（此八者以瀉胸中之熱也）　氣衝
三里　巨虛　上下廉（此八者以瀉胃中之熱也）　雲門　髃骨
委中　髓空（此八者以瀉四肢之熱也）
五臟腧傍五　此十者以瀉五臟之熱也凡此五十九穴者皆之左右

故病甚則當刺之乙刺之出吸則納鍼得氣則瀉勿令足腹起似稅
挍故鍼經曰熱者疾之刺熱病汗不出
夫傷寒熱病汗不出者榮衛不交陰陽不和故汗不出當刺結胃汗通
其經絡和其陰陽令汗得出
手陽明有高陽合谷　手太陽有腕骨陽谷
足少陽有俠谿　足陽明有厲兊　手厥陰有勞宮
凡此七穴皆刺熱病汗不出隨經擇脉調其陰陽和其榮衛令得汗
出又十二經之滎皆治身熱為主身熱皆南方火故經曰滎主身熱
皆可刺也
刺傷寒結胷痞氣
傷寒下後結胷痞氣者皆是三陰之終手三陰之始胷中結痞過在
足少陰腎手厥陰包絡刺兩經之井原以瀉胷中之氣心中結痞過
在足太陰脾手少陰心刺兩經之井原以瀉心中之氣胃中結痞過
在足厥陰肝手太陰肺刺兩經之井原以瀉胃中之氣然上脘中脘
下脘應痞結而瀉之

治傷寒三陽頭痛法
傷寒三陽頭痛何法刺之答曰手之三陽足之三陽皆會於頭者謂
諸陽之會其受邪伏留而不去故曰三陽頭痛視其色脉知在何經
而取之
如脉浮而頭痛過在手足太陽刺　穴腕骨　京骨
如脉浮而長過在手足陽明刺　穴合谷　衝陽
如脉浮而弦過在手足少陽刺　穴陽池　丘墟　風府　風池
已上數穴刺三陽之頭痛法也
治傷寒三陰腹痛法　傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足
之經皆會於腹過經取之
如脉弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺
穴太衝　太淵　太陵
如脉沉而腹痛過在足少陰腎手厥陰心胞刺
穴太谿　太陵
如脉細沉而腹痛過在足太陰脾手少陰心刺

穴太白　神門　三陰交
已上數穴刺三陰腹痛之法也
灸少陰原救脉法
治傷寒陰病脉欲絶當灸太谿穴太谿者足少陰腎之原少陰病屬
水陰氣太盛陽氣不得營故瀉陰補陽陰毒傷寒將次四肢俱重賊
痛脉微遲當灸氣海或關元脉屬少陰故同法瀉陰補陽也
辨傷寒榮衛鍼灸法
傷寒經與表合鍼與榮合汗逆痛不止刺風池風府却與桂枝湯傷
寒經與裏合灸太谿七壯與通脉四逆湯此太陽少陰表裏之法故
表可鍼太陽也裏可灸少陰也
傷寒刺期門
太陽病頭痛眩冒心下痞者刺肺俞肝俞不可發汗發汗則譫語不
止當刺期門穴〇頭痛背強太陽經病可發汗心下痞滿邪傳裏也
不可發汗刺肺俞肝俞其邪氣二穴皆在太陽經也是高下之刺也妄
發其汗內亡津液傳屬陽明故譫語不止太陽者當瀉肝經刺

期門恐傳於脾胃也
傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門
腹滿譫語太陰陽明經也脉浮而緊肝脉也故夫來妻名曰縱當刺
期門
傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴欲水其腹必滿自汗出小便利肝乘肺也名
曰橫刺期門
發熱嗇嗇惡寒者肺病也大渴也上焦有熱也自汗者表虛也小便
利者裏和也妻來乘夫名曰橫當刺期門
灸傷寒欬逆法
千便良方云有患霍亂吐痢者其日忽發欬逆半日之間遂至困殆
有人云有灸欬逆法凡傷寒及患疾吃欬逆皆為悪候投藥皆不效
者灸之必愈予遂令灸之火至欬逆已定其法乳下一指許正與乳
相直骨間陷中婦人即屈乳頭度之乳頭齊處是穴艾炷如小豆許
灸三壯男灸左女灸右只一處火到肌即差若不差則多不救矣
治脉微細不見二時無脉者

以圓利鍼刺足少陰經復溜二穴在內踝上二寸陷中鍼至骨順鍼
往下刺之候迴陽脉生大乃出鍼
治傷寒飲水過多腹脹氣喘　穴中脘
治熱病身痒洒淅振寒季脇支滿痛　穴刺陷谷足先寒上至膝乃出鍼
治傷寒寒熱身熱喘　穴三間
治傷寒過經不解　刺足厥陰經期門二穴使經不傳凡治傷寒辨
其足三陰三陽經當而刺之仲景傷寒傳足經不傳手經此之謂也

○傷寒頭痛

治傷寒寒熱頭痛欬喘肩不舉　穴溫溜
治熱病頭痛身熱引目外眥而急煩滿汗不出引頷筋面赤皮痛
穴懸顱
治熱病偏頭痛引目外眥　穴懸釐
治振寒小指不用頭痛　穴少澤
治身熱頭痛進退往來　穴神道　關元
治頭痛食不下　穴三焦俞
治熱病先頭重項痛煩悶心身熱熱爭則腰痛不可俛仰又熱病煩悶
不得卧身重骨痛不相知　穴太白
治傷寒身熱頭痛欬逆肩不得舉　穴溫溜
治頭痛　穴魚際　掖門　中渚　通理
治頭痛　穴天池
治頭眩痛　穴支正
治頭痛項頸熱　穴涌泉　治頭痛汗不出　穴魚際
資生經云治傷寒頭痛者多矣惟袁氏五苓散服之效不必鍼灸于
屋施與人皆效故也
治頭痛　穴風池

○傷寒寒熱

治熱病先腰脛痠喜渴身熱項強振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩
痛虛則生疣痂　穴少海　支正

治傷寒溫病身熱煩心口乾心清善驚手清逆氣嗌嚏肘瘛善搖頭顏
清汗不過肩　穴曲澤
治氣熱身熱喘寒熱口乾喘息口急痛善嘔　穴三間
治寒熱頸項腫耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛麻小不舉　穴肩貞
治傷寒欬熱不盡　穴曲池　治寒熱好嘔　穴商丘
治寒熱皮肉骨痛少氣不得卧　[illegible]
穴中府　膈俞　[illegible]　穴支溝　肩井
治寒熱欬氣上不得卧
治寒熱掌中熱　穴列缺　治傷寒振寒頭項痛　關衝　穴天井
治振寒而久　穴衝陽　治身熱惡寒　穴後谿
治傷寒熱盛煩嘔　穴大椎

○寒熱

治骨寒熱汗注不止　穴復溜
治寒熱解散淫濼脛酸四肢重痛少氣難言　穴至陽
治身體寒淫濼骨痠不能久立　穴光明
治寒熱風痙脊強反折　穴瘂門
治洒淅寒氣　穴陶道　神堂　風池
治洒淅惡寒厥逆　穴陰郄
治洒淅惡風寒虛熱舌黃身熱頭痛欬嗽汗不出寒走背痛不得息
穴魚際
治寒熱　穴浮白　治頭重身熱　穴胃俞
治身熱頭重脇痛不得轉側　穴顱息
治身熱　穴太白　陽綱　治身體煩熱　穴曲差
治骨寒髓熱　穴腦空　治寒熱喘滿　穴肺俞
治寒熱胸脇滿　穴天池　治下寒上熱　穴少衝
治寒熱　穴神道　少海　治振寒　穴聽會
治洒淅振寒　穴臨泣
治虛熱洒洒毛竪惡風寒舌上黃身熱欬嗽喘痒走背皆不得息頭痛
甚汗不出熱煩心少氣不足

穴魚際

治寒熱骨痛 穴膈俞 治身寒熱 穴天突

治身寒熱引項強急 穴臨泣 治寒熱 穴[illegible]陽 光明

治臟腑積聚心腹滿腰背痛飲食不消吐逆寒熱往來小便不利羸瘦

少氣

穴三焦俞隨年壯 又胃管穴灸百壯及灸至千壯止

治四肢寒熱腰疼不得俯仰身黃腹滿食嘔舌根直

穴脾俞并胃三穴各灸七壯

治盜汗寒熱惡寒 穴肺俞隨年壯 陰都百壯

治盜汗寒熱 穴玉枕五十壯 治三焦寒熱 穴小腸俞灸隨年壯

治膀胱三焦津液下大小腸寒熱赤濁洞洩腰脊痛小便不利婦人帶下

穴三焦俞灸五十壯

治身體腰脊如解及治寒熱

先灸項大椎以年為壯數次灸撅骨尾翠骨也以年為壯數視背

頰陷者灸之○兩肩胛上陷者灸之穴肩井也○兩季脇之間灸之穴京門也

外踝上絕骨之端灸之穴陽輔也○足小指次指間灸之穴俠谿也○缺盆

骨上切之堅痛如筋者灸之穴缺盆也○臍下陷脈灸之穴關元也○外踝後

灸之穴崑崙也○膺中陷骨間灸之穴天突也○背兩胛下灸之穴膈俞也○膝下

三寸灸之穴三里也○毛際動脈灸之穴氣衝也○膝下三寸分間灸之穴[illegible]

○足陽明跗上動脈灸之穴衝陽也○巔上一灸之穴百會也

治身體腰脊如解 穴湧泉

○腹寒熱氣

治腹痛而熱 穴行間 治腹中熱 穴中極

治五臟熱及身體熱脈弦急

灸第十四椎與臍相當五十壯老小增損之若虛寒至百壯橫三

間寸灸之

治身體熱腹痛 穴氣衝

治腹中熱善渴涎出是蛔也手持之物令得移

穴刺中管穴亦不可容易鍼

治腹中大熱不安 穴氣衝

治寒氣入腹 穴關元 治久冷 穴天樞灸百壯

治腹寒 穴陰陵泉 三陰交 治腹中寒熱 穴隱白

療熱風冷痺 穴下廉 治寒熱 穴上關

治寒熱亦主下部寒熱 穴飛揚 治寒熱 穴京門

治乍寒乍熱 穴少衝

治但是積冷虛之病 穴宜灸關元

治臟腑久積冷氣心腹脹滿 穴三里

治久積冷氣繞臍切痛時上衝心 穴天樞

治冷氣 穴中極 治冷氣 穴漏谷 會陽

治六腑氣寒不嗜食 穴下管

治冷氣上衝心 穴氣海 治腹中寒冷氣脹滿 穴隱白

治上氣冷發腹中雷鳴 穴太衝

治結氣寒冷 穴太倉灸百壯

治臍下攪痛流入陰中發作無時此冷氣也 穴關元灸百壯

治心下寒 穴商丘

治心寒冷氣上 穴鳩尾 少衝 商丘

治寒厥狂 穴陽交 治腹寒氣滿 穴衝門 龍頷灸百壯

曹氏經云五臟六腑復生七傷變生七氣積聚堅牢如杯留在腹內

心痛煩冤不能飲食時來時去發作無常寒氣為病則吐逆心滿

熱氣為病則恍惚悶亂長如眩冒又復失精宜服和氣百方七氣湯

若冷氣忽作常灸不及只用大鍼微刺諸穴與反覆須臾即定神效

治胃中熱 穴三里灸三十壯

治三焦膀胱胃中熱氣 穴水道灸隨年壯

○身寒痺

治身常濕 穴腎俞 治身濕 穴[illegible]

治身濕怯時時寒 穴曲池 列缺

治寒痺痛引頭下節 穴曲泉

治膝股重 穴合陽 治久濕痺不能行 穴漏谷

治溼痺不腫髀筋急痛頸痛 穴懸鍾
治髀樞痛膝脛骨搖痠痺不仁筋縮諸節痠折 穴絕骨
治身痺洗淅振寒 穴臨泣 治骨痺煩滿 穴商丘
治身體不仁 先取京骨 後取中封絕骨皆瀉之
治痿厥身體不仁手足氣溼重膝腫 穴中封
治繞從痿痺脇腸疼冷不仁 穴風市
治寒氣在分肉間痛苦痺不仁 穴中瀆
治膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁 穴陽關
治痠痺不仁身重 穴杼骨 治冷風溼痺 穴環跳
治溼痺 穴犢口 治寒溼内傷 穴下髎
治風溼痺 穴委中
治偏風熱風冷痺不遂風溼痺 穴下廉灸瘡差冷痺即已
治痺走胸背 穴魚際
治冷痺脛膝疼腰腳攣急足冷氣上不能久立有時厥厥嗜臥手足沉
重目覺氣疫名緩風病令人極無情地常愁不樂健忘嗔喜有如此候

冷 穴灸懸鍾絕骨隨年壯一灸即愈不得再灸也若年月久更發依法
更灸若意使酸多者七日外更七壯
資生經云痺論曰痺之所起生自五勞五勞既用二臟先損心腎
受邪即生六極一曰氣極氣極令人內虛五臟不足外受邪氣多寒
溼痺又曰五勞六極七傷七氣積聚為病者甚則令人得大風緩
急溼痺不仁偏枯筋縮四肢拘攣令人無子
治胃痺擧節不用而痛汗注煩心取三陰之經補之○厥痺者厥氣上
攻腹取陽之絡視主病者瀉陽補陰經也
穴會陰 太淵 消濼 照海
治足大指痺傷下車挫閃脾腎傷為筋痺 穴解谿
治痺脛重足跗不收跟痛 穴巨虛下廉
治脛疼足緩失履溼痺足下熱不能久立 穴條口
治膝寒痺不仁痿不屈伸 穴髀關
治膚痛痿痺 穴外丘

治髀痺引膝股外廉痛不仁筋急 穴陽陵泉
治腰脇相引痛髀筋瘈脛痛不可屈伸痺不仁 穴環跳
治風寒從足小指起脈痺上下帶胸脇痛無常處 穴至陰
治足下熱脛痛不能久立溼痺不能行 穴三陰交
治胸痺引背時寒 穴間使 治痺心痛 穴天井
治胸痺心痛不得息痛無常處 穴臨泣
治胸痺心痛 穴膻中忌鍼 治胸痺當痛 穴期門

○自汗

治多汗 穴玉枕 治汗出 穴膈俞
治多汗四肢不擧少力 穴橫文灸五十壯 長平灸五十壯
治頭項疼歷節汗出 穴飛揚 涌泉 頷厭 後頂
治瘧多汗 穴崑崙 治溫瘧汗出 穴然谷
治骨寒熱汗注不止 穴復溜 治心痛汗出 穴大敦

治汗出 穴[illegible] 治風汗出 穴中府
治汗出而寒 穴少商 治汗出 穴衝陽
治熱病煩心心悶先手臂身熱瘈瘲唇口聚鼻張目下汗出如珠
穴列缺 曲池
治汗出寒熱 穴五處 攢竹 正營 上管 缺盆
中府
治汗出衄血不止 穴承漿 治汗出而喉痺 穴百會
治熱病汗出目眩足清又治汗不出厥手足清 穴大都
治寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫 穴復溜
治熱病煩心足寒清多汗 先取然谷 後取太谿大指間動脈皆先補之
治汗出 穴列缺 肺俞 心俞
治多汗瘧病 穴譩譆灸五十壯

○汗不出

治青衄逆氣不得汗　此鍼補手太陰穴汗出
治瘧疾汗不出　穴少澤　復溜　崑崙
治風瘧汗不出　穴偏歷　治瘧寒熱汗不出　穴少澤
治疫瘧振寒熱汗不出　穴上星
治頭痛風汗不出　穴瘂門
治心中煩滿汗不出　穴心俞　曲差
治洒淅寒熱脊強汗不出　穴陶道
治振寒汗不出　穴腕骨
治頭痛如破身熱如火汗不出　穴命門
治身熱汗不出　穴上脘
治汗不出　穴至陰　魚際　曲泉　俠谿　中膂俞
治風汗不出　穴偏歷
治手足煩熱汗不出時動　穴[illegible]
治汗不出　穴命門　肺俞　治汗不出過肩　穴曲澤
治汗出不過眉　穴曲澤　治汗不出　穴魚際

治熱病汗不出腹中拘急煩嗜臥四肢怠惰不欲動身常重不能食
食則心痛周痺身皆痛　穴鬲俞

◎傷寒無汗

療熱病汗不出手足逆冷腹滿善嘔目眩煩心四肢腫　穴大都
治熱病三日以往不得汗徐傷又云及主熱病煩滿欲嘔噦脇不可
反側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下　[illegible]
渴口中爛掌中熱欲嘔　穴勞宮
治臂厥熱痛汗不出　穴孔最　[illegible]
治熱病汗不出　穴經渠　陽池　陽谷　合谷　前谷　內庭
後谿　腕骨　支溝　厲兌　衝陽　解谿
治熱病汗不出　穴中衝
治煩滿汗不出　穴命門　膀胱俞　上管　曲差
上星　陶道　天柱　上窌　譩譆　風池

治下部寒熱汗不出體重　穴飛揚
治汗不出悽厥惡寒
穴玉枕　大杼　肝俞　心俞　膈俞　陶道
治腹足清寒熱汗不出　穴光明
治身熱頭痛汗不出　穴曲泉　治頭痛不甚汗出　穴魚際
治氣膈善嘔鼓頷不得汗煩心身痛　穴尺澤
治熱病先不樂頭痛面熱無汗　穴液門　中渚　通理
治傷寒寒熱頭痛清汗出不過肩　穴曲澤
治熱病汗不出取耳經血立愈　穴委中
治熱病汗不出　穴孔最　[illegible]
治熱病汗不出　穴陷谷　厲兌　膽俞　中渚　大都
支溝　陽谷　腕骨　前谷
治熱病煩滿汗不出　穴意舍
治熱病汗不出面痛頸痛心不欲食　穴譩譆
治熱病汗不出　穴譩譆　治傷寒汗不出脊強　穴大杼

治熱病汗不出鼻衄喘逆心痛嘔吐　穴經渠　治熱病汗不出　穴商陽
治熱病汗不出寒熱身如火心痛煩滿舌強頭痛如破　穴中衝
治熱病汗不出寒熱嗜臥頸黃腹滿大便難　穴太谿
治身病汗不出目眩苦頭痛　穴風池
治熱病汗不出胸脅滿腫善笑不休心懸若飢善悲且驚恐目赤小便血
噫逆狂言不樂　穴大陵
治熱病汗不出卒狂走則喜笑不能足實則足[illegible]痛身體不仁
善嚙頰　穴光明
治熱病汗不出目瞑頸痛四肢不舉腋下腫上氣胸中有聲喉中鳴
穴天池
治熱病汗不出　穴譩譆　天牖　風池　上星
治熱病汗不出肩苦眩目心　穴承光
治熱病汗不出　穴天柱　風池　[illegible]　關衝　液門
治熱病胸中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿瘛瘲心疝氣不
得息　穴巨闕

治熱病汗不出𧏾痛不得息頸頷腫寒熱耳鳴聾無所聞 穴陽谷

治熱病汗不出善嘔腹脹滿嘔一日 穴衝陽

傷寒嘔噦

治傷寒煩心善嘔心腹脹滿熱腸中不利 穴巨闕

治熱病煩心善嘔胸中澹澹 穴間使

治傷寒寒熱頭痛嘔噦 穴足留

治汗出而嘔痓 穴百會　治寒熱好嘔 穴商丘

治傷寒熱盛煩嘔 穴大椎　治頭身熱赤欲嘔 穴腎俞

治熱病煩滿而嘔噦 穴勞宮　治身熱氣逆嘔噦 穴曲澤

治傷寒嘔逆噦嗝膈中氣閉塞

穴膈俞　灸穢下散毛不附肋宛宛中五十壯

治傷寒嘔逆汗出氣自腹中起上衝咽喉逆氣連屬不能出或至數十聲上下不得喘息此由寒傷胃脘胃氣先虛逆氣上乘於胃與氣相擊不止者難治謂之噦

五百壯

穴灸中脘關元百壯未止灸腎俞百壯宜茱萸丸

宜用方論噦者俗云欬逆也針灸書皆以此名之

瘧 附論

治瘧病灸刺法論曰足太陽瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已刺郄中出血足少陽瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽足陽明瘧令人先寒洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上足太陰瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取之足少陰瘧令人吐嘔甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已足厥陰瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數小便意恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰 法

治溫瘧寒瘧痎瘧久不愈 穴譩譆

治溫瘧痎瘧 穴腰俞 中膂

治痎瘧 穴腎俞 命門 大谿

治寒瘧 穴陶道　治寒瘧 穴上廉

治瘧寒熱口乾身熱喘息痛 穴二間

治瘧發寒熱頭重相心 穴合谷 至陰

治寒熱痎瘧 穴液門 陽谷 天池

治發寒熱瘧久不愈目視䀮䀮 穴偏歷

治痎瘧久不愈 穴大椎

治痎瘧久不愈者項痛少氣悲恐畏人臂痠掌熱手握不伸

穴少府

治瘧寒熱洒淅 穴陶道　治寒熱痓腰腹相引痛 穴命門

治瘧日西發 穴足臨泣

治久瘧 穴太谿 照海 中渚

治久瘧振寒及頸下腫 穴丘墟

治瘧 穴陷谷

治痎瘧色蒼蒼振寒小腹脹食快快遶臍痛足逆冷不嗜食身體不仁太息 穴中封

治痎瘧寒熱目眩頭痛暴泄耳聾 穴液門

治痎瘧頭痛煩悶 穴腕骨　治寒熱痎瘧口乾 穴商陽

治溫瘧 穴譩譆 中脘 白環俞

治寒熱瘧 穴上脘 偏歷

治寒瘧唇焦口乾氣喘 穴三間

治瘧腹寒熱 穴脾俞

資生經云有人患久瘧諸藥不效或教之以灸脾俞即愈更一人亦久患瘧閱之亦灸此穴而愈蓋瘧多因飲食得之故灸脾俞作效

治寒瘧不嗜食 穴內庭 公孫

治瘧寒熱善驚不欲食 穴京骨 偏歷

治瘧心煩甚欲得飲冷汗寒則欲處溫中咽乾不嗜食 穴神門

治身寒熱瘧病心下煩滿氣逆 穴合谷 陽谿 後谿 陽池 陰都

治寒瘧 穴天樞

治寒瘧嘔沫善笑縱唇口 穴列缺

治瘧寒慄腹痛嘔逆心善噦唾沫唇乾引飲不下膨脹手攣指痛寒慄
鼓頷喉鳴　穴少商
治瘧寒熱胸背拘急胸滿膨脹　穴通谷
治溫瘧痎瘧　穴大椎　腰俞
治瘧頭項強不可俛仰頭痛振寒　穴大杼
治痎瘧　穴百會　前谷　風池　神道
治痎瘧振寒熱汗不出　穴上星
治風瘧汗不出　穴偏歷
治瘧寒汗不出　穴少澤　復溜　崑崙
治瘧先寒先熱甚又而熱熱去汗出　穴衝陽
治瘧多汗又云主瘧多汗腰痛不可俛仰目如脫項如拔
穴然谷　崑崙
治瘧寒熱　穴列缺　後谿　少澤　前谷
治瘧欬逆心悶不得臥寒熱　穴太淵　太谿　經渠
治作寒作熱瘧　穴太陵　腕骨　陽谷　少衝

治瘧振寒熱盛狂言　穴天樞
治瘧多寒少熱又溫瘧腹疼嘔吐甚則多寒少熱欲閉戶而處寒厥足熱
穴大鍾
治寒瘧頭痛　穴商丘
治瘧背振寒項痛引肘腋腰痛少腹四肢不舉　穴少海
治瘧苦寒數嘔吐　穴陽谿
治瘧不嗜食惡寒　穴厲兌　內庭
治瘧振慄鼓頷　穴少商
治痎瘧熱　穴商丘　神庭　上星　百會　完骨
風池　神道　液門　前谷　光明　至陰
大杼
治瘧身熱　穴陷谷　少海　商陽　三間　中渚
治瘧甚者　穴列缺
治瘧脇痛不得息　穴陽谷　治瘧足痛　穴俠谿
治瘧從腋斷起　穴衝陽　束骨

治狂瘧頭眩痛瘛反折　穴飛揚
治瘧面赤腫　穴溫溜
治瘧食時發心痛悲傷不樂　穴天井
治瘧病　穴天府
治痎瘧少氣　穴三里　陷谷　俠谿　飛揚
治風瘧　穴譩譆　支正　小海
王氏云夫瘧皆生於夏傷於暑秋為痎瘧
一歲之間長幼相似者為疫瘧有數名先寒後熱曰寒瘧先熱後寒曰溫瘧熱
而不寒曰癉瘧多寒曰牡瘧又不差曰勞瘧又不愈曰老瘧時行後
變成瘧曰瘴瘧瘧結為癖曰瘧母又有肝肺脾腎心胃亦皆有瘧
或每日發或間日發或作輸或三日一發素問千金等方論之
詳矣治瘧之方甚多惟小金丹性最佳予嘗以與人皆效人皆得
皆有以針灸此灸之所以不可廢也予居人間早年嘗患瘧
第一次灸當兩筋中以古文錢壓之以艾灸之以故帛未又即起小泡
謂之天灸尚能愈瘧況於灸乎故詳著之
治諸瘧而不見者
刺十指間出血看兩舌下有紫腫紅筋亦須針去血效血去必
已先視身上如小豆者盡取之
治肝瘧　穴刺足厥陰見血　治心瘧　穴刺手少陰
治脾瘧　穴刺足太陰　治肺瘧　穴刺手太陰陽明
治胃瘧　穴刺足太陰陽明橫脈出血
治腎瘧　穴刺足少陰太陽
治五臟瘧
凡瘧二穴各灸三壯發時灸○凡灸瘧者必先問其病之所先
發者先灸之從頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸灸過時
止從腰脊發者灸腎俞百壯從手臂發者灸三間又灸上星及
大頂發時令滿百壯灸炷如黍米粒若覺小異即灸百會七
壯若後更發又七壯極難愈者不過三灸以足踏地以線圍足一
匝中折從大椎向百會灸線頭三七壯炷如小豆○又灸風池二穴
三壯○又正頭仰臥以線量兩乳間中折從乳向下灸度頭隨年
壯男左女右

治瘧瘧 〔穴〕上星主之先灸七壯先取譩譆後取天牖風池瘧日西而
發者臨泣主之灸七壯
治瘧實則腰背痛虛則鼽衄 〔穴〕飛揚灸七壯
治瘧多汗腰痛不得俛仰目如脫項如拔
〔穴〕崑崙灸三壯〇又大開口度上下脣以繩度心頭灸此度下頭
百壯又灸脊中央五十壯過發時灸二十壯
治熱多寒少又云瘧悶嘔甚欲閉戶而處寒厥足熱 〔穴〕太谿
治瘧 〔穴〕刺足少陰血出愈
治瘧寒熱 〔穴〕合谷 陽池 俠谿 京骨
治瘧病醫不能救者
以繩量病人脚圍繞足跟及五指匝訖截斷繩取所量得繩置項上
著反向背上當繩頭盡處脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸
三十壯則定比至過發一炊久候之雖飢勿與食盡日此神驗男左
足女右足
治瘧瘧服藥後
〔穴〕灸大椎三四十壯無不斷若先寒者將欲寒預前以炭火安床
下令背暖并炙鼈甲末一方寸匕後自知服至發時令得三服
被覆過時無不斷此是陶氏法既欲寒時但以火炙其背亦乃即
差者縱發亦輕效驗

治瘧
從手發者灸三間三年瘧欲發條後則下火〇從腰發者灸腎
俞百壯
治瘧疾久不愈
不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立效或灸
第三骨節亦可
治瘧疾 〔穴〕灸大椎百會各隨年壯

黃疸

治黃疸 〔穴〕脾俞 胃管 太谿
治黃疸一足寒一足熱喜渴及舌縱煩滿 〔穴〕然谷

治黃疸熱中善渴 〔穴〕太衝
治身黃時有微熱不嗜食少氣身體重膝內內踝前痛
〔穴〕中封 五里
治黃疸腹滿不能食 〔穴〕脊中
治黃疸善欠不下食脇下滿欲吐身重不欲動 〔穴〕脾俞
治黃疸目黃 〔穴〕勞宮 治目黃振寒 〔穴〕中管 太陵
治黃疸 〔穴〕脾俞
治腰身黃脹滿腹脹洩痢身重四肢不收黃疸邪氣積聚腹痛寒熱
〔穴〕脾俞
治身黃羸瘦 〔穴〕章門
治馬黃黃疸等病 〔穴〕當門穴 [illegible]
治馬黃黃疸 上脣裏穴正當人中及脣鍼三鋥
治馬黃黃疸四時等病 上腭入口裏邊在上縫赤白脉是鍼三鋥
治黃疸 舌下穴俠舌兩邊鍼
治馬黃黃疸寒暑毒疫 脣裏穴正當承漿裏邊逼齒齗鍼三鋥

治四時寒暑所苦疸氣温病 〔穴〕顳顬鍼灸
治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不轉者 俠人中穴火鍼
治馬黃急疫 俠承漿穴
治馬黃黃疸急疫等病 〔穴〕巨闕灸七壯
治馬黃黃疸 〔穴〕上管灸七壯
治馬黃黃疸 男陰縫穴拔陰反向上灸若女人玉門是穴男女針灸無在
治頭中百病馬黃黃疸 〔穴〕風府鍼之
治馬黃黃疸 熱府穴在第二節下兩傍相去各一寸五分
治馬黃黃疸寒暑諸毒 〔穴〕心俞 肝俞 脾俞 腎俞
脚後跟穴在白肉後際鍼灸隨便
治黃疸通治百毒 〔穴〕肺俞灸
治馬黃黃疸寒暑疫毒 耳中穴在耳門孔上橫梁是鍼灸之
治馬黃黃疸寒暑溫疫
頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸鍼頭兩邊同法
治馬黃黃疸 懸石子頭穴 [illegible]

治黄疸　鍼孔穴度乳至臍中屈肋頭骨足灸人百壯
治馬黄溫疫　穴大衡針灸隨便
治傷胞身黄　穴章門
治二十六黄臍指應同俞之處
肝俞　心俞　脾俞　肺俞　腎俞　膽俞
小腸俞　胃俞　大腸俞　膀胱俞　風門　百會
挾脊二穴在背當中心　大椎　明堂　神庭
風府　風池　玉枕　承漿　太陽　鳩尾
巨闕　上管　中管　下管　胃管
陰倍二穴在胃兩旁各一寸半　章門　手太陽
手陽明　勞宮　三里　上廉　下廉　下山
絶骨　足陽明　大衡　伏兎　氣海　丹田
關元　曲骨　魂舍　玉泉

治黄疸　穴手太陽灸隨年壯

資生經云五苓散治疸病發渴及瘀熱在裏身黄腫疼茵陳湯下服此不效方可鍼灸

治黄疸　穴百勞灸五壯

治痺善喘氣走咽喉而不能言手足清穴便溺嗌中腫痛吐血口中熱唾如膠　穴太谿

普濟方卷之二百六十一　畢

普濟方卷之二百六十二目錄

鍼灸門

○頭面眼目耳鼻類

頭風　頭痛　腦痛　頭旋
頭腫　頭項強　面腫　面痛
目痛　目上視　目淚出　目眩
目不明　目翳膜　目赤　青盲
耳鳴　耳痛　耳聾　聤耳
鼻塞不利　鼻有息肉　鼻涕出
鼻痛　鼻衄

○口齒咽喉類

口噤　口瘖瘂　口眼喎　口舌乾苦
口齒瘡　唇頰腫痛　舌強
牙疼　齒齲　[illegible]　咽喉腫痛
咽喉鳴　咽喉乾　喉痺

普濟方卷之二百六十二目錄　畢

普濟方卷之一百六十二

鍼灸門

頭面眼目耳鼻類

頭風

療頭風 穴百會 腦空 天柱

療頭風目眩狂亂風癇左主如花右主如果 穴神聰

療頭風熱痛頭腫風痛 穴前頂

療風眩目眈眈額顱上痛 穴後頂

療頭風目眩 穴上星 治頭風目眩面赤腫 穴前頂

治頭風 穴下廉 五處 神庭

治風頭眩善嘔煩痛 穴神庭

治風頭眩頭痛 穴天牖 風門 崑崙 關元 關衝

治風眩偏頭痛 穴前頂 後頂 頷厭

治風頭眩頭清引頭痛 穴上星

治風頭眩頭痛頭清 穴顖會

治風頭耳後痛煩心 穴完骨

治瘧厥風頭重痛 穴付陽

治腦中寒如風狀頭眩兩額痛 穴俠谿

治風頭痛 穴督俞 攢竹 承光 絲竹空

療眩 和髎

治頭眩風癇 穴五處 治風頭熱 穴合谷 五處

療頭風面腫目眩項強不得轉 穴天牖

治頭風生白屑多睡 穴顖會 鍼佳以油塩揩髮根頭風永除

治頭風腫痒 穴肩衛 療頭引漏痛 穴通理

療頭眩 穴陽谷

王氏云論頭痛本於大寒內至骨髓以腦為主承著下本於頭夫入腦髓

耶本氏方論婦人患頭風者十居其半或者婦人無中以御風寒

耳男子間有患之者非頭上少髮必其顖會前頂之髮竟也故灸

頭風先宜顖會百會前頂等穴其頭風連目痛者當灸上星 神

聰後頂等穴予者自笑發說教人灸亦驗云

治頭風

灸後頂穴穴在百會後一寸五分枕刺穴前一寸五分灸五壯兼治

頭疾并搖頭口喎者風府穴兼灸曲池二穴甲乙經云穴

在肘外輔骨屈肘曲骨之中手陽明脉之所入也各灸一壯

治頭風面腫項強不得迴顧

刺手少陽經天牖二穴在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下

髮際上鍼入五分留七呼不宜補亦不宜灸若灸之面腫眼合

取足太陽經譩譆二穴在背俞部第三行肩髆內廉俠第六椎

下兩傍相去各三寸正坐取之足太陽脉之所發也鍼入六分留

三呼瀉五吸使鍼天牖風池其病即瘥若不先鍼譩譆即難療其

疾也此皆是病源注之法今舉此為例學者宜須審詳

治頭風面虛腫 穴上星 治目黃頭腫 穴腦戶

頭痛

治風眩頭痛嘔吐心煩 穴解谿 承光

治頭痛振寒汗不出 穴膈俞 治頭痛振寒 穴大杼

治頭痛風汗不出 穴瘂門

治頭痛 穴合谷 天池 絲竹空 魚際 四白 天衝 二椎 風池

治寒熱頭痛甚退疫唇恍惚悲愁健忘驚悸 穴神道

治厥逆頭痛胸滿不得息 穴陽谿

治厥頭痛面浮腫風熱內支腫身溫 穴豐隆

治頭重鼻塞風寒從足小指起脉痺上下帶胸脇痛無常轉筋寒

熱汗不出煩心 穴至陰

治頭痛振寒目黄脇痛 穴青靈
治腦旋目運頭痛不可忍頂心嘔吐涎沫發無時頸項不可顧 穴強間
治頭痛肩背急 穴崑崙
治頭痛頸項急不得顧眄 穴風府
治頭項痛 穴曲差
療身熱頭痛不可反側 穴顱息
療頭痛善汗不出 穴魚際
療頭痛 穴腦戶
療頭目眩痛 穴百會 通理
療頭痛如破身熱如火 穴命門 中衝
療寒熱頭痛善噦衄有不奉 穴溫溜
療醉後酒風發頭重皮膚走痛 穴率谷
治頭痛
穴天柱 陶道 大杼 孔最 後谿
治頭重痛 穴腦戶 腦空 通天
治頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐汗出 穴大陵 頭維

治頭痛如錐刺不可動 穴竅陰 俠谿
治頭痛寒熱汗出不惡寒
穴目窗 中渚 完骨 命門 豐隆 太白
外丘 通谷 京骨 臨泣 小海 承筋
陽陵泉
治寒熱頭痛偏頭目不可視 穴神庭 水溝
治寒熱頭痛 穴消濼
治頭痛 穴五處
治頭痛筋攣骨重少氣噦噫滿時驚不嗜臥咳嗽煩寃其脈舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥
宜灸關元百壯服玉真丸
治頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓髓以腦為主腦逆故頭痛齒亦痛
穴兩額角七壯左痛灸左右痛灸右 宜白附子散
治頭痛頭風耳後痛腦空等 穴火? 完骨
治癲疾頭痛 穴天衝

素問曰有數歲頭痛不已者大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故頭痛齒亦痛名曰厥逆頭痛亦有腎厥肝厥頭痛皆以本事方所謂下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也肝厥則頭暈是也皆可灸灸治之古人治頭痛目視灸風池及行間刺發少許愈亦未如之何要之亦有所因苦其標本不同耶若欲著艾須先白會顱曾等穴而丹田氣海等穴所當灸以補養之斯更至於此極也

治風眩治頭痛 穴豐隆
治風眩頭痛 穴豐隆
治頭偏痛引目外眥 穴懸鐘
治頭風目眩其所見偏頭痛引目外眥急耳鳴 穴頷厭
治頭半邊痛引目外眥 穴五樞
治頭偏痛 穴後頂
治頭頂偏痛 穴正營
治熱病頭痛汗不出頭偏痛引目外眥亦身熱齒痛 穴懸顱
治頭偏痛煩心不可食 穴懸釐
治偏正頭痛 穴絲竹空 風池 合谷

治肩擔內疼痛不可忍者 穴解谿
治胸脇痛
穴崑崙 解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤
通理

○腦痛

治腦旋頭重 穴強間
治頭旋腦痛頭風腦重目如脫項如拔頂強痛不能 穴天柱
治腦風疼不可忍 穴玉枕
治腦風頭痛惡風寒 穴承靈
治腦風頭痛不可忍目瞑心煩發即為癲風引目眇 穴腦空
治腦風頭痛 穴上星
治腦兩角強痛 穴率谷
療頭風腦疼 穴瘈脈
療腦疼 穴風池
治腦風 穴少商
治口鼻出血不止名腦衄 穴上星灸五十壯
治腦虛冷痛 穴顖會 強間

王氏云患眩頭疼甚者自床投下以腦拄地或以冷水淋得石瘥
終不已服諸藥不効人教灸顖會而愈亦且可灸氣海合療手足
腦痛腦旋腦寫先宜灸顖會而後灸諸穴爲其次也

頭旋

治忽頭旋 穴目窗　治頭旋耳鳴 穴絡却
治頭旋腦重 穴天柱
治坐如在船車中 穴申脉
王氏云毋隨赴任爲江風所吹自覺頭動搖如在舟車上如是半年
乃大吐痰偏服痰藥幷灸頭風諸穴方愈
治頭風旋動 灸從玉枕中間七壯
治失枕頭重如石 穴玉枕　治頭重 穴百會
治腦重鼻塞頭目眩疼 穴百會　治頭重目眩 穴陶道
治頭重 穴率谷　治頭重痛 穴付陽 腦戶
治頭重 穴至陰　治頭重不能勝 灸腦戶下一寸半

治頭重腦重 穴瘂門 通天 付陽
治頭重 穴腎俞　治頭重氣少 穴腦戶 灸五壯

頭腫

治頭腫癢生 穴腦戶
療頭風熱痛頭腫大腫極卽以三稜鍼刺之繞寸已下出頭一同出血瘥 穴前頂
療頭風頭腫皮腫面虛鼻塞頭痛 穴上星
治頭皮腫生白屑 穴顖會　治項痛 穴曲差
治頭面腫 穴公孫　治頭面氣腫 穴完骨

頸項強

治頸項腫寒熱頸痛 穴扶突 陽谷
治頸腫寒熱 穴缺盆　治寒熱頸痛瘰癧 穴大迎
治項痛 穴[illegible] 消濼
治項腫不可俛仰頰腫引耳後 穴完骨

治頭項強不可俛仰 穴太杼 京骨
治頸項不得顧 穴肩井 腦戶
治項強不得顧 穴天牖 後谿
治頸項痛 穴完骨 頷厭　治頸項強痛 穴本神
治瘈瘲頸項痛不得顧 穴風池　治頭項轉側難 穴通天
治頸項強不得顧
穴頰車 大椎 氣舍 腦空
治頸項筋急不得顧 穴天柱　治項氣悶嚥食不下 穴人迎
治頸項痛惡風寒 穴後頂 外丘
治頸項急不得顧 穴齗交 風府
治頸項強 穴肩俞 強間
主項強急痛不可顧
穴少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 崑崙
小海 攢竹
治項如拔不可左右顧

穴消濼 本神 通天 強間 風府 瘂門
天柱 風池 齗交 天衝 陶道 外丘
通谷 玉枕
療項如拔 穴強間　治項如拔 穴天柱
治頸腫項痛不可顧 穴天容 前谷 角孫 腕骨 支正
治頸項癰腫不能言 穴天容
治頸項疼瘰癧汗出 穴飛揚 涌泉 頷厭 後頂
主頸項柱滿 穴角孫
治頸項癰腫不能言及瘂肩不舉 穴浮白
療心煩滿汗不出頭項痛身熱目視不明 穴曲差
治項痛寒熱起僵仆 穴通天　治項強不得顧 穴瘖門
治項痛 穴玉枕 完骨
療頭痛及項急不可傾側 穴風府

療腸痛頸腫寒熱 穴陽谷
療身寒熱頸腫喉中鳴胸中氣哽 穴大尖
療頸項及肩背痛 穴天井
療頸項強不得顧引牙齒痛口噤不能言 穴曲鬢

面腫

治面惡風寒頰腫痛 穴巨髎
治頭風面虛腫 穴上星 天牖
治目眩面腫 治面赤浮腫 穴顖會
治面赤腫 穴前頂
治頭面浮腫痛引目外 上赤痛 穴目窗
治頭面浮腫 穴完骨
治面腫瘙動狀如虫行 穴水溝
治面痒腫 穴迎香
治風壅面浮腫目不得開唇吻瞤動不正 穴大迎鍼之即愈

七

治面浮腫唇口吻不收痹不能言口噤不開 穴合谷
治面虛腫 穴温溜
治面腫 穴豐隆 承漿 陽交
治寒瘡面腫足寒 穴厲兌 治面目浮腫 穴陷谷
治飲酒面赤 穴百會 治頭風面赤 穴解谿
治面赤腫頭痛 穴腦戶 療面手腫 穴[illegible]
療面腫 穴水溝 天牖 療頭面虛腫 穴陷谷
療肺風面赤目 眩眩項強不得顧面腫皮軟胷痰 穴風池
治面赤腫 穴上星 顖會 前頂 腦戶 風池
治辛面腫 穴陷谷 上星 前頂 公孫
治面腫 穴陷谷 陽陵泉 天樞 中府 解谿
有人因入水得水腫四肢皆腫面亦腫 灸水分并氣海
視其面如削是飛面腫亦可灸水分云

面痛

主面赤頰中痛 穴攢竹 斷交 玉枕
治頰顴痛引顴頰痛面赤 穴中渚 治面赤熱 穴肺俞 內關
治面皮赤痛 穴頰車 治面赤目黃 穴腦戶
治面皮熱 穴天窗 三里 主面蒼黑 穴行間
治面瘡赤痛 穴懸顱
治面塵黑 穴大衝
治面赤 穴支溝 間使
治面赤 穴解谿 液門
療面黃黑 穴腎俞 療冷痛面黑 穴氣海
治面黑 穴關衝
治目眩面腫 穴顖會 治目眩面赤腫小兒頂腫 穴前頂

目痛

治目瞳子痛痒 穴陽白 治下眥痛 穴大衝
治目急痛赤腫 穴太衝 陽谷 崑崙
治目赤腫痛 穴曲泉 治目痛赤 穴陽谿 陽谷

八

治目外眥赤痛淚出目痒 穴俠谿
治目眥傷 穴二間
治目痛不能視先取譩譆後取天牖風池
穴風池 腦戶 玉枕 風府 上星
治目痛視如見星 穴照海 崑崙
治目如脫 穴天柱 陶道
治目痛如脫 穴大陵 頭維
治目急痛 穴前谷 三間 治面目痛目眩 穴陽白
治頭面浮腫痛引目外眥上赤痛忽頭旋目䀮䀮視不明 穴目窗
治目睛痛不能遠視 穴上星 腦戶
治目痛不能視目痛如脫 穴玉枕
療頭風目如脫 穴天柱 療目痛 穴心俞 陰蹻
療頭眩眼痛 穴飛揚 陽谷
療目內眥赤痛夫忱頭重項痛風眩目痛頭痛鼻多汗耳聾鼻塞
穴玉枕

治目痛眩及目不明 穴四白 治目痛不明 穴齗交

治眼痛 穴下廉

治眼疼不可忍 刺足少陽經風池二穴入手陽明合谷二穴立愈

治目痛 穴前谷

治風疼赤痛 穴人中 鼻柱灸二壯

療頸目痛 穴魚理 百會 後頂 治頭重目眩 穴陶道

治目如拔 穴完骨

治目睆視 穴天柱 治頭風目眩頭痛 穴腦空

治頭眩目眩遠視睆睆 穴天府

治目眩身汗出 穴承泣

目翳生痛或兩傍生小米珠刺去其淚目愈不必灸之 治目翳遠視睆睆 穴目窗

治目不得閉 穴大迎

治睢目瞤瞼 穴偏歷

夫眼生倒睫拳毛者兩目緊急皮縮之所致也蓋內伏熱攻陰氣外行當去其內熱并火邪眼皮緩則睫毛即出翳膜亦退用手攀出內瞼向外刺以三稜鍼出血以左手爪甲迎其鍼鋒立愈

治目眶歲久赤爛俗呼爲赤瞎是也當以三稜鍼刺目眶外以瀉濕熱立愈

治睢目瞤瞼火氣

灸五星右取左左取右

治氣勞邪氣眼赤

灸當陽二穴百壯

治眼急痛不可遠視

灸當陽

治傷寒目瞑 穴風門

目上視

治目反上視若赤痛從內眥始 穴申脈

治目系急目上插 穴陽白 上星 本神 天常 曲泉 支溝 三間 前谷 攢竹 玉枕

治目上插傷風寒 穴腦空 前頂

治目上不識人 穴神庭 顖會

治目上視 穴肝俞 療目睛上反目瞪上望 穴前項

治目瞤動與項口相引 甲乙云目瞤動與項口參相引喎僻口不能言 穴承泣

治口喎面赤目黃眼瞤動不止 穴巨髎 齒痛 穴巨髎

治眼瞤動不止目不得開 穴地倉

治眼瞼瞤動 穴攢竹

治目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視䀮䀮昏夜無見目瞤動 刺承泣

治眼瞼瞤上插非又戴眼 穴筋縮

目淚出

治目泣出 穴攢竹 前谷 後谿 腕骨 神庭 百會 天柱 風池 心俞 天牖

治目淚出多眵瞜 穴肝俞 治泣出目癢 穴俠谿

治目淚出 穴承泣 治目淚出 穴臨泣 神庭

治多淚 穴臨泣

治目冷淚十內眥赤痒痛生白翳 穴齗交

治目淚出冷淚多 穴風池 治氣眼冷淚 穴睛明

治目瞤冷淚 穴承泣 治風冷淚出 穴頭維

治目冷淚生翳 穴腕骨 療目泣出 穴行間 承際

療目眩冷淚出 穴心俞

治目遠視不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩瞢內眥赤痛遠視䀮䀮無見眥癢痛淫膚白翳 穴睛明 治目淚出 穴行間

治目淚出甚者灸肝俞 穴前谷

目眩

治頭重目眩善驚引欬鼻衄目痛目䀮䀮頭項 穴通谷
治目眩
穴神庭　上關　承泉　[illegible]　束骨　魚際
大都　穴本神
治目眩頭項強急痛相引不得顧　治目如脫肩痛 穴肝俞
治頭目眩 穴飛揚 陷谷
治目眩頭痛目赤視物䀮䀮風癇目戴上不識人眼睫毛倒拔吐沫
未發即兩時 穴絲竹空
治目眩遠視䀮䀮 穴天府　治目眩頭痛 穴支正 三焦俞
治目眩 穴風池　治身熱目眩 穴風門
治頭風目眩淚出 穴神庭　治目眩耳不聞遠視 穴上星
治頭風目眩戴上 穴前頂 五處
治目眩耳塞目生白翳 穴臨泣
治頭痛目眩眼白翳風目瞤動不息 穴四白
治風赤眼頭痛目眩澁 穴前關
治頭痛目眩身熱肌肉動 穴陽谷

治目眩淫淚 穴前谷
治胃痛目眩 穴四白 廉泉 大杼
治頭目風眩面赤痛鼻細目䀮䀮無遠見 穴攢竹
治頭目眩 穴顖會
治偏頭旋目眩及偏頭痛不可忍牽眼䀮䀮不遠視
灸兩眼小眥上髮際各一壯立差
治面赤風熱發兩目疼痛 穴率谷
治目眩 穴大都
治目瞤 穴承泣 前頂 天柱 腦空 目窗
治目眩目如脫又云痛少年目如脫項如拔
穴天柱 陶道 崑崙
治目不欲視太息 穴大敦
治頭痛目不可視 穴水溝 神庭

治目眩 穴承泣 百會
治目上視 穴[illegible]　治頭目眩 穴[illegible] 通里 中渚
治目眩 穴頷厭　治目眩仆 崑崙
治頭痛頸項強目眩 穴風府　頭痛惡寒穴臨泣

目不明

治目䀮䀮 穴膽俞 膏肓 後頂
治目䀮䀮視物不明眼中赤痛及臉瞤動又云二寒以四指鍼到一寸
治目䀮不明 穴養老 合谷 曲差
大明 穴攢竹
治寒熱目視不明 穴膺中俞　治目不明 穴風池 五處
治目頭痛目䀮䀮遠視不明又云三寒取目不明 穴目窗
治眼目䀮䀮 穴瞳留 肝俞
治偏痛目視物不明 穴頭維
治目不明

穴三里 人年三十以上若不灸三里令人氣上眼暗所以三里下氣也 又云

療目無所見偏頭痛引目外眥而急 穴頷厭
療目䀮䀮 穴攢竹 脾俞 崑崙
療目不明惡風寒頭目眩痛 穴後頂
療目生白翳氣短喘血目上視多怒狂衄目䀮䀮 穴肝俞
療目黃遠視䀮䀮 穴腦堂　治目不明 穴天牖
治目眩目不明目如脫 穴天柱 陶道 [illegible]
治目不明淚出目眩瞢瞳子痒遠視䀮䀮昏夜無見 穴承泣
治目瞳子痛痒遠視䀮䀮昏夜無見 穴陽白
治目䀮䀮不明惡風寒 穴膽俞 胃俞 心俞 百會 內關 復留
大泉 肌背 中渚 攢竹 睛明 委中
崑崙 天柱 本神 人杼 承泉 通谷
曲泉 人迎 二間 [illegible]空
治目痛不能視 穴風池

治肝虛目不明
肝俞二百壯小兒斟酌可灸一二七壯
消主云前人喪明之由 生食五辛 接熱飲食 刺頭出血過
多 極目遠視 夜讀注書 久處煙火 博弈不休 日夜讀書
飲酒不已 熱食麵食 抄寫多年 雕鏤細作 泣淚過多 房
室不節 數向日月輪看 月下讀書 夜視星火 極目瞻視山
川草木 又有馳騁田獵 冒涉風霜 迎風追獸日夜不息者 並是
傷目之由也 其讀書博弈等過度患目者 名曰肝勞 若欲治之 非三年
閉目不視不可得差 徒自瀉肝及作諸治 終是無效 又云讀書之苦
傷肝損目 誠如晉范甯嘗苦目痛 就張湛求方 湛戲之曰 古云用損
讀書一 減思慮二 專內視三 簡外觀四 旦早起五 夜早眠六 凡六物熬
以神火 下以氣篩 蘊於胸中七日 然後納諸方寸 修之一時 近能數
其目睫 遠視尺棰之餘 長服不已 洞見牆壁之外 非但明目 乃亦延
年 審如是而行之 非可謂之嘲戲 亦奇方也 以其勸戒人有理 故具
載之以示後人

治眼暗
大椎數節第十當脊中安灸二百壯 以多爲佳 眾驗 又云 人年三
十以上 若不灸三里 令氣上衝目
千金云 讀書博弈等過度患目者 名曰肝勞 若欲治之 非三年閉目不
視不可得差 徒自瀉肝及作諸治 終是無效 則是目者 不可使之勞
也 古人蓋有養之之法 如彭真人夏年常患目疾 不計晝夜瞑目
注視以去昏暗 閑之以須 依法再行 積功而視秋毫 余真人審當
目疾 暗室正坐 運睛旋還八十一數 閉目集神 再不數 而神光自
現 狀如金輪 永除昏暗 施真人自記 歌亦云 運睛除目猜 內見有目
養之之法也 若用藥 則地黃丸 羊肝丸等 與用蜜膏 皆
爲末以蜜丸
治癧風引目赤
脫空

目翳膜

治目翳 穴至陰
治目涓皆腫 又治目青盲翳 穴後谿 治目淚暗子不見物不明 穴丘墟
治目中白翳 穴前谷 京骨
治目反白膜 又內皆 穴京骨
治目淚出多眵聵內皆赤痛癢 主目
八髎前 上星 風池 睛明 斷文 承泣
四白 巨髎 瞳子髎
治目生白膜 穴承光
治目主白膜多 又治目赤生白翳 穴臨泣
治青盲 瞳子髎 瞳子痛 小兒雀目 痛眼 大人眼
令淚 視目物不明大赤翳 瞳子眼 雀目
令目 穴 治白翳膜 瞳子 穴巨髎
治目上膜 瞳子 穴 治目中翳 穴丘墟 瞳子髎
治目生白翳 穴中渚
治目生白翳

穴臨泣 睛明 斷文 肝俞 四白 間前
前谷
治目暈 穴上關 偏歷
治目生白翳眼皆赤痛 於當中引痛 穴大淵 治目主膚翳 穴光明
治目風赤爛有翳 穴陽谿 療目不明生白翳 穴合谷
療目翳膜痛 穴至陰
千金文 療風眼卒生翳膜兩目痛不可忍
灸手中指本節兩節間尖上三壯 炷如麥 左灸右 右灸左
治目中白翳 穴前谷 治目眇瞳子無所見 穴解谿
治目卒生翳
灸大指節橫文三壯 左灸右 右灸左
療目生白翳 穴肝俞 解谿
治眼暗目 穴水溝
王氏云 予嘗學書 損兒早觀書 尿碎方食 久之患目 無僅 雖而滿
同舍道以益精 數次揩目而旋 除益精 且不則 青盲之能治目 故

也古方盖用青鹽揩牙因浴在手洗目而明矣鹽精乃鹽倉地下之精英

目赤

治目尤眥赤痛 經驗主 穴照海 治眼赤痛 穴攢竹

治目內眥赤痛氣熱耳塞目不時 穴風池

治目赤 穴睛明 太淵 陽谿

治目外眥赤目眩 穴光明 治目赤連眉痛 穴承門

治目赤支痛 穴內關 治目赤 穴目窗 太陵

治目內眥赤痛痒 穴上星 肝俞

治目赤痛腫 穴申脈 太衝 曲泉 陽谿

治目內眥赤癢 穴束骨 京骨

療風赤眼 穴前關

治目赤 穴侍明 後谿 目窗 童子髎 治目赤痛從目眥始 穴俠谿

治肝勞邪氣眼赤 穴當陽灸百壯

治風痒赤 灸人中

治目黃 穴腦戶 膽俞 意舍 陽綱

治目黃振寒 穴太陵 中管

治黃疸目黃 穴勞宮 治目青而啞 穴期門

治目中白睛青 穴太泉 治目黃 穴青靈

治目赤黃 穴顴髎 內關 治眥黃 穴束骨

青盲

治青盲無所見 經驗主

穴商陽 巨窌 上關 童子窌 絡卻 承光

治目青 穴太泉 期門 治青風內障目無所見 穴絡卻

治青盲目無見遠視䀮䀮白翳覆瞳子 穴巨髎

治青盲目無見遠視䀮䀮目中翳膜痛目外眥青痛 穴瞳子髎

治青盲 穴商陽左取右右取左 治肝眼 穴睛明

治熱病瘥後食五辛多患眼闇雀目令灸 穴肝俞

耳鳴

治耳鳴聾 經驗主

穴上關 下關 四白 百會 顱息 翳風

耳門 頷厭 天窗 陽谿 關衝 液門

中渚

治聾嘈嘈若蟬鳴 穴天容 聽會 聽宮 中渚

治頭痛引耳嘈嘈耳鳴無所聞

穴腕骨 陽谷 肩貞 竅陰 俠谿

治耳鳴

穴前谷 後谿 偏歷 太陵

治耳中聾氣閉 刺一分留一呼灸三壯左取右右取左如食頃

穴偏歷 太陵 商陽

治耳鳴耳聾 穴百會 治頭旋耳鳴 穴絡卻

治耳鳴嘈嘈無所聞 穴浮白 治耳中生膿 穴和髎

治耳中如蟬聲 穴上關 治耳中如蟬聲 穴耳門

治耳鳴聾聵 穴聽會 聽宮

治頭風耳鳴 穴瘈脈

治耳鳴 穴偏歷 陽谿 商陽 絡卻 腕骨 前谷

治耳鳴 穴頷厭

治耳鳴無聞 穴肩貞

人之耳鳴聾者皆以為腎虛所致是則然矣亦有因氣而得者爾心而得者不可一槩論也若欲無此患蓋宜不受觸至於盡且不使不用心可也或欲救耳鳴只用蔥管實在耳中令氣透自不鳴矣

耳痛

治耳痛 經驗主

穴上關 下關 四白 百會 顱息 翳風

耳門 曲池 前谷 天窓 陽谿 關衝
液門 中渚
治耳前痛 穴少商 治頭風耳後痛 穴瘈脉 完骨
治耳痛 穴曲池

耳聾

治耳暴聾經主 穴天牖 四瀆
治耳渾渾淳淳聾無所聞 穴外關 會宗
治耳中氣聾鳴 穴商陽 治耳不聰暴聾 穴天牖
治耳鳴聾如蟬聲 穴上關 百會
治耳鳴耳聾 穴商陽 陽谷 後谿
治耳聾 穴束骨 翳風 上關 顱顖
治耳塞 穴太谿 治耳聾腎虛 穴腎俞
治耳聾耳中如蟬聲無所聞 穴聽會
治耳聾如物塡塞無所聞耳中蒼蒼 穴聽宮

治耳鳴聾無所聞 穴外關 天窓
治卒聾不聞人語 穴窓籠 治耳暴聾 穴三陽絡 液門
治暴氣耳聾 穴四瀆
治頭痛耳聾兩顳顬痛 穴中渚
治耳聾 穴會宗
治頰頷腫耳聾耳鳴痛不可轉側痛無常處耳中聲 穴俠谿
治耳聾嘈嘈無所聞 穴少商 治耳聾 穴玉枕
治耳鳴聾 穴耳門 翳風 腦空
治耳渾渾淳淳無聞
穴聽會 外關 華陀灸耳病見中風不語
治耳聾 穴肩貞 治耳聾 刺足少陰
治暴聾 穴天牖
耳聾有因氣得者怒則通氣實閉不被揮塞得者而去之愈瘳
刺耳草取汁滴用新羅白草煮粥食亦驗云
治耳痛

作尼竹子厚半分覆耳上四邊勿泄氣以竹刺尼竹作一小孔以
艾炷百上灸耳中痛不可忍即側耳使黃水出盡即差出尼竹散
易之 又截葦筒二寸內耳中以麵擁四畔勿令泄氣又藥筒上
七壯 又搗豉作餅塡耳內以地黃長五寸截一頭令尖內耳中
與豉餅底齊餅上著椒葉蓋之刺一孔如筋頭透餅於上灸三壯
治耳聾耳鳴
刺手少陽經翳風二穴 次鍼足少陽經聽會二穴

聤耳

治聤耳有膿汁出經主 穴下關 治耳如物塞 穴聽宮
治耳塞 穴翳風
治聤耳膿出 穴上關日灸三壯至二百壯
治耳有膿汁出生瘡癢耳耳鳴如蟬聲重聽無所聞 穴耳門

鼻塞不利

主鼻窒喘息不利鼻喎僻多涕鼽衄有瘡經主
穴風府 曲差 上星 迎香 素髎 水溝
齗交 通天 禾窌
主鼻窒喘息不通 穴承靈
主鼻不利涕黃 穴前谷 厲兌 京骨
治息肉不利 穴齗交 治不知香臭 穴天柱
治鼻間焦臭 穴中管 療頭疼鼻塞 穴眉衝
治鼻塞 穴玉枕 百會 明堂 當陽 臨泣
治鼻息不聞香臭 穴迎香 療鼻不得息 穴風府
療鼻塞不聞香臭 穴天牖 治鼻塞 穴至陰
穴顖會 灸鼻塞不聞香臭灸至四日漸退七日頓愈 上星 百會 承光
治鼻塞悶 穴通天 臨泣 治鼻塞不通 穴步郎
治鼻塞不聞香臭
治目眩鼻塞 穴臨泣 治鼻塞不利 穴前谷 齗交
治鼽衄息不利 穴承靈

治鼻塞息肉不消多涕生瘡　穴素髎
銅人云素髎穴諸方闕治療法千金治鼻塞息肉不消多涕生瘡而
今之千金只云主鼻喎僻多涕鼽衄有瘡又云主鼻窒喘息不利鼻
此文稍異豈古今本不同耶
治惡風鼻不利　穴厲兌　主不知香臭　穴水溝

鼻有息肉

治鼻中息肉不利鼻頭額頞中痛鼻中有蝕瘡　穴齗交
治齆鼻　穴腦空
治鼻中息肉　穴上星灸二百壯　又灸夾上星兩旁相去二寸各百壯
治鼻有息肉不聞香臭衄血　穴迎香
治鼻中息肉蝕瘡　穴齗交　治息肉不消多涕生瘡　穴素髎
治鼻中息肉　穴顖會灸七壯　又通天灸七壯左臭灸右右臭灸左左右

臭皆灸之曾用此法灸數人皆於鼻中去臭積一塊如朽骨臭不可言
去此全愈

鼻涕出

療頭風多鼻涕鼻塞　穴明當
療鼻窒口僻鼻多清涕出不可止鼽衄有瘡　穴禾窌
療鼻衄多涕　穴崑崙　療鼻衄不止鼻重清涕　穴風門
治鼻洞涕生瘡　穴禾髎　治鼻鼽出清涕　穴風門
治口喎鼻多清涕　穴通天　承光
治頭風目眩鼻出清涕目戾出　穴神庭
主鼻鼽清涕出　穴通谷　神庭　攢竹　迎香　風門
合谷　至陰
主鼻喎僻多涕　穴曲差　治多嚏　穴風門
主鼻不收涕不知香臭　穴天牖　水溝

主涕黃　穴前谷　厲兌　京骨
治多涕　穴素髎
治鼻中乾鼻衄等也三十二病　穴絕骨宜灸五十壯
王氏曰舟人久病鼻乾有冬月閒熱鼻者亦不能但云病去日
愈既而病去亦不愈也後因灸絕骨而漸愈矣予亦嘗患此偶絕骨
微疼而著艾鼻乾亦失去初不知是灸絕骨之力後閱千金方有此
證始知鼻乾之去因絕骨也若鼻涕多宜灸顖會前頂大人小兒之
病初無以異焉耳
治時時嚏不已　穴風門　五處
療鼽嚏　穴頭承

鼻痛

主鼻管疽發為癘鼻　穴腦空　竅陰
治鼽出鼻中痛　穴復留　治面風寒鼻頞上腫壅痛　穴巨髎

治鼻中膿　穴肝俞　治額頞中痛　穴齗交
療鼻準上腫癰痛　穴巨窌
療鬼擊鼻血出　穴人中　水分　陰交

鼻衄

治鼻鼽　穴神庭　治鼽衄有瘡　穴曲差
治鼻衄窒喘息不通
穴承靈　風池　風門　譩譆　後谿
治頭熱鼽衄
穴中管　郄　臨泣　三間　偏歷　厲兌
承筋　京骨　崑崙　承山　飛揚
隱白
治鼻中衄血不止抹案　穴京骨　申脈
主衄血唾血　穴郄門　治衄血劇不止　穴隱白
治衄不止　穴湧泉

主鼻衄不得息及衄不止 穴水溝 天牖
治衄血不止 穴天府 四分
治鼻衄 穴上髎 後谿 風府
治諸陽熱氣盛衄血不止 穴瘂門 治衄血頭重 穴通天
治衄血不止 穴禾髎 兌端 勞宮
治衄血 穴曲泉 隱白 譩譆 陰郄 迎香
治鼽衄 穴偏歷 合谷 二間 崑崙 通谷
治衄血喘呼小腹痛攻咽喉 穴曲泉
療衄血不止 穴太谿 隱白 風門 兌端 腦空
療鼽衄有瘡 穴禾髎 瘡鼽衄 穴攢竹
治口鼻出血不止名腦衄 穴上星 灸五十壯
徐德占教衄者急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立定盖血自此入
腦注鼻中常人以綿勒頸後尚可止衄血灸穴筋無疑
治腦衄 穴上星 灸五十壯
王氏云母忽患鼻衄急取藥服旡乎昔無人服有效者皆不效因閱

十一

集効方云口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯尚疑頭上不宜多
灸只灸七壯而止次日捷作再灸十四壯而愈有人鼻常出濃血後
以予教灸顖會亦愈則知顖會上星皆治鼻衄去
治鼻衄 穴絶骨 治衄血 穴前谷
治鼻塞眉骨痛目 鼻衄治逆腹脹脊背内康痛不得俛仰 穴譩譆
治鼻鼽 穴風門
治衄時痒不止
灸足大指横理三毛中十壯劇者百壯衄不止灸之並治陰卵
腫 又灸風府一穴四壯不止又灸湧泉二穴各百壯又以引張
絃向上病人仰卧桃紲放四體如常卧法
治衄而不衄血法
取足太陽大衄衄取手太陽不已刺腕骨下不已刺膕中出血
治鼻衄不止 穴合谷 內庭 瘄門
治鼻衄滿血不止
項後髮際兩筋間陷者中三壯止

治卒鼻衄 灸手大指端骨七壯隨衄左右出此療數外則立瘥
治脉浮大鼻中燥如此必去血鼻衄
灸兩臂中脉取止取臂脉法以鼻嗅臂自點其處是穴兩
臂皆同

口齒咽喉類

○口緩

治唇吻不收 灸五 穴合谷 水溝
治失欠頰車蹉
背第五椎一日灸二七壯滿三日未瘥灸氣衝二百壯胸前喉
下甲骨中是亦名氣堂又灸三陰交百壯三報之
治數欠頻伸 穴通理
治口失欠下牙齒痛 穴下關 大迎 翳風

廿二

治善頻伸數欠惡聞人音 穴内庭
治強欠 穴涌谷 治數欠不得息 穴太淵
治數欠 穴経渠 治目淚出欠氣多 穴風池
治口緩不收不能言 穴地倉 大迎
治失欠 穴翳風 通谷 治舌緩 穴風府
治舌緩 穴瘂門 治口閉 穴崑崙
治不能言 穴[illegible]風 治失欠 穴完骨
治數欠
穴通里二穴甲乙經在手少陰在掌後一寸走手太陽各
灸五壯灸如手未瘥大又灸足内踝上三寸宛宛中或三寸五
分白壯三報此三陰交穴也

○口瘖瘂

治瘖 灸七 穴合谷 水溝
治不能言

穴承泣 地倉 大迎 魚際 通理

治瘖不能言 穴户 療失音 穴孔最 瘂門

療瘖不能言 穴風府 承漿 治失聲 穴聽宮

療暴瘖不能言 穴翳風 通理

治失音 穴頰車 治失音不能言 穴陰郄

治瘖不能言 穴間使 合谷

治暴瘖氣哽又云暴瘖咽腫食不下喉鳴 穴天鼎

治暴瘖不能言口噤 穴靈道 天突 天窓

治暴瘂 穴支溝 通谷 三陽絡

治牙關不開口噤不語失音牙關痛頷頰腫 穴頰車

治言語不止 穴日月

治舌下腫難言舌縱涎出 穴廉泉 然谷 陰谷

治舌緩瘖不能言舌急語難 穴風府

治暴瘖不能言

穴支溝 天窓 扶突 曲鬢 天道

治舌卷不能言 穴復溜 治不能言 穴通理

治瘖上氣失瘖不能言舌急 穴□□

治頸項強舌緩不能言失音不能言舌急 穴瘂門

瘂門一名舌本一名舌厭督脉陽維之會又云舌本則是穴也其

舌本於繫數凡舌緩不能言者宜治此

治舌下腫難言舌縱涎出欬嗽上氣喘息嘔沫口噤舌根急縮下食難

穴廉泉 廉泉一名舌本蓋舌之根本也故能舌下腫難言舌縱

涎出根急縮諸病與千金方所療略同凡有此等疾者宜鍼灸此穴

治舌強不能言 穴大迎

○口眼喎

治口喎僻不能言 □□

穴承泣 四白 巨髎 上關 大迎 顴髎

强間 風池 迎香 水溝 禾髎

治口僻痛惡風寒不可嚼 穴頰車 顴髎

治口不能禁水漿喎僻 穴水溝 齗交

治風頭耳後痛煩心足不收失履口喎僻 穴完骨

治偏風口目喎 穴上關 下關

治口喎鼻多清涕風眩頭痛 穴承光

治口喎鼻多清涕鼻血頭重 穴通天

治口面喎 穴□□ 列缺

治口眼喎斜失欠脫頷口噤不開吃不能言頰腫牙車痛 穴翳風

治偏風口喎 穴□□ 治□□口喎 穴巨髎

治口喎眼瞤動 穴顴髎

治口眼喎斜目眼面□□□口眼目視䀮䀮冷淚眼皆赤痛

穴承泣

治偏風口喎目不得閉失音不語飲食不收水漿漏落眼瞤動不止療

左治右右治左

穴地倉 承漿 □□□□□□

治口喎四肢逆冷益乾煩滿腹不欲視目淚出太息 穴行間

治失欠口噤食欲喉暴瘂不能言 穴通谷

治口喎 穴温溜 偏歷 二間 內庭

治偏風口眼喎附膝痛寒熱 穴衝陽

治口僻 穴和髎 治口□ 穴太衝

治口喎 穴列缺 地倉

治口僻面風寒□□□□臃痛□□□□□ 穴巨髎

治偏風口喎失音不言不得飲水食漏落□□□□ 穴地倉 大迎

治風中脉口眼喎斜其狀喎向右者謂左邊脉中風而緩宜灸左 喎左

灸右 炷如麥粒各二七壯 頰炎取患風氣

穴聽會 頰車 地倉各二穴

治舌□□□ 穴光明 臨泣 治目□頭痛 穴京骨 陽谷

治口瘡舌下腫難言舌縱涎出舌根急縮

穴廉泉 灸三壯 次鍼瀉 各二穴

治口中下齒痛惡寒頗腫 穴商陽

治口僻 穴偏歷 治口齒痛 穴温溜

治口舌生瘡失欠頰車蹉及治咽喉腫痛
灸背第五椎一日二七壯滿三日未差 灸氣衝二百壯背兩邊
下甲骨中是亦 氣堂 又灸足內踝上 二寸宛宛中或三寸五
分百壯三報 此三陰交穴也

○口舌乾苦

治口舌乾食飲不下 穴脾俞 商陽 小腸俞
治口熱口乾口瘡
穴勞宮 少澤 三間 大衝
治咽乾口熱唾如膠 穴少澤 大谿
治口乾 穴曲澤 章門 治舌緩口乾 穴少陰
治口苦噫氣介介然 穴陽陵泉
治舌卷口乾心煩悶 穴關衝 治身熱煩渴口乾 穴曲澤
治口乾
穴三間 脾俞 不容 雲門 商陽 飲陰

治口苦舌乾又治食不下口舌乾 穴脾俞 兌端
治舌乾 穴復溜 大鍾 尺澤
治唇乾涎出不覺 穴下廉 治口中熱 穴少衝 大鍾
治口乾 穴肝俞 少澤 曲澤
治大人小兒口中腥臭胸膈支痛又主老小口中腫腥臭及療小兒斷
爛臭 穴勞宮
治口熱口臭 穴少衝 治口乾 穴曲澤

○口齒疳瘡

治口齒疳蝕生瘡 穴承漿 治牙齦腫 穴天衝
治齒齦腫小兒疳濕瘡 穴角孫
史記齊大夫病齲齒太倉公灸其左太陽明脈即為苦參湯日嗽
三升出入五六日病已得之風及臥開口食而不漱
治牙車急 穴[illegible] 治牙車痛 穴翳風

治牙車脫 穴下關
治牙關不開 穴水溝 上關 頰車
治牙車引急頸項痛耳中嘈嘈頸頰腫 穴和髎
治牙車脫臼相離三寸及治牙車急痛不得嚼食 穴聽會

○唇頰腫痛

主唇吻不收 穴合谷
治唇吻不能開合
灸虎口男左女右 又灸承漿七壯
療唇口乾 穴三間 治唇乾涎出 穴下廉
治喜嚙頰 穴光明 足臨泣 治頰腫痛 穴巨髎
主自嚙唇 穴京骨 陽谷 治頰痛 穴腕骨
治唇腫痛 穴迎香 治牙痛唇吻急強 穴正營
治唇吻強 穴上關 兌端 治唇吻瞤動 穴大迎
治唇腫 穴[illegible] 太衝

治頰腫 穴俠谿 和髎 頰車
治頸頰腫引牙車不得開急痛口噤不能言 穴曲鬢
治頰腫 穴完骨 治頰頷腫 穴大迎
治頰頷腫 穴翳風 治頸項腫實熱 穴腕骨 陽谷
治頷腫 穴支正 治頰頷腫瘡癢 穴手三里
治頰頷腫 穴少商
治頸頷腫痛惡寒肩背急相引缺盆痛目青盲
穴商陽 又三壯右取左左取右食頃立已
治頰腫痛 穴天窓 治頰痛 穴攢竹
治頸頷注痛 穴角孫
治胸脇肩間腋下腫善齧頰 穴足臨泣
治面腫唇動葉葉馬風狀如虫行又治不能言口噤不開 穴水溝
資生經云李觀察村武德中出鎮潞州殊權以新撰明堂示予
有刺史成君綽忽頸腫加數升喉中閉塞水粒不下三日矣余屈
權救之鍼其右手次指之端如食頃氣息即通明日飲啖如故

銅人云少商穴在手大指端內側去爪甲角如韭葉唐刺史成君綽忽頷腫
大如升甄權鍼之立愈病候少異功效實同但李云以指端銅人云
大指端未知其孰是果針少商當在大指端也姑兩存之以俟識者

舌強

治舌強 穴中衝
治舌縱涎下煩逆溺難小腹急引陰痛股內廉痛 穴陰谷
治舌下急 穴天突　治舌縱 穴然谷
治口痛齧舌 穴[illegible]　治俠舌縱涎青 穴天突
治舌上黃身熱 穴魚際　治舌強 穴竅陰
療吐舌戾頸小兒吐舌舌強難嚥下不得 穴陽谷
療吐舌 穴滑肉門 少海 溫溜
治舌強 穴大迎　治吐舌 穴滑肉 太一
治舌卷 穴衝陽
治吐舌 穴陽絡 二間 揚 溫溜

治舌強 穴瘂門　治舌急 穴風府
治舌緩 穴陰谷
治舌本出血 穴扶突 大鐘 竅陰
治舌乾脇痛 穴[illegible]　治舌本痛 穴中衝
治舌縱涎下煩悶 取足少陰
治重舌 刺舌柱以鈹鍼　治重舌 穴行間 灸隨年壯
治重舌經驗
右用指去爪先以舌下筋上擦至根斷然後擇入如此三次又用指
蘸水取頂後髮灰擦口中筋自上趕下至小窩擇擦入亦三次小
兒若飲乳哺前則病去矣
治舌上出血如鑽孔者
以鐵篦燒赤烙之灸下以五十壯
治舌卒腫滿口溢出如吹猪胞氣息不得通須臾不治殺人急以指刮
破舌兩邊去汁即愈亦可鈹刀決兩邊破之以瘡膏傅之
治舌卒腫

刺舌下兩邊大脈血出勿使刺著舌下中央脈血出不止殺人如上
治不愈或血出數升則燒鐵今赤熨瘡數過以絕血也

牙疼

治齒痛惡寒 穴曲池 大迎
治牙齒痛不能言 穴厚白　治上牙齒痛 穴陽谷 顴髎 聽會 正營
治下牙齒痛 穴四瀆 陽谷 液門 商陽 二間
治牙齒不能嚼 穴頰車 角孫
治風齒疼痛
外踝上高骨前之陷灸三壯則止又以繩量手中指至掌後橫文
折為四分量橫文後當臂中灸三壯愈隨左右
王氏云有老婦人患牙疼人教灸兩手掌交叉以中指頭盡處為
穴灸七壯永不疼恐是外關穴也穴在手少陽去腕後二寸兩筋中
因循手毒灸悉善手疼人為灸手外踝穴近前些子遂痊灸但不知
千金所載灸法上指足外踝耶手外踝耶識者當辨之

治牙車痛 穴顴髎　治牙疼齲齒 穴大迎
治頰腫引牙車不得嚼 穴曲鬢
治牙齒痛齲腫口噤 穴正營
治齒痛 穴陽谿 懸顱 手三里
治齒痛惡寒 穴商陽　治齒齲痛 穴兌端
治上齒齲腫頸項痛 穴小海
治風牙疼青口不開 穴上關
治牙痛 穴[illegible]
灸牙疼法
隨左右所患肩尖微近後骨縫中小舉臂取之當骨解 灸五壯
王氏云予親灸數人皆愈[illegible]坦夫病良久乃定永不發予親病
齒痛百方治不驗用此法瘥 又李帥[illegible]傷寒方愈食素梅
既而牙疼甚有道人為之灸屈手大指本節後陷中灸三壯

初灸覺痒再灸覺牙有聲三壯疼止今二十年更不發陽谿穴
也 又云齒痛手陽明脉入齒縫中左痛灸右右疼灸左

治牙齒疼 拖穴 灸兩手中指背第一節前有陷處七壯下火立愈

治牙疼 穴合谷

治出牙方
凡蛀牙疼必須出之否則不止然不可出也無問上下但隨左右
於牙關旁車骨長指時以指捻之覺痛處是穴以艾人灸七壯
瘥銀蛀牙自落其妙如神 又人灸指節如以內孔中便緣
脂出

治牙疼 鍼內庭二穴如蟲灸後者便藥而愈 又方男左女右在肩頭上
穴口中灸三壯左疼灸右右疼灸左

治唇吻強齒斷痛 穴兌端

治骨槽風 於疼處耳中梗上灸 治齒痛 灸肩髃七壯隨左右

又法 灸耳垂下牙盡骨上三壯未效加壯數

治牙齒疼痛 先以稻草心量中指中節至手長即將手掌下量至掌上兩段以
艾灸之七五壯若左邊牙疼灸右邊右邊牙疼灸左邊

治齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明

○齒齲

療齒牙不嚼物齲痛腫 資生 穴角孫

療齒齲 穴耳門

治齒齲痛 穴三間 陽谷 衝陽 內庭 厲兌 四瀆
液門 上關

治齒齲痛 穴三間 大迎 正營

治齒齲痛又治齒寒脏風頭痛 穴少海

治齒齲 穴合谷 偏歷 三陽絡 耳門

治齒齲 穴完骨

治齒齲痛唇吻強上 穴兌端 目窓 正營 耳門

治齒齲 穴厲兌 三間 衝陽 偏歷 小海 合谷
內庭 復溜

治齒齲 穴曲鬢

療牙齒齲痛 穴下関 大迎 翳風
傳曰脣亡齒寒謂前齒非牙也說文云齲齒蠹也謂齒蠹蝕而痛也
其不因齲蠹而痛者蓋風寒入腦髓爾素問謂大寒至骨髓故頭
痛齒亦痛當以此治之

治齒齲 穴曲鬢 衝陽 治上齒齲腫 穴目窓

治上齒齲痛惡寒 穴正營 治下齒齲痛惡清 穴二間

齒噤

治欬逆上氣喘息喧咊齒噤 穴天容 廉泉 魄戶 氣舍 譩譆 扶突

治口噤不能言 穴曲鬢 治口噤 穴天窓 翳風

治口噤舌根縮 穴廉泉

治口噤不開 穴合谷 列缺 頰車 禾髎

治風痓口噤 穴大迎

治口噤不開暴瘖不能言 穴支溝

治牙噤 穴外關 內庭 三里 商丘 大泉

治口噤不開引鼻中 穴斷交 上関 大迎 翳風

治唇吻不收瘖不能言口噤不開 穴合谷 水溝

治口噤不開 穴曲鬢 商丘

療面風口不開口生瘡又治口噤 穴承漿

療斷噤 穴廉泉 療口噤鼓 穴兌端

療口噤不開 穴翳風 療口不可開及尸厥 穴[illegible]

咽喉腫痛

治咽喉痛 資生 穴風府 治咽痛食不下 穴膽俞

治喉嗌痛 穴風府 天窗 勞宮
治嗌痛 穴中渚 支溝 內庭
治咽中痛不可內食 穴湧泉 大鍾
治嗌中如扼 穴間使 治喉咽痺 穴膝關
治喉痛 穴天窗 治喉咽腫 穴水突
治嗌腫不可咽 穴前谷 照海 中封
治喉腫 穴中封
治嗌內腫氣走咽喉不能言 穴然谷 大谿
治咽喉癰腫 穴人迎 治咽痺 穴大谿 中渚
治喉痺咽癰水漿不下 穴琁璣
治咽外腫肘臂痛不能上下 穴液門
治咽內腫 穴然谷 治咽腫 穴水突 氣舍
治喉中生瘡不得下食 穴天突
治頷腫咽升喉中閉塞水粒不下
又穴少商以三稜鍼刺微出血泄諸陽臟熱 次鍼陽谷二穴而愈

治喉腫胸脇支滿 穴尺澤灸百壯
治喉腫厥逆五臟所苦鼓脹
灸下兩各五十壯老人加之小兒隨年壯
治咽腫難言 穴天柱
治男子婦人喉閉腫痛不能言者
刺小商穴出血立愈如不愈以溫白湯口中含咽是以熱消于熱也

咽喉鳴

主喉鳴暴痄氣哽噎生 穴扶突 天突 太谿
主喉中鳴 穴少商 太衝 經渠
治喉中焦乾 穴魚際
治喉中如水雞聲 穴天突 扶突
治喉中作聲 穴天牕 治喉鳴 穴大鍾 大包
治喉中鳴翕翕 穴天突
療喉鳴 穴陽陵泉 天池 曲中

主呼吸短氣咽中如息肉狀 穴液門 四瀆
主嗌中有氣如息肉狀 穴蠡溝 少府
主嗌中內腫氣走咽喉 穴然谷 大谿
治咽喉偃引項攣不收 穴風池
治咽全聲破 穴天瞿灸五十壯

咽喉乾

治咽喉乾噎生 穴極泉 大淵 偏歷 太衝 天突
治喉乾淬寒慄鼓頷欬引尻痛溺出嘔血 穴魚際
治喉乾煩渴 穴行間 治咽乾不嗜食 穴神門
治嗌乾四肢惰 悲不樂 穴照海
治咽酸 穴少衝 治咽乾 穴少澤 太谿
主嗌乾 穴復溜 照海 太衝 中封

喉痺

治喉痺脇中暴逆噎生
先取衝脉後取三里雲門各瀉之又刺手小指端出血立已
治喉痺不能言 穴三里 溫溜 曲池 中渚 豐隆
治喉痺 穴神門 合谷 風池
治喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引耳後 穴完骨 天牖 前谷
治喉痺咽腫水漿不下 穴琁璣 鳩尾
治喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下 穴天鼎 氣舍 鬲俞
治喉痺哽咽寒熱 穴涌泉 然谷
主喉痺胸痛寒熱 穴中府 陽交
主喉痺哽咽寒熱 穴天容 缺盆 大杼 鬲俞 雲門 尺澤
二間 厲兌 涌泉 然谷
治喉痺咽如哽 穴三間 陽谿

治喉痺咽乾急 穴天突 治喉痺嗌乾 穴大陵 俞府

治喉痺舌捲口乾 穴關衝 竅陰 少澤

治喉痺 穴陽輔 陽交 厲兌 下廉 然谷 經渠

完骨 鬲俞 缺盆 氣舍 雲門 陽谿

合谷 溫溜 中渚 浮白

治喉痺頰滿 穴大杼 治喉痺實熱咽中如鯁 穴天容

治喉痺咽腫不得息飲食不下喉鳴 穴天鼎

治頸腫喉痺 穴前谷

治喉痺頸腫肩背痛振寒 穴二間

治喉痺不能 穴曲池

治喉痺舌強口乾肘不舉 穴竅陰

治喉痺舌強口乾心煩 穴少澤

治喉痺口乾身熱痛頭痛短氣胸脇痛 穴大陵

治喉痺實熱 穴浮白 治喉痺 穴商陽 [illegible]

治喉痺咽如有物傷急振寒 又治喉痺咽腫多臥善驚 穴二間

治喉痺氣逆欬判中涎壅

灸肺俞七壯 亦可隨年壯至百壯

治急疾閉塞喉風

灸三里穴二七三七壯 有人苦喉痺雖水亦不能下 然灸三里而愈 又隨腫一邊於大指外邊指甲下與根齊鍼之 不問男左女右 只用人家常使針 血出即効 如大段危急 兩大指都針尤妙

治喉痺

以砭鍼刺腫處出血立効

治咽喉痛

刺手小指爪文中 出三大豆許血 逐左右刺 皆須慎酒麵毒物

治咽喉諸證及毒氣歸心等項惡證 並皆治之 無有不效

第一穴風府穴 腦後入髮際一寸 針入四分 穴高主[illegible]量恐傷人 不可不知 須令人扶護乃針 第二穴少商穴 在手大指近虎口一邊 指甲與根齊 離爪如韭葉許 針入二分 病甚則入五分 第三穴合谷穴 穴法口授 治牙閉不開 目閉 穴應針 各刺一刺 出血入二分 閉即開 又有一證 渾熱者 有作寒者 合谷穴用針左轉發寒 右轉發熱 第四穴是上星穴 在頂前入髮際一寸 治頰腫及喉痺喉風等證 又氣急者 實熱針足三里 虛熱灸足三里 以手約膝 取中指稍盡處是穴 根脚咽喉常發者 耳垂珠下半寸近腮骨 灸七壯 二七尤妙 及灸足三里 穴在膝下 三寸骨骨外

治喉痺 穴豐隆 湧泉 關衝

如病甚 以小三稜鍼藏於筆頭中 妄以點藥於喉中痺上 乃刺之 則有紫血頓出 放如不敢鍼 以患人難以刺之

治喉痺及毒氣

穴尺澤 灸百壯

普濟方卷之三百六十二

普濟方卷之一百六十三目錄

鍼灸門 類二類

心疾類　心腹脹滿類　脾胃類

心疾類

心氣　心痛　心恍惚　心驚恐　心喜笑
心憂悲　心煩悶　驚悸　欬逆　嗜卧
不卧　夢覺

心腹脹滿類

腹滿　胃滿　腹脹　心腹堅大　小腹脹滿
鼓脹　水腫　積聚　胃痛　反胃

脾胃類

脾疼　胃痛　反胃　食不下　不能食
不嗜食　食氣　食多

普濟方卷之一百六十三目錄畢

普濟方卷之一百六十三

鍼灸門

心疾類

心氣

治心氣亂 資生經 穴心俞

治中風心煩驚悸健忘 穴百會

治健忘 穴神道　幽門　列缺　膏肓俞

主憂風邪氣久出喜忘 穴百會　天府　曲池　列缺

主健忘 穴刺足少陰　主心悗少力 穴大橫灸五十壯

療無心力 穴百會　巨闕　療心中悶 穴上脘

治失志 穴至陽　療神氣不足失志 穴中衝

主失志 穴內關　主心中懊憹 穴通谷

療心中氣悶不喜聞人語 穴鳩尾

治無心力忘前失後 穴百會

王氏云予舊患心氣凡思慮過多心下怔忪或至自悲感槩必灸百會則灸百會有治無心力忘前失後證故也 並見鍼經

心痛

凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智 資生經 穴內關

治卒心痛汗出 穴大敦刺出血立已

治心痛 穴心俞　膻中　通谷　巨闕　太倉　神府
郄門　曲澤

治心痛短氣 穴期門　長強　天突　俠白　中衝

治心痛彭彭然心煩亂悶少氣不足息 (穴)尺澤
治心如懸少氣不足以息 (穴)然谷
治心悶痛上氣牽引小腸 (穴)巨闕灸二七壯
治心痛如懸 (穴)腎俞 復溜 大陵 云門
治心懸如飢 (穴)間使
治心痛如錐刺甚者手足寒至節不息者死(得今集)
(穴)支溝 太谿 然谷
治心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息 (穴)行間
治心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心疝太息 (穴)鳩尾
治心痛難俛仰及治身寒心疝衝胃死不知人 (穴)中脘
治胸痺心痛不得反側及不得息痛無常處 (穴)臨泣
治痛搶心 (穴)厥陰 行間
治卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲 (穴)通理
治心痛悲恐相引瘈瘲 (穴)靈道
治心痛上搶心不欲食及身體 (穴)建里
治心痛面蒼 (穴)章門
治心痛脇脹胃氣上逆 (穴)大泉
治心寒脹滿不得食 (穴)鳩尾
治暴泄心痛腹脹心痛尤甚(得今集) (穴)大都 太白
治心痛有三蟲多涎不得反側 (穴)正管
治心切痛喜噫酸 (穴)不容 期門
治心痛而寒 (穴)少衝
治心下有寒痛又治脾虛令人病不樂好太息 (穴)商丘
治胃痺心痛 (穴)大井 臨泣 膻中或灸百壯
治胸心痛心腹諸病心痛 (穴)膻中 天井 灸太倉 肝俞
治心腹胸滿吞痛 灸肝俞 治心痛 (穴)中脘
治心痛 (穴)建里 治心痛周痺 (穴)鬲俞
治心痛周痺痛無常處 足臨泣
治心痺 (穴)魚際
王氏云妻嘗侍親疾累日不食因得心脾疼發則攻心腹後心

痛亦應之至不可忍與兒女以藥飲之疼反甚若灸則偏身
不瘳灸矣不免令兒女以火針微刺之不拘心腹有時痛定即欲
起灸神效
治心痛悲恐相引瘈瘲肘攣暴瘖不能言 (穴)靈道
治心痛乾嘔煩滿 (穴)俠白 治心痛乾嘔 (穴)極泉
治心痛唾血振寒咽乾狂言口𠯗 (穴)太淵
治心痛煩滿舌強 (穴)陰郄 中衝
治心痛 (穴)厥陰俞 神門
治兩乳心煩痛 (穴)斷交 治心胃痛 (穴)天井
治心痛不可忍及不得臥 (穴)下脘 治心痛不可忍 (穴)上脘 太陵
治心如懸下痛 (穴)外陵
治胸息心痛 (穴)音門
治心下痛不欲食及心痛有時 (穴)建里 涌泉
治九心痛有數種冷痛虫心痛蠱毒霍亂不識人及婦人虫心痛
蠱毒 (穴)巨闕
治心痛不能食反胃霍亂心痛 (穴)中脘
治心痛 (穴)曲澤 督俞 鬲俞
治心痛不嗜食 (穴)涌泉 治卒心痛 (穴)少衝
治寒熱心痛背相引痛胸脅痛悶欬欬不得息煩心多涎 (穴)心俞
治心痛不可忍唾血煩心 (穴)巨闕
療卒心痛不可忍吐冷酸水及元臟氣
灸足大指次指內橫文中各一壯炷如小麥大立愈
治心懊憹微痛煩逆 (穴)心俞灸百壯
治心痛如錐刀刺氣結 (穴)鬲俞灸七壯
治心痛冷氣上 (穴)龍頷灸百壯
治心痛惡氣上脇急痛 (穴)通谷灸五十壯
治心痛暴絞急絕欲死 (穴)神府灸百壯在鳩尾正心有尼
治心痛暴惡風 (穴)巨闕灸百壯
治心痛堅煩氣結 (穴)太倉灸百壯
治心痛

灸臂腕横文三七壯　又灸兩虎口白肉際七壯

治腎心痛

先取京骨崑崙發針不已取然谷

治胃心痛　取大都　太白

治脾心痛　取然谷　太谿

治肝心痛色蒼蒼然如死狀終日不得休息 得效方

取行間　太衝

治肺心痛　取魚際　太淵　治心痛不可按煩心　穴巨闕

主心痛有三蟲多涎不得反側 居見方 穴上脘

主心痛身寒難以俛仰心疝衝冒死不知人　穴中脘

主心痛如錐刺　穴然谷　太谿

主心腹中卒痛　穴石門　主心痛　穴陰郄　行間

治卒心痛多驚喜不得語咽中如噎　穴間使

治心痛善驚　穴曲澤

治心痛卻數噫喜驚恐畏人神氣不足　穴郄門

治心痛胸脅支滿欬逆膺背胛間內痛　穴天泉

治厥心痛數逆心痛如錐刺手足寒節常息者死　穴太谿

心痛右此種乃心胞疾而非真心痛真心痛則朝發夕死夕發朝死如難經所載是已然此疾亦有所自產論嘗謂產後心痛若訣以為有所積瘀之則虛極而心絡寒甚得心之正經則變為真心痛此一說也巫臣以夏姬之故然子反曰余必使汝疲於奔命以死手反於是乎載七奔命遂還心疾而卒則又因用心而成疾矣然則如之何平居當養其心使之和平疾自不作其或則當服鎮心丹之類以補養之可也若疾將作而鍼灸之亦可以為次矣

治心腹冷痛王氏玉抱肚法

針砂四兩炒似烟出入碁子兩個炒粉霜各半錢新水拌勻微濕以皮紙貼安中假裝袋中系於石門關元穴大補本元或寅其他令癒汗出立差予自用驗此藥煉則不熱再以新水拌再熱可用十餘次如藥力盡卻曬乾再入碁等依舊熱否

予叔吾傳一方只用針砂瓦礬石功效亦同豈以硇砂粉霜價不廉而不用耶

王氏云予舊患心脾疼則疾不可忍急用艾炷實灸丹中繞令通紅取出投米醋中漉出以紙三二重裹之置疼處稍止冷即再易書舊所得也後見千金方有云凡心疾冷痛熱鹽一斗熬或熬蠶沙燒磚石蒸熨取其暖溫腹止或蒸土亦大佳始知予家所用蓋出千金方也它日心疼甚急灸中脘數壯覺少腹中處有冷氣自下而上至灸處即散此灸之功也本事方載王思和論心忪非心忪也胃之大絡名曰建里絡胸膈及兩乳間虛而有疾則動更須臾發一陣熱是其證也審若是又當灸建里矣但不若中脘為要穴云

治心疼及治小兒心疼

足大拇指中節上灸三壯即止男左女右其有蚘蟲齩心疼其證者不明其證但服止疼等藥大相遠也如是蟲痛作時面心青黑仰身撲手悶亂欲絕止而口吐清水者是也

治心痛

足心亂文中以麥粒大艾炷灸三壯男左女右無過痛發時灸

治真心痛論手足青至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死療心痛痛及已死得令集

右高其枕拄其膝欲令腹皮寬灸其臍上三寸胃脘有頃

其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差緩者

治蚘心痛

以手按而堅持之勿令得移以大針刺之後久持之蟲不動乃出針心下不可刺中有成聚不可取於輸腸中有蟲蚘皆不取以小針

治心痛引腰脊欲嘔及不得息 得令集

刺足少陰不已取手少陰

治心痛腹脹嗇嗇然大便不利 得令集

刺足太陰

治心痛引小腹滿上下無當處便溲難 得令集

刺足厥陰
治心痛但短氣不足以息 保命集
刺手太陰
治寫熱厥心痛 保命集
太谿灸三壯或五七壯
治寒熱厥痛 保命集
崑崙灸三壯或五七壯
治心痛與背相接善恐如從後觸其心傴僂者腎心痛也 保命集
先刺京骨崑崙不已刺合骨
治心痛卧若徒居間動作痛益甚其色不變此肺心痛也 保命集
刺魚際大淵宣通氣行無所礙者刺痛愈
治卒心痛不可忍
刺任脉上脘針入八分先補後瀉之其穴下針令患人覺針下氣行如衮雞子入腹爲度次針氣海二穴足少陰湧泉二穴然積者刺之如食頃而已有積者先飲利藥後刺之立愈如不已刺間使二穴針支溝一穴次針三里二穴如灸治心痛猶針針任脉巨闕穴如五臟氣相干心痛者刺之無不愈有小腸氣痛無腰脹氣膈痛等疾皆痛至心宜審辨不可執一而刺之如汗出刺大敦出血立已
治腹有逆氣上攻心腹脹滿上搶心痛不得息氣衝腰痛不得俛仰
氣衝各灸七壯炷如大麥禁針次針一里二穴而愈
治心痛週痺 (穴)鬲俞 臨泣
治心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁慮面赤身熱其脉實大
數此爲可治
春當刺中衝 夏刺勞宮季夏刺大陵皆補之
秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之 此是手心主脉
又當灸巨闕五十壯背第五顀百壯
治心病暴痛 取足太陰
治卒心痛 肘後方
手中央長指端灸三壯

足横度病人口折之以度心厥下度頭灸一壯
治心病激痛難忍 肘後方
巨闕及左右一寸並灸百壯
又以繩度頸及度脊如之令正相對乃灸六處
治卒心腹痛 肘後方
乳下一寸灸七壯
又兩手大拇指內邊爪後第一紋頭各灸一壯
又兩手中央長指爪下各灸一壯愈
治心腹冷痛不可忍
足大拇指甲頭當中曲甲之間男左女右灸五壯艾炷如麥粒大
經驗方云景齊事爲者會日一棵痛此痛不可忍同官郭會望傳是
洪立愈
治心腹痛下逆 秘方
手脘灸三百壯
治心腹疼刺痛不可忍
陰郄二穴灸三壯

○心恍惚

治恚怒恍惚 資生經
(穴)心俞 天井 神道
治狂驚恍惚 灸足陽明 治狂癲恍惚 灸膝户
治狂言恍惚 灸天樞
治卒中邪魔恍惚左手關後尺中陰實者腎實也若恍惚健忘目視眬耳聾悵悵善鳴
刺足少陰治陰
治恍惚不知人 (穴)巨闕
率少力忘前失後心神恍惚 (穴)百會
療心恍惚 (穴)陰都

○心驚恐

治心痛善驚（資生經） 穴 曲澤　治悲恐 穴 靈道
治暴驚 穴 下廉　治心痺悲恐 穴 魚際
治悲恐善驚 穴 少衝　治心風驚悸 穴 上脘
治悲恐畏人 穴 少府
治驚悸少氣 穴 神門 蠡溝 巨闕
治大驚乳痛 穴 梁丘
治多驚 穴 陰郄 間使 二間 厲兌
療驚悸 穴 間使　治驚恐 穴 五里
治喜驚恐 穴 京骨 大鍾 太陵
治驚悸 穴 百會 神道 天井 液門
治善恐 穴 通谷 章門
治癲疾風 隨善驚恐 穴 大衝
治風虛驚恐狂陽又療驚恐悲愁 穴 支正
治驚恐畏人 穴 郄門　治驚悸不得安寢 穴 神庭
治腦風頭痛目眩心悸 穴 腦空

八

主吐舌戾頸善驚 穴 二間 合谷 厲兌
主心下澹澹善驚 穴 曲澤 太陵
主心下悸又療悲恐畏人 穴 通里
主心下惕惕恐人將捕之 穴 然谷 陽陵泉
主驚恐畏人神氣不足 穴 大鍾 郄門
主驚不得臥 穴 氣海 陰交 大巨
主善驚 穴 大巨　主多卧好驚 穴 厲兌
主喜驚妄言面赤 穴 掖門　主數噫恐悸氣不足 穴 少府
主數噫恐悸不足 穴 神門　主驚悸心痛 穴 巨闕
主卧驚視如見鬼 穴 陰蹻　主瘈瘲而驚 穴 解谿
主太息煩滿少氣悲驚 穴 少衝
主心痛數驚心悲不樂 穴 行間
主氣驚心痛 穴 手少陰 陰郄
療悲心畏人善驚 穴 少衝　療驚不安寢 穴 神庭
療善驚 穴 商丘　療大驚 穴 梁丘

療多悲恐驚悸 穴 風府　療心驚悸神氣耗散 穴 鳩尾
治驚悸心怯少力 穴 天樞 灸五十壯
治驚悸 穴 上脘　治驚悸 穴 天井
治善驚 穴 厲兌　治悸坐不安席 穴 或中

○心喜笑

主笑若狂（資生經） 穴 神門 陽谷　治善笑不休 穴 太陵
主喜笑不止 穴 勞宮 太陵　治狂言喜笑見鬼 穴 陽谿
主喜笑 穴 列缺　治善怒 穴 後谿 勞宮
治喜笑 穴 勞宮　療多笑 穴 肝俞
治失笑無時節 穴 水溝
療心痺悲恐 穴 魚際
主笑欲殺人 穴 身柱

○心憂悲

九

主心悲（資生經） 穴 漏谷　治心悲 穴 商丘
治悲恐 穴 靈道　治恍惚悲愁 穴 神道
主悲愁恍惚悲傷不樂 穴 天井 心俞 神道
主大風默默不知所痛悲傷不樂又療驚悸悲傷 穴 天井
治大風逆氣多寒善悲 穴 大横
治善悲不樂 穴 照海
治太息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四肢不收 穴 日月
治悲恐善驚 穴 少衝
治煩滿少氣悲恐畏人掌熱肘腋攣急胸痛手卷不伸 穴 少府
治驚恐悲愁 穴 支正　治悲笑 穴 勞宮
治喜悲泣 穴 心俞 神門 解谿 太陵
主善悲 穴 間使　主悸悲 穴 通里
主心悲 穴 行間 勞宮　主泣出 穴 百會
治憂主心 灸絶骨
治悲哭 穴 水溝

王氏云母氏久病忽泣者不可禁知是心病也灸百會而愈予
凡遇憂愁悽愴亦必灸此有此疾者不可不之信也
治泣出而驚 穴俠谿

○心煩悶

治瘥心煩甚欲得飲令惡寒則欲處温中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸
少氣不足手臂寒喘逆身熱狂走笑言血遺溺身生白 穴神門
治心中熱煩 穴上脘 治心中煩滿 穴陰都 巨闕
治煩心 穴玉堂
治頭痛煩心 穴魚際 少商 公孫 解谿 至陰 完骨
治熱病煩心 穴陽谿 治煩心 穴百會 獨間 承光
治心中煩滿汗不出 穴曲差 主鼽頭耳從痛煩心 穴完骨
主舌卷口乾心煩悶 穴關衝 治心煩悶 穴幽門
療煩心上氣

療胃脹支滿寒痛胃寒食不下嘔逆上氣煩心 穴紫宮
療胃滿不得喘息胸痛胃寒嘔逆上氣煩心 穴玉堂
主煩心 穴公孫 主心煩 穴尺澤 少澤
凡心虛則心煩 穴內關 主煩心 穴通里
療煩心 穴巨闕 心俞 治心煩 穴太一
治心風驚悸不能食心中悶發噦 穴上脘
治熱悶心煩 穴百會 治心中煩悶 穴巨闕
治心悶 穴中脘 治心煩 穴紫宮
治心痛出血則心下澹澹喜驚身熱煩心口乾逆氣嘔血肘瘈喜搖
頭清汗出不過肩 穴曲澤 治心煩 穴曲差
主心悶痛 穴巨闕灸二七壯 治亂心煩 穴絕骨
治煩滿驚 穴腕骨
治心悶不已 刺支溝 三里各二穴

○膽虛

治膽熱嘔逆上氣 穴中脘
治膽寒 穴三陰交各二十壯

○歎息

主太息煩滿少氣悲驚 資生經 穴少衝
主不得太息 穴行間
凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰
穴取公孫 井俞
資生經 胸中切痛脹頭而灌走煩心狂多欲不嗜臥處則鼓脹腹中
氣滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之
治太息善悲 穴日月 商丘
治太息 穴行間
療胸脇痛善太息胸滿膨膨 穴丘墟

○嗜臥

治多臥 資生經 穴頭會 百會
治嗜臥 穴陰蹻 兩俞 治好獨臥 穴胃俞
治多臥善欠 穴二間 三間 治多驚善驚 穴厲兌
治四肢煩熱嗜臥怠惰四肢不欲動 穴脾俞
治嗜臥身不欲動 穴三陽絡
治嗜臥 穴三里 太谿 大鍾 照海 二間
治傷寒嗜臥 穴兩俞 治善寐 穴厲兌 大敦
治嗜臥 穴天井
王氏云千金謂食多身瘦名曰食㑊先取脾俞後取手腦又云凡
身重不得食無味喜臥皆針胃脘太倉服建中湯平胃丸令人嗜
臥與夫食罷則脾困欲臥然不能針豈可不灸予與人灸中脘
膏肓遂皆不困故既言之

○不臥

治驚悸不得安寢 資生經 穴神庭 治不得臥 穴[illegible]衝 章門

治大喘不得卧 穴期門　治賁豚煩悶不得卧 穴大淵
治腰脊冷疼不得久卧 穴白環俞
治不得卧 穴隱白 天府 陰陵泉
治風癇驚悸不得安寢 穴神庭
治不可卧 穴太淵 肺俞 上脘 條口 隱白
治卧伸縮四肢不得 穴譩譆 環跳
治卧不安 穴大椎
治驚不得卧 穴氣海 陰交 大巨
治不嗜卧 穴公孫
治不得卧 穴攢竹
王氏云人不得卧亦有因心氣使然宜服俞山人鎮心丹此丹以酸棗仁微炒過則令人得睡故也○指迷方若頭痛筋急驚不著卧謂之腎厥頭疼宜灸關元百壯服玉真丸

夢魘

治魘夢及治喜魘夢 資生經 穴商丘
治夜夢顛倒面青黄無顏色 穴天牕
凡治手閉後尺中陰絶者無腎脉也苦足逆冷上搶胸痛夢入水見鬼
善魘寐黑色物來掩人
上刺足太陽治陽
凡魘死不得著燈火照亦不得近前急喚多殺人但痛咬其足跟及足拇指甲邊并多唾其面即活
又灸足大指聚毛中二七壯 集效
王氏云有婦人夜多魘蓋因少年侍親疾用心所致也後服定志丸遂不常魘矣固不可廢灸亦不可不服也
治卒魘方
以帶左索縛其肘後男左女右用餘捎急絞之又縛扶脚及絞閉其口鼻則解之令一人坐頭守一人於戶內呼病人姓名坐人應曰諾在便蘇
治卒魘寐不寤 穴胃脘灸一七壯

心腹脹滿類

腹滿

治腹滿便難 穴大鍾
治腹滿及治小兒腹滿不食 穴陷谷 懸鍾
治腹中滿暴厥少氣 穴陰市　治腹滿積聚 穴太陰郄
治寒氣腹滿腹中積聚痛 穴衝門
治腹滿喜噫 穴隱白　治腹脹滿 穴三里 行間 曲泉
治腹中滿嘈雜不便心下有寒痛 穴商丘
治腹痛脹大心下氣逆腹脹滿急 穴漏谷
治腹食脹滿 穴期門　治結積留飲痛 穴通谷
治心堅滿 穴石關　治心滿氣逆腸鳴 穴陰都
治心腹滿 穴靈宮　治腹寒脹滿 穴衝門
治腹滿善噫煩熱悶亂吐逆目眩及治熱病汗不出手足逆冷 穴大都
治心腹脹滿 穴厲兌 陷谷　治腹滿 穴巨闕
治腹暴滿 穴厲兌　治腹大滿 穴太白
治腹滿 穴三里 譩譆
治心下腹滿傷飽食不化霍亂出洩不自知心痛 穴中脘
治心腹諸痛心痛 灸太倉　治心腹疼痛 灸肝俞
治心脹滿 穴膈俞　治腹滿 穴府舍
治心腹有水 穴四滿　治胃腹滿 穴神堂
治腹滿 穴魚際　治腹滿疝積 穴石門
治腹脹不能食 穴分水
治腹滿虛脹 穴意舍
王氏云人有心腹脹滿者予只多以厚朴與之令每服錢重到七八錢重用生薑七片水一小碗煎至七分服滓再煎服不過五六服腹滿脹去纔灸之幾未如此速也因識于此
治腹滿 灸絶骨　治小腹積聚堅如石小腹滿 穴中極
治小腹滿 穴肝俞 包肓　治腹大滿喜噫 穴陷谷

治氣瘦恐懼氣不足腹中悒悒 穴大衝

治腹滿痛不得息 穴氣衝 治腹滿 穴懸鍾

胸滿

治胸滿短氣不得汗資生經

皆鍼補手太陰以出汗

治胸脇滿 穴神堂 治胸黃腸鳴 穴三間

治胸滿不得息 穴天容 陽谿

治胸中滿 穴曲池 天池 人迎 璇璣 神道 俞府 章門 中府 臨泣

治胸滿腫 穴陽交 治胸滿欬逆 穴鳩尾

治胸滿欬呼脇背痛 穴天泉 治胸中淡夾 穴巨闕 間使

治胸下積氣 穴期門

治胸中熱息賁脇下氣上 穴期門 缺盆

治胸中暴逆 穴雲門 治胸中熱滿 穴大杼 心俞

治胸中寒脹氣時不止寸口小腹脹上搶心欬唾有血 穴然谷

治胸脇痛 穴期門 療胸滿頭痛 穴三間

療胸中氣滿如寒胸背心痛 穴膻中

療胸下滿痛 穴乳根 治胸滿 穴陽交 臨泣

治胸滿腹脹 穴委陽

治胸皮膚痛胸脇支滿 穴譩譆 治胸中氣滿喘欬支膈 穴商陽

治胸痛 穴俞府

治胸中室悶 穴膈關

治胸滿不得息欬逆 穴陽谿 神封

治胸中氣滿背痛如龜胝強頭目眩令人失顏色 穴肺俞

治胸中寒滿不得卧常息 穴輒筋 治胸脇支滿 穴胃俞

治胸滿支腫 穴膈俞

治胸腹滿 穴湧泉 神堂

治胸脇支滿鬲塞食不下嘔吐食還出 穴中庭

治胸煩滿氣上衝心喉痺欬喘不得息胸脇短氣府痛不得舉臂

穴雲門

治胸中有熱 穴天池 治胸中煩滿 穴曲池

治胸脇滿引背痛不得轉側 穴肩井

治胸脇滿不得俛仰食不下欬唾稠濁 穴周榮

治胸脇支滿欬逆喘不能食 穴彧中

治胸脇支滿欬逆喘不得息心悶吐胸滿不嗜食 穴神藏

治胸脇支滿喘逆上氣胸背急不得息不知食味 穴氣戶

治胸脇支滿膈閉雷鳴常有水聲 穴食竇

治胸脇支滿痛引背不得息欬逆嘔吐胸滿不嗜食 穴靈墟

治胸脇支滿鼻塞不通呼吸少氣喘息不得舉臂 穴步郎

治胸脇支滿 穴章門

治胸脇支滿欬逆上氣多唾濁沫膿血 穴庫房

治胸脇脹滿 穴外丘 治胸脇支滿寒熱汗不出 穴俠谿

療胸脇微背痛 穴雲門

療胸脇滿痛引背 穴華蓋

治胸脇支滿 穴紫宮 中庭 湧泉 通谷 章門 曲泉

膈俞 期門 食竇 陷谷 石門

治胸脇柱滿

穴胃俞 三里 紫宮 華蓋 中庭 神藏

靈墟 俠谿 步郎 商陽 上廉 氣戶

周榮 上脘 勞宮 湧泉 陽陵泉

治胸痛不得臥胸滿喘無所出 穴膈俞 章門

治欬而胸痛陽氣逆上滿胸 穴天容 前谷

治胸滿 穴肺俞 巨闕 治胸脇支滿 穴大泉

治胸中煩悶 穴天髎 療兩脇滿 穴肝俞

治胸滿 穴手白 療胸腹兩脇滿 穴庫房

治寒熱胸脇煩滿頭寒四肢不舉腋下腫上氣胸中有聲喉鳴

穴天池

治胃滿痃氣胃脇癰腫 穴胃倉
治胃脊痛 穴魂門 治胃下積氣 穴梁門
治胃脇支滿頭目痛腫 穴陷谷刺出血立已
治胃痛心腹積聚痞痛 穴肝俞灸百壯三報

○腹脹

治腹脹黃疸 穴高俞
治腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦 穴大腸俞 脾俞
治寒中腹脹 穴中脘 治心下堅積聚冷脹 穴上脘
治腹脹不通逆息支主腹中支冷氣脹喘 穴隱白
治腹脹喘振慄 穴尺澤 治腹脹氣衝胃 穴天樞
治腹脹不通痃大便堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛作膿腫往來上下
穴中脘
治腹中脹腫 穴太谿 治寒熱腹脹 穴京門
治腹脹滿不得息
穴三里 章門 京門 厲兌 內庭
陰谷 絡却 崑崙 商丘 陰陵泉 曲泉
治腹中大熱不安腹有大氣暴腹脹滿下堅痛癃溢滿 穴氣衝
治腹大堅不得息脹痛引小腹尤大 穴期門
治腹脹心腹滿 穴巨闕 上脘
治心下脹滿而痛上氣 穴五里
治腹脹食不化鼓脹腹中氣大滿 穴公孫 太白
治腹中脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得臥 穴陰陵泉
治大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立
大巨虛 上廉
治胃喘息脹 穴太鍾
治腸下脹 穴關元 期門 少商
治腹脹堅硬水腫支滿 穴石門
治腹脹 穴解谿 血海 商丘
治心腹脹滿恒則食無所出口苦舌乾咽痛食不下 穴脾俞

治腹脹 穴高俞 譩譆 中膂俞
治腹脹引脅背痛食飲多身羸瘦黃疸善欠胃滿溏利體重
四肢不收癃痛腰痛不嗜食 穴脾俞
治胃寒腹脹不嗜食羸瘦腸鳴腹痛胸脇支滿脊痛喘急
穴胃俞
治腸鳴腹脹水穀不化腹痛欲瀉注目眩頭痛吐逆飲食不下
穴三焦俞
治心腹鼓脹 穴腎俞 治心腹脹滿 穴三里 懸鐘
治腹脹繞臍切痛大小便不利洞泄食不化脊強不得俛仰 穴大腸俞
治腹脹下痢 穴中膂
治腹滿脹大便難利小便赤黃身熱目黃 穴陽綱
治身熱煩滿腹脹食不化嘔吐泄腸血 穴太白
治腹滿虛脹大便滑泄背痛惡風寒食飲不下嘔吐消瘦目黃
穴意舍
治腹虛脹水腫食飲不下惡寒背脊不得俛仰 穴胃倉
治腹脹食不下 穴中府
治腹脹滿氣如水腫狀小腹堅如石 穴膀胱募灸百壯
治腹脹滿不得息小便黃男如蠱女如娠 穴陰谷
治腸鳴腹脹上衝氣逆食飲不下肩息唾血 穴承滿
治腹脹滿 穴大敦
治脾病身重四肢不舉腹脹腸鳴溏泄食不化 穴三陰交
治腹脹喘滿不得臥嘔吐食下暴泄 穴隱白
治腹中有寒熱起氣喘衄血不止腹中脹逆胸寒熱不得臥氣滿胃中
熱暴泄腸中喧吐不欲食 穴隱白
治腹脹 穴上
治膈脹胃脘滿 穴膈俞灸百壯三報
治肺風氣痿把四肢腹脹喘逆胃滿 灸肺俞各二壯
治脹滿水腫 穴脾俞灸隨年壯三報
治腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦
先取脾俞 後取季脇

治臟腑積聚脹滿羸瘦不能飲食吐逆寒熱往來小便不利少氣
穴三焦俞灸隨年壯
治脹滿雷鳴百病 穴大腸俞灸百壯三報
治脹滿氣聚寒冷 穴胃脘灸百壯三報
治腹脹滿遶臍結痛堅不能食 穴中守灸百壯
治脹滿瘕聚滯下疼冷 穴氣海灸百壯
治脹滿胃冷瘕聚洩利 穴天樞灸百壯
治腹暴脹按之不下
刺任脈中脘氣海二穴次針足陽明經三里二穴
治小腹脹滿痛引陰中 穴水道
治腹中膨脹不消
灸大腸俞四十九壯
治脾胃虛弱心腹脹滿不思飲食腸鳴腹痛食不化
刺三里 三陰交
凡刺腹痛諸俞穴須針三里穴下氣良

治腹脹腸鳴氣上衝胸不能久立腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫一作重俠臍急 穴天樞
治寒中傷飽食飲不化五臟脹滿心腹胸脇支滿脉虛則生百病
穴上脘
治心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄
刺穴中脘灸百壯
治寒氣入腹 穴關元 治五臟遊氣 穴陰交
治腹中熱喜渴涎出是蛔也
治腹滿痛不得息 穴氣衝
刺中脘大持之以手聚而按之
治臍脹氣陰腫下熱痛 穴陰都灸隨年壯
治臍脹腸痛嘔吐上氣等病
灸大椎并兩乳上第三肋間各止七壯

○心腹堅大

治腹胃不調腹痛不能食小便赤腹堅硬癖遇脉厥動背生癰
穴下脘
治腹堅大不嗜食振寒 穴衝陽
治腹堅硬 穴期門 治心下堅脹 穴不容
治腹堅硬 穴石門 治心下大堅 穴肓門
治腹堅如鼓 穴水分 治腹堅急 穴志室
治腹堅硬 穴陰陵泉 地機 下脘
治堅結積聚 穴脾俞
治心下堅積聚冷熱腹脹 穴上脘
治大病腹堅 穴丘墟 治腹大堅 穴期門
治腹大不嗜食 穴衝陽
治腹大下重又主厥氣上柱腹大 穴解谿
治腹滿堅脹不能食胃氣不足反胃四肢腹積聚 穴三里
治腹大堅 穴天樞 治腹痛胃脹堅硬 穴分水
附心堅滿積如盤 穴石關 治小腹腫 穴委中

治小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消 穴胃脘 三焦俞

○小腹脹滿

治小腹脹滿煩渴痛偏枯四肢不舉 穴大巨
治小腹脹滿小便淋瀝不通痛疝小腹痛 穴四滿
治小腹脹 穴然谷
治小腹脹滿嘔未止注寫 穴曲門
治小腹腫 穴京門 蠡溝 中封
治小腹堅急 穴胞肓
治小腹滿引陰中痛腰背強急膀胱有寒三焦結熱小便不利
穴水道
治小腹痛中熱喜寐小便不利小腹脹滿痛之
穴大敦 灸小腸俞隨年壯
治五臟虛勞小腹弦急脹熱
灸胃俞五十壯老小損之若灸全可百壯

治小腹堅腫 穴委中

銅人云小腸俞治小便赤澁淋瀝小腹痛千金亦云治小腹脹滿

此治小腹脹痛要穴也若又不效方灸其它穴云

治小腹熱欲走太息 穴日月 太衝

鼓脹

治腹堅大鼓水腫腸鳴胃虛脹不嗜食繞臍痛衝不息出千金 穴水分

治腹虛脹如鼓 穴公孫 神闕

治鼓脹并水腫 穴中封灸二百壯

治腹中雷鳴腹脹如鼓四肢腫十水病 穴復溜

治身重腹痛四肢怠惰腹脹如鼓腸鳴積氣如卵石 穴章門

治鼓脹 穴中封 四滿

治腹鼓脹腹中氣大滿 穴太白 公孫

治水脹小腹皮敦敦然 穴陰交 石門

治鼓脹腸鳴 穴分水

水腫

黃帝治水之腧五十七處尻上五行行五謂腎腧五十七穴積陰之所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎腧故水病下爲胕腫大腹上爲喘呼不得卧者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲逆不得卧分爲相輸俱受者水氣之所留也伏兔上各二行行五者此腎之街也三陰之所交結於脚也踝上各一行行六者此腎脉之下行也名曰太衝凡五十七穴者皆藏之陰絡水之所客也

治水遍身腫出資生經 足第一指上一寸灸隨年壯 又兩手大指縫頭灸七壯

治虛勞浮腫并水氣遍身腫滿效 穴太衝灸百壯 又灸腎俞

治頭面虛腫留飲胸脇支滿及水腫 穴陷谷刺出血立已

治面目癰腫 穴陷谷 列缺

治頭面腫 穴陽陵泉 公孫

治頭面氣浮腫 穴完骨 巨闕

治面浮腫 穴天樞 豐隆 厲兌 陷谷 衝陽

治面腫 穴中府 間使 合谷

治風水面胕腫顏黑 穴解谿 治肩腫不得顧 穴氣舍

治水腫脹皮腫 穴三里 治腹腫 穴曲泉

治寒熱頸腫 穴陰谷 治大腹腫脹臍腹悒悒 穴大敦

治水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黃氣滿 穴陰交 石門

治身腫皮痛不可近水 穴豐隆

治身腫身重 穴關門

若身腫連息不得臥風汗身腫喘息多唾 穴天府

治水氣遍身腫 穴水溝

若是水氣惟得針此若針餘穴水盡即死

治水腫 穴胃倉 治水氣 穴缺盆

治身腫皮膚痛不可近衣淫濼寒痺不仁 穴蠡溝

治身腫 穴胃俞 治腹脹身腫 穴建里

治水腫鼓脹腸鳴如漏水聲 穴神闕

治水腫 穴中極 石門 治大腹有水 穴四滿

治腹腫脊強四肢懈惰 穴章門

治男子如蠱女子如妊娠五指端盡痛足不得踐地 穴湧泉 陰谷

治水氣 穴三里 治水分病 穴復溜

治水腫不嗜食 穴維道

治丈夫瀆洩腹脹水腫腹堅不嗜食小便不利 穴地機

治腹中寒不嗜食腸下滿水脹腹堅痛逆不得臥脇痛難俯仰 穴陰陵泉

治面目浮腫及水病善噫腸鳴腹痛 穴陷谷

治腹腫不能食及療水病腹腫繞臍痛衝胸不得息并水氣浮腫

鼓脹腸鳴如雷聲時上衝心及胃虛脹

穴 分水 [illegible]
治水病脹滿 穴 曲骨
治水腫臌脹食飲不下惡寒 穴 胃倉
治水腫人中盡滿唇反死 穴 水分
治身腫石水身腫 穴 章門 治小腹滿石水 穴 關元
治大腹石水 穴 四滿 然谷
治大氣石水 穴 氣衝 治四肢腫身重 穴 豐隆
治汗出四肢腫 穴 列缺
治四肢腫 穴 復溜

王氏云水腫惟得針水溝若針餘穴水盡即死此明堂銅人所戒也庸醫多為人針水分殺人多矣若其他穴亦有針得差者特幸焉耳不可為法也或用藥則葶藶為第一予羞見人服驗故書于此然灸水分則最為要穴也有里醫為予生治水腫以藥飲之久之不效以受其延待之勤一日忽為灸水分與氣海穴翌早觀面如削矣信乎水分之能治水腫也明堂固云若水病灸之大良蓋以此穴能分水不使妄行云爾可但不知明堂又云針之水盡即死者豈治其他病當針四分耶

治百病水腫 穴 胃俞灸百壯 胃倉灸隨年壯
治水腫脹 穴 陷谷灸隨年壯 治水腫上下 穴 陰交灸百壯
治水陰 穴 曲骨灸百壯 治風四肢腫 穴 豐隆 復溜
治大腹 穴 陰市灸隨年壯
治人中滿唇腫及水腫大水 穴 臍中 石門各灸百壯 風水 上廉各灸隨年數壯
治水腫不得臥 穴 陰陵泉灸百壯
治石水 穴 灸然谷 氣衝 四滿 章門
治水腫臌滿不能食堅硬 穴 水分灸七壯至四百止
此穴忌針針水盡即死
治水腫大臍平 穴 灸臍中腹無紋理者不治
治水腫大及水脹水氣行皮中 穴 石門
治石水痛引脇下脹頭眩痛身盡熱 穴 關元

治石水 穴 刺氣衝 治石水 穴 章門 然谷
治水病 穴 天泉 治風水膝腫 穴 巨虛 上廉
治面胕腫 穴 上星 先取譩譆 後取天牖風池
治風水面胕腫 穴 衝陽
治腹滿水腫 灸脾俞隨年壯三報
治卒腫滿身面皆洪大方
灸足內踝下白肉際三壯
治氣熱水身面腫
灸肝俞穴三壯女子禁灸
治水腫脹鼓
用大蒜切作錢片安臍心又用艾灸為末同作艾炷灸蒜上熱即易之每日頻灸其水自下忌一切毒物并鹽一年
治五水灸法
青水灸肝井 赤水灸心榮 黃水灸脾俞
白水灸肺經 黑水灸腎合

脾胃類

脾疼

治脾虛令人不樂 穴 商丘
治脾痛身重 穴 陰交
王氏云灸患脾疼服脾藥反膨脹不得已依書或方用麵裹人地蓬莪茂末水與酒醋煎服立愈已而告人人亦云高良薑末米飲調服亦作效後鄭教授傳一方云草果延胡索靈脂沒藥酒調三兩錢一似手拈却草果子五苓脂四味等分為末此亦平穩藥也有此疾者且服之或不吐不瀉心中疼甚日輕夜甚者用乾漆梅并茶煎服神效若疼者宜上脘中脘下脘脾俞三陰交等穴

胃痛

治疝癖脾中急痛循有上下搶心腹痛積聚厥氣兩乳 穴 府舍

治胃氣逆 穴魚際
治胃脹不調胃虛脹不嗜食 穴分水
治胃脘暴痛 穴脾俞 治腹胃不調腹痛 穴下脘
治胃寒脹 穴胃俞 治胃中寒 穴
治胃虛脹 穴水分
治胃中寒心腹脹滿胃氣不足惡聞食臭腸鳴腹痛食不化
穴三里
治胃熱不嗜食 穴下廉 懸鍾
治胃中弱食不下 穴心俞 治胃氣上逆唾血 穴太淵
治胃補胃 穴胃俞百壯
治胃寒不嗜食食多身瘦腸鳴腹滿胃脹胃熱 穴三里三十壯

反胃

治食飲不化入腹還出 穴先取下管 後取三里瀉之
治食飲不化入腹還出 穴章門
治脾寒食不下遍吐還出噎逆吐食不得上 穴中庭 中府
治賁脇支滿心下滿食不下嘔逆吐食還出 穴中夏
治胃氣不足反胃 穴三里 治吐食 穴胃俞
治吐食不留住 穴意舍 治吐逆食不住 穴胃倉灸百壯
治噎逆不得下食今日食明日吐 穴膈俞灸百壯
王氏云有人久患反胃予與鎮靈丹服之更令服七氣湯遂能立食若加以著艾尤為佳也有老婦人患反胃飲食至喉即吐出見其氣繞臍而轉予為點水分氣海并夾臍邊兩穴他歸只灸水分氣海即愈神效
治反胃食即吐上氣
灸兩乳下各一寸以差為驗 又臍上一寸二十壯 又內踝下三指稍斜向前穴三壯
一云一指 中脘穴在臍上四寸足三里一穴在膝下三寸各灸七壯或九壯其效尤著

食不下

治飲食不下腹中雷鳴 穴[illegible]門 治吐逆飲食不下 穴三焦俞
治食飲不下 穴胃倉 意舍 膈關

治嘔吐宿汁食不下 穴胃俞
治食不下喜飲 穴大腸俞 周榮
治脾寒食不下 穴中庭 中府
治飲食不下 穴腸無 期門 少商 勞宮
治胃弱食飲不下 穴心俞
治脾寒食飲不下腹脇滿胃弱食少嗜臥怠惰不欲動身溫不能食又
云主吐食 穴脾俞
治食不下腹中雷鳴大小便不節畜水 穴陽綱
治飲食不下 穴勞宮 中庭 膽俞
治穀不化 穴三里 大腸俞 三陰交 下脘 三焦俞 懸樞
章門
治食不化 穴天樞 志室 胃俞
治寒中食不化 穴腹哀
治水穀不消腹脹脹痛吐逆 穴三焦俞
治食不化 穴腹哀 太白 治不欲食穀入不化
治食不化不嗜食夾臍痛 穴天樞 厲兌 內庭
治食飲不化 穴章門
治寒中傷飽食飲不化 穴上脘 中脘
治胃腸滿食不下 穴中庭
治小腹積聚堅大如盤胃脹食不消 穴胃管 三焦俞
治食不下 穴志室 治食不化 穴太白 公孫
治食不下 穴中府 胃倉 承滿 魚際 周榮
治食不化 穴中脘 三陰交
治胸痛不能食 穴然谷 治不能食 穴豐隆
治飢不能食 穴中極
治嘔吐宿汁食不下不能食 穴胃俞
治三焦有水氣不能食 穴維道
治不欲食穀入不化 穴石門

治醉酒風熱後不能飲食嘔吐 穴章谷
治不能食腹中氣滿實食無味 穴少商
治不能食 穴分水　治噴滿吐食膿脹不能食 穴胃俞
治胃中寒氣不能食脹腸鳴身瘦不能食胸滿兩脇上逆氣悶熱
穴大腸俞灸二七壯小兒減之
治腹痛不能食胃氣不足反胃不能飲食腸鳴腹脹積聚及飲食不消
寒熱 穴三里
治不能食胸中滿膈上逆氣悶熱
灸心俞二七壯小兒減之

不嗜食

治不嗜食 資生經
刺然谷多見血使人立飢
治不嗜食 穴隱白 然谷 脾俞 內庭
治食不化不嗜食夾臍急 穴天樞 厲兌 內庭
治身黃有微熱不嗜食 穴中封
治食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞食臭傷飢身黃酸疼羸
瘦 穴章門
治上氣嘔吐支滿不嗜食 穴肺俞
治腹痛不嗜食 穴胃俞 脾俞
治不嗜食 穴地機 陰陵泉 水分 幽門 小腸俞
治六腑氣寒不嗜食 穴下脘
治胃熱不嗜食 穴下廉 懸鍾
治痛飢不欲食 穴陰蹺
治腹滿中焦客熱不嗜食心腹脹滿胃熱不嗜食 穴懸鍾
治不嗜食 穴陽綱 治胃虛脹不嗜食 穴分水
資生經云不嗜食有數端有三焦客熱不嗜食有胃熱不嗜食有
胃寒不嗜食有六腑氣寒不嗜食固當隨證用藥治之而針灸者亦
當知補瀉之法可也 史記陽虛侯病甚眾醫皆以為蹶太倉
公診脈以為痺根在右脇下大如覆杯令人喘逆氣不能食病得之
內即以火齊粥且飲六日氣下即令更服圓藥出入六日病已甚
則人之不能食亦有患痺而得者豈曰胃有寒熱則不可也
扁鵲治心風腹脹滿食不消化四肢羸瘦不欲食
穴灸心俞 肝俞
治不嗜食 穴曲泉
治心痛不嗜食婦人無子男子如蠱女子如妊娠五指端盡痛足不
得履此宜針灸千金云忽忽喜忘身體腰脊如解大便難小便不利
足中清至膝咽中痛不可內食瘖不能言衄不止 穴涌泉
治食多身瘦洩利體重四肢不收腹痛不嗜食 穴脾俞
治胃塞腹脹不嗜食羸瘦 穴胃俞

食氣

治食氣惡聞食臭 穴三里 治食氣 穴大杼
治嗜食無味 穴百會 少商
治身重不得食食無味心下虛滿時時欲下喜臥
穴針胃腕 太倉 一名中脘又名太倉

食多

治食飲多身瘦 穴脾俞 治食多身瘦 穴腎俞
治胃中寒脹食多身瘦 穴胃俞 腎俞
治食多身瘦 穴脾俞 大腸俞

考論官侍讀金子驊
看書訓導黃益 郭彧
對方醫士孫志善 杜宗
寫書弓昂等
刊字楊興等

普濟方卷之一百六十三畢

普濟方卷之一百六十四目錄

鍼灸門（論一道 類一類）

虛勞類
虛損　附虛　勞瘵
夢遺失精　消渴

諸氣類
欬逆上氣　少氣　欬逆
賁豚氣　膀胱氣

諸痛類
腰痛　小腹痛　臍痛
胸痛　胸脇痛　脇痛
背痛　肩背酸痛　肩痹痛
臂痛　腋痛　肘痛
髀樞痛　膝痛　腿脚痛
腨痛　腿脊痛　脊痛
骨痛　膝理痛　腸痛

目錄畢

普濟方卷之一百六十四

鍼灸門

虛勞類

虛損

治臟虛乏下元冷憊等疾（穴）灸丹田
人有常言七七之數是爲太歲壓本命六十有一是太歲壓本命人值此年多有不能必者是固然矣然傳不云吉人吉其凶者乎常觀素問以六八之數爲精髓竭之年是言其欲矣千金載素女論六十者閉精勿泄是欲當絕矣宜節不知節宜絕不能絕坐此而衰生蓋自取之豈歲之罪哉人無罪歲則雖有夢猶可逸矣所謂吉其凶者如此雖不灸丹田可也

治陽氣虛憊失精絕子　灸中極
中極一名氣原蓋氣之原也人之陽氣虛憊者可不灸此以實其氣

治胃寒心腹脹滿胃氣不足惡聞食臭腸鳴腹痛食不化秦承祖云諸疾皆治華佗云療五勞羸瘦七傷虛乏胸中瘀血乳癰明堂云人年三十以上若不灸三里令人氣上衝目千金云治陰氣不足小腹堅熱痛汗不出口苦壯熱身反折口噤腰痛不可顧胃氣不足久泄利食不化脇下注滿不能久立狂言狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽愴惡寒（穴）三里凡此等疾皆刺灸之多至五百壯少至二三百壯
資生經云小品云四肢但去風邪不宜多灸七壯至七七壯止不得過隨年數故銅人於三里穴止云灸三壯鍼五分而已明堂上經乃云曰灸七壯止百壯亦未爲多也至千金方則云多至五百壯少至二三百壯何其多耶要之日灸七壯或艾炷甚小可至二七壯數日

灸至七七壯止灸瘡既乾則又報灸之以合乎若要安丹田三里不曾乾之說可也必如千金之壯數恐非小品之所戒也予傳有脚氣疾遇春則足脛腫甚中尤甚至冬腫漸消偶見聞依素問主所說穴之所在以溫鍼微刺之翌日腫消其神効有如此者按刺且尓况於灸乎有此疾者不可不知也不止治足腫諸疾皆治之

治久冷傷憊臟腑泄利不止中風不省人事等　灸神闕

王氏云舊傳有人年老而顏如童子者蓋每歲以鼠糞灸臍中一壯故也予嘗患溏利一夕灸三七壯則次日不如厠連數夕灸則數日不如厠足見經言主泄利不止之驗也又予年踰壯覺左手足無力偶灸之此穴而愈後見同官說中風人多灸此穴或百壯或三五百壯皆愈而經不言主中風何也

治臟氣虛憊真氣不足一切氣疾久不瘥者　灸氣海

人身有四海氣海血海照海髓海是也而氣海爲第一氣海者元氣之海也人以元氣爲本元氣不傷雖疾不害一傷元氣無疾而死矣宜頻灸此穴以壯元陽若必待疾作而後灸恐失之晩矣

治男子臟氣虛憊真氣不足一切氣疾久不瘥不思飲食全無氣力
燔鍼鍼任脉氣海一穴鍼入五分可灸百壯次以毫鍼鍼足陽明經三里二穴

治虛勞咳嗽　灸脊骨從上第五椎下間神庭穴百壯

治虛勞羸瘦腎虛水臟久冷小便滑出精陰中疼五勞七傷虛憊足寒如冰身體如水　(穴)腎俞

難經疏云夾脊骨有二腎在左爲腎在右爲命門言命門者性命之根本也其穴與臍平凡灸腎俞者在平處立以杖子約量至臍又以此杖子當背脊骨上量之知是與臍平處也然後相去各寸半取其穴則是腎俞穴也更以手按其陷中而後灸之則不失穴所在矣凡灸以隨年爲壯灸固有功亦在人茲養之如何尓人當愛護丹田吾既於既効方論之詳矣而嬖妾之戕害蓋未之及也君子偕老之序曰夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也且偕老而不至偕老夫人之非多矣故詩人以是刺之意可見也至於士夫之得意者不期驕而

驕室妾數十人亦三五輩[illegible]而淫縱其欲者多矣[illegible]不之戒[illegible]賢人[illegible]言之矣[illegible]婦人也人或[illegible]其夫[illegible]以爲賢而不知[illegible]上入[illegible]古人十日一御荀子彼其不知吾[illegible]十日一御之數亦不知[illegible]所以不如則異吾故夫[illegible]之以爲夫婦之義[illegible]人也

治失精五臟[illegible]　(穴)四骨　灸五十壯

治骨[illegible]之七十壯

[illegible]

治膀胱三焦津液少大小腸寒熱或三焦寒熱

當第十八椎骨兩傍上[illegible]可也

(穴)小腸俞　灸五十壯

治三焦[illegible]胃中熱[illegible]　(穴)水道　灸隨年壯

治羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆發狂健忘等疾　(穴)膏肓俞

膏肓俞無所不療而古人不能求其穴是以晉景公有疾秦醫曰[illegible]在肓之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可爲也晉侯以爲良醫而[illegible]人乃究其[illegible]不能尋其穴而灸之也[illegible]

[illegible]

治五臟虛[illegible]　(穴)灸腎俞五十壯[illegible]上百壯[illegible]

治虛勞[illegible]中[illegible]泄精　(穴)灸列缺五十壯

(穴)又灸[illegible]五十壯　(穴)又云治五臟虛竭又灸大椎二十壯

治虛勞失精[illegible]　(穴)灸中封五十壯

治顏色[illegible]　(穴)灸肩髃百壯

治失精[illegible]

(穴)灸[illegible]隨年壯

比二穴一法經驗五五孫戶 苦救異並之

治虛勞骨蒸盜汗灸四花穴 ⊙膏肓 灸百壯

⊙又灸三十壯 ⊙足三里 灸百壯

治法背俞又云

先以蠟打線一條於患人項匝一轉向前心骨則截斷用鍼一箇穿上頭於頸上取兩端於中轉線垂向脊中正當用墨點記以線對分自兩乳折斷於中墨點兩旁是灸之七壯須以病人兩腳取齊以蠟線從腳心跟過至兩大腳指截斷以線之頭於頸上取一端垂向脊中線兩頭盡處點記以脊骨節取中行灸之於頭上取一端旋面中腰以線頭於脊骨節取中

治請背骨蒸少顏堅皷痛難以又隆縮因為戰死又陰陽病療又膚人參前之病若兩旁虛者

⊙足陰頭一百壯使痛可至五二百壯 ⊙心俞六十壯依生于如歐五

功一又胃和興兒使足陰三七壯

治脈虛參脈胸亂寒入腹久遠頭痛等 ⊙宜先顧會

王氏云年踰壯後夜觀書漸覺眼昏欲通調書以灸氣其法

灸此穴而愈有二十遂瘳手狗不已予教灸此穴即愈皆人之遺風寒灸此穴即愈又云主鼻塞不聞香臭寒有病而已故予書此

治療之關於人腦戶不宜鍼灸觀之頭會亦不宜鍼灸從此云八歲以下不宜鍼灸恐未盡也

治飲食不思心腹膨脹面色萎黃世謂之胃病者

⊙宜灸中脘

資生經云請當以中風與夜臥驚且不皆氣脫兒而所依食不思專外引為神道穴耳時死既而竟年神道是之揭後及膜其故君將疰為神道乃是不敢論一日死為之謂曰死諸君曰走至神道神道閉之曰吾使料生不使料死故也其曰料生蓋料其事而食不如前死悲也食不加前神道主而肯之此死令人飢食減少是胃氣將絕不可又灸又去且以食脈而使之氣數經化嵌入食糜是胃受穀之

不能食物不知灸中脘穿穴以壯脾胃未愈之甚也

[illegible] 為本胃者水穀之海人須養胃數為之然則當全

使胃食後胃脘

腎虛

治腎虛水腫 灸 ⊙腎俞

治腎虛消渴 ⊙中極俞 治腎虛 ⊙陽蹻

治小腸氣不足當五 ⊙[illegible]

治小腸氣痛 [illegible]

症剎痛或生所下

大甚驗

一經云治小腸氣一七壯 多天心當灸城余少命來良方脊膂

先皆已試之有一士人是小腸氣失此方又足第二指下文五

壯專效而再發恐灶數未多也予寄以從雪丹十粒與之令早飯服五粒未食心來是令灸藥君灸不得之人不知藥填病者見効之

遠且灸且藥方為當(穴)近傳一方聖散與乾蠍七枚細研

三七枚腦荀香一錢為末分二服熱酒調下和溫空心服此疾甚

小腸灸熱腫積不散久而熟痰爽此主藥雖未識用以其說有理

附于此有士人年少覓灸壹疊為無腎俞灸腎令灸而愈前

精光少腎皆知之腎人云百病皆生於心又云百病皆生於腎心

勞生百病人皆知之腎虛亦生百病人不知也蓋天一生水地二生火腎水不上昇則心火不下降茲病所由生也人不可不養心不寶

識腎乎

勞瘵

治丈夫五勞七傷六極腰痛大便難小便淋瀝頭腫不能食

⊙中髎

治五勞虛瘦七傷之 ⊙腎俞

治五勞七傷益陰補虛 治五勞七傷 ⊙胃俞

治虛熱病有盜汗乾嗽虛勞骨蒸 ⊙大椎

治全人勞瘵 ⊙肺俞

治五勞 ⊙腰戶

治勞損虛之不得睡 穴譩譆　治骨瘡身熱 穴下焦俞
治但是虛之冷極 灸曲泉
治冷病面黑肌體羸瘦四肢力弱小腹氣結聚積[illegible]脈弱[illegible]傷驚
不知人五臟氣逆上攻 穴氣海
治羸瘦虛損夢中失精遺精不療 穴膏肓俞
治虛勞羸瘦耳聾腎虛水臟久冷腰痛腹臍脹滿引小腹痛目
視䀮䀮少氣溺血水便濁出精陰痿夜夢五勞七傷虛憊腳膝拘急心忪
腰以足寒冷如冰頭重身熱振慄腰中四肢淫濼洞泄食不化身腫如
水又療身寒熱食多身羸瘦面黃黑目䀮䀮及女人積冷氣或
勞 穴腎俞
治勞疾羸瘦體熱頸項強 穴腦空
治傷飽身黃羸瘦 穴章門　治食不為肌膚 穴漏谷
治羸瘦 穴下脘 胃俞 脾俞 下廉
治日漸羸瘦 穴下脘
灸勞法 其狀手足心熱多盜汗精神困頓骨節疼寒初發咳嗽漸吐膿血

血肌瘦而黃減食少力
令身正直用草子男左女右自腳中指尖量過腳心下向上至曲
䐐大橫紋截斷卻將此草自鼻尖量從頭正中須分開頭心髮
貼肉量至脊以草盡處用墨點記別用草一條令病人自然合口
量兩吻截斷卻將此草於墨點上平摺兩頭盡處量穴灸時隨年
多灸一壯 如年三十灸三十一壯累效
羸瘦因病[illegible]後有寒熱等證[illegible]者非有瘡也
惟病後瘦甚久不復常[illegible]之形[illegible]
少者或有已疾乘之則[illegible]須[illegible]之於中而[illegible]也於仲景論
無精充且云八味腎氣是六經而五臟[illegible]是味[illegible]所當服
六[illegible]日精[illegible]令人氣少無力漸漸[illegible]身[illegible]
或[illegible]或[illegible]而腎俞等穴乃所當灸也
治腹中氣脹引脊痛食多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季肋
穴脾俞 大腸俞
治五臟六腑心腹滿腰背痛飲食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣

穴三焦俞 灸隨年
治勞瘵
緊束一束六神背脊之時解去上體衣服於腰上兩傍微陷處謂
之腰眼直身平立用筆點定然後上床合面而臥每灼小艾炷七壯
更或灸出蟲泄下即安此法書曰膏肓俞穴各灸九壯乃依前
蟲醉日冬穴灸多多為妙後百日忌煎煿生熟物毒食物或常
避風寒遠喜怒安靜[illegible]一月尤覺未痊於初穴上再灸
治傳尸伏連殗殜骨蒸羸瘦痃癖思氣惡寒或如瘧狀
宜灸大椎上一穴又灸大椎兩傍近下少許對[illegible]各相去一
寸五分二穴又灸兩肋下二穴名章門又灸當心脊骨上兩穴
各相去一寸二穴以上日別灸皆取正午時灸各七壯止兩百壯
治骨蒸痃癖
灸漸至五百壯病除
治骨蒸法
灸兩肩井二穴若人面熱帶赤色者灸之取穴之法以手三
指按肩骨[illegible]向頸[illegible]上[illegible]之中指下陷是也上廉二穴在膝下
寸足一[illegible]三里下三寸是下廉二穴在上廉下三寸是當[illegible]骨上
立以指按[illegible]墨點記[illegible]即是穴以上[illegible]灸之如前法
治骨蒸[illegible]
令患者於板上平身正立以杖柱板向上[illegible]點記[illegible]
量脊中點之又令患人合口引以物橫[illegible]兩吻[illegible]中[illegible]之以[illegible]點
灸又兩乳[illegible]大肋間二穴總六穴灸之並如前法
凡量皆取病者男左女右無名指中節[illegible]之為寸又法取男左女右
手中指以物從指本量至指尖將此度於腳趺上[illegible]
腰面上量一度是穴
治傳尸殗殜喜魘夢
穴肩井二穴灸七壯是乃止[illegible]二穴灸一壯大[illegible]
穴灸二壯
以上六穴[illegible]多[illegible]二穴灸一壯大[illegible]
令[illegible]骨[illegible]病者[illegible]亦謂[illegible]亦稱[illegible]
是[illegible]以[illegible]為[illegible]少多[illegible]此病

凡取四花穴以稻稈心量口縫如何闊斷其長多少以如此長裁紙四
方當中剪小孔別用長稻稈踏腳下前取腳大指為止後取腳曲䐐橫紋
之中為止斷了却環在結喉下垂向背後看稈止處即以前小孔紙當
中安分為四花蓋灸紙四角也又一法先橫量口吻取長短以
所量草就背上三椎骨下直量至草盡處兩頭用筆點了再量中指長短
為準却將量中指草橫直量兩頭用筆圈四角其圈者是穴[illegible]可
灸七壯止王氏云二穴日灸治十二人病後又灸各數餘二百壯止四花
[illegible]背蒸又司瘵疾風或嗽或[illegible]上病狀既虛久灸治者不可具
錄灸後宜服滋補地黃丸良

[illegible]曹鑑方云[illegible]行氣[illegible]使人見其[illegible]鄉子年十三至十六歲當三月
間病發熱肌肉消瘦四肢困倦吐血咳逆汗大便溏多腸鳴可治紀食
舌不知味[illegible]入語[illegible]特去[illegible]其氣餘[illegible]子[illegible]之說其脉浮數除
之其乃正[illegible]主取知浮脉歌云脉中指[illegible]中[illegible]得其精量[illegible]
先灸中脘穴乃胃之紀也引清氣上行[illegible]理之灸[illegible]乃生[illegible]
元氣附[illegible]長養肌肉之元三里乃胃之合穴亦[illegible]

使下於[illegible]以其寒之劑[illegible]以其[illegible]其中氣之食使[illegible]
內[illegible]因其胃氣[illegible]以[illegible]語節[illegible]食[illegible]
氣[illegible]遂二年肥[illegible]常[illegible]者[illegible]病名[illegible]之
劑君用[illegible]寒之藥[illegible]以發[illegible]人[illegible]之[illegible]
折之[illegible]經[illegible]大位之主其瀉以[illegible]法肘[illegible]
食[illegible]以[illegible]以瀉之瀉[illegible]補[illegible]不可右以[illegible]其上
使脾[illegible]俞[illegible]火[illegible]形不足者[illegible]之以氣精不足者補之以
味[illegible]者益之損者益之[illegible]補可人[illegible]人參[illegible]之屬是也況
[illegible]云人參能補氣[illegible]形[illegible]之病食[illegible]之類何不
可之有或者[illegible]曰[illegible]之學有自來矣
[illegible]五勞七傷及山嵐[illegible]氣[illegible]煩[illegible]心痛[illegible]飲食不生肌肉
[illegible]頭項[illegible]面色[illegible]積[illegible]精[illegible]
穴
胃俞二穴各灸七壯上或至一百壯[illegible]　又腎俞二穴
灸七壯[illegible]日灸七壯至百壯[illegible]　又章門二穴可灸七壯

四花[illegible]至七七壯[illegible]　又天樞二穴灸五壯漸加日灸如前
法
凡[illegible]二穴令[illegible]人坐曲背伸兩臂著膝令直手大指與膝[illegible]
以物[illegible]令臂[illegible]動從胛骨上角[illegible]摸之[illegible]胛骨下頭其間當有四肋三
間灸中間依胛骨之裏去胛骨[illegible]容側指許[illegible]之[illegible]
間灸[illegible]之自覺[illegible]引胸肩中[illegible]兩胛[illegible]灸[illegible]五百壯多至千壯
[illegible]下如水若無停痰宿水[illegible]有所下也[illegible]法[illegible]不治者[illegible]即令側臥
挽臂令前取穴或正坐伸臂令人挽之使兩胛骨相遠不爾胛骨覆
穴即難取也其穴在五顀相望灸之又脾俞二穴在第十一顀下兩傍
各一寸五分日灸七壯病深者至百壯復又[illegible]室穴在第五顀下兩
傍各三寸[illegible]中正坐取之先七壯至七七壯[illegible]法以二七名[illegible]
四穴皆不[illegible]得灸[illegible]數[illegible]灸之[illegible]脊[illegible]骨[illegible]章門[illegible]
太衝是也若[illegible]依次第灸之各[illegible]百壯[illegible]凡量穴法不拘肥瘦長
短取病人男左女右手中指[illegible]兩[illegible]為一寸是為同身寸也凡灸皆
取正午時[illegible]日[illegible]灸即傷人[illegible]令人血[illegible]若日[illegible]食[illegible]

即[illegible]氣[illegible]治本病[illegible]即不在此例

夢遺失精

治虛勞尿精[illegible]　灸第七椎兩傍各三十壯
右虛勞白濁泄精　⑦脾俞　[illegible]俞　[illegible]俞　[illegible]各百壯
治夢遺失精小便[illegible]　⑦腎俞灸百壯
治夢泄精及治失精陰縮　⑦中封灸五十壯
治男子夢與人交泄精　⑦三陰交灸五十壯
治陰痛溺血精出　⑦列缺灸五十壯
治失精五臟虛竭　⑦曲骨端灸五十壯
治失精陰縮莖痛　⑦大赫灸三十壯
治失精膝脛痛冷　⑦曲泉灸百壯
治腰脊冷疼溺濁　⑦脾募灸百壯
治[illegible]尿精　[illegible]大椎骨[illegible]中[illegible]繩量大椎至[illegible]
[illegible]折中取四間穴

治精不足 (穴)太衝 (穴)中封 地機

治失精及小便不利 (穴)中極 大赫 陰谷 承扶 至陰

治失精小便淋瀝 (穴)志室

治精溢剝痿不能久立 一灸三一報 (穴)然谷

治溺難白濁寒冷痛小腹腫 (穴)行間

治溺血便清出精 (穴)腎俞 治夢失精 (穴)膏肓俞

治失精 (穴)至陰 曲泉 中極 治不睡失精 (穴)志室

治虛勞尿精泄精 一法灸尿 陰陵 陰陵泉隨年壯 或十椎十九椎當 三十壯

治失精及尿臟腰痛食少脉以下清 (穴)京門 灸五十壯 又十四椎百壯

治失精 (穴)中極

治失精泄精 灸三陰交二七壯 夢斷神良

資生經云五臟論曰心有二孔藏精十二合則人之壹一溺其因於心手心動則精溺從之故凡此患當養其心使不動可也其次則灸或起必須要御之至游者士一二末然命起只為覺近是也服藥灸斯為下焉然精俞然不為也

消渴

治燥中渴 (穴)商丘 治消渴身熱面目黃 (穴)意舍

治消渴飲 (穴)然谷 治飲渴 (穴)隱白

治善渴食不下 (穴)勞宮 治腹熱渴 (穴)曲池

治噎乾善渴 (穴)太衝 行間

治腎虛消渴汗不出腰脊不得俯仰腹脹脇痛 (穴)中膂俞 意舍

治小便黃舌乾消渴 (穴)兌端 治舌緩煩滿消渴 (穴)然谷

治消渴飲水無度 (穴)水溝 治消渴 (穴)陽綱

治消渴嗜飲 (穴)承漿 意舍 關衝 然谷

治消渴飲痛黃身體疲痛 (穴)隱白

治消渴咽喉乾

灸胃脘下輸三穴各百壯 穴在背第八椎下橫三寸間寸灸之

又灸胸堂五十壯 足大指五十壯

治消渴口乾一寸忍者 灸小腸俞百壯

治消渴咽之 灸手厥陰隨年壯

治消渴口乾煩悶 灸足厥陰百壯 又灸陽池五十壯

治消渴小便數 灸兩手小指頭及兩足小指頭并灸項頸佳 又灸當脊梁中央解間兩與腰髮上兩邊各二處 又灸背上脾俞下四寸當俠脊梁灸之兩處隨年壯 又灸腎俞二處 又灸腰目在腎俞下三寸亦挾脊骨兩傍各一寸半左右一指按取 又灸關元一處 又兩傍各二寸二處 陰市二處在膝上當伏兔上行三寸臨膝取之 或三二列灸相去一寸五日 曲泉 陰谷 陰陵泉 足復溜此諸穴斷小便最佳不損陽氣 亦云止遺溺也 太谿 中封 然谷 大白 大都 趺陽 行間 大敦 隱白 湧泉 凡此諸穴各一百壯 腹背兩腳凡四十七處其腎俞 腰目 關元 水道 此可灸三十壯五日一報之各得一百五十壯佳 涌泉一處可灸十壯 大敦 衝陽此處可灸三壯 餘者各七壯 皆五日一報 滿三度止 若諸陰而不愈宜灸諸陽在腳表并灸肺俞募按流注孔穴 如灸陰家法

治男子婦人血結胸面赤大燥口乾消渴胸中疼痛不可忍者 灸期門 陰結之期門一穴 鍼任脈關元一穴 若妊娠不得刺關元穴 若刺之胎死不出子母俱亡如須慎之

王氏云凡消渴經百日以上不得灸刺 灸刺則於瘡上漏膿不歇遂致癰疽羸瘦而死 亦忌有所誤傷 但作鍼許大瘡 所飲之水皆於瘡中變成膿水而出 若水出不上者 少死 慎之慎之 初得患者可如方灸刺之

諸氣類

欬逆上氣

治欬逆上氣喘息喉鳴 灸 資生經 (穴)天容

治肺寒熱呼吸不得臥欬逆上氣嘔沫喘氣相追逐（穴）魄戶
治欬逆上氣喘暴不能言（穴）天突 華蓋
治欬逆上氣喘不得息（穴）俞府 神藏
治欬逆上氣喘掌中熱（穴）經渠
治欬逆上氣咽中鳴喘及咽喉痛喘息（穴）扶突
治欬喘又主卒欬逆上氣（穴）尺澤 出血立已
治欬上氣逆心煩（穴）紫宮 玉堂 太谿
治欬逆上氣涎出多唾（穴）彧中 石關
治欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席（穴）彧中 雲門
治欬逆上氣唾沫膿血（穴）庫房 中府 周榮 尺澤
治欬逆上氣咽喉鳴喝喘[illegible]頸項強（穴）氣舍
治欬逆上氣喉咽痺[illegible]喘息不得（穴）水突
治逆氣嘔吐上痛留結胸中煩滿（穴）[illegible]俞
治瘈多唾上氣咽引喘息喉鳴如水雞聲（穴）扶突
治背脾痛欬逆上氣嘔吐煩滿（穴）魄戶

天 十一卷 [illegible] 天

治上氣欬逆（穴）庫房 屋翳 膏肓俞
治欬逆上氣胸中氣滿喉中如水雞聲胸中氣鯁鯁（穴）天突
治吐逆上氣（穴）天谿 中府
治一切氣及痰五噎氣逆上攻（穴）氣海
治欬嗽上氣數欠（穴）經渠
治短氣心痺悲怒逆氣狂陽胃氣逆（穴）魚際 治逆氣數欬（穴）[illegible]門
治嘔吐上氣心痛身腫（穴）建里
治逆氣嘔逆牙痛留結胸滿（穴）厥陰俞
治身寒熱欬逆上氣嘔吐血（穴）石門
治氣腸滿欬逆上氣呼吸不得息（穴）庫房
治嘔逆上氣（穴）建里
治喘逆上氣（穴）氣戶 [illegible]
治上氣逆嗽短氣氣滿食不下（穴）[illegible] 灸五十壯
治上氣支氣氣滿百病（穴）肩井 灸一百壯
治上氣欬逆短氣胸痛（穴）風門 灸百壯

治上氣欬逆短氣[illegible]多唾[illegible]（穴）肺俞 灸五十壯
治上氣[illegible]（穴）天突 灸三十二
治上氣[illegible]欬逆（穴）雲門 灸五十壯
治上氣[illegible]胸痛（穴）膻中 灸百壯不止
治上氣[illegible]（穴）膻中 灸五十壯
治上氣[illegible]（穴）[illegible] 期門 灸五十壯
治逆氣[illegible]
治逆[illegible]
[illegible] 灸五十壯
治上氣[illegible]轉[illegible]
（穴）[illegible] 灸[illegible]不痛[illegible]不痛[illegible]上
治上氣[illegible] 灸百壯
治[illegible]（穴）尺澤 灸不三[illegible]七壯 治上氣[illegible]不得息（穴）天府
治上氣喉鳴[illegible]大逆上氣胸中[illegible]（穴）天池 天容

天 十一卷 [illegible] 天 [illegible]

治伏氣逆上喘渴坐臥不得息（穴）天容
治上氣咽痛（穴）廉泉 治欬嗽上氣（穴）天井
治欬嗽上氣喘息咽束（穴）廉泉 治短氣逆上氣（穴）雲門
治上氣嘔吐支滿脊強寒熱不嗜食汗不出（穴）肺俞
治上氣（穴）玉堂 治氣上衝心（穴）石門
治腸中大熱不得安臥腹有逆氣上攻心腹脹滿（穴）氣衝
治嘔逆氣上胸脅痛（穴）雲門
治飲咳上氣（穴）天突 膻中 天池 [illegible]中俞
治不能食胸中[illegible]腸上逆氣煩熱（穴）心俞 灸之壯[illegible]
治欬逆上氣[illegible]未齒[illegible]
治欬逆上氣[illegible]不安[illegible]不精[illegible]（穴）期門
（穴）天容 [illegible] [illegible] [illegible]
治上氣（穴）[illegible] 灸三壯
治逆氣[illegible] 灸[illegible]
[illegible]上[illegible]眼昏暗

二里次以下氣也
治欬逆上氣喘滿嗌乾胸背痛 (穴)列缺 肺俞二穴 針入三分留七呼灸百壯 次尺澤二穴
治欬逆上氣 暑生痰 (穴)魄戶 氣舍 譩譆 期門

○少氣

治喘呼少氣 虛勞損 (穴)氣舍 治振寒不足 (穴)上廉
治胃氣不足 (穴)三里
治臟氣虛憊真氣不足一切氣疾久不差者皆灸之 (穴)氣海
治勞欬喘 (穴)少府
治少氣 (穴)少衝 步郎 間使 腎俞 大鍾
治少氣難言 (穴)至陰 治少氣不足 (穴)神門
治短氣 (穴)大腸俞 魚際 大陵 ?俞
治胸滿短氣 (穴)膺窗 治痛而短氣 (穴)于問
治胸滿短氣不得汗 (穴)手太陰皆灸 補之出汗
治短氣 (穴)湧泉
治短氣不得息不能言 (穴)膻中 華蓋
治胸上不通呼吸少氣喘息 (穴)步郎 安都
治大氣不得息 (穴)大包
治欬嗽少氣喘息嘔沫噤齘 (穴)廉泉
治氣短不安 (穴)風門 治短氣不食 (穴)肝俞
治腹脹少氣 (穴)伏兔 治氣短 (穴)肝俞
治短氣 (穴)肩井各二百壯
治短氣不得語 (穴)天井各百壯 大椎或灸隨年壯
肺俞 肝俞 尺澤或灸各百壯 小指第四指間交脈上或灸
七壯或手大指頭各十壯
治少年房室多短氣 (穴)鳩尾頭灸五十壯 又鹽灸臍孔中二七壯
治乏氣 (穴)第五椎下灸隨年壯 治短氣 (穴)灸巨闕
治短氣 (穴)雲門 風門 魂府 脇募 巨闕 期門
治少氣 (穴)巨闕 解谿 然谷 尺澤

治少氣 (穴)巨闕
治心腹痛吐逆短氣病食難下不消 (穴)膈俞
治心痛如錐刀刺氣結 (穴)膈俞灸七壯
治氣結 (穴)大倉灸百壯 治結積留飲 (穴)通谷
治心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴
泄利 (穴)太倉灸百壯
治結氣囊裏針藥所不及 (穴)肓募灸隨年壯
治虛病結氣壅塞 (穴)中脘
治結氣又胸中膈氣 (穴)心俞灸隨年壯
治五臟六腑心腹滿腰背痛飲食不消吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣
(穴)三焦俞灸隨年壯
治卒走氣衰不復報痛息 (穴)右足手拇指所度心下灸三壯瘥
治寒中少氣 (穴)間使

○氣逆

治欬逆喘息 (穴)然谷 天泉 陷谷 胸堂 章門 四泉 天突
雲門 肺俞 臑會 肩井 風門 行間
治欬逆不止 (穴)清逆 治欬逆寒熱 (穴)太淵
治欬逆喘 (穴)大陵 太衝 治欬逆胸滿喘不得息 (穴)大淵
治欬逆多唾 (穴)三里 治脅氣急欬引脇痛 (穴)中府
治欬而胸滿 (穴)前谷 治喜欬 (穴)經渠 行間
治欬乾嘔煩滿 (穴)俠白 治欬而胸熱 (穴)天髎
治欬喘息善欬氣無所出 (穴)三里 太白 章門 孔最 天泉
太淵 行間 俞府 神封 膻中 ?
治欬逆 (穴)手白
治欬引兩脇急痛不得息轉側難脇下與脊相引而反折目上視目
瘕積胃腹痛驚狂癲疾起則目䀮䀮自生白翳欬引胸中痛寒疝小腹
痛嘔血短氣又治欬逆煩悶不得臥 (穴)肝俞
治欬引尻痛 (穴)中膂 治痛嘔欬俞不得息 (穴)築陰
治欬逆上氣積嗽喘不得臥息 (穴)手白

治欬逆煩心不得卧 穴 太谿

治咳逆

乳下一指許正與乳相直骨間陷中婦人即屈乳頭度之乳頭所值是穴灸

如小豆許灸三壯男左女右只一處火到肌即瘥良方云欬中有

霍亂吐利垂困忽發欬逆遂至危殆與鄭廷陳中脊病傷寒

甚氣已不屬一灸而愈云凡傷寒及久病得咳逆皆為惡候投

藥不效者灸之必瘥若不瘥則多不救

王氏云欬病有十四風欬寒欬支欬肝欬心欬脾欬肺欬腎欬五藏欬千金書其

療法詳矣而傷寒欬為惡證施私監專人患傷寒欬[illegible]

檢灸經欲結喉下灸三壯即瘥蓋天突穴也神哉神哉

治一切欬逆不止 [illegible]

男左女右乳下黑盡一非少許灸三壯甚者二七壯

治欬而嘔噯常及卒欬逆逆氣 穴 [illegible]

賁豚氣

治賁豚腹腫 [illegible]

穴 章門灸百壯

治賁豚 [illegible] 穴 氣海 期門 關元各灸百壯

治賁豚搶心不得息 穴 中極灸五十壯

治賁豚上下腹中與腰相引痛 穴 中府灸百壯

治賁豚腹腫 穴 章門

治賁豚 穴 期門 陰交 石門

治賁豚氣上腹䐜痛莖腫先引腰後引小腹腰髖少腹堅痛下引陰中 治賁豚上下 穴 四滿灸三七壯

治賁豚氣上腹䐜堅痛引陰中不得小便兩丸騫 穴 陰交

不得小便兩丸騫 穴 石門

治賁豚上氣 穴 章門 石門 陰交

治賁豚上下 穴 期門

治賁豚 [illegible] 穴 天樞

治心中煩賁豚氣脹滿不能食 穴 上脘

治賁豚氣脹不能食 穴 巨闕

治賁豚伏梁氣上攻狀如覆杯寒疝結氣 穴 中脘

治小腹賁豚 穴 歸來

治賁豚搶心不得息 [illegible] 穴 中極

治賁豚寒氣入小腹時欲嘔 [illegible] 小便赤小腹滿不止 穴 關元

治賁豚腹堅 穴 氣海 治賁豚 穴 期門

治賁豚氣上下引莖痛 穴 氣穴 治伏梁氣狀如覆杯 穴 上脘

治伏梁氣 穴 中脘

治息賁 [illegible] 穴 期門 巨闕 鳩尾

膀胱氣

治膀胱氣 [illegible] 積聚 [illegible] 穴 章門

岐伯治膀胱氣攻衝兩脇臍下鳴陰卵入腹

灸臍下六寸兩旁各寸六分三七壯

治膀胱氣攻兩脇及膀胱灸之加臂蓋法 穴 五樞

治膀胱三焦津液少大小腸寒熱 [illegible] 穴 三焦俞 [illegible]

治膀胱三焦津液少大小腸寒熱 [illegible] 穴 小腸俞五十壯

治三焦膀胱腎中熱氣 灸水道各百壯

千金云 [illegible] 云治水

癩偏大上下不定夜不可思恆呼為膀胱氣是膀胱氣即顙[illegible]

熱太倉公診命婦云病氣客膀胱難於前後溲而溺赤[illegible]

便謂膀胱氣為病云

諸痛類

腹痛

治腹脹胃脘暴痛及腹積聚肌肉痛 [illegible] 穴 脾俞 陰谷

治腹中積聚時切痛 穴 商曲

治寒氣小腹 [illegible]

治腹臍切痛 (穴)四滿 治腹中盡痛 (穴)天樞 外陵
治腹痛喘暴滿 (穴)崑崙 治腹脹痛 (穴)復溜
治腹中滿暴痛汗出 (穴)巨闕 上脘 石門 陰交
治腹中相引痛 (穴)太谿
治胃痛如刺腹若刀切痛 (穴)豐隆
治腹皮痛搔痒 (穴)鳩尾 治腹切痛 (穴)胃俞
治身熱腹痛 (穴)氣衝 治腹中熱痛 (穴)中極
治腹痛而熱上搶心下滿 (穴)三間
治腹脹不能食腸鳴腹滿胃脹不調堅硬 (穴)廿太
治腹痛 (穴)大杼
治寒熱腹痛雷鳴奔上心痛 (穴)腎俞
治腹熱急不得食腹痛如刀刺不可轉氣欲死 (穴)不容
治腹疼刺痛 (穴)二脘
治腹痛 (穴)太白 溫溜 三里 陷谷
治大便膿血寒中食不化腹中痛 (穴)腹哀
治腹痛不下食 (穴)魚際
治大腹寒疝大便難腹切痛 (穴)肓俞
治腹鳴氣脹 (穴)地機
治腹痛心如懸下引臍腹痛 (穴)外陵
治腹痛六腑之氣寒熱不時不嗜食小便赤腹堅硬痛喘逆上氣衝
動而滿更 (穴)下脘
治腹痛不嗜食 (穴)脾俞 治腹一痛泄瀉 (穴)三焦俞
治腹痛不嗜食 (穴)膀胱俞 治腹痛 (穴)胃俞
治腹中甚痛作膿 (穴)中脘
治腹有逆氣上攻心腹脹滿上搶心痛不得息氣衝腸一所不得俛仰
(穴)氣衝 灸七壯 炷如大麥 禁針 次針三里二穴而愈
治小腹疝氣遊行五臟腹中切痛 (穴)築賓

○小腹痛

治小腹偏痛嘔逆 灸十壯 (穴)陰蹻
治小腹痛積聚堅如石小便不利灸絕子百壯 (穴)中極
治小腹痛 (穴)腎俞 復溜 中封 承筋 承山 大敦 陰包
治小腹堅痛下引陰中 (穴)石門 商丘
治小腹拘急痛 (穴)石門 水分 治寒入腹中小腹痛 (穴)涌泉
治小腹熱而寒痛 (穴)太谿
治小腹痛 (穴)肝俞 小腸俞 委陽 照海 下廉 丘墟 中都
治腰引小腹痛 (穴)大巨 治小腹痛 (穴)五樞
治小腹痛 (穴)復溜 中封 腎俞 承筋 大敦
治小腹疝氣小痛 (穴)臍中
治小腹熱而偏痛 (穴)關元 委中 照海 太谿
治小腹疼痛不可忍者 (穴)灸注臍間三穴 次鍼足陽明經三里二穴

○臍痛

治臍下塊如覆杯 灸五十壯 (穴)中極
治臍下疞痛小便赤澀不覺遺溺小便處痛狀如散火溺血暴疝痛
下結血狀如覆杯轉胞不得溺 (穴)關元
治臍下疞痛 (穴)陰交 治繞臍痛 (穴)中封 水分 神闕
治痛引臍中 (穴)湧泉
王氏云臍腹疼痛中風則欲溺偏高者以手中指按之少上是正或下亦
按之則不痛宜只灸臍中後不痛更發又常痛利不已灸之則止
治凡臍痛者 灸神闕 治寒疝走臍急心 (穴)關門
治臍下冷氣上衝心血結成塊狀如覆杯小便赤澀 (穴)氣海
治臍下厥痛氣動 (穴)下脘
治繞臍腹痛上搶心腹寒泄利欬逆 (穴)腹結
治臍切痛時上衝心煩滿嘔吐霍亂冬月感寒臍痛
(穴)天樞 治心如懸下引臍腹痛 (穴)外陵
治冷臍腹痛 (穴)上廉 治臍下切痛 (穴)四滿
寒疝繞臍痛者 (穴)公孫 治繞臍攪痛 (穴)天樞灸百壯
治臍下絞痛 (穴)關元灸百壯 治二十年絞痛 (穴)臍中 石門
治臍疝走痛 (穴)臍中 石門 天樞

治脾中積氣 穴 蠡溝

治男子元臟發動臍下痛不可忍

穴 刺任脈承漿一穴 次鍼足太陰經三陰交一穴立愈

○膺痛

治胸膺骨疼 穴 玉堂 紫宮

治膺前痛 穴 玉堂

治乳腫痛 穴 太谿

○胃腸痛

治胃腸相引不得伸則肩背生 穴 太冲 築息

治胃腸脹切痛 穴 太白 治胃腸痛 穴 [illegible]

治胸腸痛無常處 胸腸相引多痛 穴 環跳 至陰

治胸腸中痛 穴 大包 治胸痛如刺 穴 至陰 丘墟

治胸腸痛心痛 穴 期門灸隨年壯

治胸下痛者 穴 乳根 亶中灸百壯

十一

治胸痺心痛 穴 天井 治胸肩痛 穴 太淵

治胸中痛 穴 肺俞 雲門 中府 隱白 期門 魂門 大陵

治胸痛口噤胸中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤

穴 上門灸隨年壯 少衝

治胸背急胸中彭彭 穴 經渠 丘墟

治胸滿噎乳腫賁痛欬逆上氣喉中作聲 穴 太谿

治欬引胸痛 穴 肝俞 治胸痛 穴 少衝 中府

治胸脇支滿痛引胸中欬逆上氣喉中作聲喘不能言 穴 章門

治胸脇支滿膈痛骨疼飲食不下嘔逆上氣噫心 穴 紫宮

治胸滿不得喘息胸背疼嘔吐寒熱上氣煩心 穴 玉堂

治胸中引痛及心下煩悶逆氣喜悲又夫滿不嗜食寒熱欬逆急

穴 幽門

治嚴逆胸痛如刺復切氣刺不可忍 穴 膻中

治胸痺逆氣寒厥急煩心飲水欲嘔噫不得臥 穴 太淵

治胸痺引背時寒 穴 間使 治胃痛胸支滿不得息 穴 [illegible]

治痺支滿不得息 穴 魚際 治胸滿支滿痛 穴 浮白

治胸中痛 穴 俞府

治胸痺心痛不得息痛無常處 穴 臨泣

治胸痛 穴 廉泉 中府

治胸脇下能轉側支滿痛 穴 膈俞 治臍腹小腹痛 穴 下廉

治胸脇滿痛不得息 穴 丘墟

治胸脇痛 穴 大包

治兩脇急痛 穴 肝俞 脾俞 志室 治脇下堅痛 穴 中脘 水泉

治脇緩急痛 穴 支溝

治脇痛不得息 穴 [illegible]

治脇痛不得臥 [illegible] 穴 [illegible] 章門

治脇痛欬逆 穴 竅陰 [illegible] 穴 章門 少澤

治脇下脹 穴 陽陵

治脇下痛脹 穴 丘墟

治脇痛 穴 膈俞 中膂俞 竅陰 陽谷 [illegible]

十一

治兩脇急痛 穴 肝俞 治脇下痛不得息 穴 腕骨

治脇滿引小腹痛 穴 胃俞

治飧泄腹脇痛滿狂走使臍腹痛食不化喘息不能行 穴 上廉

治腹脇痛連脊手足厥冷 穴 太谿

寒熱脇微骨痛 穴 雲門 治脇肋痛 穴 三里

治胸脇痛 穴 華蓋 治胸中滿痛 穴 東骨灸隨年壯

治脇卒痛如打 出射後方

穴 以繩橫度兩乳中間屈繩從乳橫度以趁痛脇下灸繩下屈

度五十壯便愈

治兩脇痛 穴 胃俞 治胸痺 灸鳩尾

治脇下痛痛腫 穴 乳根

治胸脇痛不可忍

穴 刺期門 次鍼章門 [illegible] 行間 丘墟 涌泉

○腸痛

療噎痰氣（穴）承滿 孔最 療胸脇支滿咳嗽氣短喘鳴（穴）膻中
療噎病（穴）膈俞 療嘔噦氣上（穴）商陽
療胸滿膈噎（穴）膈關
療胸中脹氣痛嘔吐（穴）厥陰俞 灸隨年壯
治胸中不利（穴）[illegible] 巨闕
治腸中雷鳴食不下胸背有水聲（穴）食竇
治胸脇中氣（穴）[illegible] 大迎 主熱病 治情胃虛衰（穴）天池
治胸氣嘔吐逆（穴）膻中 治情胃虛衰（穴）率谷
治氣噎（穴）天突 療氣噎（穴）天府 陽谿
療噎（穴）膏肓 日[illegible]（穴）中庭
治良噎不下喘息欬（穴）大陵
治胃中氣噎（穴）期門 天突
治胸中如塞又積氣成噎（穴）膻中
療膈氣不下食噎病（穴）乳根
療大痰背寒嘔悶胸中氣噎（穴）譩譆
療暴噎（穴）神堂 中府 治膈中不利（穴）巨闕

治五噎
黃帝問岐伯曰：凡人患噎疾，百味皆難不能食者，其何也而至哉？
岐伯答曰：夫人噎病有五般：一曰氣噎，二曰憂噎，三曰食噎，四曰勞噎，五曰思噎。此皆由陰陽不和，三焦膈絕，津液不行，故令氣膈不調，成噎疾。
治氣噎 灸膻中　治憂噎 灸心俞
治食噎 灸乳根　治勞噎 灸肺俞
治思噎 灸天府
治五噎：胸膈痞悶，多嗔嘔吐不止。
刺任脈天突一穴，在結喉下一寸宛宛中，陰維任脈之會。鍼入五分，留三呼，得氣即寫。次鍼足少陰經通關二穴，在中脘穴兩傍開各寸之間，去各五分。用長鍼鍼入八分，左捻鍼能進飲食，右捻鍼能和脾胃。許氏云：此一穴一鍼四效。下鍼後，良久先脾磨食，覺鍼動為一效，次鍼破病根，腹中作聲為二效，次覺流入膀胱為三效，然後覺氣流行入腰後腎堂間為四效矣。

治五膈：氣喘息不止。
刺任脈中脘一穴，一名太倉，胃之募也。在上脘下一寸，岐骨下當中是也。手太陽、足陽明所生，任脈之會。上紀者，中脘也。用長鍼鍼入八分，先鍼足兩陰絡穴，三門一之。凡此刺後，即諸俞穴氣血入內，息大七八口，下入丹田，閉氣刺之。
治結氣胸中隔氣
肩髃、日月、第四椎下兩傍各一寸半，名厥陰俞，灸隨年壯。

背痛

治胸背急，胸中悒悒（穴）[illegible] 五處
治肩痛引頸 [illegible] 引頸（穴）附分
治背惡寒，脊強難俛仰（穴）膈關 秩邊 京骨
治脊強背尻骨重（穴）崑崙
治背痛惡寒，脊強俛仰難，食飲不下，嘔噦多涎，嚥胸噎悶[illegible]
治肩背痛，惡風寒，食不下，嘔吐，又脇腹脹滿（穴）意舍
治背膂痛，胸中痛，五臟背不得屈伸而痛（穴）[illegible]
治背脊中痛（穴）魄戶　治背脊強急（穴）神堂
治胸背急（穴）氣戶　治氣注背膂胸急（穴）大椎
治腰背拘急（穴）承筋　治胸背相引痛（穴）不容
治胸拘急腸鳴（穴）經渠　治肩走胸背痛（穴）魚際
治背髀悶滿，時悶急痛，背冷不歡，引頸項強上喘（穴）魄戶
治背中氣上下行，腰痛，腹鳴（穴）胃俞
治背痛俛仰不得（穴）志室　治背痛（穴）巨闕 灸　胸堂 灸
治背傴如龜，背生背柱，客熱相著，脊骨逐於龜所致
（穴）肺俞 心俞 膈俞 各灸二壯
治蟲痛惡寒，背悶氣，痛後脹熱，咳又胸中痛引腰背（穴）譩譆
治胸腸背寒痛（穴）天髎
治胸腸痛背痛（穴）雲門
王氏云：人二八年後，亦乃穴腑所致，支鑿之與上古刺法者，多有此患。

肩背酸痛

□之□□□□之□□□□者亦無之者之穴 亦是也 惟膏肓爲要穴
賢人膏肓之側去脊骨四寸半 是更欲求按之則疼甚謹以
小兒足三壯即不足之□復道 上穴 則灸肩疼處之方 知
千金方之阿是穴須詳云 □□□□□□□□□□□
治肩背急痛手不上頭
灸肩外頭近後以手按之 疼處 七壯更愈 此是□家病宜檢
風府中

治肩背不舉 □□□ 穴 □□ 療肩背重痛不可俛仰 穴 曲垣
治肩背是引缺盆痛 穴 □□ 治肩背肩背痛 穴 □□
治肩背痛 穴 中府 治肩背手心 穴 □□
治肩高胸腹痛 □□□ 肩背急 穴 □□
治肩背急腰脊強不得俛仰 穴 □□
治肩背頸項痛 穴 □泉

治肩背痛 穴 天髎 缺盆 神道 大杼 天突 水道 巨骨
治肩背寒痓肩胛內廉痛 穴 膈俞 譩譆 京門 尺澤
治肩背痛欲折 穴 天柱 療肩疼 穴 肝俞
治肩痛肩痺氣注肩胛拘急疼悶 穴 曲垣
治肩痺熱痛而寒至肘 又療肩痛并寒熱引項強 穴 肩井
治肩項不得顧肩胛痛兩手不得向頭或因撲傷 穴 肩外俞
治肩痛不能舉 穴 雲門 秉風 治肩中熱痛 穴 肩貞
治肩胛痛 穴 天宗 治肩痛引項不得顧 穴 天窗
療臂胛小指痛 穴 前谷 療肩欲折 穴 養老
療肩不舉不能帶衣 穴 肩髃 療肩重不舉 穴 肩髎
治肩痛欲折 穴 養老 天柱 治肩痛不可屈伸 穴 天井
治肩重痛不舉 穴 曲垣 天宗
治肩中痛不能動搖 穴 巨骨 治肩胛痛而寒至肘 穴 肩外俞
治肩臑前痛與胸相引 穴 前谷 治肩臑痛 穴 後谿
治肩肘痛引頸項急寒熱缺盆中痛汗不出胸中熱 穴 天髎

治厥逆肩臂不舉 穴 臑會 治肩重不舉臂痛 穴 肩髎
治肩背不得屈伸 穴 □□ 治肩引項臂急 穴 肩髃
治寒熱肩腫引胛中痛臂酸無力 穴 臑俞
療肩背酸重 穴 天宗 治肩臂酸重 穴 臑會
治背臂疼 穴 □□ 治肩重背痛 穴 天宗
治肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀 □□□□ 肩背熱
汗出四肢暴腫 □□ 肩背寒 氣不足以息 穴 □□ 缺
治頸項及肩背痛 穴 天井 治腰背痛 灸 □□
治背轉急 穴 大椎 治背痛 □□ 穴 下焦俞
治肩腫不得顧 穴 □□
王氏云肩背酸疼諸家鍼灸之詳矣 然當隨病證鍼灸之 或背上先
疼遊走引肩上疼者 乃是膏肓爲患 千金外臺既云按之自覺牽
引於肩中是也 當灸膏肓俞 肩背自不疼 予嘗肩背
痛矣 灸膏肓肩痛 未已 遂灸肩井三壯而愈 以此知雖灸
膏肓而他處亦不可不灸云

肩痺痛

治肩痛痺不仁不屈伸肩內麻木 □□□ 穴 天井
治肩胛周痺 穴 曲垣
治肩中熱頭不可顧 穴 肩貞 肩髃 關衝
治肩重痛不舉 穴 曲池 天鄉
治肩不舉不得帶衣 穴 清冷泉 陽谷
治肘痛引肩不屈伸 穴 天井 治肩痺 穴 肝俞
王氏云兩肩頭冷痛不可忍予嘗見將中風人臂骨脫臼不與肩
相連接多有治不愈者要之植覺肩上冷疼必先灸肩髃等穴毋
使至於此 亦可也 予中年 每遇寒月肩上多冷常以手掌心摩
之夜臥則多以被擁之僅能不冷 後灸肩髃方免此患 □肩髃
兩手之穴 □□□□ 是之 安不可不灸也

臂痛

子067-654

治肘臂偏細 (穴)曲池

治臂細無力痠疼臂冷而疑 (穴)肩髃

唐甄權以母病與弟立言專習醫方隋開皇初為秘書正字

後除魯州刺史辭疾不就若患風手不得引弓諸醫莫能療權曰但將

弓箭向垛一鍼可以射矣鍼其肩髃一穴應時即射貞觀中一日

三歲太宗幸其家視其飲食訪以藥性因授朝散大夫賜几杖衣服

撰脈經鍼方明堂人形圖一卷至今行用焉

治臂膊痛屈伸難 (穴)關衝　治肩重不舉臂痛 (穴)肩髎

治肩中熱指臂痛 (穴)肩井　治臂痛 (穴)乳根

治臂內廉痛 (穴)太淵

治臂引小腹痛肩引胸臂攣急手臂不得舉而至肩 (穴)肩髎

治臂痛不舉 (穴)臂臑 肘髎　治臂痛 (穴)臑會

治臂麻痛 (穴)孔最　治臂腕外側痛不舉 (穴)陽谷

治臂不得舉 (穴)液門 前谷

治因折傷手腕捉物不得肩臂痛不舉 (穴)陽池

治臂膊腋寒 (穴)[illegible]

治胸脅痛臂不舉不得帶衣 (穴)肩[illegible]

治肩軟折臂如拔骨痛不能向上下 (穴)養老

治臂酸無力 (穴)[illegible]　治厥逆肩臂不舉 (穴)章門

治肩臂不得舉伸而痛 (穴)巨骨

治臂痛不得舉氣痙寒痛 (穴)臑會

治手臂攣急 (穴)肩髃

治風痺手臂不舉 (穴)尺澤 肩貞

治寒臂 (穴)合谷　治臂不舉 (穴)陽谿

治臂痛 (穴)天宗 五里　治臂急 (穴)後谿

治臂不伸 (穴)[illegible] 腕骨　治臂不仁 (穴)附分

治臂不舉 (穴)巨骨 前谷

治臂不及頭 (穴)尺澤 關衝 外關 [illegible]陰

治臂攣心手不上舉 (穴)前腋

治臂攣頻色無枯勞氣失精肩臂痛不得上頭

治臂痛 (穴)肩髃 曲池

治臂重痛肘攣 (穴)液門　治臂疼 (穴)肩髎 天宗 陽谷

治臂腕急腕外側痛腕如拔 (穴)[illegible] 前谷 陽谷

治臂內廉痛 (穴)太淵 經渠

治肩臂痛 (穴)腕骨 天井　治臂身熱 (穴)列缺

治臂痛 (穴)後谿 手三里 曲池

治臂時疼痛不可忍

刺足少陽經肩井穴 手陽明經肩髃 各二分 先瀉後補之

灸亦大良可三壯

治臂細無力手不得向頭 (穴)肩髃 肩髎

治臂疼 (穴)少海 乳根 臑會

治肘臂腫疼 (穴)中渚 孔最 支正 肘髎

治臂攣不仁 (穴)天井 外關 曲池

腋痛

治胸滿缺盆中及腋下腫馬刀瘍瘻善噫 居天[illegible] 中腫 [illegible] 目

腋挾骨合頸痛汗出振寒 (穴)足臨泣

治腋拘攣暴脈急心引腸痛 (穴)譩譆

治臑腋攣急 (穴)少府　治肘腋腫小腹痛 (穴)少海

治肘攣腋腫下痛四肢不舉 (穴)支溝

治腋下腫 (穴)天池 腋俞 委陽 陽輔

治掌中熱腋腫肘攣 (穴)間使 陽輔 中瀆 委陽 天池 臨泣 俠谿

治腋下腫 (穴)地五會　治腋下腫胸中滿 (穴)臨泣

治肘攣腋腫 (穴)太陵

治腋下腫瘰癧生不能起[illegible] 中府 [illegible]

治肩背疲重腸腹痛四肢不舉 (穴)支溝

腹堅寒氣頸腫 (穴)上廉

治腋下腫寒熱頸腫 (穴)丘墟 陽蹻

治癜痣　六　卷第
王氏云癜不理者最不可　予幸見患宿齋人癜不宜發療有王
取不可取者多八分白之矣
治疵魚　出海上方
右先以炭煤擦之却洗去有黑點見之可乳也以艾灸之去根

肘痛

治肘攣　資生經(穴)前谷　尺澤　陽谿　曲澤　靈道
治肘攣腋腫紅痛(穴)尺澤　小海攣(穴)間使　肩俞　譩譆
治肘節痺臂酸重痰急痛　出類經之方
治肘中痛(穴)曲池
治肘痛(穴)曲池　腕骨　臑會　支溝　肘髎
治肘痛(穴)中衝　治肘疼不能屈曲帶衣(穴)關衝
治肘內廉痛(穴)間使
治肘痛時寒(穴)曲池　三里　關衝　中渚　陽谷　尺澤
治臂肘外後廉痛(穴)天宗
治肘寒(穴)肩外俞
治肩肘痛(穴)天髎
治肘節風痺臂痛不可舉屈伸攣急肘臂酸重麻痺不仁(穴)肘髎
治肘攣支滿(穴)魚際　治肘攣(穴)靈道　尺澤　少海
治驚恐肘臂不舉(穴)支正　曲澤　陽谿
治臂肘厥寒(穴)極泉
治手臂肘不仁不伸(穴)大陵　手三里
治臂肘不仁(穴)肘髎　治臑痛臂肘不得屈伸(穴)腕骨
治臂攣急(穴)後谿　治臂肘痛(穴)五里　天井　下廉
治肘中痛(穴)衝陽　曲池
治肘攣支滿喉中焦乾渴瘛上氣(穴)魚際
治肘臂酸重屈伸難(穴)偏歷　三里
治肘臂酸痛(穴)中渚　治肘痛(穴)太淵
治肘痛屈伸難手不得舉偏風半身不遂捉物不得挽弓不得
治肘臂偏痛(穴)曲池

療肘臂厥痛屈伸難手大支痛不握指盡痛(穴)孔最
療肘臂酸難屈伸手不握十指盡痛(穴)支正
療肘臂酸重不可屈伸麻痺不仁(穴)肘髎
療肘痛引肩不可屈伸振寒項及肩背痛臂痿不仁(穴)天井
療肘痛不能上下(穴)列缺
治肘痛(穴)液門
甲乙經云五里在肘上三寸大脉中央禁鍼　註肘云臂節即巴替臂之下節
也予數次臂上灸之百方其肘至其臂節也當以此求之
治肘攣疼痛(穴)魚際　靈道

腳膝痛

治膝不得屈伸取其經血立愈(穴)委中
治腳膝拘急足寒如水(穴)腎俞
治腳骨攣痛　足絕骨
療膝中痛不仁難跪起(穴)犢鼻
療膝寒不仁痺痿不屈伸(穴)髀關
療脛痛冷痺膝痛不能屈伸(穴)梁丘
療腿膝連髀脛麻痺屈伸難膝外廉不仁連腰痛腳攣急足不收履坐起(穴)委陽
(穴)懸鍾　療足寒脛酸屈伸難
療腳脛酸痛屈伸難不能久立難跪云主大寒不足偏風腰腿腳
不相隨(穴)巨虛　療脛麻膝痛(穴)風市
療四肢腫痛腿膝酸痛(穴)三里
療膝內廉痛引小便不利身重足痿不能行(穴)陰谷
療腿膝脛痺腳攣不得伸屈痛狂走冠疰脛寒(穴)京骨
療腿膝脛酸(穴)附陽　療腳酸膝重(穴)承山
療膝股內外廉痛不仁屈伸難(穴)陽陵泉
主膝攣痛引脇拘急掣尋身或青或焦或枯或黑如腐木(穴)風市
治膝脛骨搖酸痺不仁(穴)絕骨
治膝寒不仁痿痺不得屈伸(穴)髀關
治痿痺足不能起坐髀脛酸痺不仁手足偏小生不能久(穴)光明

治膝內廉痛引臏不可屈伸（穴）膝關
治膝不可屈伸（穴）曲泉
治筋攣膝不得屈伸不可行（穴）曲泉 梁丘 陽關
治膝股腫䯒酸轉筋（穴）解谿 條口 丘墟 太白
治風水膝腫（穴）上廉
治膝腫少氣身重膝重內踝前痛（穴）中封
治膝股䯒腫（穴）解谿
治腨後廉急不可前却（穴）復溜
治腳筋急痛腳脛酸腳及跟痛（穴）承山 承筋
治腳如結踝如別（穴）崑崙
治腨痙攣（穴）京骨 承山 承筋 商丘
治拘急（穴）膀胱俞
治腨外廉骨痛（穴）附陽

○膝痛

治膝骨痠痛（穴）三里
治寒痺兩膝寒痺膝腳不收（穴）陽交
治膝脛冷痠痛足緩履不收濕痺足下熱（穴）條口
治膝痛如錐不得屈伸（穴）陰谷
治腳膝無力（穴）膀胱俞
療膝股重（穴）合陽
治腰膝拘攣（穴）陰交
治膝寒不仁痿痺股內筋絡急（穴）膝關
治膝伸不得屈拳腳不仁偏風半身不遂腳冷無血色（穴）陽陵泉
治膝痛不得屈伸（穴）京骨
治寒痺膝不能屈伸（穴）梁丘
治膝外痛不可屈伸風痺不仁（穴）陽關
治膝中痛不仁難跪起膝臏癰腫不潰可治潰者不治（穴）犢鼻
治膝脛內廉痛（穴）交信
治膝股內痛（穴）三陰交
治膝內痛（穴）曲泉 膝關
治心腹脹滿胃熱不嗜食膝前痛 治筋攣手足不收癱坐不能久（穴）懸鐘
治膝冷痛不已（穴）膝眼
療膝冷（穴）伏兔
療腿膝酸痺（穴）豐隆
治膝外廉痛（穴）俠谿 陽關
主膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引咽喉痛（穴）膝關
治膝臏內踝前痛（穴）中封
治膝內踝前痛（穴）太衝
治膝中痛不仁（穴）犢鼻
治膝痛脛轉不能行手足偏小腹脛痠痺不仁（穴）光明
治膝痛痿（穴）三里
療膝酸（穴）風市
療膝重（穴）承山
甄氏云有人一二里路膝必痠不可行須坐定以手撫摩久之而後能行後因多服附子而愈予又有膝亦痠疼或膝痛
愈若此是藥與灸不可偏廢也若灸膝關三里亦得但按其穴
痠痛即是受病處灸之不拘

○腰腳痛

治腰腳重痛（穴）委中刺出血
治腰下至足不仁（穴）次髎
療腰腳如冷水（穴）陰市
治腰脊痛腳腨重戰慄不能久立腳氣膝下腫（穴）承山
治腰痛不能舉體足清寒不能久立坐如在舟車中（穴）中髎
治腰足痛足腨腫不得履地（穴）崑崙
療腰痛偏風半身不遂腳脛痠不得履地（穴）崑崙
療膝足不仁（穴）膀胱俞
療腰痛不可舉下重腳痿（穴）僕參 承山
療腿痛不可俯仰足痺痛屈伸難（穴）地機
療冷痺腳脛麻腿膝酸痛腰尻重起坐難（穴）風市
療腳疼痛不能久立腰胯重起坐難腳攣急不可屈伸（穴）承山
張仲文療腰腿重痛不可轉起坐難及冷痺腳筋攣急不可屈伸
灸曲瞅兩文頭左右腳四處各一壯
日初覺痛便用之……艾至人定自行動
腨腫 一名……
治腰髖手足不仁（穴）上廉
治腰痛如坐水中膝下寒腰背痛膝腳骨節疼痛無常處脛痠痛
療膝前痛風痺不仁（穴）陽輔
治腰膝拘攣（穴）陰交
治患腳（穴）環跳 陽陵泉 巨虛 下廉 陽輔
治患風腳不隨不得跪起

腰痛

治腰痛之病皆本於腎……諸經皆有腰痛不同出圖
證治之凡腰痛引項脊尻背如重狀者病在足太陽經也刺其郄中正
經出血春無見血……腰痛如以針刺其皮中不可以俛仰不可以顧者刺
少陽成骨之端出血……不可以顧顧如有
見者悲者病在陽明也刺於骭前三痏上下和之出血秋無見血
……腰痛引脊內廉者刺少陰於內踝上二痏春無見血出血太多則
不可復……腰痛腰中如張弓弩弦者病在厥陰刺厥陰之脈在腨踵魚腹之外循之
累累然乃刺之……腰痛引肩目𥇒𥇒然時遺溲者病在解脈刺解脈

在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血血變而止……腰痛如引帶常如折腰狀善
恐者亦刺解脈病在郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而止……
……腰痛如小錘居其中怫然腫者病在同陰之脈刺絕骨之端為三痏……
痛不可以俛仰仰則恐仆得之舉重傷腰衡絡絕惡血歸之刺之在郄陽筋之
間上郄數寸衡居為二痏出血……腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲
飲已欲走者會陰之脈刺直陽之脈上三痏在蹻上郄下五寸橫居視其盛者出血……
腰痛痛上怫怫然甚則悲以恐者病在飛陽之脈也刺內踝上五寸少
陰之前與陰維之會……腰痛痛引膺目𥇒𥇒然甚則反折舌卷不能
言者病在昌陽之脈刺內踝上大筋前太陰後上踝二寸所……腰痛
而熱熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚則遺溲者病在散脈刺
膝前骨肉分間絡外廉束脈為三痏……腰痛不可以欬欬則筋縮急
者病在肉里之脈刺為二痏在太陽之外少陽絕骨之後……腰痛俠脊而
痛至頭几几然目䀮䀮欲僵仆刺足太陽郄中出血……腰痛上寒刺足太陽陽明
上熱刺足厥陰中熱而喘刺足少陰郄中出血腰痛上寒不可顧刺

足陽明大便難刺足少陰少腹滿……
刺足太陽……
為痏數……
法者附之于後

治腰……小腹痛 穴 居髎
治腰痛面黃小腹堅急……
治腰痛不能俛仰……
治腰重不能舉體 穴 委中
治因撲傷腰痛…… 穴 人中…… 穴 腰俞
治腰脇相引痛 穴 命門
治腰痛 穴 陰陵泉 大腸俞……
治腰如坐水中 穴 湧泉……
治腰痛不得俛仰…… 穴 ……
治腰痛肩背 穴 肝俞

治腰痛 穴 腎俞 氣海俞 中膂俞
治風勞腰痛 穴 關元俞 膀胱俞
治惡氣腰背卒痛又云腰痛不可以俛仰…… 穴 ……
治腰尻重不欲起俛仰難舉腰人者 穴 崑崙
治腰尻重起難 穴 風市
治腰痛不可俛仰轉側難 穴 腎俞
治腰疼不能久立腰已下至足不仁坐起難腰脊急強不可俛仰腰重
如石難舉動 穴 腰俞
治四肢寒熱腰疼不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根直
灸第十一椎上及左右各一寸五分三處各七壯
治腰痛 穴 腰俞 膀胱俞 長強 氣衝
上窌 下窌 居髎
治腰痛不可顧 穴 三里 陰市 陽輔……
治腰痛如錐在中 腰痛不可欬欬則……
治腰痛不能舉 穴 申脈 大衝 陽蹻

治腰痛不[illegible]不行[illegible]

治腰痛[illegible](穴)太谿 [illegible] 太白 [illegible]

治腰痛[illegible](穴)[illegible] (穴)委中 [illegible]

治腰痛大[illegible] (穴)[illegible] 治[illegible]

治腰痛不得[illegible] (穴)[illegible]

治腰脊痛 (穴)[illegible]

治腰[illegible]仰者

令患人正立以杖拄地[illegible]

年壯灸[illegible]令人[illegible]

治腰痛

灸腳跟[illegible]又中[illegible]又灸足[illegible]又灸腰目

[illegible]七壯在[illegible]左右是[illegible]

治腰[illegible] 灸[illegible]七壯左右[illegible]灸七壯

治腰脊痛 灸[illegible]五十壯

治腰脊痛 灸三焦俞隨年壯

王氏云有婦人久病而腰甚疼腰眼忌灸醫以鍼其[illegible]中全熱[illegible]

刺腎俞初不深入既而夾止則知人不可[illegible]之說猶信云

若[illegible]可因浴而大冰忽腰中如冰冷[illegible]得[illegible]腰痛不可屈

伸思之此必腎經感水氣而得

灸腎俞二七壯服鹿茸丸愈 王氏云[illegible]謂腰痛不可屈伸

灸腎俞[illegible]不服鹿茸丸亦可

王氏云舍弟腰疼出入甚艱予用火鍼微微頻刺腎俞則行屈伸如

故初不灸也舍弟有人腰背傴僂來[illegible]予[illegible]其是筋病使然

為灸陽陵泉令歸灸即愈筋會陽陵泉也然則腰疼又不可專

泥腎俞不灸其他穴也

治腰傴僂[illegible]筋無力 不收 (穴)風池

治腰強 (穴)脾俞

治腰如折膕如結身體[illegible]目不可顧目內眥赤痛 (穴)束骨

治腰脊攣痛 (穴)白環俞 治腰痛不得反側 (穴)章門

治腰[illegible] 又白環俞二穴 又灸腰目[illegible]七壯

治腰痛控睾小腹及股卒俛不得仰 刺[illegible]

治忽然氣滯腰疼不可俛仰

刺足太陽經[illegible]二穴 次鍼足少陰經行間二穴

治丈夫[illegible]腰痛刺而復發者[illegible]不能[illegible] 取經[illegible]

刺足太陽經委中二穴

治風腰疼刺之不已者 刺八髎穴[illegible]

治腰脊強痛不可[illegible] 刺足少陽經風池二穴

合谷二穴 次鍼足太[illegible]崑崙二穴

治腎虛腰痛[illegible]

刺足[illegible]二穴 次鍼足太陽經[illegible]二穴

治腰脊[illegible]痛不得屈伸上痛者 刺手陽明經合谷二穴 次鍼手陽明經

治腰脊[illegible]痛不得屈伸下痛者

刺足太陽經崑崙二穴 刺足少陰經復溜二穴

治[illegible]腰痛 刺督脈[illegible]

治腰脊強痛 刺[illegible]

治腰痛不得轉側 刺足少陽經環跳二穴 次鍼足太陽經[illegible]二穴

治因有[illegible]腰疼[illegible]

刺任脈氣海一穴以圓利鍼刺肥人鍼入一寸瘦人鍼入五分

三補三瀉令人覺臍上或臍下滿腹生痛停鍼候二十五息左手

重按其穴右手進鍼三息又停鍼二十五息依前進鍼令人覺

從外腎熱氣上入小腹滿腹出鍼神效

治腰疼行步難者

端正伸足立地以杖子一條當前就地豎至臍用以杖子吞量

[illegible]後[illegible]至[illegible]一寸[illegible]灸三上[illegible]也

治[illegible]腰[illegible] 灸腰眼中七壯

治腰痛不可俛仰轉側難身[illegible]如反腰[illegible]而[illegible]之

治丈夫婦人積冷氣勞疾 (穴)腎俞

治腰痛不可俛仰夾脊痛上下按之[illegible]後[illegible]皆灸之

俞也 (穴)[illegible]

醫家[illegible]其[illegible]不[illegible]人時[illegible]善醫方名

問安曰嘗夜問有鬼呼吸聲其甚怒夫曰不是鬼何所主答曰
我姓解名斯家在東陽患腰痛而死雖爲鬼而猶痛苦可見聞君
善術願相救濟敘夫曰汝是鬼而無形云何可治鬼曰君但縛
蒭爲人索孔穴鍼之敘夫如其言爲鍼腰眼四處鍼肩井二處設
祭而埋之明旦一人來謝曰蒙君醫療復爲設祭病除饑解感惠實
深忽然不見當代稱其通靈長子道度文子叔嚮皆精其術焉
治腰尻引小腹痛遺尿不禁（穴）陰谷
治腰如冷水（穴）陰市　治腰尻腫脹跟腫（穴）崑崙
治腹大腰痛膀胱寒飲注下　各一穴灸隨年壯

○腰脊痛

治腰痛夾脊至頭几几然目䀮䀮腰脚重痛刺出血又痛當不可以之
已責生疑（穴）委中　治腰脊痛（穴）大鐘
治腰脊痛痛（穴）小腸俞　中膂俞　白環俞
治腰背痛惡寒　腰下至足不仁（穴）次髎　胞肓　承筋

治腰脊痛引腹（穴）合陽　治腰脊尻臀股陰寒痛（穴）承扶
治腰脊相引如解及腰痛大便難（穴）湧泉
治腰痛脊急（穴）志室　京門
治腰脊急強（穴）脾俞　小腸俞　膀胱俞　腰俞　秩邊　脊中
長強　大杼　腸關　水分
脊腰髖疼腰脊強不得轉（穴）腎俞
治腰脊痛大小便不利百病腰髖疼不遂腰中冷試眼痛又云治
腰脊急強不能俛仰起坐難手足不仁小便黃腰尻重（穴）白環俞
脊腰脊痛急食不消腹堅急（穴）志室　胞肓
脊脊急強腰至足酸重（穴）膀胱俞
寒腰脊急強通氣上攻時噎（穴）神堂
治腰脊強痛（穴）大陵
治腰脊強痛食飲不消腹堅急（穴）志室
治腰脊不得俛仰脊疼背痛上下按之應者從項後
至此穴皆灸之立愈（穴）京門　中膂俞

治腰脊內引痛不得俛仰惡寒生目䀮䀮善怒不得出足委　不
女癃膝寒不可過（穴）僕參
治腰痛脊跟引髀樞痛項背腰不可俛仰（穴）京骨
治腰脚重痛欲遺溺腰重不能舉體急腹大痛可出血痛寒疼
背俞云難汗不出足熱不欲行難伸取其經血立愈
（穴）委中
治腰脊強引背少腹俛仰難腰尻重履難（穴）合陽
治腰脊相引如解又痒腰脊尻臀陰寒（穴）承扶
治腰脊不可俛仰舉重惡寒注之（穴）殷門
治腰脊痛不得轉（穴）章門　次髎
治腰脊強不得屈伸（穴）懸樞
治肩背急腰脊強不得俛仰（穴）三焦俞
治腰脊痛（穴）膀胱俞
治腰脊疼痛大小便不利腰髖寒痹膝不遂　治腰脊冷疼不得久
腎損風虛（穴）白環俞

齊太倉公診宋建曰君有病往四五日君腰脇痛不可俛仰又不
得小溲不亟治病即入濡腎及其未舍五藏急治之病方今客腎濡
此所謂腎痺也宋建曰然建故有腰脊痛往四五日舉石不能起即
復置之暮腰脊痛不得溺至今不愈建病得之好持重即爲柔湯
使服之十八日而病愈然則腰脊傷持重得痛而入腎灸腎俞
可也
治腰背脊強四肢懈惰善怒欬少氣鬱然不得息厥逆肩不可
舉馬刀瘻身瞤（穴）章門
治背惡寒痛脊強難以俛仰（穴）腸關　秩邊　京骨
治腰背不便筋攣痹縮虛熱閉塞
灸第二十一椎兩邊相去各一寸半隨年壯

○脊痛

主脊強反折瘈瘲癲疾（穴）五處　身柱　委中　委陽　崑崙

治脊強 穴 瘂門 治脊強背急腰重 穴 崑崙
治脊痓反折 穴 章門 石關 治脊內廉痛 穴 陰谷
療脊急強 穴 至陽
治脊強不得俛仰 穴 章門 肝俞 胃倉
治脊痛 穴 胃俞 大腸俞
治腹中氣脹引脊痛食多身瘦名曰食晦先取脾俞後取季脇
穴 脾俞 大腸俞 療脊急強 穴 膀胱俞
治赤白洞利腰脊痛 穴 小腸俞五十壯
治貴氣上下引腰脊痛 穴 氣穴
治胃虛消渴腰脊不得俛仰及腰脊痛上下按之應手者從項後至此穴
灸之立愈 穴 中膂俞

○骨疼 資生經

療骨疼 穴 膈俞 紫宮 玉堂
治關骨痛 穴 上關 治骨肩痛 穴 絕骨五十壯
治骨痺煩滿 穴 商丘 治背內骨痛 穴 膈俞
治骨痛 穴 太白 治骨寒熱 穴 復溜
治骨髓冷疼痛
穴 上廉七十壯 骨會大杼 骨病治此 髓會絕骨 髓病治此
此病在骨髓疼起人多可令灸之何則骨髓有病病亦深矣八
十一難經既乃云骨會大杼骨病治此髓會絕骨髓病治此是尚有
鍼灸治法可不鍼灸乎但明堂上經云大杼禁灸而銅人云可灸七
壯明堂下經云可灸五壯素問諸經既同惟明堂獨其灸之可也況
明堂經固云禁一穴許灸三壯乎又炷若小一二七壯亦可更灸上廉
絕骨等穴尤佳

○腠理痛

治肩背急風熱客於腠頸項強痛不得顧 穴 附分
治背腠寒慄重衣不得溫 穴 陽白
治腰中痛 穴 腎俞 治背腠寒 穴 次髎
治腰下至足不仁背腠寒小便赤熱心下堅脹 穴 次髎
史記扁鵲之言曰疾居腠理湯熨之所及也在血脈鍼石之所及也
在腸胃酒醪之所及也其在骨髓雖司命無奈之何也夫疾之在
骨髓至於治於居腠理也使居腠理而求治雖非聖人之治於無病
不貴者治於病也齊之侯乃以無病為好利欲治不疾以為功而卒
至於不可救不特齊侯為然人皆有之吾故載扁鵲之言於腠理
之末以戒人令使後之醫者皆識治人於未病焉耳

○腸痛

治腸痛 資生經 穴 太白 治腸痛 穴 陷谷
治腸切痛 穴 商曲
治腸中寒脹逆上氣心痛身腫 穴 建里
治腸中大熱 穴 承滿
腸痛有多端若疾甚者乃腸癰急宜服內補十宣散等藥其他
隨證治之有老人腸中常痛若無急後重甚苦自言
有老人熱腸此奇疾也為按其穴大腸俞疾甚者灸之而愈
治腸癰為病小腸重小便數似淋或繞臍生瘡或膿從臍出大便出
膿血 穴 屈兩肘正灸肘尖頭骨各百壯則下膿血止差

普濟方卷之一百六十四

詳校官典簿臣王祖昭
覆勘中書臣孟郭
校對官助教臣杜宗
謄錄監生臣劉煥等
校字匠臣周保等

普濟方卷之一百六十五目錄

鍼灸門（論一道 法一法）

類

喘欬痰飲類　霍亂嘔吐類

積聚痃癖類　手足諸疾類

喘嗽痰飲類

喘　欬嗽　肺氣　喜泣　哭

痰飲　水飲不消

霍亂嘔吐類

霍亂吐瀉　霍亂轉筋　吐　乾嘔　噎

積聚痃癖類

積聚　積氣　痃癖　痃癥

癥瘕

手足諸疾類

手痺　手指攣　手足冷熱　腕勞

足不能行　足寒熱　足腫病　四肢痛

普濟方卷之一百六十五目錄畢

普濟方卷之一百六十五

鍼灸門

喘嗽痰飲類

喘

治欬喘　穴崑崙

治氣喘　穴三間

治喘逆　穴神門　譩譆

治喘欬　穴不容

治喘欬支腫胸脅滿氣滿喘息　穴商曲

治胸脹喘息　穴大鍾

治大喘不得臥　穴期門

治欬逆上喘嘔吐胸滿不得食

穴俞府

治欬逆喘不能食　穴或中

治逆氣喘不得息　穴天府

治欬逆喘不得息　穴雲門

人迎　神藏

治喘逆上氣　穴氣戶

治喘息不得舉臂　穴[illegible]

治喘　穴足臨泣

治喘氣相追逐　穴魄戶　中府

治喘暴　穴華蓋　天突

治喘不得息　穴俞府　神藏

治喘息喉鳴　穴天容

治欬喘　穴曲澤

治欬逆上喘　穴魄戶

治喘不得息　穴浮白

治掌中熱生欬逆上氣喘數欠熱病汗不出暴痺喘逆心痛欬嘔

穴經渠

治喘逆　穴中府　魄戶　脇堂

治欬逆上喘喉鳴　穴璇璣

治喘逆胸不安席欬脇下積聚　穴期門

治欬逆氣喘　穴天突

治肺喘　穴肺俞

治喘息急　穴[illegible]

治呼吸喘　穴或中

治氣逆喘鳴　穴天容

治喘息不能行　穴廉

治喘　穴然谷

治喘　穴大陵

治喘不得息　穴天池

治喘欬息　穴廉泉

治喘 穴 魚際

王氏云有貴人久患喘夜卧不得而起行夏月亦衣夾背心予知是膏肓病也令灸膏肓而愈亦有暴喘者予知是痰為令細剉厚朴七八錢重以薑七片水一小碗煎七分服滓再煎服不過數服愈若不因痰而喘者當灸肺俞凡有喘與哮者為按肺俞無不酸疼皆為謬刺肺俞令灸而愈亦有只謬刺不灸而愈此病有淺深也舍弟登山為雨所搏一夕氣悶幾不救見昆季必泣有欲別之意予疑其心悲為刺百會不效按其肺俞云其疼如錐刺以火針微刺之即愈因此與人治哮喘只謬肺俞不謬他穴惟按肺俞不疼酸者然後點其他穴云

治大腸有熱腸鳴腹[illegible]食不化喘不能久立 灸巨虛上廉

治喘逆上氣呼吸肩息不知食味 穴 [illegible] 雲門 天府 神門

治腹[illegible]喘 穴 京門 治欬喘 穴 [illegible]

治欬嗽上喘 穴 [illegible] 治喘息[illegible] 穴 水突

治喘息如水雞鳴 穴 扶突 治欬逆上氣咽喉鳴[illegible] 穴 [illegible]

喘而欬少氣百病 穴 肺俞 腎俞 [illegible]

治欬喘 穴 曲澤出血立已 治咽中鳴喘 穴 扶突

治欬逆上氣喘息胸中滿 穴 經渠 治欬逆喘 穴 少商 大陵

治欬逆胸滿喘不得息 穴 太泉

欬嗽

論

經[illegible]刺法論內經治欬之法治臟者治其俞治腑者治其合浮腫者治其經以穴考之各有定處諸欬而喘息有音甚則唾血者太淵主之浮腫則治經渠 在[illegible]欬而兩脇下痛不可以轉轉則兩胠下滿者太衝主之浮腫則治在中封 欬而右脇下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇者太白主之浮腫則治在商丘 欬而腰背相引而痛甚則欬涎者太谿主之浮腫則治在復溜 欬而心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痹者神門主之浮腫則治在靈道 欬而遺失者小海主之浮腫則治在[illegible] 欬而遺矢者曲池主之浮腫則治在[illegible] 欬而嘔嘔甚則長蟲出者三里主之浮腫則治在解谿 欬而[illegible]者陽陵泉主之浮腫則治在陽輔 久欬不已欬而腹滿者天井主之浮腫則治在支溝 凡此五臟六腑之欬治之常也腧穴之外亦有患處者附之于後云

法

治久嗽各脈血有[illegible]不愈者

右用白表紙數重折定以水內浸[illegible]了然後[illegible]艾炷仍蘸此當[illegible]者[illegible]成艾炷子安在紙上用火點着隨即放於舌頭上正中爲妙下手灸人令患人手[illegible]喉[illegible]起須於未[illegible]之上呼吸住艾煙呼[illegible]令患人如[illegible]久[illegible]令患人把茶盞一小[illegible]下仍用[illegible]啟之比灸炷數依歲數多少[illegible]

治欬嗽多唾 穴 三里

治欬嗽喘之痛胸心痛欬[illegible] 治欬嗽 穴 魚際 缺盆 膻中 巨闕

治肺嗽 穴 肺俞 治欬嗽 穴 太淵 心俞 靈房

右欬嗽上氣唾濁胸中氣噎內如水聲 穴 天突

治欬嗽少氣 穴 乘泉 治欬嗽上氣短 穴 膻中

治欬逆上氣 穴 經渠

治上氣咳嗽胸中氣滿喉鳴而支不舉腋下腫 穴 天池

治上氣咳嗽喘息胸中積氣上下行 穴 解谿

治咳嗽 穴 魚際 列缺 少澤 缺盆

治咳嗽喘急 穴 尺澤 治欬嗽上氣唾血 穴 肩中俞

治風勞氣咳嗽 穴 太杼 治勞氣臥不安 穴 風門

治肺痿咳嗽 穴 肺俞 治肺氣咳嗽 穴 膻中

治咳嗽咽血項頸痛 穴 前谷

治痰痹咳嗽不嗜食上氣咳嗽 穴 肺募灸五十壯

治欬

手屈腕中有橫文外骨頭按之痛處灸十四壯良 又灸兩乳下黑白際各百壯即差 又以蒲量乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨節中灸十壯

治欬嗽 穴 廉泉 天井 太淵

王氏云久欬最宜灸膏肓穴其次則宜灸肺俞等穴各隨證治之若是久欬則不足灸也有司[illegible]子勿[illegible]氣[illegible]乳[illegible]病[illegible]以手按其膻中

穴而庶從以冷針頻頻刺之而後以初下之灸何其神也

治十二種風風入肺則欬逆短氣

肝欬刺足大衝　心欬刺神門　脾欬刺太白

肺欬刺太淵　腎欬刺太谿　膽欬刺陽陵泉　又第五椎

下第六節上穴中間隨年灸主上氣

治喘欬 (穴)肺俞灸各十一壯　(穴)天突灸七壯立效

治欬 (穴)胸前對乳一寸灸隨年壯　又以繩横量乳中折從脊灸

繩兩頭各八十壯三報之三日畢

治欬嗽 (穴)心俞灸五壯　囊核大

肺氣

治肺脹氣搶脇下熱痛 (穴)陰都灸隨年壯

治肺脹脇滿嘔吐上氣等病 (穴)大椎并兩乳上第三肋間灸各止七壯肺與大腸俱實

治肺實熱 (穴)中府

治肺氣欬逆上喘唾膿不得下食胸中如塞 (穴)膻中

治肺壅咳嗽唾膿血咽乾舌下急喉生瘡 (穴)天突

治胸脇急胸痛欬嗽喘熱嘔逆上氣欬唾鼻衄肩背痛風汗出腹脹食

不下喉痺肺急胸滿喘逆喉鳴 (穴)中府

治肺脹滿膨及膺胸中氣滿不得臥 (穴)大周

治肺寒熱肺痿上喘欬嗽欬血胸脇氣滿不得臥不嗜食汗不出及背

急痛 (穴)肺俞

治肺風氣痿絕四肢滿脹喘逆胸滿 (穴)肺俞灸各二壯

治面腫唇動葉葉肺風狀如蟲行 (穴)水溝

治肺風 (穴)風池

嗽血

治內損唾血不足外無膏澤 (穴)地五會刺入三分特忌灸

治唾血 寫魚際 補尺澤

治欬嗽有血 (穴)然谷

治唾血振寒嗌乾上氣 (穴)大淵 神門

治唾血吐血 (穴)青堂 手心主 間使 肝俞 胃脘 天樞

肝俞 魚際 勞宮 肩俞 太谿

治欬唾血 (穴)心俞 肝俞 缺盆 巨闕 鳩尾

治唾血逆上氣呼吸多唾濁沫膿血 (穴)庫房 中府 周榮 天澤

治嘔血 (穴)上脘 不容 太陵 治吐血衄血 (穴)郄門

治短氣嘔血胸背痛 (穴)行間

治面赤色白時時嘔血女子吊血 (穴)太衝 治吐血 (穴)手少陰陰郄

治胸中寒血積脇一痛不能久立膝痺寒 (穴)三里

治心脇下嘔血 (穴)上脘

治嘔血肩脇痛口乾心痛與背相引不可欬欬引腎痛 (穴)不容

治唾血振寒嗌乾 (穴)太淵 治嘔血 (穴)太陵 郄門

治嘔血上氣 (穴)神門

治虛勞吐血及治勞嘔逆不食多飽多睡 百病

(穴)胃脘灸三百壯

治吐血 (穴)青堂灸百壯不針

治吐血腹痛雷鳴 (穴)天樞灸百壯

治吐血唾血上氣欬逆 (穴)肺俞灸隨年壯

治吐血酸削 (穴)肝俞灸百壯

治吐血嘔逆 (穴)手心主灸五十壯 大陵是

治口鼻出血不止名腦衄 (穴)上星灸五十壯

治唾膿 (穴)胃中 治唾血 (穴)肝俞 承滿

治欬唾血 (穴)大鍾 然谷 心俞 治欬唾膿血 (穴)天突 肩中俞

治多唾濁沫膿血 (穴)庫房 治多濁沫膿血 (穴)屋翳

治色貧時唾血及嘔血煩心 (穴)巨闕

治嘔血 (穴)大淵 神門 行間 太衝 魚際

治逆氣嘔血 (穴)日泉 治吐血 (穴)五里

治咽腫唾血及治衄血不止 (穴)巨骨 (穴)太谿

治驚癇致心吐血 治吐血唾血 (穴)魚際

治吐血 (穴)肝俞 勞宮 石門

治唾血 (穴)肝俞 治虛氣吐血 (穴)承滿

治吐血失音腦痛 穴 孔最 治心痛出血嘔血 穴 曲澤

治嘔血 穴 庫房 灸七壯

治嘔血衄血心胸血出 [illegible] 灸七壯

治吐血 穴 [illegible]關 灸七壯 吐血不止 大椎 [illegible] 之

治上氣 吐膿血 穴 肺俞 [illegible] 百壯

○ 嗽

治欬嗽喘急 [illegible] 穴 中府 治多唾 [illegible] 唾血 穴 庫房

治欬嗽胸脹 穴 [illegible] 治腹滿 唾沫 穴 少商

治喘末 穴 百會 治多唾 嘔沫 穴 石關

治肺實 欬 欬唾膿 穴 庫房 治嘔沫吐 [illegible] 唾 穴 幽門

治脅強不閒多唾 穴 石關 治多唾 穴 日月

治心胸痛欬逆上氣吐膿不嗜食 穴 天井

治吐血唾如白膠 穴 紫宮

資生經云積主臟病聚主腑病積者是飲食[illegible]不消聚者是伏痰

結痛不化痰伏在上而主頭目眩痛多因延寒熱[illegible]用手胃散

烏金散治之其論有理故併載之 [illegible]

○ 痰涎

治熱病胸中痰飲腹脹暴痛恍惚不知人 穴 巨闕 資生經

治結積留飲胸滿食不化 穴 通谷 治痰癖 穴 不容

治痰 穴 少衝

治胸胃寒痰傷酒風發腦兩角眩痛不能飲食煩滿吐不止 穴 [illegible]谷

治痰沫胸中痛不得喘息 穴 浮白 治頭痛吐涎沫 穴 本神

治涎沫 穴 絲竹空 治涎出 穴 [illegible]谷 復溜

治涎下 穴 陰谷

治痰飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹支滿痰瘧 穴 [illegible]俞

治痰閉 穴 [illegible]俞 治痰多吐涎 穴 上管

治結積留飲 穴 [illegible] 治涎出不覺 穴 下脘

治吐沫 穴 少海 [illegible] 治本神

治嘔沫 穴 絲竹空 通谷 [illegible] 治沫出 穴 上關

治嘔沫 穴 尺澤

治吐涎 穴 [illegible]

治涎出多唾 穴 或中 云門 治多唾唾沫 穴 庫房

治嘔沫 [illegible] 穴 [illegible]

王氏百痰從乎[illegible]不一而[illegible]有疾[illegible]最宜灸膏肓穴[illegible]

[illegible]多[illegible]有[illegible]水之狀[illegible]也[illegible]治之 ○

[illegible]水在口中涌水[illegible]之[illegible]食後吐水可灸肺俞 又灸

三[illegible]交期門[illegible]也[illegible]有[illegible]諸法灸之

○ 水飲不消

治胸中痰飲蠱毒霍亂驚悸腹脹暴痛恍惚不止[illegible]逆不食

刺巨闕[illegible]針八分[illegible]足陽明經

三里二穴[illegible] 治唾沫 穴 天容

治痰延[illegible] 灸[illegible] 丹田

治蓄飲脇下堅痛 穴 中脘

治蓄飲水背不通[illegible] 穴 京門

治飲渴身體痛多唾 穴 隱白

治水漬入胃名曰溢飲滑泄[illegible]飲水水不復泄[illegible]

[illegible] 穴 大椎

霍亂嘔吐類

○ 霍亂吐瀉

治霍亂遺失失氣 [illegible] 穴 三里 治霍亂泄注 穴 期門

治嘔泄上下出[illegible] 穴 [illegible]

治腹脹食不化善嘔泄有膿血 穴 大白

治霍亂胸中氣滿不嗜食[illegible] 穴 關衝

治吐逆霍亂[illegible] 穴 人迎

治胸中煩熱[illegible]霍亂泄利腹堅硬大喘不得臥脇下

精氣　穴　期門
治霍亂吐瀉身熱汗不出　穴　上脘　治吐瀉　穴　陰谷
治霍亂出瀉不自知　穴　中脘　穴　支溝　天樞
治氣逆霍亂腹痛又吐瀉眩暈　穴　太白
治心痛霍亂脹滿　穴　陰都　治霍亂心痛不可忍吐瀉　穴　上脘
治胸脇滿霍亂吐痢不止悶頓不知人　穴　巨闕
治吐逆霍亂吐血　穴　手心主灸五十壯
治霍亂先心痛及先吐　穴　巨闕灸七壯
治先腹痛　穴　大倉灸二七壯
治先下痢　穴　夾大腸募二寸　男左女右又灸谷門
治吐下不禁兩手脉疲散　灸臍中骨下三寸　又臍下二寸又灸七十壯
治霍亂下不止　穴　大都灸七壯
治霍亂轉筋欲死　穴　灸二七壯
霍亂吐瀉不止當量治宜服來復丹靈砂丹等藥以多為貴尤宜灸上
脘中脘神闕關元等穴若水分穴尤不可縫蓋水穀不分而後泄瀉
又云若分水能分水穀故也或云若灸中脘穴須先中管而後水分

一二七

治霍亂乾嘔　穴　間使灸各七壯不差更灸即愈
治霍亂吐不止而痢不止者
穴　臍一夫約中灸七壯　又云臍上一寸二七壯
治霍亂若吐者　穴　手腕第一約紋中灸七壯名心主當中指
治霍亂煩悶　穴　心厥下三寸灸七壯　又灸內踝中上灸二七壯
治霍亂遶臍痛　穴　關元灸三七壯
治霍亂欲死者
以物横度病人人中屈之從心鳩尾度以下灸先灸中尖畢更横灸
左右又灸脊上以物圍令正當心厥又夾脊右左一寸各七壯是腹
背各灸三處也
治霍亂危困諸治不差者
抑病人腹臥之伸臂相對以繩度兩頭肘尖依繩下夾脊骨兩邊相
去各一寸灸之百壯未愈者可灸肘頭灸畢即起

也忌霍亂或雖未能吐瀉然無苑不可逆忌或但少腹痛或先
後吐當隨所見之證灸之
治霍亂泄出不自知　穴　先取太谿　後取大倉之原
治泄注上下出兩脇下痛　穴　尺澤　治霍亂吐痢　穴　灸霍亂連
治霍亂手足逆冷　穴　三陰交灸各七壯不愈加壯數
其外近踝白肉際灸七壯亦可至二七壯

霍亂轉筋

治霍亂頭痛胸滿呼吸喘鳴窮窘不得息　穴　人迎
治霍亂不識人　穴　巨闕
治霍亂　穴　關衝　支溝　公孫　陰陵泉　巨闕
治厥逆霍亂　穴　足太陰大都　金門　僕參
治霍亂逆氣　穴　太白　治霍亂逆氣　穴　魚際
治霍亂脛不仁　穴　承筋　治霍亂　穴　承筋　僕參
解谿　陰陵泉

治轉筋霍亂　穴　金門　僕參　承山　承筋
治霍亂轉筋大便難　穴　承山
治筋攣　穴　曲泉　照海　陽輔　京骨　胃腧
治轉筋　穴　僕參　築賓　至陰　解谿　丘墟
治筋脉急　穴　解谿
治小腸熱大腸結腹外廉筋急髀樞不仁　穴　浮郄
治筋攣拘不得屈伸引不開屈伸難風痹肘細無力　穴　曲池
治股青轉筋欠寒作熱鼓脹中相引痛　穴　入泉
治寒氣客於分肉間痛攻上下筋痹不仁　穴　中瀆
治寒轉轉筋支腫大便難腳脫疼重引小腹痛　穴　承筋
治筋急子治腳筋急　穴　委中　附陽　承山
岐伯治腳轉筋發不可忍者
穴　灸腳踝上一壯內筋急灸內外筋急灸外
治脚重腳轉筋遲痺　穴　解谿　治四肢轉筋　穴　交陰
治腳急腫痛轉攣不能久立　附筋足攣　穴　丘墟

治筋急身搐 (穴)大敦 [illegible]
治筋攣 [illegible] (穴)[illegible]
治筋急手相引轉筋入腹痛欲死者 使四人捉手足灸臍左邊二寸十四壯
又臍上一寸十四壯 (穴)心兪 肝兪
治轉筋 (穴)灸涌泉六七壯
治轉筋脛酸 (穴)灸氣根黑白際一壯
治手足厥冷 (穴)三陰交二七壯 治霍亂已死有暖氣者
(穴)承筋 [illegible] 又灸臍上[illegible]四灸二七壯
治腰脊不便轉筋急 [illegible] 筋攣 (穴)二十一椎邊[illegible]壯
治轉筋在兩臂及胸中 (穴)灸手掌白肉際七壯
又灸足中[illegible] 有[illegible]筋[illegible]足皆愈
治腹脹轉筋 (穴)臍上一寸二七壯
治有人身屈不可行亦有膝上腫疼動不住
(穴)灸陽陵泉皆愈 王氏云已救多餘人矣神效無比
治吐瀉轉筋者 (穴)灸水分即止

治腳十指轉筋急不得屈伸 (穴)灸腳外踝骨上七壯
治轉筋腰背痛不可忍 (穴)灸屈膝下廉橫筋三壯
治轉筋急 (穴)僕參二穴各灸七壯
治走痛轉筋 (穴)灸踵踝白肉際各三七壯
又灸小腹下橫骨中央隨年壯
治轉筋不止 (穴)灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈
治轉筋入腹痛欲死四人持手足
(穴)灸臍上一寸十四壯 自不動勿復持之 又灸股內大筋去陰一寸
治霍亂轉筋 (穴)灸大指歧中際七壯
治霍亂轉筋
(穴)令病人合面正臥伸兩手着身以繩橫量兩肘尖頭依繩下俠
脊骨兩邊相去各一寸半灸一百壯無不差 [illegible]
治腳轉筋 (穴)灸兩足大拇指爪甲後逆肉處當中央三壯
治轉筋入腹痛 (穴)灸腳心下當拇指上七壯
又灸足大拇指下約中一壯

○嘔吐

治嘔吐[illegible] (穴)[illegible]
治肝虛令人[illegible]不嗜[illegible]太息者 [illegible] (穴)[illegible]
治善嘔 (穴)商丘 幽門
治嘔宿汁心下淡口瘡 (穴)陽陵泉 [illegible]
治逆氣嘔吐 (穴)曲澤 [illegible] (穴)維道
治煩心痛 (穴)大陵 太谿 [illegible] (穴)魄門
治嘔吐胸滿 (穴)[illegible] 靈墟 [illegible]
治噎吐 (穴)[illegible] 石門 中庭 [illegible]
治膈中嘔吐不欲食 (穴)[illegible]
治吐食 (穴)巨闕 胃室
治吐食 (穴)[illegible] [illegible]
治膈虛食飲嘔[illegible]
治嘔吐 (穴)中庭
治嘔逆 (穴)[illegible] 魚際
治嘔逆 (穴)雲門
治胸滿 (穴)神藏 靈墟 治嘔吐 (穴)[illegible] 大都
治嘔逆發寒 (穴)太衝 治嘔逆多寒 (穴)[illegible]
治氣逆噎嘔 (穴)勞宮
治嘔逆不止三焦不調水腫不嗜食 (穴)維道
治嘔逆 (穴)上脘 治嘔噦多逆 (穴)[illegible]
治嘔吐不止 (穴)率谷 治上氣嘔吐 (穴)肺兪
治嘔吐宿痰上氣 (穴)玉堂
治嘔噦氣逆不得下食 (穴)心兪灸百壯
治嘔噦 (穴)中庭 腧府 意舍
治氣逆嘔逆兩脅[illegible]痰食飲不下胸滿支腫脇痛腸鳴脹胃脘暴痛
(穴)期門
治嘔則食無所出 (穴)膽兪 治嘔吐煩滿 (穴)魄戶
治吐逆 (穴)膻中 治嘔吐口中如膠善噫 (穴)太谿
治嘔吐涎沫 (穴)[illegible] 少海 治喘息嘔沫 (穴)廉泉
治嘔吐不止 (穴)[illegible]

噫

治數噫心下氣不足嘔口常噫 (穴)少衝
治腹大痛善噫 (穴)陰谷
治氣逆吐噫歎 (穴)大谿 治心痛滿欲噫 (穴)公孫
治欬逆噫善歎氣無所出 先取三里 後取太白 (穴)章門
治嗜噫 (穴)大敦 石關 治善噫 (穴)太谿
治噫氣上逆 (穴)太淵 治數噫恐悸 (穴)神門
治嗳心善噫 (穴)少衝
治善噫嘔 (穴)大陵

噦

治噦 (穴)少商 灸三壯
治噦逆 腸中氣閉 灸臍下 灸毛下附肋宛宛中五十壯
治咳逆噫噦 (穴)承漿 灸七壯 (穴)石關 灸百壯 又臍下四指 灸七壯
治噦死 灸心主尺七壯 在掌後横紋中 吐不止更灸如前數
治噦而手足逆冷者 灸三陰交七壯 未差者更灸如前數
治一切噦逆不止 男左女右 乳下黑盡處 一韮葉許 一灸立止
治乾噦 (穴)期門
治卒噦 (穴)膻中 中府 胃管 灸數十壯 尺澤 巨闕 各灸七壯

積聚 疝 瘕 類

積聚

治積聚 (穴)肺兪 腎兪 陰谷 (穴)上脘 (穴)脾兪
治心下堅積聚冷脹 (穴)上脘 三壯
治腹中積上下行 (穴)懸樞 治腹中積聚 (穴)曲泉
治腹滿積聚 (穴)大陰郄 治堅結積聚 (穴)膀胱兪
治積聚堅滿 (穴)脾兪 灸百壯 治穀中積聚及痛 (穴)衝門
治積聚堅大如盤 冷脹 (穴)胃脘 灸二百壯 三報之
治腹滿積聚 (穴)衝門 府舍
治積聚上下行 水穀不化 下利 腹中留積 腰痛 (穴)懸樞
治積聚 (穴)脾兪
治腹中積 及腸中切痛不嗜食 (穴)曲泉
治臍下積聚 大腸切痛 振寒大腹有水 (穴)四滿
治結積留飲 (穴)通谷 治積聚氣 (穴)章門
治冷氣積聚 上衝心 氣不嗜食 (穴)中極
治積聚 (穴)中脘 治積聚 (穴)灸肝兪 或三焦兪
治黃疸積聚 (穴)脾兪
治腹脹積聚 腹滿 食氣 重不嗜食 灸三焦兪
治心腹積聚 灸肝兪 治嘔逆臥不安 腹脇下積聚 (穴)腎兪

積氣

治脇下積氣 食欲不思 大腸滑泄 穀不化 (穴)期門
治積氣上下行 (穴)解谿
治積氣 腸鳴 卒痛 泄利 不欲食 腹中氣 逆走 夾臍急 (穴)期門
治氣結成塊 狀如覆杯 (穴)氣海
治氣痛如刀攪 作塊如覆杯 (穴)陰交
治積氣成塊 (穴)膻中 治積氣 (穴)三里 不容
治積氣如石 (穴)章門 治胸脇積氣 (穴)章門
治五臟積聚 (穴)中脘 灸一七壯 ○ 結氣
遠年壯下氣 灸肺兪百壯 又灸太衝五十壯 ○ 九臍下疝痛 泄入陰中 發作無時 此冷氣 灸關元百壯 又臍下灸臍孔中二七壯

痃癖

治痃癖 腹痛 氣逆 小便不利 (穴)三陰交
治痃癖氣 小腹痛 (穴)腎兪
治痃癖積聚 (穴)脾兪
治痃癖結氣 (穴)中脘

治癖塊腹堅又叉取穴刺 (穴)下脘

治腹痛痃癖不嗜食腹虛鳴泄注月不利引痛濕熱疝瘕痢下

痛重羽疝瘕(穴)下脘合

治痃癖冷氣心腹脹滿食飲不下 凡動(穴)商谷

治痃癖(穴)三里 大谿 苦蘇兆(穴)灸氣海 天樞各百壯

治痃癖小腸膀胱腎餘疝氣冷等疾

刺任脈氣海一穴次針五臟二穴在氣海兩傍相去各寸三分一

併三穴備針刺五分可灸百壯即止次以毫針刺足陽明經三里二

穴足太陰經三陰交二穴

治瘕氣

從乳下即數至第三肋下共乳上下相當稍似近內接腹骨外取穴

乳即是灸處兩邊俱灸元一穴各灸三壯明日四壯每日加一壯至

七壯還從三壯起至三十日報灸除已上兩穆穴灸者取時叉脚挽

即叉脚按灸者頭脚取時還脚灸

治痃癖(穴)關元

○瘕癖

治瘕癖(穴)內踝後宛中容隨年壯 氣海百壯

治久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利繞臍絞痛(穴)天樞灸百壯三報之万壯

治腹瘕(穴)地機 治疝瘕(穴)陰陵泉 太谿 大陰郄

治疝瘕(穴)不容 中極

治小腹堅大如盤胷腹脹滿飲食不消婦人瘕聚腰痛

三焦灸百壯 內踝後宛宛中隨年壯 氣海百壯

治瘕癖左右相隨

患左灸左患右灸右第一屈肋頭近第二肋下是灸處第二肋頭近

第三肋頭一向肉翅前不是灸處初日灸三次日五後七周而復始

至十止 又關元五十壯臍上四指五十壯

積聚堅滿痛(穴)章門灸百壯 治瘕(穴)三焦俞

治結積留飲癖囊胷滿飲食不消(穴)灸通谷五十壯

治瘕癖閉癖

令患人平坐取皮一條繞項向前垂臨鳩尾即截斷即四邊綫

向後當脊骨頭即點記乃別度口吻外截卻即取其綫

中摺分於脊骨點處中心上下分之各點小兩頭通前合灸三處其穴

灸處日別灸七壯以上十壯從滿十日即停若患人食得未即

取綠邊度口吻分各之其數一準前法仍看脊骨穴

去斂一二分亦可就點六穴如相去遠者不須取所點穴若患人未

指可停二十日外還依前灸之仍灸季肋頭二百壯其灸季肋吋之見

與灸脊上穴等下以也

治閉癖

其癖有根其根著背者有著脇上者 其患人平坐熟看癖頭

仍將手捉癖頭向上尋之當有孫脈與當尋上此脈尋至脇上至其穴

案頭當脾骨下入裏邊兩壯點其引至處云尋上穴得過多不

火只可細目引七炷以來

疝瘕

治疝瘕小便不利氣淋又主婦人疝瘕按之如湯沃股內至膝陰瘡

治痃痛小腹痛繞心下運不嗜食(穴)陰陵泉

治腹中有大疝瘕積聚與陰相引(穴)太谿

治疝瘕陰痛(穴)衝門 太陰郄 治癖下疝積

治腹滿疝積(穴)石門 治疝瘕(穴)四滿 中極

治疝瘕(穴)府舍 治大疝腹堅(穴)丘墟 (穴)四滿

治卒疝小腹痛小便不利如淋(穴)太衝

○癩疝

治癩疝陰腫痛引臍中不尿陰痿一云痛引臍中(穴)曲泉

治癩疝(穴)中都 合陽 中郄 闕元 大巨

交信 中封 太衝 地機

治癩疝瘻腫痛身體不仁(穴)中封

治陰痛實時皮長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴痒氣逆卒疝小

便不利(穴)少府

治陰股內痛氣癰狐疝走上下引小腹痛不可俛仰 穴 商丘
治狐疝 穴 巨闕　治狐疝驚厥 穴 太衝
治偏癩 穴 肩井旁肩解與臂相接處
治癩陰腫痛 穴 氣衝　治衝疝[illegible]死不知人 穴 中脘
治氣癃癩疝陰急股樞腨內廉痛 穴 交信
治小腹疝氣遊行五臟疝繞臍衝胸不得息
穴 氣海　臍中　[illegible]門　天樞
治臍疝繞臍痛衝胸不得息 穴 灸臍中
治卒疝繞臍痛 穴 石門
治臍疝繞臍痛時止又主氣疝煩嘔面腫奔豚 穴 天樞
治癩陰腫痛陰寒莖中痛兩丸騫痛不可仰臥 穴 氣衝
治陰疝兩丸上入小腹痛 穴 五樞
治兩丸騫 穴 陰交　石門　太衝
治寒疝 穴 交信　中封　大巨　曲骨
治大疝癀疝陰股痛小便難腹脇支滿癃閉少氣泄利四肢不舉
[illegible]身熱[illegible]痛汗出[illegible]臍痛引腰背不可屈伸 穴 曲泉
治癩有四種腸癩卵脹難灸氣癩水癩針灸易治　治卵偏大上入腹
穴 灸三陰交隨年　[illegible]灸[illegible]元百壯
大敦隨年壯　[illegible]二七壯[illegible]是
治疝 穴 石門　陰交
治寒疝下至腰腳如合水[illegible]諸疝按之在膝上[illegible]腹脹滿
[illegible]少氣[illegible]小腹痛[illegible]腹如合水[illegible]上寒
如合水 穴 陰市　肝俞　合陽
治寒疝陰偏腫痛
治寒疝小腹脹[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

治寒疝手足[illegible]中痛或身微熱 穴 中封　治寒疝陰挺出 穴 大敦
王氏云[illegible]相去
各三寸青脈上灸七壯[illegible]亦治此灸之愈
治暴疝痛 穴 金門　丘墟
治卒疝小便數[illegible]上入腹[illegible]臍下痛
恒恒不樂 穴 大敦病左取右病右取左
治卒疝小腹腫時小腹暴痛[illegible]便不利如癃閉數噫恐悸少氣不足腹
痛悒悒不樂咽中閉如有息肉狀[illegible]不可俛仰 穴 蠡溝
治卒疝小腹有[illegible] 穴 照海左取右右取左立已
治卒疝小腹痛轉胞不得小便 穴 關元
治卒疝小腹腫[illegible]一寸刺臍[illegible]足厥陰經[illegible]
穴 蠡溝　兼刺陰蹻經照海二穴
左取右右取左刺之立已
治小腸氣　以毫針刺足厥陰經行間二穴
又取陽明經三里二穴刺足少陰經復溜二穴[illegible]
治小腸氣痛　灸足底中指中紋七壯立効
治一切癩[illegible]
當騎縫以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯
治陰卵大癩病　灸大敦穴隨年壯
又灸足大拇指內側去端一寸赤白肉際隨年壯雙灸之
又灸横骨兩邊二十七壯[illegible]　又灸足太陽五拾壯三報
又灸足太陰五十壯
治陰癩　灸足大指下理中十壯隨癩邊灸之[illegible]
[illegible]
治陰卵偏大癩病　灸泉陰百壯三報在横骨邊
治陰卒腫者　令並足合兩拇指以一丈之灸兩爪端方角處每爪甲各半丸七
壯愈
治卵偏大上入腹　灸三陰交隨年壯

治婦人偏大癩病　灸肩井隨年壯　又灸手中指端七壯病在右可灸左　左者灸右　又灸關元百壯　又灸玄泉百壯穀之　又灸足太陽五十壯三報之　又灸足[illegible]指端七壯病在左者灸右　左者灸右良效

治氣偏墜　[illegible]

右以[illegible]草一條[illegible]兩口角[illegible]折斷如此三[illegible]

[illegible]

[illegible]灸十四壯或二十一壯[illegible]

治疝氣

於左右足第二指下中節[illegible]灸七壯至二七壯止　艾丸不須大如麥粒而緊實[illegible]屢[illegible]不可多灸

仍不妨服藥

治腎氣外腎腫小腸氣痛　[illegible]

灸風市穴五七壯　又灸氣海穴七壯　又灸臍左右各去一寸[illegible]

穴名灸七壯灸之立效　[illegible]

灸卒癲

以藁[illegible]口如[illegible]之[illegible]大指[illegible]中[illegible]

勿使偏斜灸度頭及中央合二[illegible]

言大[illegible]　又[illegible]頂正上[illegible]　又[illegible]下向[illegible]

又[illegible]向左右[illegible]各隨年壯　又[illegible]足厥陰在左灸右

在右灸左三壯　（穴）關元　治狂啞（穴）天樞

治癲疝

治卒暴痛　右取足太陰

治癩卒痛暴痛及陰腫痛　右灸大敦男左女右三壯立已

治心痛　右灸兩足大指甲當之隙[illegible]隨年壯灸

治癩心痛發時心護[illegible]欲灸方

右灸足心[illegible]大指甲[illegible]上及大指[illegible]百壯則止[illegible]

治諸氣心腹痛小腸[illegible]痛[illegible]不可忍[illegible]

灸足大[illegible]

[illegible]

治[illegible]　[illegible]

治[illegible]

[illegible]

華佗[illegible]偏大

[illegible]　（穴）[illegible]

治[illegible]

治[illegible]　（穴）大巨

治癲[illegible]不足　（穴）[illegible]

治男[illegible]不可[illegible]　到足[illegible]大[illegible]　針足[illegible]

手足諸疾類

手痺

治手不仁　（穴）火[illegible]　治手臂小不舉　（穴）肩貞

治四肢手足腫　（穴）內庭　治四支厥[illegible]　（穴）[illegible]缺

治節痺　（穴）曲池　支溝　臑會　腕骨　肘[illegible]

治臂痿不仁　（穴）曲池　天井　外關

痺手足不仁　（穴）[illegible]

治手不舉又主手不可舉重腕急肘中痺難屈伸　（穴）曲池

治手痛　（穴）[illegible]

治臂腕外側痛不舉　（穴）陽谿

治手掌熱[illegible]　（穴）[illegible]　[illegible]　[illegible]宮　太泉

[illegible]

痺手掌[illegible]　（穴）[illegible]宮

治手[illegible]　（穴）[illegible]

治肘臂不仁　（穴）[illegible]

治痺走背胸不得息 穴魚際 治胸滿頸痛 穴浮白
治胸中痛 穴俞府
治胸痺心痛不得息痛無常處 穴臨泣
治胸痺 穴廉泉 中府
治胸脇不能轉及胸脇滿 穴膽俞
治胸脇滿不得息 穴章門 治胸脇小腹痛 穴下廉
治胸脇痛 穴大包
治兩脇急痛 穴肝俞 膽俞 志室
治脇腹急痛 穴支溝 治脇下堅痛 穴中脘 承滿
治脇痛不得息 穴竅陰 陰谷
治脇痛不得側臥胸滿喘無所出 穴肺俞 雲門
治脇痛欬逆 穴竅陰 治短氣脇痛心煩 穴尺澤 少澤
治脇下脹 穴關元 期門 少商
治脇下滿痛 穴極泉
治脇痛 穴膈俞 中膂俞 竅陰 陽谷 顱息

十一

治兩脇急痛 穴肝俞
治脇滿引小腹痛 穴胃俞 治脇下痛不得息 穴腕骨
治痰泄腹脇痛滿狂走夾脅腹痛食不化喘息不能行 穴上廉
治腹脇痛連脊手足厥冷 穴太谿
療胸脇楔背痛 穴雲門 治脇肋痛 穴三里
治胸脇痛 穴華蓋 治胸中澹病 穴束骨 灸隨年壯
治脇卒痛如打 出前後方
穴以繩橫度兩乳中間及繩從乳橫度以左痛脇下灸繩下屈
灸三十壯便愈
治兩脇引痛 穴腎俞 治胸痺 灸胸堂
治胸下滿痛膺腫 穴乳根
治胸脇痛不可忍
穴期門 灸 章門 行間 丘墟 湧泉

膈痛

療膈氣 穴承滿 乳根 療胸膈脹欬嗽氣短喉鳴 穴三里中
療膈痛 穴膈俞 療胸膈氣滿 穴商陽
療胸中膈氣聚痛好吐 穴厥陰俞灸隨年壯
療胸膈滿脹 穴臨泣 足臨泣
治膈中不利 穴隱白 巨闕
治膈中寒嘔噦寒隱隱常有水聲 穴食竇
治胸膈中氣 穴膽俞灸隨年壯 治胸膈煩滿 穴天池
治膈氣嘔吐涎沫 穴三里中 治胸膈寒痰 穴率谷
治氣噎 穴扶突 療氣鯁噎 穴天突
療噎 穴章門 治胸膈支滿噎塞 穴中庭
治食噎不下胸喘息脹 穴大鍾
治膈中氣噎 穴關衝 天突
療胸中如塞及積氣成乾噎 穴三里中
療喉塞氣不下食噎痛 穴乳根
療噎塞胸膈氣滿胸脇中氣噎 穴譩譆

十二

治五噎
五噎 穴神堂 中脘 治膈中不利 穴巨闕
黃帝問岐伯曰凡人患噎疾百味珍饌不能食者灸何穴而立得
其愈岐伯答曰夫人噎病有五般一曰氣噎二曰憂噎三曰食
噎四曰勞噎五曰思噎此皆由陰陽不和三焦隔絕津液不利故
令氣神不調成噎疾
治氣噎 灸膻中 治憂噎 灸心俞
治食噎 灸乳根 治勞噎 灸脾俞
治思噎 灸天府
治五噎黃癉醋心多睡嘔吐不止
刺任脈天突一穴在結喉下一寸宛宛中陰維任脈之會鍼入五
分留三呼得氣即瀉次鍼足少陰經通關二穴在中脘穴兩傍
同身寸之相去各五分用長鍼鍼入八分在燃鍼能進飲食右
撚鍼能和脾胃許氏云此穴一鍼四効凡下鍼後良久先脾磨
食覺鍼動爲一効次鍼破病根腹中作聲爲二効次覺流入膀

足寒熱

治風寒從足小指起脉痺上下 資生經 (穴)至陰
治足寒 (穴)胃俞 京骨 然谷　治膝上伏兎中寒 (穴)陰市
治厥足下熱 (穴)行間
治足下熱脛寒不能久立濕痺不能行 (穴)中都
治足下熱不能久立 (穴)三里 條口 承山 承筋
治足熱厥逆滿取其經血立愈 (穴)委中
治足下熱喘滿乃熱厥也 (穴)涌泉
治足下熱 (穴)至陰　治足寒熱 (穴)然谷
治手足逆冷 (穴)大都　治足寒 (穴)隱白 太衝
治足逆冷 (穴)中封　治足冷無血色 (穴)陽陵泉
治胻寒不能自溫 (穴)復溜
療足熱脛冷不能久立麻痺不仁 (穴)漏谷
史記齊北王阿母足熱而懣太倉公曰熱蹶也刺其足心各三所案之無出血病旋已病得之飲酒大醉

足雜病

治足跟痛不得履地脚疼轉筋 資生經 (穴)僕參
治脚股筋急髀樞不仁 (穴)浮郄　治髀樞股胻痛 (穴)附陽
治足指不屈伸 (穴)飛揚　治足心痛 (穴)經渠
治足腨痛 (穴)築賓　治脚腨痠 (穴)承筋
療心中煩熱脚底白肉際不得履地又治足指盡痛不得踐地
(穴)涌泉
治五指盡痛足不履地 (穴)涌泉 然谷
治足痿不能行 (穴)三陰交　治脚重不得履地 (穴)上廉
治脚重踝腫不得履地 (穴)崑崙　治足跗腫不得履地 (穴)然谷
治脛寒 (穴)中都　治風身重脛寒 (穴)絕骨 灸百壯
治脛寒 (穴)條口
治大驚脛痛冷痺膝痛不屈伸 (穴)梁丘

難經疏云足脛寒者皆是腎有病也以經冷也當以此求之
治足不能安行脛不能久立 (穴)然谷
治脛酸 (穴)湧泉 太衝　治脛痛四肢重少氣難言 (穴)至陽
治脚脛酸脚急腫痛脚筋急痛 (穴)承山 承筋
治脛痛不可屈伸 (穴)環跳 內庭
治脛痺不仁 (穴)陽關　治脛酸 (穴)至陽
治脛寒拘急不得屈伸 (穴)[illegible]
治足緩不收足經偏細 (穴)丘墟　治脛寒 (穴)復溜
治髀樞中痛不可舉 (穴)環跳 承扶 交信 陰交
治髀中痛不得行足外皮痛 (穴)風市 三陰交
乙經髀樞中痛不可舉以毫鍼寒而留之以月生死為數立已
治髀痛拘痛 (穴)丘墟
治髀樞不仁 (穴)陽輔
膝以上病宜灸環跳風市膝以下病宜灸犢鼻膝關三里陽陵泉
足踝以上病宜灸三陰交絕骨崑崙足踝以下病宜灸照海申脈

按其穴復痠灸之方効
治脛寒不得臥 (穴)厲兌 條口 三陰交
治人脚無冬夏裂 灸指頭七壯立愈

四肢病

治四肢厥逆腹脹數之 資生經 (穴)內庭　治厥逆四肢腫 (穴)章門
治四肢重痛 (穴)至陽
治四肢怠惰 (穴)膈俞
治四肢不收 (穴)極泉 日月 脾俞
治四肢不舉 (穴)支溝 小海 付陽 天池 三陰交
治偏枯四肢不舉 (穴)大泉
治四肢暴腫臂寒短氣 治四肢浮滿 (穴)三里　治腰中四肢淫濼 (穴)胃俞
療手足逆冷四肢腫 (穴)太都
療厥逆眩暈灸刺不可忘旋中大小便難四肢不收身体怠
懈腰痛 (穴)章門

主四厥手足悶　穴內庭　主手足寒至節　穴大谿

主四肢厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹皮痛者使人久持之

穴內庭　主四肢厥喜笑　穴列缺

主四肢解惰喜怒　穴營門　主四肢淫濼　穴照海

主四肢不舉　穴曲泉　附陽　天池　大巨　小海

支溝　絕骨　前谷

主著卧四肢不欲動搖　穴三里　三陽絡　三間　厲兌

天井　四肢逆冷　穴行間

治手足厥冷　穴大敦　治手足逆冷　穴大都

王氏云有人患陰證傷寒手足冷甚以火溫之亦不暖王氏與理

中湯服即得汗而愈三足自溫矣若其他手足厥者當隨證

灸之

四逆　穴大谿

治四厥脉沉絕喘嘔四厥是死法　穴間使　乳根各灸隨年壯

又病如癡手足厥作狂病治不效 [illegible] 日此驚恐憂思所得

又治傷心大恐傷腎大憂 [illegible] 則狂 [illegible]

治心怖懼 [illegible] 足不收 [illegible] 因情奪恐傷 [illegible]

治風逆四肢腫　穴復溜　豐隆　大都

治四肢寒熱腰疼不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根直

灸第十一椎上及左右各一寸五分三處各七壯

治四肢冷　穴行間　治病不出　穴然谷

治厥逆　穴內庭　至門

[illegible]

普濟方卷之四百十五